

52.8493
544
И. В. ВОЛКИНД * И. Я. ГУРЕВИЧ
О. Ю. УРЮПОВ

**рецептурный
справочник
для врачей
и фармацевтов**

52.8192

~~6159~~

В64

И. В. ВОЛКИНД, И. Я. ГУРЕВИЧ,
О. Ю. УРЮПОВ

Рецептурный
справочник
для врачей
и фармацевтов

24048 2/3



ЛЕНИНГРАД, «МЕДИЦИНА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 1976

УДК 615.015.3(031)

Волкинд И. В., Гуревич И. Я., Урюпов О. Ю. Рецептурный справочник для врачей и фармацевтов, Л., «Медицина», 1976, 648 с.

Предлагаемый справочник содержит более двух тысяч прописей, носящих имя автора или условное название. Состав и способ приготовления их известен не всем фармацевтам и врачам, так как последнее издание Фармацевтического мануала, описывающего магистральные прописи такого рода, вышло в 1949 г. Кроме того, в справочнике даны сведения о многих импортных препаратах, как сложных, так и содержащих отдельные вещества. Приведены состав, формы выпуска, лечебные свойства и показания к применению лекарств, сроки хранения и синонимы препаратов; для импортных препаратов указана страна-экспортер. Сроки годности указаны по состоянию на 1 января 1975 г. В некоторых статьях описаны способы приготовления магистральных и мануальных прописей, если их изготовление отличается какими-либо особенностями. Издание предназначено для фармацевтов, а также для врачей и студентов соответствующих вузов.

Р 50700—044 БЗ—34—4—76
039(01)—76

© Издательство «Медицина»,
Москва, 1976 г.

ХИМИЧЕСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
Библиотека № 3

ПРЕДИСЛОВИЕ

В арсенале лекарственных средств, применяемых в настоящее время в медицине, значительная доля приходится на готовые отечественные и импортные препараты. Многие из них выпускаются под условными наименованиями.

Кроме того, в аптечной и врачебной практике часто встречаются магистральные прописи, носящие условные названия или именуемые по фамилии автора или названию учреждения, предложившего их. Среди них нередки прописи, предложенные десятилетия назад, но сохранившие в определенной степени свое значение до настоящего времени. Последнее утверждение особенно справедливо для сложных прописей из растительного сырья, так как в настоящее время значительно повысился интерес к фитотерапии.

Между тем, сведения о составе многих лекарственных средств отсутствуют в доступной литературе или не систематизированы. Это существенно затрудняет или даже делает невозможным их отпуск из аптеки и тем самым ограничивает возможности врача.

Исходя из вышеизложенного, авторы поставили перед собой задачу создания пособия, в какой-то мере компенсирующего перечисленные недостатки. Настоящий справочник включает в себя свыше двух тысяч прописей и рассчитан на фармацевтов и врачей, а также на студентов соответствующих вузов. Он ни в коей мере не является пособием по фармакотерапии, поскольку о лечебных свойствах лекарств даны лишь самые общие сведения. Наша главная цель — ознакомить медицинского работника и фармацевта с составом, правилами прописывания и (в отдельных случаях) приготовления сложных лекарств, а также с некоторыми другими рецептурными сведениями.

Основную часть объема справочника составляют препараты, выпускаемые в готовом виде в нашей стране и за рубежом. Те из них, которые включены в X издание Государственной Фармакопеи, в справочник не вошли. Исключение составляют лишь лекарственные средства, одновременно получаемые из-за границы.

Кроме того, в справочник вошли сложные мануальные прописи, известные под условными наименованиями или под фамилией предложившего их автора.

Статьи помещены в алфавитном порядке русских названий. Здесь же дается латинское название и в скобках — страна-экспортер. Содержание статей составляют рациональное химическое название, состав или источник растительного сырья, сроки и условия хранения, а также указания на фармакологическую активность лекарственного средства, важнейшие показания и в некоторых случаях противопоказания к его применению. С целью облегчения ориентировки фармацевта и врача в чрезвычайно запутанной номенклатуре лекарств для многих из них приведены синонимы с указанием страны-экспортера.

Обязательной составной частью статьи является рецепт, составленный согласно транскрипции, принятой ГФ Х. Для готовых лекарственных препаратов рецепт приведен в сокращенной форме, а для магистральных прописей — в развернутой форме.

Для отдельных сложных препаратов приведены краткие указания о технологии их изготовления. Составными частями некоторых прописей являются некоторые виды сырья, редкие в современной аптеке. Эти компоненты могут быть заменены иными препаратами, близкими по физико-химическим и фармакологическим свойствам. Многие из готовых лекарств также могут быть приготовлены в аптеке, благодаря тому, что в справочнике указан их состав. Составные части препаратов при этом перечислены по возможности в принятой в нашей стране номенклатуре.

Ряд мануальных и официальных прописей приведен в нескольких вариантах, что позволяет врачу выбрать наиболее подходящий из них в каждом конкретном случае.

В конце справочника помещены русский и латинский предметные указатели.

Авторы надеются, что материалы, помещенные в справочнике, будут способствовать повышению качества и расширению ассортиментаготавливаемых в аптеках лекарств.

Абехол — Abehol (СФРЮ)
1-(*o*-хлорфенил)-1-фенил-3-ди-
метиламинопропан-1-ола гидро-
хлорид

Синонимы: Clofedanohydrochlorid, Tossilamina

Выпускается в таблетках по 0,02

Хранение — список Б

Срок годности — 1 год

Rp.: Tabul. «Abehol» 0,02

D. t. d. N. 20

S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Противокашлевое средство.
Применяется при различных
заболеваниях дыхательных путей,
главным образом инфекционной
этиологии

Абизин — Abicinium
Purginat (ГДР)
Сумма вторичных гликозидов
(дигитанидов А, В и С) из листьев
наперстянки шерстистой (*Digitalis lanata*)

Активность 16 000 ЛЕД в 1 г
Выпускается в таблетках по 0,00025 и в ампулах по 1 мл 0,02% раствора

Хранение — список А

Срок годности — 3 года

Rp.: Abicini 0,00025

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Abicini 0,02% 1,0

D. t. d. N. 5 in amp.

S. По 0,5—1,0 мл в вену медленно, предварительно разведя в 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида

Кардиотоническое средство.
Применяют при сердечной не-
достаточности, фибрилляции пред-
сердий, тахикардии и т. д. По
скорости наступления, силе и
длительности эффекта, а также
по кумулятивным свойствам бли-
зок к дигоксину. Нельзя приме-
нять при коронарной болезни,
склерозе венечных сосудов, па-
роксизмальной желудочковой та-
хикардии, эндокардите, активном
ревмокардите

Абомин — Abominum
Содержит сумму протеолитиче-
ских ферментов желудочно-ки-
шечного тракта

Получают абомин из сычужов
телят и ягнят молочного возраста

Выпускают в таблетках по 0,2
(50 000 ЕД)

Хранение — в сухом защищен-
ном от света месте

Срок годности — 2 года

Rp.: Abomini 0,2

D. t. d. N. 30 in tabul.

S. По 1 таблетке 3 раза в день (во время еды).

Курс лечения — 1—2 месяца

Ферментный препарат.
Применяют при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, со-
провождающихся нарушением пе-
рваривающей способности и по-
нижением кислотности желудоч-
ного сока (гастрит, гастрознте-
рит, энтероколит и др.).

Авербаха капли глазные —
Guttae ophthalmicae Averbachi

Антисептическое, противовос-
палительное и местноанестезирую-
щее средство.

Применяется при конъюнктивитах и травмах конъюнктивы и роговицы

Rp.: Dicaini 0,05
Acidi borici 0,2
Solutionis Zinci
sulfatis 0,25% 10,0
Solutionis Adrenalini
hydrochloridi 0,1% gttis X
MDS. По 1—2 капли 2 раза в день в глаз

Авиомарин — Aviomarin (ПНР)
N, N-диметил-2-(дифенилметокси)-этиламина 8-хлортеофиллинат

По составу и применению почти аналогичен отечественному димедролу

Синонимы: Amalmare, Amosyt, Anausin, Anautin, Andramine, Antivomit, Bontourist, Chloranautine, Daedalon (ВНР), Diamarin, Dimenhydrinat, Dramamin, Dramarin, Dramyl, Emedyl, Epha, Faston, Fridophenum, Gravol, Lomarin, Medramin, Menhydrinate, Neode-vomit, Neo-Navigan, Neptusan, Novamin(a) Permital, Prosamine, Removine, Sedovestul, Solbrin, Suprimal, Teodramin, Travamine, Travelin, Travelmin, Vertirosan, Vomex A, Vomidrine, Voyal, Xatamina

Выпускается в таблетках по 0,05

Хранение — список Б

Rp.: Tabul. «Aviomarin» 0,05
D. t. d. N. 10
S. По 1—2 таблетки за 30 мин до путешествия (не более 6 таблеток в сутки)

Ависан — Avisanum

Суммарный препарат из плодов растения амми зубная (Ammi Visnaga L.)

Действующие вещества — фуранохромоны, по действию близ-

спазмолитическое средство, действующее довольно избирательно на мочевыводящие пути.

Применяют главным образом при почечной колике, циститах, а также для облегчения катете-

кие к келлину

Хранение — в сухом защищенном от света месте

Срок годности таблеток, покрытых оболочкой, — 4 года

ризации мочеточников

Rp.: Avisani 0,05

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 1 таблетке 3—4 раза в день после еды

Адебит — Adebit (ВНР)

1-Бутил-бигуанида гидрохлорид

Синонимы: Buformin, Silubilin (ФРГ)

Формы выпуска: таблетки по 0,05

Хранение — список Б

Срок годности — 5 лет

Антидиабетическое средство.

Применяют самостоятельно или в комбинации с сульфаниламидными антидиабетическими средствами в тех случаях, когда выработка эндогенного инсулина еще не прекратилась, преимущественно в пожилом возрасте

Rp.: «Adebit» 0,05

D. t. d. N. 40 in tabul.

S. Дозировки строго индивидуальны в зависимости от тяжести заболевания

Адельфан — Adelphan (Швейцария)

Состав на 1 таблетку:

Reserpinі 0,0001

Neprəsoli 0,01

Хранение — список Б

Срок годности — 3 года

Симпатолитическое и седативное средство.

Применяют главным образом при гипертонической болезни I—II стадии, повышенной возбудимости, базедовой болезни, психических заболеваниях с явлениями возбуждения.

Примечание: непрессол близок по составу и действию к отечественному апрессину

Rp.: Tabul. «Adelphan» N. 50

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день с постепенным увеличением до 2—3 таблеток 3 раза в день, а в исключительных случаях до 4 таблеток 3 раза в день

Адимицин — Adimycin (СФРЮ)

Состав на 1 таблетку:

Oxytetracyclini

Erythromycinі aa 0,125

Хранение — список Б

Срок годности — 2 года

Комбинированный препарат антибиотиков.

Применяют при заболеваниях, вызванных микроорганизмами, устойчивыми к антибиотикам узкого спектра действия, особенно стафилококками, а также при сальмонеллезах, дизентерии, риккетсиозах и др.

Примечание: по составу и действию близок к отечественному олететрину и к макроцилину (ПНР)

Rp.: Tabul. «Adimycin» N. 24
DS. По 2—4 таблетки через 6 ч

Адипат — Adipatum

Rp.: Lanolini 35,0
Vasellini 53,0
Paraffini 7,0
Aquae destillatae 5,0
U. f. unguentum
DS. Наружное.
Применяется самостоятельно или как основа для мазей

Адиптин — Adiptinum

Применяется как основа для косметических кремов

Rp.: Cerae albae 20,0
Paraffini 80,0
Olei Amygdalarum 400,0
Lanolini anhydrici 250,0
Aquae Rosae 150,0
Aquae Amygdalarum 20,0
Tincturae Benzoës 4,0
M. f. unguentum
DS. Наружное. Индифферентная мазь

Приготовление: смешивают воск, парафин, ланолин, растапливают и к полуохлажденной массе при помешивании прибавляют миндальное масло, розовую и лавровишневую воду и настойку росного ладана

Адоль — Adol

Кератолитическое средство.
Применение: ежевечерне наносят на распаренные в горячей воде мозоли в течение 3—5 дней, после чего мозоли удаляют оперативным путем

Rp.: Acidi salicylici 2,0
Aetheris aethylici 4,0
Collodii 16,0
Olei Terebinthinae 1,0
Chlorophylli ad colorem 0,01
MDS. Наружное. Для смазывания мозолей

Адонис-бром — Adonis-Brom
Состав на 1 драже (таблетку):
Extracti Adonidis sicci
Kalii bromidi $\bar{a}\bar{a}$ 0,25
Хранение — в сухом защищенном от света месте
Срок годности — 2 года

Успокаивающее средство.
Применяют при неврастении и психостении, связанных со слабостью тормозных процессов, бессоннице, а также при хронической недостаточности сердечной деятельности

Rp.: Tabul. «Adonis-brom» N. 20
DS. По 1 таблетке 3 раза в день после еды

Адорин — Adorin

Дезинфицирующее, подсушивающее и дезодорирующее средство.

Применение: присыпка от потливости ног

Rp.: Acidi salicylici 6,0
Paraformaldehydi 5,0
Amyli 20,0
Talci 174,0
M. f. aspersio
DS. Присыпка

Адофен — Adophenum
Состав на 1 таблетку:
Codeini phosphatis 0,015
Coffeini-natrii benzoatis 0,05
Phenacetini
Analgini
Amidopyridini $\bar{a}\bar{a}$ 0,2
Хранение — список Б,
в защищенном от света месте
Срок годности — 4 года

Противовоспалительное и анальгетическое средство.

Применяют при болях различного происхождения (головная боль, невралгии, миозиты, полиневрит, артриты, артрозы и др.)

Rp.: Tabul. «Adophenum» N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Адроксон — Adroxonum
1-Метил-3-окси-2,3-дигидроиндол-5,6-хинона семикарбазон
Синонимы: Adrenosem, Adrenoxyl, Carbazochrome, Sangostasin
Выпускают в ампулах по 1 мл 0,075% раствора
Хранение — список Б
Срок годности — 2 года

Гемостатическое средство.

Применяют для остановки паренхиматозных и капиллярных кровотечений при травмах, операциях; для профилактики послеоперационных кровотечений, для остановки желудочного или кишечного кровотечения. При массивных артериальных кровотечениях препарат неэффективен. Возможно местное применение по 1—2 мл на марлевом тампоне.

Rp.: Solut. Adroxoni 0,075% 1 ml¹

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Внутримышечно или под кожу 1—4 раза непосредственно до, во время или после операции

Аевит — Aevitum

Масляный раствор, содержащий в 1 мл ретинола ацетата 35 мг (около 100 000 ИЕ) и α -токоферола ацетата — 100 мг

Выпускается в ампулах по 1 мл
Хранение при температуре 5—10°

Срок годности — 2 года

Комплекс витаминов А и Е. Применяют с лечебной целью при атеросклеротических изменениях сосудов, главным образом при облитерирующем эндартерите.

Курс лечения — от 20 до 40 дней, повторение курса — через 3—6 мес.

Rp.: Sol. Aeviti oleosae 1 ml¹

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 1 мл 1 раз в день внутримышечно

Азаурацил — Asauracil (ЧССР)

1,2,4-триазин-3,5-диол

Выпускается в ампулах по 2 и 4 мл 12,5% масляной суспензии

Хранение — список А, в защищенном от света месте

Цитостатический препарат.

Применяется как вспомогательное средство для лечения злокачественных опухолей, гематобластозов, лимфогранулематоза. Назначают по 10—15 мг на кг веса тела больного

Rp.: Suspensionis «Asauracil»

12,5% 2(4) ml

D. t. d. N. 20 in ampul.

S. По назначению врача

Аймалин — Ajmalinum

3-Этил-4, 13-диоксн-12-метил-1, 2, 3, 4, 6, 7, 12а, 12b-октагидро-12Н-7а, 2, 6-этинилидениндола-2,3,-а) хинолизин гидрохлорид

Синонимы: Aritmin, Argymal, Cartagin, Gilurytmal (ФРГ), Rauwolfiin, Tachmalin

Выпускается в ампулах в виде 2,5% раствора по 2 мл

Хранение — список Б

Противоаритмическое средство. Применяется при пароксизмальной тахикардии, эктопической аритмии, желудочковой тахикардии в сочетании с инфарктом миокарда, при передозировке препаратов наперстянки

Rp.: Sol. Ajmalini 2,5% 2,0

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Внутримышечно (глубоко в мышцу) по 1—3—4 ампулы в сутки. Внутривенно — только при точно установленных пароксизмальных тахикардиях. При не поддающихся терапии тахикардиях вследствие инфаркта миокарда назначают длительные капельные вливания

Аклиман — Akliman (ЧССР)
Состав на 1 таблетку (драже):
Radobelini 0,0001
Ergotamini tartratis 0,0002
Phenobarbitali 0,01
Bromisovalii
Theobromini aa 0,05

Хранение — список Б, в прохладном защищенном от света месте

Срок годности — 3 года

Седативное средство.
Применяют при нейровегетативных расстройствах, неврозах и в климактерическом периоде

Rp.: Dragee «Akliman»
D. t. d. N. 30
S. По 1 драже 3 раза в день

Акостезин — Acosthesinum
Состав на 1 таблетку:
Anaesthesini 0,2
Amidopyrini 0,3
Coffeini-natrii benzoatis 0,01
Хранение — список Б

Местно анестезирующее, противовоспалительное и анальгетическое средство.

Применяют при головной боли, при болях в желудке и т. п.

Rp.: Tabul. «Acosthesinum» N. 10
DS. По таблетке 2—3 раза в день

Акофин — Acofinum
Состав на 1 таблетку:
Acidi acetylsalicylicii 0,25
Coffeini 0,05
Срок годности — 4 года
Дополнительный срок годности после переконтроля — 1 год

Противовоспалительное, жаропонижающее и анальгетическое средство.

Применяют при головной боли, невралгиях, лихорадочном состоянии и др.

Rp.: Tabul. «Acofinum» N. 10
S. По таблетке 2—3 раза в день

Аксеромальт — Aheromaltum
Препарат, содержащий высушенную эмульсию масляного раствора ацетата ретинола (или рыбьего жира) в солодковом экстракте.
Хранение — в сухом, защищенном от света месте.
Срок годности — 6 мес.
Дополнительный срок годности после переконтроля — 6 мес.

Витаминный препарат.

Применяют при авитаминозе А (гемералопния), а также в дерматологии при избыточном ороговении, в педиатрии при вяло текущих инфекциях дыхательных путей и заболеваниях пищеварительного тракта.

Rp.: Axeromalti 0,25
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1—4 таблетки в день для профилактики

Ахсянцева порошки —
Pulveres Axiancevi

Снотворное и анальгетическое средство.
Применяют при бессоннице, невралгиях, спазмах гладкомышечных органов

Rp.: Extracti Belladonnae
Codeini phosphatis $\bar{a}\bar{a}$ 0,015
Phenobarbitali 0,05
Acidi acetylsalicylici 0,25
M. f. pulv.
D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку на ночь за $\frac{1}{2}$ ч до сна, запивая горячей водой

Алгена — Algena (ЧССР)
Состав на 1 таблетку:
Amidopyrini 0,3
Phenacetini 0,15
Coffeini
Diali $\bar{a}\bar{a}$ 0,05
Хранение — список Б
Срок годности — 8 лет

Анальгетическое средство.
Применяют при головной и зубной боли, при послеоперационных болях, невралгиях, в менструальном периоде при альгодисменорее

Rp.: Tabul. «Algena» N. 10
DS. По $\frac{1}{2}$ —1 таблетке 1—3 раза в день

Алептин — Aleptin

Индифферентная мазевая основа

Rp.: Cetacei 15,0
Cerae albae 11,0
Olei Amygdalarum 60,0
Lanolini anhydrici 20,0
Balsami peruviani aut
Balsami Schostakovsky (Vinylini)
Spiritus aethylici 95% $\bar{a}\bar{a}$ 1,0
Sol. Gelatinae 10% 20,0
M. f. ung.
DS. Наружное

Приготовление: спермацет, воск, ланолин сплавляют и при помешивании прибавляют миндальное масло, смесь спирта и бальзама, а затем 10% водный раствор желатина

**Алибура жидкость —
Liquor Aliburi**

Антисептическое и противовоспалительное средство.

Применяют для лечения сикоза, гнойничков кожи

Rp.: Cupri sulfatis 1,0
Zinci sulfatis 0,4
Spiritus camphorati 3,0
Aquae destillatae 300,0

MDS. Наружное. Предварительно обмыть этим составом пораженные места, потом намочить чистую марлю, положить в виде примочки

Алиодан — Aliodan (БНР)

Йодэтиловый эфир аллофановой кислоты

Хранение — в защищенном от света месте

Йодсодержащее средство.

Применяют при атеросклерозе, гипертонической болезни, при параличе, энцефалите, отравлении свинцом, при зобе и др.

Rp.: Tabul. «Aliodan» 0,25 N. 20

DS. По 1—2 таблетки 3—4 раза в день после еды

Аллацил — Allacilum

1-Аллил-3-этил-6-аминоурацил
Синонимы: Aminometradin(e), Aminometramide, Catapyrin, Katarpyrin, Metravigor, Mictine, Min-card.

Выпускается в таблетках по 0,2
Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Мочегонное средство.

Применяют для лечения больных с отеками вследствие сердечно-сосудистой недостаточности, при циррозах печени (преимущественно средней тяжести) и т. д. Сравнительно мало эффективен, но не вызывает сдвигов ионного баланса

Rp.: Allacili 0,2

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 1—4 таблетки в день

**Аллергастмин — Allergastmin
(ПНР)**

Состав на 1 таблетку:

Anaiergini 0,025

Ephedrini hydrochloridi 0,012

Theophyllini 0,12

Phenobarbitali 0,008

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Антигистаминное и бронхолитическое средство.

Применяют при эмфиземе легких, бронхиальной астме, аллергических состояниях и др.

Rp.: Tabul. «Allergastmin» N. 20

DS. По 1 таблетке 3 раза в день

Аллилглицер — Allilglycerum
Спиртовое извлечение лука репчатого, смешанного с равным количеством глицерина. Содержит фитонциды.

Хранение — в защищенном от света месте.

Срок годности — 1 год

Противопротозойное и противомикробное антисептическое средство.

Применение: для лечения трихомонадного кольпита марлевый тампон вводят во влагалище на 6—12 ч ежедневно в течение 20—25 дней. Спринцевание в процессе лечения, а также назначение процедур при менструации противопоказано

Rp.: Allilglyceri 100,0

— DS. Наружное. Применение только по указанию врача

Аллилат — Allilsatum
Спиртовая вытяжка лукович чеснока (*Allium sativum* L.). Действующее вещество — фитонцид аллацин

Срок годности — 3 года

Противомикробное средство. Применяется при гнилостных и бродильных процессах в желудке и кишечнике. Есть указания на активность при атеросклерозе и сердечной астме. Противопоказание: заболевание почек

Rp.: Allilsati 50,0

DS. По 10—15 капель в $\frac{1}{2}$ стакана молока 2—3 раза в день

Аллилцеп — Allilcerum
Спиртовая вытяжка из репчатого лука (*Allium sera* L.). Действующие вещества — фитонциды

Срок годности — 1 год

Антимикробное средство. Стимулирует моторику пищеварительного тракта.

Применяют при поносах и атонии кишечника. Есть сведения об эффективности при атеросклерозе. Курс лечения — 3—4 недели

Rp.: Allilceri 20,0

DS. По 20—30 капель 3 раза в день

Аллохол — Allocholium
Состав на 1 таблетку:
Choles medicatae siccae 0,08
Extracti Allii sativi 0,04
Carbonis activati 0,025
Extracti Urticae sicci 0,005

Желчегонное средство (холеретик).

Применяют при хронических холециститах, холецистогепатитах и холангитах. Оказывает легкое послабляющее действие

Rp.: Allocholi

D. t. d. N. 50 in tabul.

S. По 2 таблетки 3 раза в день после еды

Алмагель — Almagel (НРБ)

Комбинированный препарат, содержащий 95% геля гидрата окиси алюминия и 2% окиси магния, а также D-сорбит

Алмагель-А содержит дополнительно 2% анестезина

Выпускается во флаконах по 170 мл

Хранение — в прохладном месте

Срок годности — 5 лет

Антацидное, адсорбирующее и обволакивающее средство.

Применяется для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гиперацидного гастрита

Rp.: «Almagel» (aut «Almagel-A») 170,0

DS. По 1 чайной ложке 4 раза в день за полчаса до еды

Алсол — Alsol

Приготовление: винную кислоту растворяют в свежеприготовленной буровой жидкости и упаривают на водяной бане до образования солевой пленки, а затем сушат при +30° на стеклянной пластинке до получения сухого винноуксусного алюминия

Вяжущее, противовоспалительное и антисептическое средство.

6% раствор используют для примочек и полоскания, 5% — для перевязок

Rp.: Acidi tartarici 3,5
Liquoris Burovi 100,0
MDS. Наружное

Алупент — Alupent (СФРЮ)

1-(3,5-Диоксифенил)-2-изопропиламиноэтанола сульфат

Синонимы: Metaproterenolsulfat, Novasmasol, Orciprenalinsulfat

Выпускается в таблетках по 0,02, в ампулах по 1 мл 0,05% раствора и во флаконах по 20 мл 2% раствора для ингаляций

Хранение — список Б

Срок годности: таблетки — 5 лет, аэрозоль — 3 года

Бронхолитическое средство (β-адреномиметик).

Применяется для лечения бронхиальной астмы и других заболеваний, сопровождающихся затруднением легочного дыхания, а также для лечения атрио-вентрикулярной блокады различного происхождения, синдрома Морганьи — Эдемса—Стокса и др. (см. также «Изадрин»)

Rp.: «Alupent» 0,02
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1/2—1 таблетке 3—4 раза в день

Rp.: Sol. «Alupent» 0,05% 1,0
DS. По 1 мл под кожу, в мышцу или в вену (медленно) для купирования приступов бронхиальной астмы

Rp.: Sol. «Alupent» 2% 20,0
DS. Ингаляции при бронхиальной астме (10—15
вдыханий)

Альба — Alba

Кератолитический и антисептический препарат.
Применяется как косметическое средство

Rp.: Axungiae porcinae 100,0
Acidi salicylici 5,0
Phenilii salicylatis 0,75
Camphorae 1,5
M. f. ung.
DS. Наружное

Альбумин плацентарный — Albuminum placentae

Биологический препарат, белковая фракция плацентарной крови. Выпускается во флаконах по 50, 40 и 200 мл 5, 10 и 20% раствора

Хранение — в сухом прохладном месте (от +2 до +10°)
Срок годности — 2 года

Кровезаменитель.
Применяется при кровопотере, гипопротейнемии и сгущении крови различного происхождения (травматический шок, алиментарная дистрофия, нефрозы, цирроз печени и т. п.). Противопоказан при внутренних кровотечениях, тромбозах, гипертонии

Rp.: Sol. Albumini placentae
5% (10% aut 20%) 40,0
(50,0 aut 200,0)
DS. Внутривенно капельно по 40—60 капель в минуту

Альдомет — Aldomet (СФРЮ)
1,3-(3,4-диоксифенил)-2-метилаланин

Синонимы: Aldometil, Aldomin, Doramet, Нупергах, α -Methyl-Dopa, Methyldopa, Presinol, Presolin, Sembina

Выпускается в таблетках по 0,25

Хранение — список Б
Срок годности — 3 года,
НРБ — 5 лет

Симпатолитик.

Применяется при гипертонической болезни, преимущественно в случаях средней тяжести. Переносится хорошо. Назначают также в сочетании с диуретиками

Rp.: Tabul. «Aldomet» 0,25
D. t. d. N. 25
S. По 1 таблетке 3 раза в день, доводя до 8 таблеток в день, по достижении эффекта дозу уменьшать

Альфадрил — *Alfadryl* (ЧССР)
N, N-диметил-2-(1,1-дифенил-этокси)-этиламина гидрохлорид
Синонимы: *Mefenhydraminhydrochlorid*, *Mephenhydramin*, α -*Methyldiphenhydraminhydrochlorid*, *Moxastinhydrochlorid*

Выпускается в драже по 0,05
Хранение — список Б
Срок годности — 3 года

Антигистаминное средство.
Применяют при крапивнице, в том числе после приема лекарств, при бронхиальной астме, отеках Квинке, сенной лихорадке, вазомоторном насморке, зуде, перемежающейся хромоте и др.

Rp.: *Dragee «Alfadryl» 0,05*
D. t. d. N. 20
S. По 1 драже 3 раза в день

Амазол — *Amazolum*
Состав на одну таблетку:
Amidopyridini 0,3
Dibazoli 0,02

Хранение — список Б
Срок годности — 1 год

Анальгетическое и спазмолитическое средство.

Применяют при головной боли, а также при гипертонической болезни, невралгиях, болях, связанных со спазмом внутренних органов

Rp.: *Tabul. «Amazolum» N. 10*
DS. По 1 таблетке 3 раза в день

Амбен — *Ambenim*
пара-(Аминометил)-бензойная кислота
Синонимы: *Acidum aminomethylbenzoicum*, *Gumbix*, *Pamba* (ГДР), *Styptopur*

Выпускается в ампулах по 5 мл 1% раствора и в таблетках по 0,25

В детской практике назначают в виде сиропа (1,0 препарата, 30,0 сахарного сиропа и воды дистиллированной до 100 мл)

По 1—2 чайные ложки 2—4 раза в день

Хранение — в прохладном месте

Антифибринолитическое средство

Применяется для остановки кровотечений, связанных с патологически усиленным фибринолизом

Rp.: *Sol. Ambeni 1%—5 ml*
D. t. d. N. 3
S. Внутривенно 5—10 мл 1% раствора
Rp.: *Ambeni 0,25*
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1 таблетке 2—4 раза в день

ХИМИЧЕСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
библиотека № 3

84052

Амбосекс — Ambosex (ВНР)
Состав на 1 таблетку:
Aethinyloestradioli 0,000004
Methyltestosteroni 0,004
Срок годности — 1 год 6 мес.
Состав на 1 ампулу:
Oestradioli benzoatis 0,001
Oestradioli phenylpropionatis 0,004
Testosteroni propionatis 0,02
Testosteroni phenylpropionatis
Testosteroni isocaproatis aa 0,04
Olei Persicorum ad 1 ml
Выпускается в таблетках и ампулах по 1 ml масляного раствора
Хранение — в защищенном от света месте
Срок годности ампул — 2 года

Комбинированный гормональный препарат, содержащий женский половой гормон яичника и мужской половой гормон. Применяется при соматических нарушениях (аллергические проявления, нарушения кровообращения), связанных с климаксом или сопутствующих менструациям, а также при остеопорозе старческого возраста у женщин, синдроме Кушинга, грудной жабе, мужском климаксе и болезни Рейно

Rp.: Tabul. «Ambosex» N. 20
DS. По 1 таблетке 3 раза в день (под язык)
Rp.: Sol. «Ambosex» 1 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. Внутримышечно (глубоко)
1 раз в месяц.
При лечении остеопороза вводят 2 ампулы или 1 ампулу в 2 недели

Амедин — Amedinum
β-Диметиламинового эфира фенилциклогексилгликолевой кислоты гидрохлорид
Хранение — список Б, в защищенном от света месте
Срок годности — 1 год

Центральный холинолитик («малый» транквилизатор).
Применяется при паркинсонизме, неврозах, для снятия чувства страха и напряженности и т. п. (см. «Амизил»)

Rp.: Amedini 0,0015 (0,003)
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке 1—2 раза в день, с постепенным увеличением дозы до 3—5 таблеток в день

Амизил — Amizylum
2-Диэтиламиноэтилового эфира бензиловой кислоты гидрохлорид
Синонимы: Actozine, Amicil, Amikon, Amitacon, Arcadin, Beatilina, Benactina, Benactizan, Benactizin, Benactone, Benactyzinhydrochlorid, Benetranc, Cafron, Cedad, Cevanol, Diazil, Ester 22,

Центральный холинолитик («малый» транквилизатор).
Применяют при астенических и невротических реакциях, депрессии, паркинсонизме, экстрапиримидном синдроме после применения нейролептиков, при подготовке к операции, для усиления эффекта анальгетиков и снотвор-

Fobex, Fortran, Ibiotzil, Кармазине, Lucidil, Megasedan, Nervac-ton, Nervatil, Neurobenzile, Neuroleptone, Nutinal, Parasan, Paratil, Parpon, Phobex, Procalm, Savitil, Sedansina, Stoikon, Sua-vitil, Svavitil, Tranquillactin, Tranquilline, Valladan

Выпускается в порошке, таблетках по 0,001 и в ампулах по 1 мл 0,25% раствора

Хранение — список А, в сухом и прохладном месте

Срок годности таблеток — 4 года

Rp.: Amizyli 0,001

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Sol. Amyzili 0,25% 1 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 1 мл подкожно

Амизол — Amizol

2-3-Диметил-5-оксо-1-фенил-3-пиразолин-4-ил-аминометансульфоновая кислота

Синонимы: Melaminsulfon, Melubrin, Pyrazogin, Sulfamidopyr-ginnatrium, Sulfamidopyrine, Sulph-amidopyrin-Natrium.

Выпускается в таблетках по 0,25

Хранение — список Б

Срок годности — 2 года

Rp.: Amizoli 0,25

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 1 таблетке 3 раза в день

ных, для кратковременного расширения зрачка (местно) и т. п.

Анальгетическое, жаропонижающее и противовоспалительное средство.

Применяется при лихорадке, миозитах, невритах, невралгиях, артритах, ревматизме, головной и зубной боли и пр.

Аминазин — Aminazinum

2-хлор-10-(3-диметиламинопропил)-фенотиазина гидрохлорид

Синонимы: Ampliactil, Ampli-cetil, Chlorderazin, Chlorpromazin, Chlorpromazinhydrochlorid, Clor-delazin, Cloropromazina, Conto-min, Elmarine, Fenactil, Hebanil, Hibanil, Hibernat, Klorpromazin, Largactil, Largaktyl, Megaphen, Neuroplex, Neuroprom, Neuroti-azina, Novapromazin, Novomazi-na, Phenathyl, Plegomazin, Pra-

Нейролептическое средство. Обладает адрено- и холинолитическими свойствами.

Применяют при острых и хронических психических заболеваниях с синдромом возбуждения, при повышенном мышечном тоне, для усиления эффекта наркотиков, снотворных, анальгетиков, миорелаксантов и противосудорожных средств, при интоксикационной рвоте, для ввода в искусственную гипотермию и пр.

zil, Promactil, Promazil, Proparphen, Proparphenin, Prozil, Prozin, Psicarmon, Psychial, Sanopron, Thorazene, Thorazine, Tozazina, Umelargil, Wintermin

Выпускается в таблетках по 0,025, ампулах по 5 мл 0,5% и по 2 мл 2,5% раствора

Срок годности драже — 5 лет, после переконтроля — 2 года

Срок годности раствора 2,5% — 2 года, после переконтроля — 6 мес.

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Осложнения: ортостатический коллапс, экстрапиримидный синдром, аллергические явления, поражение печени, депрессия

Rp.: Aminazini 0,025

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 1 таблетке 3 раза в день после еды

Rp.: Sol. Aminazini 0,5% 5 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Для внутримышечного введения по 5 мл, предварительно разведя равным количеством 0,5% раствора новоканна

Rp.: Sol. Aminasini 2,5% 2 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Для внутривенного введения (вместе с 10—20 мл 20—40% раствора глюкозы)

Аминоакрихин — *Aminoacrichinum*

Дигидрохлорид-2-метокси-6-хлор-7-амино-9-(4-диэтиламино-1-метил-бутиламино)-акридина

Выпускается в порошке и таблетках по 0,1 и 0,3

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Противопротозойное и противоглистное средство.

Применяют для лечения инвазии карликовым цепнем, трихомоноза (внутрь и местно)

Rp.: Aminoacrichini 0,1 (0,3)

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 0,3—0,4 утром натощак

Аминокровин — *Aminocrovinum*

Прозрачный раствор, готовится путем кислотного гидролиза белков из сгустков гомогенной крови и эритроцитарной массы после слива сыворотки

Выпускается во флаконах по 250, 300 и 500 мл

Хранение — в сухом, защищенном от света месте

Срок годности — 3 года

Плазмозаменитель.

Применяется для лечения гипотензии различного происхождения в случаях, где показано переливание сыворотки или плазмы крови

Rp.: Sol. Aminocrovini 250—500 ml.

D. t. d. N. 1

S. Вводить под кожу, внутримышечно и внутривенно (в подогретом до t° тела виде) капельным способом, начиная с 20 капель в минуту с постепенным увеличением до 40—60 капель

Аминопептид — Aminopeptidum
Ферментный гидролизат белков крови крупного рогатого скота, содержащий все незаменимые аминокислоты и лишенный анафилактических свойств

Выпускается в ампулах по 250 мл и во флаконах по 250, 300 и 500 мл

Хранение — в прохладном и защищенном от света месте

Срок годности — 3 года

Дополнительный срок годности после переконтроля — 6 мес.

Плазмозаменитель.

Применяется для поддержания белкового равновесия в организме

Rp.: Aminopeptidi 250 ml.

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Вводить под кожу, внутримышечно и внутривенно по 1—2 л в сутки капельным способом, начиная с 10—20 капель в минуту и постепенно увеличивая до 50—60 капель в минуту

Аминофиллин сложный — Aminophyllin compositum (ПНР)

Состав на 1 таблетку:

Euphyllini 0,1

Phenobarbitali 0,02

Paraverini hydrochloridi 0,03

Atropini methylnitratis 0,001

Nitroglycerini 0,0005

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Сосудорасширяющее и спазмолитическое средство.

Применяют при бронхитах, бронхиальной астме, пневмоклерозе, спазмах полых органов, начальной стадии гипертонической болезни, стенокардии и пр.

Rp.: Tabul. «Aminophyllin compositum» N. 20

DS. По 1—2 таблетки 3 раза в день

Аминохинол — Aminochinolum

7-Хлор-4-диэтиламино-изоэтиламино-2-(2'-хлорстирил)-хинолина трифосфат

Выпускается в таблетках 0,025, 0,05; 0,1 и 0,15

Противопротозойное средство.

Применяют для лечения лямблиоза, красной волчанки и кожного лейшманиоза

Хранение — список Б
Срок годности — 4 года
Дополнительный срок годности после переконтроля — 1 год

Rp.: Aminochinoli (0,025; 0,05; 0,1; 0,15)
D. t. d. N. 15 in tabul.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Амитесал — Amitesalum

Состав на 1 таблетку:
Theobromini 0,15
Amidopyrini 0,3
Phenobarbitali
Salsolini hydrochloridi $\bar{a}\bar{a}$ 0,03
Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Спазмолитическое и гипотензивное средство.

Применяют при спазмах полых органов, начальной стадии гипертонической болезни, спазмах периферических сосудов, при коронарной недостаточности, отеках сердечного происхождения

Rp.: Tabul. «Amitesalum» N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Амифен — Amiphen

Состав на одно драже:
Theobromini
Hiposteroli $\bar{a}\bar{a}$ 0,1
Rutini 0,0075
Magnesii stearatis 0,025
Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Спазмолитическое и гипотензивное средство.

Применяют при гиперхолестеринемии, коронарной болезни, гипертонической болезни, спазмах периферических сосудов и бронхов.

Примечание: гипостерол — гипохолестеринемическое средство, близкое к цетамифену

Rp.: Dragee «Amiphen»
D. t. d. N. 20
S. По 2 драже 3 раза в день

Аммифуриин — Ammifurinum

Смесь двух фурукумаринов: изопимпинеллина и бергаптена, выделенных из семян амми большой (*Ammi majus* L.)

Выпускается в таблетках по 0,02

Хранение — список Б, в темном и прохладном месте

Срок годности — 1 год

Фотосенсибилизирующее средство. Препарат стимулирует синтез пигмента меланина в коже при облучении ультрафиолетовыми лучами.

Применяется для лечения витилиго и гнездовой плешивости вместе с ультрафиолетовым облучением

Rp.: Ammifurini 0,02
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке 1 раз в день за 1—4 ч до облучения

Аммония каприлат — Ammonii caprilas

Каприловой кислоты аммонийная соль

Хранение — список Б

Противогрибковое средство.

Применяется наружно для профилактики и лечения кандидозных поражений кожи и слизистых, в том числе при осложнениях антибиотикотерапии

Rp.: Sol. Ammonii caprilatis
1% (2%) 250,0

DS. Для полоскания рта

Rp.: Ung. Ammonii caprilatis
1% (5%) 50,0

DS. Для смазывания очагов поражения

Аммония хлорид — Ammonii chloridum

Синоним: Acidamon (ПНР)

Выпускается в таблетках по 0,5

Хранение — в сухом месте

Срок годности неограничен

Отхаркивающее средство, кислотообразующий диуретик.

Применяют при заболеваниях верхних дыхательных путей, сопровождающихся сухим кашлем, а также для подкисления мочи и усиления действия рутных диуретиков

Rp.: Tabul. «Acidamon» 0,5 (Ammonii chloridi 0,5)

D. t. d. N. 10

S. По 2—4 таблетки 2—3 раза в день

Аммурон шипучий — Ammuron effervescens

Приготовление: смешивают карбонат лития, хлорид и фосфат натрия, отдельно смешивают лимонную и винно-каменную кислоту. Затем к первой смеси прибавляют сначала хлорид аммония и гидрокарбонат натрия, а потом смесь кислот. Готовый порошок просеивают и сушат при +35°

Препарат способствует выведению мочевой кислоты из организма за счет образования легко растворимого урата лития, а также вследствие изменения кислотно-щелочного равновесия организма.

Применяется при подагре

Rp.: Lithii carbonatis 1,0

Natrii chloridi

Natrii phosphatis

Acidi tartarici aa 40,0

Acidi citrici 280,0

Ammonii chloridi 80,0

Natrii hydrocarbonatis 386,0

M. f. pulv.

DS. По 1 чайной ложке на стакан воды на прием

Аналептин-Спофа — Analeptin-Spofa

1-(4-Оксифенил)-2-метиламиноэтанол гидрохлорид

Синонимы: Acordin, Aethaphen, Cardiodinamin, Cardiodynamin, Coraphene, Corazol, Corsympal, Corvasymton, Oxedrin, Pandrenil, Parasympatol, Pentedrin, POPMA-aethanol, Simpadren, Simpalon, Simpatol, Symcoral, Sycmorthal, Sycmortal, Sympadrin, Sympaethamin, Sympalept, Sympathomin, Sympatol, Symptovas, Synadren, Syncalton, Synephrine, Synergol, Synthenate, Vascardyne, Vasocordin, Vasoton

Выпускается в ампулах по 1 мл 6% раствора

Хранение — список Б

Срок годности — 10 лет

Симпатомиметик и аналептик. Применяется при острых расстройствах кровообращения, при отравлениях снотворными препаратами, наркотиками, при коллапсе и пр.

Rp.: Sol. «Analeptin-Spofa» 6% 1,0

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. По 1 ампуле подкожно или внутримышечно; в экстренных случаях вводят $1/2$ —1 ампулу внутривенно (медленно)

Аналергин-Спофа — Analergin-Spofa (ЧССР)

2-(N-Фенил-N-бензиламино)-метилпимидазолина гидрохлорид

Синонимы: Allergan A, Antastan, Antasten, Antazolinhydrochlorid, Antihistal, Antistin, Ben-a-Hist, Glyoxamin, Histostab, Imidaminiumhydrochlorid, Phenazolin

Выпускается в таблетках по 0,025; 0,1 и в ампулах 5% раствора по 2 мл

Хранение — список Б

Антигистаминное средство. Применяется при бронхиальной астме, крапивнице, зуде, сыпороточной болезни, сенным насморке, синдроме Меньера и др.

Rp.: Tabul. «Analergin-Spofa» 0,025 N.20

DS. По $1/2$ —1—2 таблетки 3—4 раза в день

Rp.: Sol. «Analergini-Spofa» 5% 2,0

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 0,5—1—2 мл в/м, в/в 1—3 раза в день

Анальгин-Спофа — Analgin-Spofa
(СССР)

Состав на 1 таблетку:

Amidopyrini 0,2

Phenacetini 0,25

Coffeini 0,05

Phenobarbitali 0,02

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 8 лет

Анальгетическое и антипиретическое средство.

Применяют при невралгии, мигрени, лихорадке, альгодисменорее и пр.

Rp.: Tabul. «Analgin-Spofa» N. 10

DS. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Анальфен — Analphenum

Состав на 1 таблетку:

Analgin

Phenacetini aa 0,25

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 1 год

Анальгетическое и антипиретическое средство.

Применяется как «Анальгин-Спофа»

Rp.: Tabul. «Analphenum» N. 10

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Анапирин — Anapirgin (НРБ)

Состав на 1 таблетку:

Analgin

Amidopyrini aa 0,25

Coffeini-natrii benzoatis 0,1

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 5 лет

Дополнительный срок годности после переконтроля — 3 года

Анальгетическое и антипиретическое средство.

Применяется как «Анальгин-Спофа»

Rp.: Tabul. «Anapirgin» N. 10

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Анатруксоний — Anatruxonium

Бис-этилоксида бис-3-пиперидинопропилового эфира *d*-труксиловой кислоты динодид

Выпускается в ампулах по 2 мл 0,3% раствора

Хранение — список А, в защищенном от света месте

Срок годности — 1 год

Миорелаксант антидеполяризирующего действия. Отличается от диплацина более длительным действием и склонностью к кумуляции. Действует от 40—60 (0,1—0,12 мг/кг) до 90—120 мин (0,15—0,2 мг/кг). Повторно следует вводить не более $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ первоначальной дозы. Как и при использовании других миорелаксантов, необходимо применение управляемого дыхания. Возможна декураризация прозеринном в сочетании с атропином

Rp.: Sol. Anafrotonii 0,3% 2 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. По 2—5 мл внутривенно

Анбитал — Anbitalum
Состав на 1 таблетку:
Anaesthesini 0,3
Phenobarbitali 0,05
Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте
Срок годности — 2 года

Противорвотное средство.
Применяют при рвоте, вызван-
ной раздражением слизистой же-
лудка, при морской и воздушной
болезни

Rp.: Tabul. «Anbitalum» N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Ангидрид — Anhydrid

Подсушивающее, антисептиче-
ское и дезодорирующее средство.
Применяется при повышенной
потливости

Rp.: Formalini 20,0
Glycerini
Aquae destillatae aa 40,0
Ferri trichloridi 2,0
DS. Наружное. Смазывать на ночь ступни ног

Ангиотрофин — Angiotrophinum

Водный экстракт из ткани под-
желудочной железы, освобожден-
ный от инсулина. Содержит по-
липептид калликреин, относящий-
ся к кининам

Выпускается в ампулах по 1 мл
Хранение — в прохладном, за-
щищенном от света месте
Срок годности — 1 год 6 мес.

Миотропный спазмолитик.
Применяется для лечения со-
судистых спазмов (эндартериит,
ангионеврозы, спазм коронарных
сосудов, болезнь Рейно, атеро-
склероз)

Rp.: Sol. Angiotrophini 1 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. Вводить под кожу или внутримышечно по 1—2 мл
ежедневно

Ангирол — Angirol (CPP)
Вытяжка из артишока (Sutaga
scolitinus)

Выпускается во флаконах по
50,0 и в драже, содержащих
по 0,04 сухого препарата
Хранение — список Б
Срок годности: драже — 2 года,
капли — не установлен

Спазмолитическое средство.
Применяется при заболеваниях,
сопровождающихся спазмами по-
лых органов (холециститы, по-
чечнокаменная и печечнокамен-
ная болезнь, колиты и т. п.).
Так как «Ангирол» снижает уро-
вень сахара в крови и препятст-
вует глюкозурии, то оправдано
его применение в легких случаях
диабета у пожилых людей, а также
при атеросклерозе

Rp.: Drag. «Angirol» 0,04

D. t. d. N. 20

S. По 2 драже 3 раза в день взрослым и вдвое меньше детям от 7 до 15 лет

Rp.: «Angirol» 50,0

DS. По 10 капель 3 раза в день и половинную дозу детям от 7 до 15 лет

Андекалин — Andecalinum

Очищенный экстракт поджелудочной железы свиней, представляющий собой лиофилизированный порошок или таблетку желтого цвета

Выпускается во флаконах в порошке по 40 ЕД

Хранить в темном прохладном месте

Срок годности — 1 год

Миотропный спазмолитик.

Применяют при нарушениях кровообращения, у больных, страдающих атеросклерозом, гипертонической болезнью, болезнью Рейно, облитерирующим эндартериитом, тромбофлебитом, при климактерических состояниях, вяло заживающих ранах и язвах, склеродермии, нарушении кровообращения в сетчатке

Rp.: Andecalini 40 ED

D. t. d. N. 10

S. Вводить внутримышечно, непосредственно перед применением, растворяя в 1,4 мл 15% раствора поливинилпирролидона

Андипал — Andipalum

Состав на 1 таблетку:

Analgini 0,25

Dibazoli

Papaverini hydrochloridi

Phenobarbitali aa 0,02

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 1 год

Спазмолитическое, сосудорасширяющее и анальгетическое средство.

Применяют при начальной стадии гипертонической болезни, спазмах полых органов, спазмах коронарных и периферических сосудов, спазмах сосудов мозга и пр.

Rp.: Tabul. «Andipalum» N. 10

DS. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Адресса пилюли — Pilulae Andreevi

Противоэпилептическое средство.

Применяют при больших припадках. Побочный снотворный эффект фенобарбитала в значительной мере купируется стрихнином

Rp.: Strychnini nitratis 0,015

Phenobarbitali 1,5

Massae pilularum q. s. ut fiant pilulae N. 30

DS. По 1 пилюле 2—3 раза в день

Андриасяна мазь — Unguentum
Andriasjani

Противогрибковое средство.
Применяют для лечения гриб-
ковых поражений кожи

Rp.: Acidi lactici (aut Acidi benzoici)
Resorcini āā 15,0
Vaselini ad 100,0
M. f. ung.
DS. Наружное

Андросан — Androsan

Противопротозойное и противо-
микробное средство.

Применяется местно при три-
хомониазе и заболеваниях моче-
половых путей, вызванных вуль-
гарной флорой, как у мужчин,
так и у женщин. Может быть
применено как противозачаточное
средство

Rp.: Chinosoli
Chinini hydrochloridi āā 5,0
Glycerini
Saponis medicati āā 45,0
Olei Melissae
Olei Lavandulae āā gtts. X

MDS. Для спринцеваний и промываний уретры.
Развести 1 столовую ложку жидкости на литр
теплой кипяченой воды.

Анестезол — Anaesthesolum
Срок годности — 2 года

Анестезирующее и противовос-
палительное средство.
Применяется при геморрое.

Rp.: Anaesthesini 0,1
Dermatoli
Mentholi āā 0,04
Zinci oxydi 0,02
Olei Cacao 2,0
M. f. suppositorium rectale
D. t. d. N. 10

S. Вводить в прямую кишку по 1 суппозиторию
при болях

Анетин — Anetinum

Препарат, содержащий сумму
веществ из плодов укропа паху-
чего (Anetum graviolens L.)

Выпускается в таблетках по 0,1
Хранение — в сухом, защищен-
ном от света месте

Срок годности — 1 год 6 мес.

Миотропный спазмолитик.

Применяют при хронической
коронарной недостаточности, при
спазмах органов брюшной полости

Rp.: Anetini 0,1
D. t. d. N. 30 in tabul.
S. По 1 таблетке 3—5 раз в день

Анкофен — Ancorphenum	Анальгезирующее и жаропонижающее средство.
Состав на 1 таблетку:	Применяется как «Анальгин-Слофа»
Antipyridini	
Phenacetini $\bar{a}\bar{a}$ 0,25	
Coffeini-natrii benzoatis 0,05	
Хранение — список Б, в защищенном от света месте	
Срок годности — 4 года	

Rp.: Tabul. «Ancorphenum» N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Анозол — Anozol (ЧССР)	Антисептическое и подсушивающее средство.
	Применяется как присыпка для лечения инфицированных повреждений кожи и слизистых

Rp.: Iodoformii 4,0
Thymoli 1,0
M. f. pulv.
DS. Наружное.
Присыпать пораженное место

Антастман — Antasthmanum (ЧССР)	Анальгетическое и бронхолитическое средство.
Состав на 1 таблетку:	Применяют при бронхиальной астме, бронхите
Amidopyridini 0,2	
Coffeini 0,05	
Phenacetini 0,2	
Theophyllini 0,1	
Extracti Belladonnae 0,01	
Folii Lobeliae pulverati 0,09	
Ephedrini hydrochloridi	
Phenobarbitali $\bar{a}\bar{a}$ 0,02	
Хранение — список Б	
Срок годности — 5 лет	

Rp.: Tabul. «Antasthmanum» N. 10
DS. По 1 таблетке 2 раза в день.
При приступах бронхиальной астмы — по 2 таблетки на один прием

Антерон — Anteron (ФРГ)	Фолликулостимулирующий гонадотропный гормон.
Препарат фолликулостимулирующего гормона. Выпускается во флаконах, содержащих по 1000 и 5000 ЕД сухого гормона	Применяют для лечения всех форм гипофункции половых желез
Хранение — в защищенном от света месте	

Rp.: «Anteron» 1000 ЕД (5000 ЕД)

DS. Содержимое флакона развести перед употреблением прилагаемым растворителем и ввести внутримышечно

Антигерпин — Antiherpin

Антисептическое средство, обладает также кератопластическим и местнораздражающим действием.

Применяется для лечения кожных заболеваний (экзема, чешуйчатый и опоясывающий лишай и пр.).

Rp.: Picis liquidae
Olei Rapae aa 10,0
Balsami peruviani aut
Vinylini 1,0
MDS. Наружное

Антигидрозин — Antihydrosin

Антисептическое и подсушивающее средство.

Применяется при избыточной потливости

Rp.: Thymoli 0,1
Acidi salicylici 0,2
Zinci oxydi 1,0
Lycopodii 4,0
Natrii tetraboratis 6,0
Pulveris radices Violae tricoloris 7,5
Amyli 6,0
Talci 12,0
Olei Geranii gtt. III
M. f. aspersio

DS. Потевшие участки кожи обмывать холодной водой и присыпать 1—2 раза в день

Антигистамин-Спофа

Antihistamin-Spofa (ЧССР)

Бензгидрил-β-пиперидинэтилового эфира гидрохлорид

Синонимы: Benzperidinhydrochlorid, Perastinhydrochlorid

Выпускается в таблетках по 0,05

Хранение — список Б

Антигистаминное средство.

Применяют при крапивнице, отеках Квинке, сенной лихорадке, бронхиальной астме, мигрени, синдроме Меньера и др.

Rp.: Tabul. «Antihistamini-Spofa» 0,05

D. t. d. N. 10

S. По специальной схеме, приложенной к препарату

Антиневралгин — Antineuralgin

Состав на 1 таблетку:
Acidi acetylsalicylici 0,4
Benzyl phenylglycolici 0,25
Coffeini 0,05
Хранение — список Б

Анальгетическое, жаропонижающее и противовоспалительное средство.

Применяют при невралгии, ишиасе, ревматизме, полиартрите, головной боли и пр.

Rp.: Tabul. «Antineuralgin» N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Антипаркин — Antiparkin (ГДР)

N,N'-Диэтил-2-(дифенилметокси)-этиламина гидрохлорид
Синоним: Rigidyl
Выпускается в таблетках по 0,1

Центральный холинолитический и антигистаминный препарат.

Применяется при паркинсонизме

Rp.: Tabul. «Antiparkin» 0,1
D. t. d. N. 50
S. По $\frac{1}{2}$ таблетки в день, увеличивая каждый второй день на $\frac{1}{2}$ таблетки, до переносимой дозы

Антипсориадикум — Antipsoriaticum

Состав: Trichlortriaethylamini 1,0
Vasellini aut Autoli 40 000—100 000,0
Выпускается в банках по 100 г
Хранение — список А, в прохладном месте
Срок годности — 1 год

Содержит в малой концентрации ОВ кожноарывного действия — трихлортриэтиламин (азотистый иприт).

Применяется при псориазе. Не следует смазывать мокнущие или высокочувствительные участки кожи. Нельзя применять при заболеваниях печени и почек

Rp.: Antipsoriatici 100,0
DS. Наружное, по указанию врача

Антиструмин — Antistruminum

Одна таблетка содержит 0,001 г калия йодида
Хранение — в сухом, защищенном от света месте
Срок годности — 3 года

Йодсодержащее средство. Применяется для профилактики эндемического зоба

Rp.: Antistrumini
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке в неделю.
При диффузных формах зоба по 1—2 таблетки 2—3 раза в неделю

Антитуссин — Antitussinum Отхаркивающее средство.
Применяется при сухом кашле

Состав:
Extracti Thermopsideis fluidi
Kalii bromidi $\bar{a}\bar{a}$ 1,0
Sacchari 21,0
Sirupi Rubi idaei 40,0
Spiritus aethylici 96% 9,0
Aquae Amygdalarum amararum
aetherei 0,1
Aquae destillatae ad 100,0

Rp.: Antitussini 100,0

DS. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день.

Приготовление: бромид калия и сахар растворяют в воде, добавляют экстракт мышатника, спирт, малиновый сироп, горькоминдальную воду. Тщательно смешивают и добавляют воду до 100,0

Антитермалин — Antithermalin Антисептическое, анестезирующее и противовоспалительное средство.
Антифлогистин — Antiphlogistin Применяется при кожных заболеваниях, сопровождающихся воспалительными явлениями

Rp.: Acidi borici 10,0
Boli albae 100,0
Glycerini 100,0
Olei Menthae piperitae
Methylii salicylatis $\bar{a}\bar{a}$ 0,1
Olei Eucalypti 0,2

MDS. Наносить на пораженную поверхность

Приготовление: каолин стерилизуют в течение часа при 180° С, прибавляют глицерин и продолжают нагревание при той же температуре в течение 30—40 мин. После охлаждения добавляют остальные ингредиенты

Антиформин — Antiforminum Дезинфицирующее, антисептическое и прижигающее средство.
Срок годности — 3 мес. Применяется в зубоврачебной практике при лечении гингивитов и язвенных стоматитов (10—25—50% растворы), а также для обеззараживания выделений и зараженного материала в лабораторной практике и иногда для протирания кожи при зуде

Rp.: Solutionis Natrii hypochlorosi 20%
Solutionis Natrii caustici 15% $\bar{a}\bar{a}$ 100,0
MDS. Наружное. В руки медперсонала

Анузол — Anusolum

Состав: Extracti Belladonnae 0,01
Xeroformii 0,1
Zinci sulfatis 0,05
Glycerini 0,12
Olei Casao 2,0

Срок годности — 2 года

Rp.: Suppos. «Anusol»

D. t. d. N. 10

S. По 1 суппозиторию при болях

Расслабляет гладкую мускулатуру (холинолитик), обладает антисептическими свойствами.

Применяется при геморрое и трещинах заднего прохода

Апизартрон — Apisarthron (ГДР)

Содержит стандартизованный пчелиный яд в смеси с хлоридом натрия, выпускается в ампулах в виде порошка по 0,1 мг и 1 мг

Хранение — в защищенном от света месте

Срок годности — 5 лет, ЧССР — 3 года

Rp.: «Apisarthron» 0,0001 (0,001)

D. t. d. N 10 in ampul.

DS. Содержимое ампулы растворить в прилагаемой воде для инъекций и вводить под кожу или внутримышечно по схеме

Препарат пчелиного яда.

Применяют при миалгии, полиартрите, ишиасе, невралгии, а также при аллергических заболеваниях, синдроме Меньера, вяло текущих язвенных процессах на коже, эндартериите и др. Противопоказан при туберкулезе, новообразованиях, кахексии, тяжелых поражениях паренхиматозных органов

Апикодин — Apicodinum

Состав на 1 таблетку:

Amidopyridini

Analginii aa 0,3

Codeini phosphatis 0,015

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 1 год

Rp.: Tabul. «Apicodinum» N. 10

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Анальгетическое и жаропонижающее средство.

Применяют при головной боли, невралгии, лихорадочных состояниях, миозите, ревматизме, гриппе, радикулите

Апилак — Apilacum

Сухое вещество натурального маточного молочка (секрет аллотрофических желез рабочих пчел)

Выпускается в таблетках по 0,01 г и в порошке

Хранение — в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 8°

Срок годности — 2 года

Биогенный препарат.

Применяют при гипотрофии и анорексии у детей грудного и раннего возраста; у взрослых при гипотонии, нарушении питания, у реконвалесцентов; при невротических расстройствах; нарушении лактации у женщин в послеродовом периоде и т. п.

Rp.: Apifaci 0,01

D. t. d. N. 30 in tabul.

S. По 1 таблетке 3 раза в день (взрослому). Таблетки проглатывать целиком, не разжевывая

Апон — Апон

Средство, раздражающее кожу.
Применяется наружно при миозитах, радикулите, люмбаго, артритах, ишиасе и пр.

Rp.: Fructus Capsici 20,0

Solutionis Ammonii caustici 10,0

Spiritus aethylici 70% 100,0

Chlorali hydrati

Olei Serpylli āā 1,0

MDS. Наружное, для растирания

Приготовление: настаивают мелко нарезанный красный перец на смеси раствора аммиака и спирта в течение 7 суток при частом взбалтывании. После процеживания добавляют остальные ингредиенты

Аноплектал — Aroplectal (ФРГ)

Состав 1 ампулы:

Oxyaethyltheophyllini 0,2

Aescusani 0,25

Aquae pro injectionibus ad 5 ml

Выпускают в ампулах по 5 мл раствора

Хранение — список Б

Сосудорасширяющее миотропное средство.

Применяют при склерозе сосудов мозга, стенокардии

Rp.: Sol. «Aroplectal» 5,0

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Внутривенно по 5—10 мл ежедневно

Апседон — Apsedon (ГДР)

Состав на 1 драже:

Extracti Frangulae sicci 0,125

Extr. Rhei sicci

Phenobarbitali āā 0,05

Хранение — список Б

Слабительное средство

Rp.: Dragee «Apsedon»

D. t. d. N. 20

S. По 1—2 драже натощак

Ара — Ага

Слабительное средство.
Применяется при хронических запорах

Rp.: Aloës 40,0
Pulveris radicis Rhei
Pulveris radicis Zingiberis āā 20,0
Natrii sulfatis
Pulveris corticis Cinnamomi
Pulveris Cardamomi āā 5,0
Pulveris Croci 2,5
Kalii sulfatis 10,0
Tincturae Rhei spirituosae q. s. ut fiant pilulae N. 100
DS. По 1—3 пилюли на ночь

Араго — Arago

Кератолитическое средство.
Применяют для облегчения удаления мозолей на ногах. Смазывать ежедневно распаренные в теплой воде ступни ног до побеления мозолей (3—7 дней), после чего удалить их оперативно

Rp.: Collodii 50,0
Acidi salicylici 6,0
Terebinthinae 4,0
Acidi lactici 5,0
MDS. Наружное

Приготовление: смешивают коллодий и салициловую кислоту, затем добавляют терпентин и молочную кислоту

Аргазол — Argasolum

Антисептическое и химиотерапевтическое средство.

Применяется в разведении 1:50 — 1:100 в виде клизм при колитах различной этиологии, в виде полосканий — при острых респираторных инфекциях. В чистом виде используется для паровых ингаляций и для закапывания в нос при ринитах, ларингитах и пр.

Rp.: Norsulfazoli 18,66
Argenti nitratis 7,63
Acidi benzoici 0,085
Pectini 0,84
Emulgentis 1,5
Aquae destillatae 155,0
MDS. Наружное

Арега глазная примочка
желтая — Collyrium
adstringens luteum Areti

Противовоспалительное и антисептическое средство.

Применяется в глазной практике при конъюнктивитах и блефаритах

Rp.: Ammonii chloridi 0,9
Zinci sulfatis 2,5
Camphorae 1,0
Croci 0,12
Aq. destillatae 150,0

MDS. Глазная примочка. Перед употреблением развести кипяченой водой в 10 раз

Ариевича мазь —
Unguentum Arievitschi

Антисептическое, противогрибковое и кератолитическое средство.

Применяется при грибковых заболеваниях кожи и ее придатков

Rp.: Acidi salicylici 4,0
Acidi lactici (aut Acidi benzoici) 2,0
Vaselini 24,0
M. f. ung.
DS. Наружное

Ариевича — Вихревой пластырь —
Emplastrum Arievitschi —
Vichrevae

Кератолитическое средство.

Применяется для лечения онихомикозов как вспомогательное средство

Rp.: Ureae purae 20,0
Acidi trichloracetici 10,0
Emplastri Plumbi 45,0
Lanolini 20,0
Cerae 5,0
Aq. destillatae 10,0—15,0
M. f. emplastrum

DS. Наносить на пораженный ноготь, через $\frac{1}{2}$ — 1 ч соскоблить пластырь вместе с размягченной ногтевой пластинкой. Процедуру повторяют до полного удаления ногтя. Не допускать попадания на кожу!

Приготовление: в фарфоровой чашке на водяной бане растапливают свинцовый пластырь, воск и ланолин. В расплавленную массу вливают горячий раствор мочевины и трихлоруксусной кислоты в 15 мл воды и смесь непрерывно помешивают до застывания и получения однородной массы

Армин — Argminum
Этил-(паранитрофенил)-этил-
фосфонат

Выпускается в склянках по 10 мл 0,01% и 0,005% раствора
Хранение — список А, в защищенном от света месте
Срок хранения — 2 года

Антихолинэстеразное средство необратимого действия.

Применяется в качестве миотического и противоглаукомного средства. После закапывания следует прижимать пальцем область слезного мешка во избежание попадания раствора в слезный мешок

Rp.: Sol. Armini 0,005%
(0,01%) 10 мл
DS. По 1—2 капли 2—3 раза в день в глаза (при глаукоме)

Арника-глицерин — Arnica-Glycerinum

Приготовление: цветы арники настаивают в течение 10 дней при частом взбалтывании на спирте. После отцеживания сырья добавляют глицерин и выпаривают на водяной бане до объема 100,0

Антисептическое средство.

По применению и действию сходно со спиртовым раствором йода, но менее раздражает кожу

Rp.: Flogum Arnicae 10,0
Spiritus aethylici 40%
Glycerini aa 90,0
MDS. Смазывать поверхностные ранения

Арпенал — Arpenalum

3-Дизтиламино-пропилового эфира дифенилуксусной кислоты гидрохлорид

Выпускается в ампулах по 1 мл 2% и 5% раствора и в таблетках по 0,05

Под тем же названием ввозится из НРБ

Хранение — список Б

Срок годности таблетки — 1 год

Периферическое и центральное Н- и М-холинолитическое и спазмолитическое средство.

Применяют при пилороспазме, спазмах гладкомышечных органов — при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, печеночной и почечной колике, бронхиальной астме, спастических колитах, а также при паркинсонизме и хорее

Rp.: Arpenali 0,05
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке 3 раза в день
Rp.: Solutionis Arpenali 2% (5%) 1,0
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. По 1 мл 3 раза в день в мышцы

Арсотонин — Arsotonin (ВНР)

Кальциевая соль метилмышьяковистой кислоты

Синоним: Трофил

Выпускается в ампулах по 1,4 мл с содержанием 0,05 препарата и в таблетках по 0,003

Хранение — список А

Общеукрепляющее и тонизирующее средство.

Применяют при различных видах анемии, в периоде реконвалесценции, а также при хроническом миелолойкозе

Rp.: Tabul. «Arsotonin» 0,003
D. t. d. N. 100
S. От 1 таблетки в день с постепенным повышением до 9 таблеток, после чего назначают по 1—2 таблетки 3 раза в день

Rp.: Sol. «Arsotonin» 1,4 ml
D. t. d. N. 20 in ampul.
S. Применяется по специальной схеме (для лечения лейкоза)

Арсотонин с железом —
Arsotonin cum Ferro reducto
(ВНР)
Состав на 1 таблетку:
Arsotonini 0,003
Ferri reducti 0,03
Хранение — список А

Общеукрепляющее и антианемическое средство.
Применяют при различных видах анемии, в периоде реконвалесценции и т. п.

Rp.: Tabul. «Arsotonin cum Ferro hydrogenii reducto» N. 10
DS. Применяется аналогично арсотонину

Артро — Artro

Анестезирующее и противовоспалительное средство.
Применяется при ишиасе, люмбаго, радикулите, миозитах, артритах

Rp.: Methylis salicylatis
Mentholi aa 3,0
Lanolini 40,0
M. f. ung.
DS. Втирать в кожу 2 раза в день. После процедуры беречься от местного охлаждения

Арфенин — Arfenin

Антисептическое и подсушивающее средство.
Применяется при избыточной потливости

Rp.: Zinci oxydi 6,0
Zinci carbonatis 7,0
Talcii 4,0
Aluminis usti 1,0
M. f. aspersio
DS. Присыпка

Арфонад — Arfonad
(Швейцария)
D-3,4-(1',3'-Дибензил-2'-оксоимидазолидино)-1,2-триметилентиофанийгидроксида D-камфосульфонат

Ганглиолитик короткого действия.
Применяется при гипертонических кризах, отеке легких и мозга, а также в хирургической практике с целью получения управляемой

Синонимы: Methioplegium, Thi-methaphan-d-Camphersulfonat, Thiophanium, Trimetaphancam-phersulfonat

Выпускается в ампулах по 0,25 сухого препарата

Хранение — список Б

Срок годности — 5 лет

искусственной гипотонии, для уменьшения кровотечения в период проведения хирургического вмешательства

Rp.: «Arfonad» 0,25

D. t. d. N. 25 in ampul.

S. Внутривенно капельно (60 капель в минуту) в виде 0,5—1% раствора в 5% растворе глюкозы. При острых отеках мозга и легких вводят 5% раствор из расчета 0,1—0,2 мг на 1 кг веса больного

Аскорутин — Ascorutinum

Состав на 1 таблетку:

Acidi ascorbinici 0,05

Rutini 0,025

Glucosi 0,2

Хранение — в сухом, защищенном от света месте

Срок годности — 2 года

Поливитаминовый препарат.

Применяют при заболеваниях, сопровождающихся нарушением проницаемости сосудов (геморрагические диатезы, коллагенозы, нефрит и т. п.), а также для профилактики и лечения гипо- и авитаминозов Р и С

Примечание: имеются и другие прописи аскорутина

Rp.: Tabul. «Ascorutinum» N. 10

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Аскофен — Ascophenim

Состав на 1 таблетку:

Acidi acetylsalicylici

Phenacetini aa 0,2

Coffeini 0,04

Срок годности — 4 года

Апальгетическое и жаропонижающее средство.

Применяют при простудных заболеваниях, головной боли, невралгии и т. п.

Rp.: Tabul. «Ascophenim» N. 10.

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Аснитин — Asnitinum

Состав на 1 таблетку:

Acidi ascorbinici 0,05

Acidi nicotinici 0,02

Thiamini bromidi seu chloridi 0,002

Glucosi 0,5

Хранение — в сухом, защищенном от света месте

Срок годности — 1 год

Поливитаминовый препарат.

Применяют при авитаминозах и гиповитаминозах РР, С, В₁, при повышенной потребности в витаминах (реконвалесценция, беременность и пр.)

Rp.: Tabul. «Asnitinum» N. 10
DS. По 1 таблетке 2—4 раза в день

Астма-спрей — Asthma-spray
(ЧССР)

Состав на 1 мл:

Methylatropini bromidi 0,0014
Papaverini hydrochloridi 0,0088
Adrenalini tartratis 0,005
Pituitrini 1 ME
Natrii nitratis 0,0008
Aquae pro injectionibus ad 1,0
Выпускается во флаконах по
10 мл

Хранение — список Б, в тем-
ном и холодном месте

Бронхолитическое средство.
Применяется для купирования
приступа бронхиальной астмы

Rp.: «Asthma-spray» 10 ml

DS. Выдыхать из ингалятора раствор, удержи-
вая дыхание после каждого вдоха. 1 мл
раствора хватает на 2—5 процедур. При появле-
нии розового окрашивания раствор в ингаля-
торе следует сменить

Астматол-Спофа —
Asthmatol-Spofa (ЧССР)

Состав на 1 таблетку:

Coffeini
Theophyllini $\bar{a}\bar{a}$ 0,1
Ephedrini hydrochloridi 0,015
Diali 0,03
Extracti Iresacuanhae sicci 0,02

Хранение — список Б
Срок годности — 1 год

Успокаивающее, спазмолити-
ческое и отхаркивающее средство.
Применяют при бронхиальной
астме, астматическом бронхите,
пневмосклерозе и т. п.

Rp.: Tabul. «Asthmatol-Spofa» N. 20

DS. По $\frac{1}{2}$ —1 таблетке 2—3 раза в день, не более
3 таблеток в день

Астмин — Asthminum

Состав на 1 порошок:

Antipyridini 0,52
Codeini 0,005
Phenobarbitali 0,02
Ephedrini hydrochloridi 0,02
Triethanolamini iodidi 0,09
Calcii gluconatis 0,25
Radobelini 0,00015
Lobelini hydrochloridi 0,000015
Olei Eucalypti 0,0004

Хранение — список А
Срок годности — 1 год

Бронхолитическое и противо-
кашлевое средство, обладает от-
харкивающим, болеутоляющим,
противовоспалительным и успо-
каивающим свойствами.

Применяется для купирования
приступа бронхиальной астмы

Рр.: Pulv. «Asthminum»
D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку при приступе бронхиальной астмы,
не запивая водой

Асфен — Asphenum

Состав на 1 таблетку:
Acidi acetylsalicylicii 0,25
Phenacetini 0,15
Срок годности — 4 года
Дополнительный срок годности
после переконтроля — 1 год

Анальгетическое и жаропонижающее средство.

Применяют при простудных заболеваниях, головной боли, лихорадочных состояниях и т. п. (см. «Аскофен»)

Рр.: Tabul. «Asphenum» N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Атероид — Ateroid (Италия)

Сульфомукополисахарид (гепариноид), экстрагированный из органов животных
Выпускается в таблетках по 0,01
Хранение — список Б

Биогенный препарат.

Применяют при атеросклерозе, заболеваниях периферических сосудов, при стенокардии и пр.

Рр.: Tabul. «Ateroid» 0,01
D. t. d. N. 40
S. 4—6 таблеток в день до еды

Атромид — Atromid (Англия)
2-(p-Хлорфенокси)-2-метил-пропионовый эфир этанола

Синонимы: Amotril, Ateriosan, Atromidin (СФРЮ), Chlorophenicate, Clofibrate, Elpi, Lipavlon, Miscleron (ВНР), Regelan

Выпускается в капсулах по 0,25
Хранение — список Б

Гипохолестеринемическое средство.

Применяют при атеросклерозе, различных формах заболеваний церебральных и периферических сосудов; при сосудистых нарушениях, диабете. Препятствует синтезу эндогенного холестерина

Рр.: «Atromid» 0,25
D. t. d. N. 20 in capsulis
S. От 6 до 9 капсул в сутки после еды

Аурелин — Augelin

Антацидное и слабительное средство. Оказывает нежное послабляющее действие

Rp.: Magnesii oxydi 45,4
Pulveris Coffeae 1,2
Elaeosacchari Vanillae 8,5
Olei Ricini 8,6
Olei Citri gtt. I
M. f. pulvis

DS. По $\frac{1}{2}$ чайной ложки на прием; запивать слабым теплым чаем

Приготовление: окись магния растирают с касторовым маслом при помощи медицинского эфира, дают последнему испариться и смешивают с остальными составными частями

Аутенрита жидкость против пролежней — *Liquor ad decubitus Autenriti*

Вяжущее и антисептическое средство.

Применяют при пролежнях и других поражениях кожи, сопровождающихся мокнутием

Rp.: Corticis Quercus 8,0
(aut Tannini 0,8—1,6)
Aquae coctae q. s.
Liquoris Plumbi subacetatis q. s.
Spiritus aethylici 90% 1,0
MDS. Наружное.

Приготовление: дубовую кору кипятят в течение получаса с количеством воды, необходимым для получения 40,0 отвара, отвар процеживают и после охлаждения добавляют раствор ацетата свинца основного до прекращения образования осадка (примерно 4,0). К отфильтрованному влажному осадку добавляют спирт. При применении танина последний растворяют в воде, а далее поступают, как описано

Ацетилдигитоксин —
Acetyldigoxin (ПНР)
Дигитоксин, в котором остатки дигитоксозы ацетилированы.
Синонимы: *Acedigal*, *Acedoxin* (ВНР), *Acylanid*, *Acylanil*, *Digicetyl*

Выпускается в таблетках по 0,0002 и ампулах по 1 мл 0,02% раствора

Хранение — список А

Срок годности — 1 год

Кардиотоническое средство.

Применяют при наличии показаний для лечения препаратами наперстянки (см. «Абицин»), главным образом при хронической сердечной недостаточности II—III ст. По скорости наступления эффекта и силе близок к дигитоксину. Менее склонен к кумуляции. Противопоказания: стенокардия, инфаркт миокарда, пароксизмальная желудочковая тахикардия, активный эндо- и миокардит

Rp.: Tabul. «Acetyldigoxin» 0,0002

D. t. d. N. 20

S. По 1 таблетке 1—3 раза в день

Rp.: Sol. «Acetyldigoxin» 0,02% 1,0

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. В вену по $\frac{1}{4}$ —1 мл, разведя 0,9% раствором натрия хлорида. Вводить медленно (дозировки строго индивидуальны)

**Ацетилхолина хлорид —
Acetylcholini chloridum**

Синонимы: Acecolex, Acecolina, Arteri-Choline, Citocholine, Lami-sil, Miochol, Ovisot

Выпускается в ампулах емкостью 5 мл в порошке по 0,1 или 0,2

Хранение — список Б

Срок годности — 10 лет

Дополнительный срок годности после переконтроля — 5 лет

Холиномиметик.

Иногда используется как сосудорасширяющее средство при спазмах периферических сосудов (перемежающаяся хромота, расстройства кровообращения в культе, обморожения и т. д.). В редких случаях вводят ацетилхолин при атонии кишечника и мочевого пузыря

Rp.: Acetylcholini chloridi 0,1 (0,2)

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Под кожу и внутримышечно, разведя предварительно в 2—5 мл воды для инъекций

Ацефен — Acerphenum

Диметиламиноэтилового эфира п-хлор-феноксисукусной кислоты гидрохлорид

Синонимы: Centrophenoxine (ПНР), Clofepoxine, Helfergin, Lucidril (Франция), Luncidril, Meclofenoxatehydrochlorid

Выпускается в таблетках по 0,1 и 0,3 (СССР), драже по 0,12 (ПНР), в ампулах в сухом виде по 0,1 (Фр.) и 0,25 (СССР)

Хранение — список Б

Срок годности: таблеток — 3 года, п/п — 6 мес.; таблетки, покрытые оболочкой, — 1 год; ампулы — 1 год

Психостимулирующее средство.

Применяется при астенических, депрессивных и невротических состояниях, неврозах навязчивости, нарушениях мозгового кровообращения, а также после нейрохирургических операций. Препарат противопоказан при инфекционных заболеваниях центральной нервной системы и при состояниях возбуждения

Rp.: Acerpheni 0,1 (0,3)

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 1 таблетке 3—5 раз в день

Rp.: Acerpheni 0,25

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Вводить внутримышечно или в вену по 0,1—0,25 1—3 раза в день, разведя изотоническим раствором натрия хлорида

**Ацидин-пепсин —
Acidin-pepsinum**

Состав на 1 таблетку:
Pepsini 0,1

Betaini hydrochloridi 0,4

Аналогичные таблетки выпуска-

Применяют при гипо- и ацидных гастритах, ахилии, диспепсии, анорексии, диарее и рвоте у детей.

ются под названием Acidol-Pepsin, Acipersol (ЧССР), Belacid (ВНР), Pepsacid

Выпускается в таблетках по 0,25 и 0,5

Хранить в прохладном месте, в темноте

Срок годности ацидин-пепсина — 1 год, дополнительно после переконтроля — 6 мес., аципепсола — 4 года, бетацида — неограничен

Rp.: Acidin-pepsin 0,25 (0,5)

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По $\frac{1}{2}$ —1 таблетке 3—4 раза в день.

Таблетки перед приемом растворяют в $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ стакана воды. Принимают во время или после еды

Ацидотест — Acidotest
(ВНР, ЧССР)

Комплект: 3 драже по 0,05 урокармина (желтого цвета) и 2 таблетки кофеина-бензоата натрия по 0,2 (белого цвета)

Хранение — список Б

Срок годности ВНР — 5 лет, ЧССР — 4 года

Применяют для определения кислотности желудочного сока (без зондирования). Сначала принимают 2 белые таблетки, затем 3 желтых драже. Сравнивая цвет мочи с приложенной шкалой, определяют кислотность желудочного сока

Rp.: «Acidotest»

D. t. d. N. 1

S. На одно исследование

Ациклофин — Aciclofin

Состав на 1 таблетку:

Acidi acetylsalicylici 0,45

Coffeini 0,05

Срок годности — 1 год

Анальгетическое и антипиретическое средство.

Применение — см. «Аскофен»

Rp.: Tabul. Aciclofini

D. t. d. N. 20

S. По 1—2 таблетки 1—3 раза в день

Аэрон — Aëronum

Состав на 1 таблетку:

Scopolamini camphoratis 0,0001

L-Hyoscyamini camphoratis 0,0004

Хранение — список Б

Срок годности — 3 года

Противорвотное (противокинотозное) средство.

Применяют для профилактики и лечения морской и воздушной болезни

X

Rp.: Tabul. «Aëropim» N. 20
DS. Профилактически за 30—60 мин до отъезда
1—2 таблетки. Через 6 ч еще 1 таблетку

Бактрим — *Vactrim* (СФРЮ)
Комбинированный препарат, со-
держащий 2,4-диамино-5-(3,4,5-
триметоксibenзил)-пиримидин
(Trimethoprimum) и 5-метил-3-
сульфаниламидонзоксазол (*Sulfa-*
methoxazole)

Состав 1 драже для взрослых:
Trimethoprimi 0,08
Sulphamethoxazoli 0,4

Состав 1 драже для детей:
Trimethoprimi 0,04
Sulphamethoxazoli 0,2

100 мл сиропа содержит:
Trimethoprimi 0,8
Sulphamethoxazoli 4,0

Хранение — список Б

Химиотерапевтическое средство,
по спектру антимикробного дейст-
вия близкое к сульфаниламидам.

Применяют при заболеваниях
дыхательных путей (бронхиты,
пневмонии, тонзиллиты и т. д.),
мочевыводящих путей, пищева-
рительного тракта, а также при ме-
нингитах, хирургических гнойных
заболеваниях и т. п.

Rp.: Dragee «Vactrim» N. 50
DS. По 1—2 драже 2 раза в день

Rp.: Sirupi «Vactrim» 100,0
DS. Детям от 6 недель до 6 мес. по $\frac{1}{2}$ чайной ложки
2 раза в день, до 6 лет — по 1 чайной ложке
2 раза в день. Принимать после еды

Балтикс — *Baltix* (ВНР)
1-(Орто-хлорфенил)-1-фенил-3-
диметиламино-пропанола-1 гидро-
хлорид

Выпускается во флаконах по
10 мл 5% раствора

Хранение — список Б

Противокашлевое средство пе-
риферического действия.

Применяется при кашлем син-
дроме воспалительного происхо-
ждения (см. также «Абехол»)

Rp.: Sol «Baltix» 5% 10,0
DS. По 20—30 капель 3 раза в день

Бальзам бенгальский —
Balsamum bengalicum

Раздражающее и анальгетиче-
ское средство.

Применяется местно при ишиа-
се, радикулитах, миозите, неврал-
гиях, артритях, люмбаго и пр.

Rp.: Lanolini anhydrici 18,0
Mentholi 1,0
Methylis salicylatis 5,0
MDS. Для растираний

**Бальзам глицериновый
косметический —
Balsamum cosmeticum
glycerinatum**

Антисептическое и смягчающее
кожу средство.

Применяется в косметических
целях для обработки рук и лица

Rp. Cerae flavae
Cetacei āā 5,0
Olei Amygdalarum 20,0
Natrii tetraboratis 1,0
Acidi benzoici 0,5
Glycerini 7,5
Aquae destillatae 1,5
Olei Rosae gtt. II
MDS. Для смазывания

**Бальзам для сосков —
Balsamum mammale**

Обе прописи обладают вяжущи-
ми и антисептическими свойствами.

Применяются профилактически
и с лечебной целью у кормящих
женщин. Повязка, смоченная пре-
паратом, предупреждает возникно-
вление ссадин и трещин на сосках.
Перед кормлением состав остро-
жно снимают

1. Rp.: Acidi tannici 1,0
Bismuthi subnitratis 2,0
Vasellini 10,0
2. Rp.: Balsami peruviani 1,0
Spiritus aethylici 30,0
Tincturae Hyperici 20,0
Glycerini
Gummi arabici āā 40,0
Aluminii sulfatis 0,5
Aquae destillatae 20,0
MDS. Наружное

**Бальзам йодно-мыльный —
Balsamum Iodi saponatum**

Антисептическое и моющее сред-
ство.

Применяется в косметических
целях для обработки кожи лица и
рук. Через некоторое время после
нанесения препарата кожу следует
обмыть водой

Rp.: Saponis oleosi 96,0
Spiritus aethylici 90% 300,0
Olei Caryophyllorum
Olei Thymi āā 1,5
Kalii iodidi 18,0
Aquae destillatae 36,0
MDS. Наружное

Бальзам камфорно-мыльный —
Balsamum Camphorae saponatum

Показания и свойства такие же,
как у предыдущего препарата

Rp.: Spiritus saponati 10,0
Camphorae
Olei Amygdalarum āā 1,0
Spiritus aethylici 90% 8,0
MDS. Наружное

Бальзам ланолиновый —
Balsamum lanolinatum

Смягчающее кожу средство.
Применяется в косметических
целях

Rp.: Lanolini 1250,0
Vaselini 500,0
Balsami peruviani aut
Vinylini
Olei Rosae āā 1,0
MDS. Наружное

Бальзам ланолиновый сложный —
Balsamum Lanolini compositus

Раздражающее кожу и антисеп-
тическое средство.

Применяют как вспомога-
тельное средство при радикулитах,
миозитах, люмбаго и пр. (см.
Бальзам бенгальский)

Rp.: Lanolini anhydrici 18,0
Mentholi 1,0
Methylii salicylatis 5,0
MDS. Для растираний

Бальзам против обморожений —
Balsamum ad perniones

Антисептическое, вяжущее и об-
волакивающее средство.

Применяется при легких обмо-
рожениях (без пузырей и некроза),
для обработки ссадин и мелких
повреждений кожи. По показани-
ям и применению обе прописи ана-
логичны

1. Rp.: Kalii iodidi 1,0
Camphorae
Glycerini āā 2,0
Spiritus saponati 14,0
Phenoli 1,0
2. Rp.: Collodii
Terebinthinae communis āā 40,0
Camphorae 10,0
Olei Ricini 30,0
MDS. Наносить на пораженные участки кожи
-

Бальзам сарептский —
Balsamum sareptae

Антисептическое и раздражающее средство.

Применяется при ушибах, миозитах, артритах и пр.

Рр.: Olei Cinnamomi
Olei Rosmarini
Olei Caryophyllorum āā 1,0
Olei Salviae
Olei Serpylli
Olei Levistici
Olei Thymi
Olei Carvi āā 2,0
Olei Majoranae
Olei corticis Aurantii
Olei Menthae piperitae āā 6,5
Olei Lavandulae
Olei Geranii
Olei Bergamottae āā 4,0
Olei Angelicae
Olei Calami āā 8,0
Spiritus aethylici 90% 20,0
Spiritus aethylici 70% 5360,0
MDS. Растирание

Бальзам скипидарный —
Balsamum Olei Terebinthinae

Антисептическое, моющее и раздражающее средство.

Применяется как средство неспецифической терапии (растирание кожи) при воспалительных заболеваниях внутренних органов (бронхиты, пневмонии, радикулит, миозит и т. п.).

Рр.: Kalii carbonatis 10,0
Saponis oleosi
Olei Terebinthinae āā 60,0
MDS. Для растирания

Баметансульфат —
Bamethani sulfas
1-(4-оксифенил)-2-Н-бутиламиноэтанол сульфат

Синонимы: Viratol (ВНР), Vitredrin (ГДР), Butylnorsympatol, Butylnorsynephrin, Propylsympatol, Vasculat, Vasculit

Выпускается в таблетках по 0,025, в ампулах по 1 мл 5% раствора и во флаконах, содержащих 1% раствор

Хранение — список Б, в прохладном защищенном от света месте

Срок годности — 1 год; таблетки, покрытые оболочкой, — 2 года

Гипотензивное и спазмолитическое средство.

Применяют при расстройствах периферического кровообращения (эндартериит, болезнь Рейно и пр.). Противопоказан при сахарном диабете

- Rp.: Bamethani sulfatis 0,025
 D. t. d. N. 10 in tabul.
 S. По 1 таблетке 2—3 раза в день
- Rp.: Sol. Bamethani sulfatis 5% 1 ml
 D. t. d. N. 10 in ampul.
 S. По 1 мл 1—2 раза в день внутримышечно
- Rp.: Sol. Bamethani sulfatis 1% 50,0
 DS. По 20—25 капель 3—4 раза в день

**Банайтиса жидкость —
 Liquor Banajtisi**

Солевое плазмозамещающее средство.

Применяется в легких случаях шока и при умеренной кровопотере

- Rp.: Solutionis Glucosi 25% 65,0
 Natrii chloridi 0,5
 Calcii chloridi 0,12
 Spiritus aethylici 60% 12,0
 M. Sterilisetur!
 DS. Внутривенно капельно

Баральгин — Baralgin (СФРЮ)

Состав на 1 ампулу:

Analgin 0,0025

P¹-piperidino-aethoxy-o-carbomethoxybenzophenonhydrochloridi 0,005

Phenpiramidi brommethylati 0,0001

Aquae pro injectionibus ad 5 ml

Хранение — список Б

Применяют при желчных и почечных коликах, при спазмах желудка и кишечника, при спастической дисменорее, при стенокардии

Примечание: последние две составные части лекарства — холинолитические и спазмолитические средства

- Rp.: Sol. «Baralgin» 5 ml
 D: t. d. N. 5 in ampul.
 S. Внутривенно медленно.
 Вводят также внутримышечно

Барбамид — Barbamid (ВНР)

Состав на 1 таблетку:

Amidopyridini 0,284

Barbitali-natrii 0,13

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 8 лет

Дополнительный срок годности после переконтроля — 4 года

Применяют при головных болях, мигрени, невралгии, артрите, бессоннице и т. п. Анальгетическое, жаропонижающее и снотворное средство

- Rp.: Tabul. «Barbamid» N. 10
 DS. По 1 таблетке 1—3 раза в день

**Барбитал-натрий —
Barbitalum-natrium**

5,5-диэтилбарбитурат натрия
Синонимы: Barbitmetten, Calmine,
Embinal, Hypnodol, Medinal, Nat-
rinal, Oneiragon, Sombrinal, Sop-
rinal, Thyalone

Выпускается в порошке и таб-
летках по 0,3

Входит в состав многих комби-
нированных таблеток

Хранение — список Б, в хорошо
упкупоренных банках оранжевого
стекла

Срок хранения — 3 года; пос-
ле переконтроля — 2 года

Снотворное и успокаивающее
средство

Rp.: Barbitali-natrii 0,3
D. t. d. N. 6 in tabul.
S. За $\frac{1}{2}$ —1 ч до сна

Барбитесал — Barbitesal (ЧССР)

Состав на 1 таблетку:

Theobromini 0,3

Phenobarbitali 0,03

Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте

Срок годности — 5 лет

Дополнительный срок годности
после переконтроля — 2 года

Спазмолитическое и успокаива-
ющее средство.

Применяют при спазмах гладко-
мышечных органов, стенокардии
и пр.

Rp.: Tabul. «Barbitesal» N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

**Барвинкана гидрохлорид —
Barvincani hydrochloridum**

Представляет собой гидрохло-
рид алкалоида винкапина, выде-
ленного из корней многолетней
травы барвинка прямого — Vinca
egeta. Относится к группе мети-
лен-индолиновых алкалоидов

Выпускается в ампулах по 1 мл
1% раствора

Хранение — список Б

Срок годности — 2 года

Общетонизирующее средство.

Применяют при невритах (лице-
вого, локтевого, большеберцового
и малоберцового нервов); при па-
резах и параличах с понижением
мышечного тонуса; при невритах
слухового нерва с понижением
остроты слуха; при пониженном
артериальном давлении; при гипо-
тонической болезни; при утомляе-
мости, при миастении, мигрании;
при остром отравлении снотворны-
ми, наркотиками; в качестве тони-
зирующего средства при общей
слабости на почве перенесенных
хронических, истощающих заболе-
ваний

Rp.: Solutionis Barvincani hydrochloridi
1% 1 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. Под кожу по 1 мл 1 раз в день

Бареж-ванна —
Balneum Baretginense

Щелочно-соляная ванна. Возбуждает нервную систему, усиливает секрецию эндокринных желез, повышает диурез, размягчает роговой слой эпидермиса.

Применяется при астенических неврозах, снижении общего тонуса, псориазе и пр. Не показана при тиреотоксикозе и других состояниях, сопровождающихся повышенной функцией желез внутренней секреции или повышенной нервной возбудимостью

Rp.: Natrii carbonatis 30,0
Natrii chloridi
Natrii sulfatis aa 60,0
M. f. pulvis

DS. На одну ванну. Температура ее — 36—38°, продолжительность — 10—15 мин. На курс лечения — 10—20 ванн 2—3 раза в неделю

Барелла порошок — Pulvis
stomachicus Barelli

Антацидное средство.

Применяется при гиперацидных гастритах, язвенной болезни желудка. Выбор прописи зависит от тяжести заболевания

1. Rp.: Natrii hydrocarbonatis 13,0
Natrii sulfatis sicci
Natrii et Kalii tartratis aa 1,0
Sacchari lactis 5,0
Pepsini 2,0
2. Rp.: Natrii hydrocarbonatis 60,0
Natrii sulfatis sicci
Natrii et Kalii tartratis
Sacchari lactis
Pepsini aa 5,0
3. Rp.: Natrii hydrocarbonatis 52,0
Sacchari lactis
Pepsini aa 5,0
4. Rp.: Natrii hydrocarbonatis 93,0
Natrii chloridi 4,0
Calcii carbonatis 3,0
Pepsini 5,0
M. f. pulvis
DS. По 1/2—1 чайной ложке за 1/2 ч перед едой

Бат — Bat —
Богомоловой и Александровой
тампон биологический антисепти-
ческий — *Tamponum biologicum*
antisepticum Bogomolovae et
Alexandrovae

Препарат приготовлен из плаз-
мы человеческой крови с добавле-
нием желатины и пенициллина
Выпускается в ампулах по 0,7
Хранение — в сухом месте
Срок годности — 2,5 года

Кровоостанавливающее и анти-
септическое средство.

Применяется для остановки па-
ренхиматозных кровотечений, в
том числе желудочных, и для про-
филактики раневой инфекции. В
последнем случае вводится в ра-
ну по окончании операций

Rp.: Bat 0,7

D. t. d. N. 10

S. По 1 порции 3—5 раз через час, запивая ложкой
воды (при желудочном кровотечении)

Батилол — Batilolum
 α -Октадециловый эфир глице-
рина

Синонимы: *Batylalkohol*, *Batylol*
Выпускается в таблетках по 0,02
Срок годности — 2 года
Хранение — список Б

Радиотерапевтическое средство.

Применяют для профилактики
лучевой болезни при рентгенора-
диотерапии, а также для лечения
хронической лучевой болезни

Rp.: *Batiloli* 0,02

D. t. d. N. 50 in tabul.

S. Профилактически по 1 таблетке 2 раза в день,
для лечения — по 1 таблетке 4 раза в день

Бахона капли —
Guttae Bachoni

Средство, размягчающее ушные
серные пробки.

После курса лечения обязатель-
но промывание ушей в условиях
амбулатории

- Rp.: *Natrii chloridi* 0,1
Natrii bromidi 0,2
Natrii hydrocarbonatis
Natrii tetraboratis aa 0,5
Glycerini 5,0
Aquae destillatae 30,0
- Rp.: *Natrii chloridi* 0,1
Natrii hydrocarbonatis
Natrii tetraboratis aa 0,5
Antipyrini
Natrii bromidi aa 0,2
Glycerini 5,0
Aquae destillatae 30,0

3. Rp.: Natrii chloridi
Natrii hydrocarbonatis
Natrii tetraboratis
Natrii bromidi
Antipyrini aa 0,1
Glycerini 5,0
Aquae destillatae 30,0
MDS. По 1—2 капли в ухо 3 раза в день в течение
3—4 дней

Беамат — Beamat (СФРЮ)
Состав на 1 драже:
Phenobarbitali 0,018
Spasmolytini 0,01
Divascoli 0,002
Scopolamini hydrobromidi 0,0005
Хранение — список А, в защищенном от света месте

Холнолитическое и спазмолитическое средство.

Применяют при вегетативной дистонии, спазмах полых органов, спазмах периферических сосудов, гипертонической болезни; при климактерических расстройствах; базедовой болезни; нейродермите и др.

Rp.: Dragee «Beamat» N. 20
DS. По 1—4 драже в день

Бебе — Bebe

Антисептическое и подсушивающее средство.

Применяется при опрелостях у детей грудного возраста

Rp.: Acidi salicylici 3,0
Xeroformii 2,0
Zinci oxydi 10,0
Amyli Oryzae 87,0
M. f. aspersio
DS. Присыпка

Бекарбон — Becarbonum
Состав на 1 таблетку:
Extracti Belladonnae 0,01
Natrii hydrocarbonatis 0,3
Хранение — список Б
Срок годности — 3 года

Холнолитическое и антацидное средство.

Применяют при заболеваниях, сопровождающихся спазмами гладкой мускулатуры органов брюшной полости, при гиперацидном гастрите и язвенной болезни желудка

Rp.: Tabul. Becarboni N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Беклорам — Becloram (СФРЮ)

Состав на 1 драже:
Laevomycetini 0,25
Nicotinamidi 0,025
Riboflavini
Calcii pantothenatis $\bar{a}\bar{a}$ 0,005
Pyridoxini hydrochloridi 0,002
Cyanocobalamini 0,000001

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 1 год

Препарат левомецетина с витаминами.

Применяют при брюшном тифе, паратифе, коклюше, пневмонии, т. е. в тех же случаях, что и левомецетин

Rp.: Dragee «Becloram» N. 20

DS. По 1—2 драже 4—6 раз в день

Беллалгин — Bellalginum

Состав на 1 таблетку:

Analgini
Anaesthesini $\bar{a}\bar{a}$ 0,25
Extr. Belladonnae 0,015
Natrii hydrocarbonatis 0,1

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 2 года

Холинолитическое и антацидное средство.

Применяют при желудочно-кишечных заболеваниях, сопровождающихся болями в животе, повышенной кислотностью и спазмами гладкой мускулатуры (см. «Бекарбон»)

Rp.: Tabul. Bellalginum N. 10

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Беллазон — Bellazonum (НРБ)

Состав на 1 драже:

INHA — 17 0,075

Radobelini 0,00025

Хранение — список Б

Срок годности — 2 года

Антидепрессивное и противоспастическое средство.

Применяют при паркинсонизме, при невралгии, депрессивных состояниях. Нельзя применять совместно с фенилалкиламинами и антидепрессантами

Rp.: Dragee «Bellazonum» N. 50

DS. По 1 драже 2—3 раза в день, через каждые 3—4 дня увеличивается на 1 драже

Белластезин — Bellasthesinum

Состав на 1 таблетку:

Anaesthesini 0,3

Extracti Belladonnae 0,015

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 2 года

Местноанестезирующее и холинолитическое средство.

Применяют при спазмах желудка как болеутоляющее средство

Rp.: Tabul. Bellasthesini N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Беллатаминал — Bellataminalum

Состав на 1 таблетку:
Ergotamini tartratis 0,0003
Radobellini 0,0001
Phenobarbitali 0,02
Срок годности — 2 года
Синоним: Bellaspon (ЧССР)
Хранение — список Б, в защищенном от света месте
Срок годности — 2 года, «Белласпона» ЧССР не ограничен

Холино- и адренолитическое и успокаивающее средство. Применяют при повышенной раздражительности, бессоннице, расстройстве менструального цикла неврогенного происхождения, гипертонии, нейродермитах, при вегетативной дистонии

Rp.: Tabul. Bellataminali N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Беллафен — Bellaphen (СФРЮ)

Состав на 1 таблетку:
Radobellini 0,00025
Phenobarbitali 0,05
Состав на 1 суппозиторий:
Radobellini 0,0005
Phenobarbitali 0,1
Ol. Sasaо 2,5
Хранение — список Б
Срок годности: таблетки — 3 года, суппозитории — 1 год, п/п — 6 мес.

М-холинолитическое (спазмолитическое) и успокаивающее средство.

Показания и побочные эффекты — те же, что и для других препаратов красавки

Rp.: Tabul. «Bellaphen» N. 10
DS. По 1 таблетке 1—3 раза в день
Rp.: Suppos. «Bellaphen» N. 10
DS. По 1—2 свечи в день в прямую кишку

Беллин — Bellin

Rp.: Acidi borici 150,0
Aluminis usti 50,0
Olei aetherei 1,0
M. f. aspersio
DS. Наружное

Подсушивающее и антисептическое средство.

Применяется как присыпка от пота

Беллкви — Bellkvi
Певзнера паста — Pasta Pevsneri

Защитная паста (от воздействия органических растворителей, технических масел и т. п.), может применяться в качестве моющего средства

Rp.: Acidi oleinici 10,0
Aquae destil. 15,0
Natrii caustici 1,25
Glycerini
Paraffini aa 1,5
Solutionis Ammonii caustici 0,2
Colofonii 0,3
M. f. pasta
DS. Наружное

Беллоид — Belloid (BHP)

Свойства и применение препарата — см. «Беллатаминал»

Состав на 1 таблетку:
Ergotoxini 0,0003
Radobelini 0,0001
Acidi butylaethylbarbiturici 0,03
Хранение — список Б
Срок годности — 3 года

Rp.: Tabul. «Belloid» N. 30
DS. По 1 таблетке 3—6 раз в день

Беллусекал — Bellusecal (ГДР)

Свойства и применение — см. «Беллатаминал»

Состав на 1 драже:
Extracti Belladonnae 0,002
Extracti Hyoscyami 0,003
Extracti Secalis cornuti 0,0015
Phenobarbitali 0,015
Хранение — список Б

Rp.: Dragee «Bellusecal» N. 20
DS. По 1 драже 3—5 раз в день

Белоголового капли —
Guttae Belogolovovi

Противовоспалительное и смягчающее средство.
Применяется при остром рините, ринофарингите и ларингите

1. Rp.: Antipyrini
Natrii bromidi aa 0,2
Natrii tetraboratis
Natrii hydrocarbonatis aa 0,5
Natrii chloridi 0,1
Aquae Amygdalarum amararum 2,0
Glycerini 5,0
Aquae destillatae 30,0

2. Rp.: Mentholi 0,1
Phenylis salicylatis 1,0
Olei Amygdalarum aut
Olei Persicorum 15,0
MDS. Закапывают в нос состав № 1, через некоторое
время состав № 2

Беляева капли —
Guttae stomachicae Beljaievi

Средство, способствующее пищева-
рению в желудке.

Применяется при гипоацидных
гастритах и ослаблении моторики
желудка

Rp.: Tincturae Absinthii compositae 8,0
Tincturae Menthae piperitae 2,0
Tincturae Opii simplicis 1,0
MDS. По 15—20 капель 3 раза в день перед едой

Бемегрид — Bemegridum
2,6-Диоксо-4-метил-4-этил-пи-
перидин
Синонимы: Аһурнон (ГДР),
Antibarbi, Etimid, Eukraton, Glu-
tamizol, Malysol, Megibal, Megi-
mide, Mikedimide, Zentraleptin
Выпускается в ампулах по 10 мл
0,5% раствора
Хранение — список Б
Срок годности — 3 года; п/п —
2 года

Аналептик.
Применяют при острых отрав-
лениях барбитуратами; для устра-
нения остановки дыхания при нар-
козе барбитуратами и другими
наркотическими средствами (эфир-
ом, фторотаном); в других слу-
чаях, требующих применения ана-
лептиков, в том числе для выве-
дения из тяжелых гипоксических
состояний после оперативных вме-
шательств на сердце и магистраль-
ных сосудах

Rp.: Sol. Bemegrīdi 0,5% 10 ml
D. t. d. N. 3 in ampul.
S. Внутривенно по 10 мл (при необходимости дозу
увеличить до 60 мл). Вводят медленно

Бемидин — Bemycin (СФРЮ)
Состав на 1 драже (капсулу):
Oxytetracyclini dihydrochloridi 0,25
Nicotinamidi 0,025
Thiamini chloridi
Riboflavini
Calcii pantothenatis aa 0,005
Pyridoxini hydrochloridi 0,002
Cyanocobalamini 0,000001
Выпускается в драже и капсу-
лах.

Препарат антибиотика оксите-
трациклина с витаминами.

Применяют при стафилококко-
вой инфекции, риккетсиозах, ди-
зентерии и пр. (в тех же случаях,
что и другие препараты группы
тетрациклинов)

Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте
Срок годности — 1 год

Рр.: Dragee «Bemycin» N. 30
DS. По 2—3 драже 2—3 раза в день

Бенаркоз — Benarcos (ЧССР)

Состав одной ампулы:
Oxycodeni hydrochloridi 0,01
Scopolamini hydrobromidi 0,0005
Ephedrini hydrochloridi 0,025
Aquaе pro injectionibus ad 1 ml

Хранение — список Б, в защищенном от света месте
Срок годности — 5 лет

Средство для премедикации перед внутривенным, ингаляционным наркозом, а также перед местной анестезией

Рр.: Sol. «Benarcos» 1 ml
D. t. d. N. 5 in ampul.
S. По 1 ампуле накануне операции и за $1/2$ —1 ч перед ней

Бензонал — Benzonalum

1-Бензоил-5-этил-5-фенилбарбитуровая кислота

Выпускается в порошке и таблетках по 0,1

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Противоэпилептическое средство. Наиболее эффективен при больших припадках, в отдельных случаях — при малых припадках и эквивалентах

Рр.: Benzonalі 0,1
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. Начиная с 1 таблетки в день, дозу повышают, доводя до такой дозы, которая полностью предупреждает возникновение припадков

БензоТЭФ — Benzotephum

N-Бензоил- N', N'-диэтилен-триамид фосфорной кислоты

Синонимы: Benzodera, Dualar
Выпускается в ампулах и флаконах, содержащих 0,024 сухого препарата

Хранение — список А, в прохладном (не выше 5°), защищенном от света месте

Срок годности — 6 мес.

Цитостатическое средство.

Применяется для лечения рака легкого с метастазами, рака молочной железы, рака яичников. При лечении обязательно контролировать состояние крови. Противопоказан при кахексии, туберкулезе, анемии, тяжелых заболеваниях внутренних органов

Рр.: Benzotephi 0,024
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. Внутривенно. Содержимое ампулы растворяют в 20 мл изотонического раствора натрия хлорида непосредственно перед применением в асептических условиях. Вводят 3 раза в неделю

Бенкаин — Bencaïnum

Бензойного эфира диэтиламиноэтананола гидрохлорид

Выпускается в ампулах в виде 0,5%, 1%, 2% раствора по 1,2 и 5 мл

Хранение — список Б, в темном месте

Срок годности — 1 год

Местный анестетик.

Применяют для инфильтрационной анестезии, особенно в хирургической стоматологии

Рр.: Solutionis Bencaïni 1% 1,0 (2—5 ml)

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Для инфильтрационной анестезии

Бепасал — Bepasalum

Состав на 1 таблетку:

Phenylii salicylatis 0,3

Paraverini hydrochloridi 0,03

Extr. Belladonnae 0,012

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 6 лет, п/п — 2 года

Спазмолитическое и холинолитическое средство.

Применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастритах, желчекаменной болезни, энтероколитах — в дополнение к химиотерапевтическим средствам), а также при циститах, пиелитах и пиелонефритах

Рр.: Tabul. Bepasali N. 10

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

**Берберина сульфат —
Berberini sulfas**

Алкалоид берберин содержится в листьях барбариса (*Berberis vulgaris* L.)

Выпускается в таблетках по 0,005

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 2 года

Холеретик.

Применяют в качестве желчегонного средства при хроническом гепатите, холецистите, холелитиазе

Рр.: Berberini sulfatis 0,005

D. t. d. N. 30 in tabul.

S. По 1—2 таблетки 3 раза в день после еды

**Бережного жидкость —
Liquor Berezhnovi**

Фунгицидное средство, применяется при эпидермофитии различной локализации. В зависимости от тяжести заболевания концентрация уксусной кислоты может быть повышена до 80%

Rp.: Iodi
Natrii iodidi $\bar{a}\bar{a}$ 2,0
Glycerini 20,0
Solutionis Acidi acetici 20% ad 100,0
MDS. Для смазывания пораженной поверхности

Бермол — Vermol

Антисептическое, вяжущее и подсушивающее средство.

Применяется как присыпка при опрелости

Rp.: Acidi borici 20,0
Acidi citrici
Tannini $\bar{a}\bar{a}$ 1,0
Gummi arabici 4,0
Amyli 14,0
M. f. aspersio
DS. Наружное

Бероксан — Beroxanum

Фотосенсибилизирующее средство.

Состоит из двух фурукумаринов: ксантотоксина и бергаптена, выделенных из пастернака посевного (*Pastinaca sativa* L.)

Выпускается в таблетках по 0,02

Хранение — список Б, в прохладном защищенном от света месте

Срок годности — 2 года

Применяется для лечения витилиго и гнездовой плешивости. Сенсибилизирует кожу к действию света, стимулирует образование в ней пигмента меланина при облучении ультрафиолетовыми лучами

Rp.: Beroxani 0,02

D. t. d. N. 30 in tabul.

S. По 1 таблетке за 1—2—4 ч до облучения

Бертенсона порошок — Pulvis Bertensoni

Нежное послабляющее и спазмолитическое средство.

Применяется как вспомогательный препарат при лечении геморроя

Rp.: Pulveris radices Rhei
Kalii hydrotartratis
Sulfuris depurati $\bar{a}\bar{a}$ 0,2
Extr. Belladonnae 0,0025
M. f. pulvis
D. t. d. N. 50
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Бесалол — Besalolum

Холнолитическое и антимикробное средство.

Состав на 1 таблетку:
Extracti Belladonnae 0,01
Phenylis salicylatis 0,3
Срок годности — 2 года

Применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся спазмами гладкой мускулатуры органов брюшной полости, а также процессами брожения в желудке и кишечнике

Rp.: Tabul. Besaloli N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Бетазин — Betasinum
β-Амино-β - (3,5 - дийод-4 - оксифенил)-пропионовая кислота
Синонимы: Betacin, Betazine
Выпускается в таблетках по 0,05

Тиреостатический препарат. По действию близок к дийодтироzinу (см. «Дийодтирозин»)

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Rp.: Betasini 0,05
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Беталактин — Betalactin
(ЧССР)
Стерилизованное снятое молоко
Выпускается в ампулах по 2 и 5 мл
Хранение — в прохладном месте

Пирогенный препарат.
Применяется как средство пиротерапии в психиатрии и дерматологии

Rp.: «Betalactin» 2 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. По 2—5 мл внутримышечно 1—2 раза в неделю

Бетиол — Bethiol
Состав на 1 суппозиторий:
Extr. Belladonnae 0,015
Ichthyoli 0,2
Olei Casaeo 1,185
Срок годности — 2 года

Спазмолитическое, болеутоляющее и противовоспалительное средство.

Применяется при геморрое и трещинах заднего прохода

Rp.: Suppos. Bethioli N. 12
DS. По 1 суппозиторию 1—2 раза в день в прямую кишку

Бефорал — Verphoral (ЧССР)
Состав на одну капсулу:
Thiamini chloridi 0,05
Amidopyrini 0,3
Phenacetini 0,15
Хранение — список Б, в защищенном от света месте
Срок годности — 1 год

Анальгетическое, противовоспалительное и жаропонижающее средство. Применение — см. «Асфен», «Аскофен» и т. п.

Rp.: Caps. «Verphoral» N. 10
DS. По 1—2 капсулы 1—2 раза в день

Бефунгин-инотин * —

Befunginum

Полугустой экстракт, получаемый из грибных наростов (березового гриба, чаги), образуемых на березах фитопатогенным паразитом *Inopotus obliquus*

Хранение — в прохладном, защищенном от света месте

Срок годности — 3 года

Применяют в качестве симптоматического средства, улучшающего в некоторых случаях самочувствие больных с опухолями различной локализации

Rp.: Befungini 100,0

DS. Три чайных ложки экстракта разводят в 150 мл воды, принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды. Лечение проводят длительно

Бехтерева микстура —
Mixtura Bechterevi

Седативное средство.

Применение — см. «Адонис-бром». Количество кодеина может меняться в пределах 0,12—0,2 (кодеина фосфата — 0,16—0,2)

Rp.: Infusi herbae Adonidis vernalis ex 6,0—200,0

Natrii bromidi 6,0

Codeini 0,12

(aut Codeini phosphatis 0,16)

MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Бецевина — Becevina (УССР)

Состав на 1 драже:

Thiamini chloridi 0,001

Acidi ascorbinici 0,03

Nicotinamidi 0,05

Хранение — в защищенном от света месте

Срок годности — 1 год

Комплексный витаминный препарат.

Применяют при гипо- и авитаминозе В, С, РР, в периоде реконвалесценции, беременности и пр.

Rp.: Dragee «Becevina» N. 50

DS. По 1 драже 3—5 раз в день

* Взамен ранее выпускавшегося густого экстракта чаги.

Бигумаль — Bigumalum

*N*¹-пара-хлорфенил-*N*⁵-изопропилбигуанида гидрохлорид

Синонимы: Balusil, Chlorguanid, Chloriguane, Chloroguanide hydrochloride, Diguanyl, Drinupal hydrochlorid, Guanatol, Guanatolily, Lepadina, Paludrin, Paludrinol, Palusil, Plasin, Plasmodil, Proguanide, Proguanilhydrochlorid, Tigian

Выпускается в таблетках по 0,05 и 0,1

Хранение — список Б, в хорошо закупоренной таре

Срок годности — 10 лет; после переконтроля — 5 лет

Противомалярийный препарат.

Применяется при разных формах малярии, особенно при тропической малярии. Препарат назначают преимущественно в случаях средней тяжести, в связи с тем, что его действие медленно развивается и он быстро выводится из организма. В бессознательном состоянии и при рвотах бигумаль вводится в виде 1% раствора — 10—15 мл в вену. Инъекционные растворы изотонируются хлоридом натрия 0,5—0,6% и стерилизуются при 100° в течение 30—40 мин. Наиболее эффективен по отношению к тканевым формам плазмодия, поэтому используется для профилактики рецидивов малярии

Rp.: Bigumali 0,05 (0,1)
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По схеме

**Биетта микстура —
Mixture Bietti**

Противосифилитическое средство. Иногда применяется при нейросифилисе и висцеральном сифилисе

1. Rp.: Hydrargyri diiodidi 0,12
Kalii iodidi 6,0
Aquae destillatae 200,0
 2. Rp.: Hydrargyri diiodidi 0,06
Kalii iodidi 3,75
Aquae Menthae 60,0
Aquae destillatae 120,0
MDS. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день после еды
-

Бийохинол — Biiochinolum

8% взвесь йодовисмутата хирина в нейтрализованном персиковом масле

Синонимы: Bismiochinina, Bismos, Herabismol, Jobichin, Quinby, Quinimutol, Quiniobine, Quiniobismuth, Quinostab, Rubyl, Spirobismol, Treproquinol

Противосифилитическое средство.

Применяется при лечении всех форм сифилиса взрослых и детей, в том числе и при нейросифилисе. Используется также как неспецифическое рассасывающее средство при воспалительных заболе-

Выпускается во флаконах по 100 мл

Хранение — список Б, в сухом прохладном месте

Срок годности — 3 года

Дополнительный срок годности после переконтроля — 2 года

ваниях центральной нервной системы

Rp.: Biiochinoli 100,0

DS. По 3 мл внутримышечно 1 раз в 3 дня

Бикарминт — Bicarmintum

Состав на 1 таблетку:

Natrii tetraboratis

Natrii hydrocarbonatis aa 0,4

Natrii chloridi 0,2

Mentholi 0,004

Хранение — в сухом месте

Срок годности — 3 года

Антисептическое и противоспалительное средство.

Применяют для полоскания, ингаляции при воспалительных процессах верхних дыхательных путей

Rp.: Tabul. Bicarminti N. 10

DS. Растворить 1—2 таблетки в 1/2 стакана теплой воды для полоскания горла и рта

Билагит — Bilagit (ВНР)

Состав на 1 драже:

Homatropini methylbromidi 0,001

Mentholi 0,0075

Paraverini hydrochloridi 0,02

Natrii cholici 0,06

Hexamethylenetetramini 0,08

Phenolphthaleini 0,02

Хранение — список Б, в сухом защищенном от света месте

Холинолитическое, спазмолитическое, антимикробное, желчегонное и послабляющее средство.

Применяют при холецистите, холангите, запорах, желчекаменной болезни, для предупреждения рецидивов после холецистэктомии

Rp.: Dragee «Bilagit» N. 30

DS. По 1—2 драже 2—3 раза в день после еды

Билихол — Bilichol (УССР)

Комплексная соль гексаметилентетрамина с холевой кислотой

Хранение — в сухом, защищенном от света месте

Антисептическое и желчегонное средство (холеретик).

Применяют при холецистите, холангите, желчекаменной болезни, гепатитах

Rp.: Dragee «Bilichol» N. 30

DS. Драже проглатывают целиком, не разжевывая, запивая водой

**Бильрота йодоформный
линимент — Linimentum
Iodoformii Bilrotti**

Антисептическое и раздражающее средство.

Применяется для перевязок с целью усиления развития грануляций и ускорения заживления ран. По действию и применению близок к линименту Вишневого (см.)

1. Rp.: Iodoformii 10,0
Glycerini 100,0
2. Rp.: Iodoformii 10,0
Aquaе destillatae
Glycerini aa 50,0
3. Rp.: Iodoformii 1,0
Olei Oliviarum 4,0
Glycerini 8,0
4. Rp.: Iodoformii 1,0
Olei Vaselini 15,0
M. f. linimentum
DS. Для перевязок

Биманол — Bimanol (ПНР)
β-Диметиламиноэтанол пара-ацетамидобензоат

Психостимулирующее и антидепрессивное средство, близкое к «Ацефену».

Синонимы: Bitonal, Cebroдин, Cergon, Deaner, Dianol, Diforene, Dinolan, Elevant, Pabenol, Parmetina, Psicoton

Применяется при астении, депрессивных состояниях, неврозах. Противопоказан при психомоторном возбуждении, grand mal, инфекциях центральной нервной системы

Выпускается в таблетках по 0,025

Хранение — список Б

Rp.: Tabul. «Bimanol» 0,025

D. t. d. N. 10

S. По 1 таблетке 1—2 раза в день.

Не принимать перед сном

Бимолин — Bimolin (СФРЮ)
N', N'-Ангидро-бис-(2-окснэтил)-бигуанид

Противовирусное средство.

Синонимы: Bioxine, Fludeten, Flumadon, Flumidin, Influmin, Ipenitol, Moroxydinhydrochlorid, Morpholinobiguanidhydrochlorid, Vironil, Virugon, Virusmin, Virustat

Применяют профилактически, а также с лечебной целью при гриппе для предупреждения развития осложнений, при кори, опоясывающем лишае и др.

Выпускается в таблетках по 0,1

Хранение — список Б

Rp.: «Bimolin» 0,1

D. t. d. N. 30 in tabul.

S. По 1—2 таблетки 3 раза в день профилактически или по 2—3 таблетки 3 раза в день для лечения

Бинге микстура —
Mixtura Binge

Успокаивающее средство.
Применяется при неврозах и
бессоннице

Рр.: Natrii bromidi
Kalii bromidi $\bar{a}\bar{a}$ 2,0
Ammonii bromidi
Chlorali hydrati $\bar{a}\bar{a}$ 1,5
Codeini phoshatis
Aethylmorphini hydrochloridi $\bar{a}\bar{a}$ 0,05
Aquaе destillatae 300,0
MDS. По 1 столовой ложке 1—2 раза в день

Бипрессин — Bipressin
Состав на 1 таблетку:
Binazini 0,02
Reserпинi 0,0002

Гипотензивное средство.
Применяется для лечения гипер-
тонической болезни I—II стадии,
а также при атеросклеротической
гипертонии

Хранение — список Б
Срок годности — 5 лет

Примечание: Binazin
(1-[N'-этоксикарбонилгидразин]-
фталазина гидрохлорид)-гипотен-
зивное средство, близкое к «Апрес-
сину».

Рр.: Tabul. «Bipressin» N. 50
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Бисал — Bisalum
Состав на 1 таблетку:
Bismuthi subnitratіs
Phenylii salicylatіs $\bar{a}\bar{a}$ 0,25
Opіi 0,01

Вязущее, антисептическое и
обезболивающее средство.

Хранение — список А
Срок годности — 2 года

Применяют при язвенной болез-
ни желудка, двенадцатиперстной
кишки, а также при колитах,
энтеритах

Рр.: Tabul. Bisali N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Бифактон — Bifacton (Голл.)
Концентрированный внутрен-
ний фактор Касла в комбинации
с витамином В₁₂
Выпускается в таблетках по 0,5
Хранение — в сухом, защищен-
ном от света месте

Антианемическое средство.
Применяют при пернициозной
анемии, когда парентеральная те-
рапия невозможна или нежела-
тельна, при макроцитарной ане-
мии алиментарного происхожде-
ния

Рр.: Tabul. «Bifactor» 0,5

D. t. d. N. 30

S. По 2 таблетки в день; при улучшении картины крови доза может быть уменьшена до 1 таблетки в день

Бишпан — Bispan (ВНР)

Состав на 1 таблетку:

Isopropamidi 0,005

Nospani 0,06

Хранение — список Б

Холинолитическое и спазмолитическое средство.

Применяют при расстройствах моторной и секреторной функции желудочно-кишечного тракта; острым и хроническом гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, колите, метеоризме, холецистите, холангите, спазмах мочеточника и мочевого пузыря, спазмах гладкой мускулатуры матки и др.

Рр.: Tabul. «Bispan» N. 20

DS. В острых случаях одновременно 1—2 таблетки.

В хронических случаях по 1 таблетке 3 раза в день, с постепенным снижением дозы до 1/2—1 таблетки 2 раза в день

БК-8 (Белковый кровезаменитель В. А. Белицера и К. И. Катковой)

Приготовлен из сыворотки крови крупного рогатого скота

Выпускается в ампулах 250 мл

Хранение — в запаянных ампулах, в защищенном от света месте при температуре 2—10° (при появлении в ампуле муты или хлопьев препарат для применения не пригоден)

Срок годности — 1 год 6 мес.

Белковый плазмозамещающий препарат.

Применяют БК-8 при шоке, острых и хронических кровопотерях, при ожогах, гнойно-воспалительных процессах, для предупреждения шока во время операций и в послеоперационном периоде, при гипопротенемии и т. п. Вводится внутривенно (преимущественно капельно) или под кожу. Однократная доза — 500—700 мл

Б-комплекс — B-complex (ЧССР, СРР)

Состав на 1 ампулу:

Thiamini chloridi 0,01

Riboflavini mononucleotidi 0,004

Pyridoxini hydrochloridi 0,003

Calcii pantothenatis 0,005

Nicotinamidi 0,04

Aquae pro injectionibus ad 1 ml

Витаминный препарат.

Применяют при недостатке в организме витаминов группы В, невритах, у недоношенных детей и т. д.

Состав на 1 драже:
Thiaini hydrochloridi
Riboflavini $\bar{a}\bar{a}$ 0,002
Pyridoxini hydrochloridi 0,001
Calcii pantothenatis 0,003
Nicotinamidi 0,002

Срок годности CPP — 1 год;
ЧССР — 4 года

Rp.: Sol. «B-complex» 1 ml
D. t. d. N. 5 in ampul.
S. Внутримышечно или в вену медленно или капельно
по 1—2 ампулы в день или 2—3 раза в неделю
Rp.: Dragee «B-complex» N. 50
DS. По 1—2 драже (таблетки) 3—4 раза в день

**БЛ, паста против геморроя —
Pasta antihemorrhoidalia «BL»**

Антимикробное, противовоспа-
лительное и подсушивающее сред-
ство.

Применяется при обострениях
геморроя

Rp.: Barii sulfatis 100,0
Streptocidi 40,0
Pastae Zinci 60,0
M. f. pasta

DS. Для смазывания геморроидальных узлов.

Приготовление: смешивают сульфат бария и стрептоцид, к получен-
ной смеси прибавляют цинковую пасту до получения однородной массы,
которую на протяжении 10—20 мин растирают для придания эла-
стичности. Полученный препарат делят на 10 доз

**Бланкара пилюли —
Pilulae Blancardi**

Железосодержащий препарат.
Применяется при железодефи-
цитных анемиях

Rp.: Ferri 2,0
Iodi
Aquae destillatae
Sacchari $\bar{a}\bar{a}$ 4,0
Pulveris radice Althaeae 2,0
Extr. radice Glycyrrhizae g. s.
Ut fiant pilulae N. 100
DS. По 2—3 пилюли 3—4 раза в день после еды

Приготовление: железо, йод и воду растирают в ступке до обесцве-
чивания, затем добавляют остальные компоненты и готовят пилюли,
как обычно

Бло пилюли — Pululae Blandi

Железосодержащий препарат.
Применяется при гипохромных
анемиях различного происхож-
дения, обычно в сочетании с циано-
кобаламином. При секреторной
недостаточности желудка следует
запивать разведенной соляной
кислотой, смешанной с водой в
соотношении 1 : 20 — 1 : 40

1. Rp.: Ferri (II) sulfatis
Kalii carbonatis
Aquae destillatae āā 5,0
Sipuri simplicis 2,5
Gummi arabici 1,0
Ut fiant pilulae N. 50
2. Rp.: Ferri (II) sulfatis 9,0
Kalii carbonatis 7,0
Sacchhari 3,0
Pulveris radices Althaeae 2,0
Glycerini g. s.
Ut fiant pilulae N. 100
DS. По 1 пилюле 3—5 раз в день после еды

**Бло таблетки — Tabulettae
Blandi**

Показания и применение см.
«Бло пилюли»

1. Состав на 10 таблеток:
Ferri (II) sulfatis
Natrii hydrocarbonatis āā 2,0
Sacchhari 1,0
Olei Cacao q. s.
2. Состав на 100 таблеток:
Ferri (II) sulfatis 9,0
Kalii carbonatis 7,0
Pulv. radices Althaeae 2,0
Glycerini 3,0
- Существуют другие прописи,
содержащие по 0,28 закисного
сульфата железа в 1 таблетке
Хранение — в хорошо закупо-
ренных банках
Срок годности таблеток, покры-
тых оболочкой, — 3 года

Rp.: Tabul. Blandi N. 100
DS. По 1 таблетке 3—4 раза в день после еды

Богомольного таблетки
Tabulettae Bogomolnovi

Состав на 1 таблетку:

Antipyrini
Amidopyrini $\bar{a}\bar{a}$ 0,2
Anaesthesini 0,3
Elaeosacchari Menthae 0,1

Болеутоляющее, противовоспалительное, жаропонижающее средство.

Применяется после небольших операций (тонзиллэктомии), при миозите, радикулите, неврите и пр., при заболеваниях верхних дыхательных путей. В последнем случае таблетку рекомендуется держать во рту до полного рассасывания

Rp.: Tabul. Bogomolnovi, N. 20
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Богословского капли —
Guttae Bogoslóvsky

Сокогонное и противопоносное средство.

Применяется при гипоацидных гастритах, гастроэнтеритах и энтероколитах (в последних случаях — как дополнение к антимикробной терапии)

Rp.: Tincturae Chinae simplicis 15,0
Tincturae Strychni 4,0
Tincturae Opii crocatae 8,0
Tincturae Chamomillae 4,0
MDS. По 20—25 капель 3 раза в день

Бойко жидкость —
Liquor Bojko

Холинолитическое и местно-анестезирующее средство.

Применяется при острых и хронических гиперацидных гастритах, печеночных коликах и т. д.

Rp.: Atropini sulfatis 0,02
Natrii iodidi 0,5
Novocaini 0,3
Aquae destillatae 30,0
MDS. По 8—10 капель при болях

Бом-Бенге бальзам — Balsatum
Baum-Bengée

Свойства и показания — см.
«Бом-Бенге мазь»

Rp.: Mentholi 5,0
Methylis salicylatis 25,0
Lanolini 90,0
MDS. Для растирания

**Бом-Бенге мазь — Unguentum
Baum-Bengee**

Состав:
Mentholi 4,0
Methylii salicylatis 21,0
Vaselini 75,0
Paraffini 4,0
Срок годности — 3 года

Отвлекающее средство.
Применяется наружно при ради-
кулитах, невритах, невралгии,
миозитах, люмбаго

Rp.: Unguenti «Baum-Bengee» 100,0
DS. Для растирания

Бороглицерин — Boroglycerinum

Антисептическое и смягчающее
кожу средство.
Применяется для смягчения ко-
жи рук и лица, для обработки
мелких повреждений кожи, при
зуде

Rp.: Acidi borici 10,0
Glycerini 90,0
MDS. Для наружного употребления

Бороментол — Boromentholum

Состав:
Acidi borici 4,0 (5,0)
Glycerini 95,0 (94,5)
Mentholi 1,0 (0,5)
Срок годности — 3 года 6 мес.

Антисептическое и болеутоляю-
щее средство.
Применяется при зуде кожи,
для смазывания слизистой носа
при остром рините и невралгии

Rp.: Boromentholi 10,0
DS. Для наружного употребления

Боротимол — Borothymolum

Антисептическое и смягчающее
кожу средство.
Применяется в косметических
целях, для придания эластичности
коже

Rp.: Gelatinae
Aquae destillatae aa 5,0
Acidi borici 5,0
Thymoli 2,0
Spiritus aethylici 10,0
Glycerini 150,0
MDS. Для наружного употребления

Приготовление: в смеси глицерина и воды при нагревании растворяют
желатин и борную кислоту, по охлаждению добавляют раствор тимола
в спирте

**Боткина капли —
Guttae Botkini**

Сокогонное средство.
Применяется при гипоацидных
гастритах

1. Rp.: Chinini hydrochloridi 15,0
Acidi hydrochlorici diluti 23,0
Tincturae Chinae compositae
Spiritus aetherei aa 120,0
Olei Menthae piperitae 2,0
2. Rp.: Chinini hydrochloridi 2,0
Acidi hydrochlorici diluti
Tincturae Strychni aa 3,0
Tincturae Opii simplicis 12,0
Tincturae Valerianae aethereaе 24,0
Tincturae Chinae compositae 48,0
Olei Menthae piperitae 1,0
MDS. По 15—20 капель 2—3 раза в день, перед едой
-

Брассикон — Brassicon

Препарат раздражает кожу и
слизистые.

Применяется как средство сим-
птоматической терапии при голов-
ной боли (мигрени)

- Rp.: Olei Menthae 5,0
Camphorae 2,0
Olei Sinapis aetherei 1,0
Aetheris 10,0
Spiritus aethylici 90% 30,0
Tincturae Menthae q. s.
MDS. Для натирания лба и висков.
-

**Бреславского мазь —
Unguentum Breslawsky**

Антимикробное, вяжущее и
анестезирующее средство.

Применяется для лечения инфи-
цированных ран и воспалитель-
ных заболеваний кожи

- Rp.: Anaesthesini
Streptocidi aa 4,8
Benzylpenicillini-Kalii 500 000 ED
Bismuthi subnitratіs
Olei jecoris Aselli aa 8,0
Vasellini 80,0
M. f. ung.
DS. Наружное. Для перевязок
-

Бринальдикс — Brinaldix (ВНР)
N-(цис-2,6-диметил-пиперидино)-4-хлор-3-сульфамойлбензамид

Синонимы: Chlosudimerprimulm, Cloramidum

В случае необходимости дозу можно увеличить до 3 таблеток в день. Поддерживающие дозы — $\frac{1}{2}$ —1 таблетка в день или 1 таблетка через день

Хранение — список Б

Rp.: Tabul. «Brinaldix» 0,2
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. 2 таблетки утром

Диуретическое средство.

Применяется при отеках, связанных с сердечной недостаточностью, гипертонической болезнью, нефропатии, отеках от применения кортикостероидных препаратов. Противопоказания: острый гломерулонефрит, а также поражения почечных клубочков. См. также «Дихлотиазид», «Лазикс»

Бродского микстура —
Mixtura Brodsky

Противоэпилептическое средство. Эффективно главным образом при больших припадках

Rp.: Phenobarbitali 0,8
Coffeini 0,4
Natrii tetraboratis 1,0
Mercusali 2,0
Calcii chloridi 15,0
Aquaе destillatae 200,0
Tincturae Menthae piperitae gtt. III
MDS. По 1 десертной ложке 3—5 раз в день.

Приготовление: буру, фенобарбитал и кофеин заливают 100 мл воды и нагревают на водяной бане при постоянном помешивании до полного растворения. После охлаждения к раствору добавляют 30 мл 50% раствора хлорида кальция, мятную настойку и доливают водой до указанного количества

Бромадрил — Bromadryl
(ЧССР)

N, N - Диметил - 2 - (пара-бром-1,1 - дифенилэтокси) - этиламина гидрохлорид

Синонимы: Embraminhydrochlorid, Mebrophenhydraminhydrochlorid, Mebryl („SKF“)

Выпускается в таблетках по 0,025

Хранение — список Б

Rp.: Tabul. «Bromadryl» 0,025
D. t. d. N. 10

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день с постепенным снижением до $\frac{1}{2}$ таблетки 3—4 раза в день

Антигистаминное средство.

Применяют при крапивнице, отеке Квинке, зуде (при укусе насекомых, желтухе и т. п.), сенной лихорадке, сывороточной болезни, некоторых видах бронхиальной астмы, мигрени и др.

Бромизовал — Bromisovalum
N-(α -бромизовалерианил)-мочевина

Синонимы: Abroval, Achibromit, Alboman, Albroman, Alluval, Alphabroom, Alural, Barbibrom, Bromherbal, Bromisan, Bromisovalum, Bromodorm, Bromoval, Bromovalcarbamid, Bromoxil, Bromural, Bromuran, Bromurea, Bromuresan, Bromuvan, Bromvaleryl, Bromvalerylurea, Bromyl, Broval, Brovalurea, Dagrabromyl, Dibroluur, Dormigen (e), Erbrol, Ergobromin, Hansadorm, Hypnoval, Isobromyl, Isonurin, Isoval, Leuperval, Magnal, Melosan, Neo-Diacid, Pivadorme, Plenabural, Quite, Sedural, Somnibrom, Somnurol, Upiol, Uvaleral, Valobroom, Valural, Valurea, Verobroman

Выпускается в порошке и в таблетках по 0,3. Входит в состав комбинированных таблеток

Хранение—список Б, в хорошо закупоренных банках оранжевого стекла, таблетки — в защищенном от света месте

Срок годности порошка — 5 лет; после переконтроля — 3 года

Успокаивающее и слабое снотворное средство.

В небольших дозах (0,3—0,6 г 1—2 раза в день) оказывает успокаивающее действие; в дозах 0,6—0,75 г за $\frac{1}{2}$ ч до сна как снотворное. Одновременный прием амидопиррина усиливает действие снотворного. После приема препарата как снотворного средства рекомендуется выпить стакан теплого чая

Rp.: Bromisovali 0,3
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Бромитал — Bromital
Состав на 1 таблетку:
Bromisovali
Barbitali-natrii
Barbitamylī āā 0,15
Хранение — список Б
Срок годности — 5 лет

Снотворное и успокаивающее средство.

Применяется при бессоннице, неврастении и пр.

Rp.: Tabul. Bromitali N. 10
DS. По $\frac{1}{2}$ —1 таблетке 2—3 раза в день как успокаивающее средство. По 1—2 таблетки за 30—60 мин до отхода ко сну как снотворное средство

Бромкамфора — Bromcamphora
3-Бромборнан-2-он
Синонимы: Camphora monobromata

Выпускается в порошке и таблетках по 0,15 или 0,25

Хранение — в хорошо укупленных банках оранжевого стекла в защищенном от света месте

Срок годности — 10 лет; после переконтроля — 5 лет

Успокаивающее средство, улучшает сердечную деятельность. Применяют при повышенной нервной возбудимости, невралгии, неврозах сердца

Rp.: Bromcamphorae 0,15 (0,25)
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Бруфен — Brufen (СФРЮ)
2-(4-Изобутилфенил)-пропионовая кислота

Синоним: Ibuprophen

Выпускается в драже по 0,2

Хранение — список Б

Противовоспалительное средство.

Применяют при лечении артрозов и артритов. Отличается от амидопирина или бутадiona более быстрым наступлением клинического эффекта

Rp.: Dragee «Brufen» 0,2
D. t. d. N. 30
S. По 1 драже 6 раз в день, постепенно снижая суточную дозу до 3—4 драже. Принимать натощак

Букарбан — Bucarban (ВНР)
N¹-сульфанилил-N²-н-бутилмо-
чевина

Синонимы: Aglicolo, Antibetis, Carbutamid, Diabetal, Diabeton, Diaboral, Diabutan, Glucidoral, Нурогlycamid, Invenol, Nadisan, Orabetic, Oranil, Orvalin, Sulfa-
diabet, Talanton, Yosulan

Хранение — список Б

Срок годности — не ограничен

Rp.: Tabul. «Bucarban» 0,5
D. t. d. N. 20
S. Дозировка индивидуальна.

Антидиабетическое средство.

Применяют для лечения сахарного диабета главным образом у пожилых людей с длительностью заболевания не более 5 лет, у которых нарушение углеводного обмена поддается регулированию инсулином в дозах 40—70 ЕД или у лиц, не пользующихся инсулином

По химическому строению близок к бутамиду

**Булатова порошки —
Pulveres Bulatovi**

Анальгезирующее, бронхолитическое и сосудосуживающее средство.

Применяется при гипотонии, головной боли, бронхиальной астме и пр.

Rp.: Ephedrini hydrochloridi
Coffeini aa 0,01 (0,05)
Acidi acetylsalicylici 0,5
M. f. pulvis
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Буренкова пилюли —
Pilulae Burenkovi

Специфический антиалкогольный препарат. Обладает также общеукрепляющим и успокаивающим действием.

Применяется для лечения хронического алкоголизма в сочетании с психотерапией. Абсолютно противопоказан при тяжелых соматических заболеваниях (сердечная декомпенсация, цирроз печени, гипертоническая болезнь), туберкулезе, психозах, обострениях язвенной болезни желудка

Rp.: Acidi arsenicosi anhydrici 0,02
Bromcamphorae 4,0
Teturami
Ferri lactatis aa 3,0
Massae pilularum q. s.
Ut fiant pilulae N. 60
DS. По 1—3 пилюли 2—3 раза в день (дозировки индивидуальны в зависимости от переносимости)

Бурже микстура —
Mixture Burgeë

Антацидное и легкое послабляющее средство.

Применяется при гиперацидных гастритах, язвенной болезни желудка, особенно сопровождающихся запорами

Rp.: Natrii hydrocarbonatis 8,0
Natrii phosphatis 4,0
Natrii sulfatis 2,0
Aquaе destillatae 500,0
MDS. По 1/2 стакана утром и вечером перед едой

Бурже порошок с экстрактом красавки — Pulveres Burgeë cum extracto Belladonnae

Антацидное, холинолитическое и послабляющее средство. По применению не отличается от «Бурже микстуры»

1. Rp.: Natrii sulfatis
Magnesii sulfatis aa 30,0
Magnesii oxydi 16,0
Natrii hydrocarbonatis 20,0
Extr. Belladonnae 0,6

2. Rp.: Natrii hydrocarbonatis
Natrii phosphatis
Natrii sulfatis aa 200,0
Extr. Belladonnae 3,0
M. f. pulvis

DS. По $\frac{1}{2}$ чайной ложки на $\frac{3}{4}$ стакана воды за полчаса до еды

**Бурова жидкость —
Liquor Burovi**

Состав на 100 мл:
Aluminii sulfatis 46,5
Sol. Acidi acetici 30% 39,0
Calcii carbonatis praecipitati 14,5
Aqvae destillatae ad 100,0
Срок годности — 1 год; после
переконтроля — 6 мес.

Противовоспалительное, вяжущее и антисептическое средство. Применяется для обработки слизистых оболочек (примочки, полоскания и пр.) при воспалительных заболеваниях

Rp.: Solutionis Aluminii subacetatis 8%—100,0
DS. Наружное

Бутадион — Butadionum

1,2-дифенил-4-н-бутилпиразолидиндион-3,5

Выпускается в таблетках по 0,05 и 0,15 (СССР) и в ампулах по 3 мл 20% раствора с добавлением 1% ксикаина («Бутапиразол», ПНР)

Синонимы: Arthrizon, Artrizin, Artropan, Azobutil, Butalidon, Butapirazol, Butartril, Butartrina, Butazina, Butazolidin, Butylpyrin, Buzon, Diozol, Diphenbuzol, Diphenylbutazon, Ecobutazone, Eributazone, Febuzina, Fenibutol, Fenilbutazona, Intra-butazone, Ipsoflame, Nadozone, Phēbuzine, Phenbutazol, Phenopyrine, Phenylbutazon, Reumasyl, Reumuzol, Reupolar, Shigrodin

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности таблеток, покрытых оболочкой, — 3 года

Анальгетическое, противоревматическое, жаропонижающее и противовоспалительное средство.

Применяется при ревматизме, хроническом полиартрите, подагре, воспалениях соединительной ткани (люмбаго, кривошея, периаартрит), радикулите, тромбофлебите и т. п.

Rp.: Butadioni 0,15 (0,05)

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 1 таблетке 4—6 раз в день

Rp.: Sol. «Butapirazol» 20% 3 ml

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. Внутримышечно вводить глубоко по 1—2 ампулы в день

Бутамид — Butamidum
N- (4-метилбензолсульфанил)-N'-
н-бутилмочевина

Синонимы: Aglicem, Aglycid, Arcosal, Artosin, Beglucin, Diaben, Diabetol, Diabuton, Diasulin, Dirastan, Dolipol, Fresan, Glicemin, Glicotron, Ipoglicone, Meranol, Mobenol, Neobellin, Neo-Diabetal, Neoinsoral, Orabet, Oralin, Oresan, Osdiaabet, Oterben (ВНР), Proinsul, Rastinon, Tolbugen, Tolbusal, Tolbutamid, Tolbutol, Tolumid, Tolurasi, Toluvan и др.

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 3 года; после переконтроля — 2 года

Rp.: Butamidi 0,5
D. t. d. N. 100 in tabul.

S. Дозировка индивидуальна и определяется в стационаре под постоянным врачебным и лабораторным контролем

Буяльского примочка глазная —
Aqua ophthalmica Bujaľsky

Вяжущее и антисептическое средство.

Применяется при воспалительных заболеваниях конъюнктивы и роговицы в виде закапываний или примочки

Rp.: Zinci sulfatis 1,0
Spiritus camphorati 9,0
Aquae pro injectionibus 420,0
MDS. Глазная примочка

Приготовление: сульфат цинка растворяют в воде для инъекций и к раствору добавляют камфорный спирт. Жидкость оставляют стоять при частом взбалтывании в течение нескольких часов, после чего фильтруют. Вместо воды для инъекций может применяться черемуховая вода (Aqua Pruni radi)

Вазальгин — Vasalgin (ВНР)
5-Алил-5-(β-гидроокси-пропил)-
барбитуровая кислота
Выпускается в таблетках по 0,1
Хранение — список Б

Сосудорасширяющее средство.
Применяют при головной боли, мигрени, болезни Рейно и т. п. Снотворного эффекта не имеет, см. также «Ипронал».

Rp.: «Vasalgin» 0,1
D. t. d. N. 50 in tabul.
S. По 1 таблетке 3 раза в день.
В тяжелых случаях назначают по 2 таблетки
3 раза в день

Вазелин ароматный —
Vaselinum aromaticum

Косметическое средство.
Применяется для смягчения ко-
жи лица и рук

Rp.: Vaselini 98,0
Olei Bergamottae
Olei Citri aa 1,0
MDS. Наружное

Вазелин карболовый —
Vaselinum carbolisatum 5—10%

Антисептическое средство.
Применяется для обработки мел-
ких повреждений кожи и лечения
поверхностных воспалительных
заболеваний кожи

Rp.: Phenoli 5 % 10 %
 1,0 1,0
Vaselini 19,0 9,0
MDS. Наружное

Вазелин ланолиновый —
Vaselinum lanolinatum

Индифферентная основа для ма-
зей

Rp.: Lanolini anhydrici 10,0
Vaselini 30,0
MDS. Наружное

Вазелин тимоловый —
Vaselinum thymolatum

Антисептическое средство.
Применение — см. «Вазелин
карболовый»

Rp.: Thymoli 5,0
Vaselini 95,0
MDS. Наружное

Вазоген жидкий —
Vasogenum liquidum

Индифферентная основа для
приготовления линиментов

Rp.: Acidi oleinici 30,0
Solutionis Ammonii caustici spirituosae 10,0
Olei Vaselini 60,0
M. f. linimentum
DS. Наружное

**Вазоген йодный —
Vasogenum iodatum**

Антисептическое и фунгицидное средство.

Применяется при воспалительных и грибковых (эпидермофития, руброфития и пр.) поражениях кожи

Rp.: Iodi 10,0
Vasolimenti 90,0
M. f. linimentum
DS. Наружное

Вазоген ихтиоловый — Vasogenum Ichthyoli

Rp.: Ichthyoli 10,0
Vasogeni 90,0
M. f. linimentum
DS. Наружное

Вазоластин — Vasolastin

(Голл.)

Состав 1 ампулы:

Ферментов метаболизма жиров
и липоидов 8000 ЕД
Ферментов аминоксидазного комплекса 4000 ЕД
Ферментов тирозиназного комплекса 4000 ЕД
Стабилизирующего растворителя
2 мл

Ферментный препарат.

Применяют при сердечно-сосудистых заболеваниях, атеросклерозе сосудов мозга, коронарном склерозе, нарушении периферического артериального кровоснабжения: эндартериите, болезни Бюргера, болезни Рейно, а также при варикозном расширении вен, нарушении жирового и холестеринового обмена

Rp.: «Vasolastin» 2 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. При сердечно-сосудистых заболеваниях по 1 ампуле ежедневно в течение 2 недель, после чего по 3 ампулы в неделю в течение 3 мес., затем по 2 ампулы в неделю в течение 6 мес.

Валедрин — Valedrin

Состав на 1 таблетку:

Amidopyridini 0,3
Codeini 0,014
Natrii bromidi 0,14
Extracti Valerianae 0,04

Хранение — в сухом месте

Успокаивающее и болеутоляющее средство.

Применяют при головной и зубной боли, неврозах, невралгиях, миозитах, плевритах и др.

Rp.: Tabul. «Valedrin» N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Валентесал — Valentesalum
(ЧССР)

Состав на 1 таблетку:
Theobromini
Bromisovalii aa 0,2
Phenobarbitali 0,015

Хранение — список Б, в защищенном от света месте
Срок годности — 5 лет

Успокаивающее и сосудорасширяющее средство.

Применяют при стенокардии, нейроциркуляторной дистонии, гипертонической болезни и др.

Рр.: Tabul. «Valentesal» N. 20
DS. По 1 таблетке 3 раза в день

Валидол — Validolum

25—30% раствор ментола в ментоловом эфире изовалериановой кислоты.

Выпускают во флаконах и в таблетках. Каждая таблетка содержит 0,06 г валидола (что соответствует 3 каплям валидола) и сахар

Срок годности таблеток — 1 год 6 мес.

Успокаивающее средство. Рефлекторно расширяет коронарные сосуды.

Применяется при стенокардии, неврозах, неврастении, психастении, а также как противорвотное средство при морской и воздушной болезни

Рр.: Tabul. Validoli N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день; держать под языком до полного рассасывания

Валиум — Valium

7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин-2-он

Синонимы: Ansiolin, Ansiolisina, Araurin (CPP), Cercine, Diacepan, Diazepamum, Duxen, Eridan, Horizon, Lembrol, Liberetas, Noan, Pacitran, Quetinin, Quatril, Seduxen (ВНР), Tranquirit

Выпускается в таблетках по 0,005 и в ампулах по 2 мл 0,1% раствора (СФРЮ)

Хранение — список Б

Малый транквилизатор. Применяется для снятия страха, тревоги, напряжения при неврозах, мигрени, климаксе. Умеренно снижает мышечный тонус, поэтому может применяться при спастических состояниях, а также для снятия абстинентного синдрома при лечении наркомании. Используется при эпилепсии как для систематического лечения (совместно с другими препаратами), так и для купирования эпилептического статуса; в последнем случае вводят в вену в 20 мл 40% раствора глюкозы. См. также «Либриум»

Рр.: Valii 0,005
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Rp.: Sol. «Araurin» 0,1% 2 ml.
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. По 1 мл в вену (в мышцу) 1 раз в день

Валоседан — Valosedan
(ЧССР)
Состав:
Extr. Valerianae 0,3
Olei Humuli lupuli 0,15
Extracti radices Rhei 0,83
Barbitali-natrii 0,2
Spiritus aethylici 20,0
Aquaе destillatae ad 100,0
Срок годности — 3 года

Успокаивающее средство.
Применяется при неврастении,
мигрени, легких формах бессон-
ницы, в климактерическом перио-
де

Rp.: «Valosedan» 100,0
DS. По 1 чайной ложке 2—3 раза в день

Вальда пастилы —
Trochisci Valdi

Отхаркивающее средство.
Применяется при сухом кашле,
сопровождающем заболевания дыха-
тельных путей

Rp.: Mentholi 0,002
Olei Eucalypti 0,0005
Sacchari
Gummi arabici aa 0,5
M. f. trochiscum
D. t. d. N. 20
S. По 1 пастилке 3 раза в день

Вальденберга жидкость —
Liquor Valdenbergi

Отхаркивающее средство.
Показания к применению — см.
«Вальда пастилы»

Rp.: Ammonii chloridi
Olei Terebinthinae aa 1,0
Aquaе destillatae 100,0
MDS. Через ингалятор или пульверизатор вды-
хать несколько раз в день. Перед употребле-
нием взбалтывать

Ванна горчичная —
Balneum sinapisatum

Местнораздражающее средство.
Применяют при заболеваниях
дыхательных путей (пневмонии,
бронхите), гриппе, главным
образом у детей

Rp.: Farinae Sinapis 100,0—250,0

Spiritus Sinapis 30,0—60,0

DS. На одну ванну. Порошок горчицы в мешочке опускают в ванну, туда же вливают горчичный спирт

**Ванна скипидарная —
Balneum terebinthinatum**

Местнораздражающее средство.
Показание к применению — см.
«Ванна горчичная»

Rp.: Olei Terebinthinae

Saponis kalini

Aquae aa 100,0

MDS. На одну ванну

Варицид — Varicocid (ГДР,
ЧССР) 5% водный раствор морру-
тата натрия

Хранение — список Б

Срок годности — 2 года;

ЧССР — 5 лет

Препарат применяется для ле-
чения варикозного расширения
вен, геморроя и гемангиом

Rp.: Sol. «Varicocid» 5% 3 ml

D. t. d. N. 30 in ampul.

S. При варикозном расширении вен вводят в вари-
козные узлы по 1—3 мл; при гемангиомах —
глубоко в пораженные участки. При геморрое —
по несколько капель в узлы

Вегантофен — Vegantophen
(ПНР)

Состав на 1 драже:

Spasmolytini 0,03

Phenobarbitali 0,04

Хранение — список Б

Успокаивающее и спазмолити-
ческое средство.

Применяется при беспокойстве,
повышенной нервной возбуди-
мости, пилороспазме, язвенной
болезни, печеночной колике, спаз-
мах мочеточников и других спастических состояниях. При необ-
ходимости может быть использо-
ван как снотворное (2—3 драже
на ночь)

Rp.: Tabul. «Vegantophen» N. 10

DS. По 1 таблетке (драже) 2—3 раза в день

Венапиолин — Venapiolinum
Стерильный раствор пчелиного яда в персиковом или абрикосовом масле

Венапиолин-1 (КФ-1) содержит в 1 мл 2—3 условные единицы пчелиного яда

Венапиолин-2 (КФ-2) содержит «ослабленный» пчелиный яд

Хранение — в защищенном от света месте

Срок годности — 1 год 6 мес.

Биогенный препарат.
Венапиолин-1 применяют как болеутоляющее и противовоспалительное средство при ревматизме, невралгиях, плевритах и т. п. Венапиолин-2 применяют при аллергических и других заболеваниях

Rp.: Sol. Venapiolini oleosae

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Под кожу. В первые 3—5 дней инъекции делают ежедневно, затем через 1—2—3 дня

Вералгин — Veralgin (СССР)

Состав на 1 таблетку:

Bromisovali 0,25

Amidopyrini 0,2

Coffeini 0,025

Barbitali 0,015

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Анальгетическое и успокаивающее средство.

Применяют при головной, зубной боли, невралгии, дисменорее и др.

Rp.: Tabul. «Veralgin» N. 10

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Верографин — Verografin (СССР)

Натриевая соль 3,5-диацетиламино-2,4,6-тригидбензойной кислоты

Синонимы: Cardiografin, Diatrizoate, Gastrografin, Нураке, Natriumamidotrizoat, Neo-Urografin, Radioselectan urinaire et vasculaire, Renografin, Sodium amidotrizoate, Triognost, Triombrinum, Urografin, Urovison, Visotrast, Vrigrafub

Выпускают в виде 35%, 60% и 76% раствора в ампулах по 20 мл с приложением «тест-ампулы»

По строению и свойствам близок к отечественному трийотрасту

Хранение — в прохладном, защищенном от света месте

Срок годности — 2 года

Рентгеноконтрастное средство.

Препарат применяют при рентгенологическом исследовании мочевых путей, кровеносных сосудов и сердца. Возможно также использование препарата для ретроградной пиелографии

Rp.: Sol. «Verografin» 60% 20 ml

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. Для внутривенной урографии раствор препарата в количестве 25—40 мл вводят в локтевую вену в течение 3 мин. С целью ангиокардиографии препарат вводят из расчета 1 мл на 1 кг веса больного в локтевую, яремную и бедренную вену, зондом в сердце, в периферические вены или плечевую, лучевую, сонную, бедренную артерию, в аорту

Веродон — Verodonium

Состав на 1 таблетку:

Amidopyrini 0,1

Barbitali 0,3

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 2 года

Rp.: Tabul. «Verodonium» N. 10

DS. По 1 таблетке 1—3 раза в день

Снотворное и болеутоляющее средство.

Применяют при головной и зубной боли, бессоннице и пр.

Верол — Verol

Кератолитическое средство.

Показание к применению и использованию — см. «Араго», жидкость

Rp.: Acidi salicylici

Acidi lactici aa 5,0

Collodii 35,0

Terebinthinae 5,0

Fuxini 0,3

MDS. Наносить на пораженные участки кожи

Ветразин — Vetrazinum

3,4-Диметоксibenзилгидразина гидрохлорид

Синоним: Veratrylhydrazinhydrochlorid

Выпускается в таблетках по 0,005 и в ампулах по 1 мл 1% раствора

Хранение — список Б, в защищенном от света прохладном месте

Срок годности — 1 год

Rp.: Vetradini 0,005

D. t. d. N. 6 in tabul.

S. По 3—4 таблетки до 5 раз в сутки

Rp.: Sol. Vetradini 1% 1,0

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Ввести 1 мл под кожу или в мышцы, при необходимости инъекцию повторяют через 40—60 мин

Стимулятор сокращений матки

Применяют при первичной и вторичной слабости родовой деятельности. Эффект усиливается на фоне эстрогенов и окситоцина. Обладает также нейротропной активностью (ингибитор моноаминоксидазы)

Виадрил — Viadril
(США, Бельгия)

21-(3-карбоксихпропионилокси) -
-5β-прегнан-3,20-диола натриевая
соль

Синонимы: Hydroxydione (Natriumsuccinat), Pregnocin-Natrium, Presuren

Выпускается в ампулах по 0,5
и 1,0

Срок годности — 3 года

Неингаляционный общий анестетик.

Применяется для кратковременного наркоза самостоятельно (при небольших операциях, бронхоскопии и т. д.), а также для вводного наркоза. Не угнетает, в отличие от барбитуратов, дыхательный и сосудодвигательный центры. Не следует сочетать с барбитуратами. Может быть применен как успокаивающее и противосудорожное средство у алкоголиков и при эпилепсии (большие припадки)

Rp.: «Viadril» 0,5 (1,0)

D. t. d. N. 3 in ampul.

S. Содержимое ампулы растворить в 5% растворе глюкозы. Применять 5—10% растворы, промывая затем вену 5% раствором глюкозы. Эффективные дозы — 0,4—1,0 препарата

Видаля молоко — Lac Vidali

Антисептическое средство.

Применяется наружно для лечения себореи

Rp.: Sulfuris depurati

Spiritus camphorati āā 6,0

Solutionis acidi borici 2%

Spiritus aethylici āā 50,0

MDS. Наружное для обтирания

Видеин — Videinum

Комплекс кальциферола (витамин D₂) с казеином

Выпускается в драже и таблетках. Содержит 500, 1000, 5000 и 10 000 ИЕ витамина D₂

Хранение — список Б, в прохладном месте

Витаминный препарат.

Применяют для профилактики и лечения рахита. Более стоек и более удобен для применения, чем раствор эргокальциферола

Rp.: Videini 500, 1000, 5000 aut 10 000 ИЕ

D. t. d. N. 100 in tabul.

S. Детям назначают до 15 000 ИЕ в день, взрослым до 100 000 ИЕ в день

Видекс — Videx (ВНР)

4,4 - Диацетоксибензил пиперидил-2-метан

Синонимы: Acetphenolpiclin, Alaxa, Alsylax, Bisacodyl, Clyso-drast, Contalax, Dulcolax, Durolox, Hillcolax, Ivilax, Laxadin, Meta-lax, Neolax, Nigaeax, Normalene, Pyrilax, Rytmilax, Zetrax

Выпускается в таблетках по 0,01

Хранение — список Б

Слабительное средство.

Применяют при привычных запорах, при болезненных состояниях прямой кишки (геморрой, трещина заднего прохода и т. п.), при запорах, вызванных изменением режима (лежачий больной, диета и т. п.)

Рр.: Tabul. «Videx» 0,01

D. t. d. N. 20.

S. По 1—2 таблетки перед сном. Проглотить, не разжевывая

Викаир — Vicaikum

Состав на 1 таблетку:

Bismuthi subnitratіs 0,35

Magnesii subcarbonatis 0,4

Natrii hydrocarbonatis 0,2

Pulveris rhizomatis Calami

Pulveris corticis Frangulaeaa 0,025

Хранение — в сухом, прохладном и защищенном от света месте

Срок годности — 3 года

Вязущее, антацидное и умеренное слабительное средство.

Применяют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Детям противопоказан

Рр.: Tabul. Vicairi N. 100

DS. По 1—2 таблетки 3 раза в день после еды с 1/2 стакана теплой воды

Викалин — Vicalinum (ПНР)

Состав на 1 таблетку:

Bismuthi subnitratіs 0,35

Magnesii subcarbonatis 0,4

Natrii hydrocarbonatis 0,2

Pulveris rhizomatis Calami

Pulveris corticis Frangulae aa 0,025

Khellini

Rutini aa 0,005

Синоним: Roter (Голл.)

Хранение — в сухом, прохладном и защищенном от света месте

Срок годности — 5 лет

Применяют по тем же показаниям, что и «Викаир»

Рр.: Tabul. «Vicalinum» N. 100

DS. По 1—2 таблетки 3 раза в день после еды с 1/2 стакана теплой воды

Викасол — Vikasolum

2,3-Дигидро-2-метил-1,4-нафтохинон-2-сульфонат натрия

Синонимы: Antiemor K, Austrovit K, Bentavit K, Dumovit K, Hemodal, Kavitamin, Kavitan, Klotogen, K-Thrombin, K-vital, Menadionnatriumbisulfid, Synthex, Vitaplex K

Выпускается в виде порошка, таблеток по 0,015 и ампул по 1 мл 1% раствора

Хранение — список Б, в хорошо укупоренной таре, предохраняющей от действия света, таблетки и ампулы — в защищенном от света месте

Срок годности ампул — 2 года

Препарат витамина К (синтетический аналог). Специфическое средство при кровотечениях, связанных с пониженным содержанием в крови протромбина.

Применяют при желтухах в случае задержки поступления желчи в кишечник, при острых гепатитах, при кровотечениях после ранений или хирургического вмешательства, кровотечениях при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, геморроидальных и длительных носовых кровотечениях и др. Витамин К является антагонистом дикумарина, фенилина и других непрямым антикоагулянтов, однако викасол неэффективен при передозировке этих лекарственных средств

Rp.: Vikasoli 0,015

D. t. d. N. 25 in tabul.

S. По 1 таблетке 2 раза в день

Rp.: Sol. Vikasoli 1% 1,0

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 1 мл в мышцу

Виллата жидкость — Liquor Villati

Вяжущее, прижигающее и антисептическое средство.

Применяется в виде примочек, спринцеваний, инстилляций, полосканий в разведении 1:10—1:20 при воспалительных заболеваниях слизистых оболочек

1. Rp.: Cupri sulfatis

Zinci sulfatis āā 5,0

Aceti 6% 80,0

Liquoris Plumbi subacetatis 10,0

2. Rp.: Cupri sulfatis 1,0

Zinci sulfatis 2,0

Aceti 6% 25,0

Liquoris Plumbi subacetatis 4,0

MDS. Наружное

Вилькинсона мазь — Unguentum Wilkinsoni

Срок годности мази Вилькинсона № 1 — 2 года

Антисептическое и инсектицидное средство. Стимулирует трофические процессы в коже.

Применяется при чесотке, экземе, дерматитах и других кожных заболеваниях

1. Rp.: Sulfuris depurati
Picis liquidae āā 3,0
Axungiae porcinae 6,0
Saponis medicati
Calcii carbonatis āā 2,0
2. Rp.: Sulfuris depurati
Picis liquidae āā 15,0
Calcii carbonatis praecipitati 10,0
Unguenti Naphthalani
Saponis viridis āā 30,0
Aquaе destillatae 4,0
3. Rp.: Unguenti Wilkinsoni 2,0
Unguenti Zinci 40,0
4. Rp.: Unguenti Wilkinsoni
Unguenti Zinci āā 50,0
M. f. ung.
DS. Наружное

**Вильсона мазь —
Unguentum Wilsoni**

Вяжущее и антисептическое средство. Применяется при различных кожных заболеваниях

Rp.: Zinci oxydi 2,0
Axungiae porcinae benzoatae 12,0
M. f. ung.
DS. Наружное

Винбластин — Vinblastin (ВНР)

Алкалоид, выделенный из растения барвинка розового (*Vinca rosea*)

Выпускается в ампулах в порошке по 0,005

Хранение — список Б

Срок годности — 2 года

Цитостатическое средство.

Применяется при лимфогранулематозе, лимфосаркоме, ретикулосаркоме, а также при хроническом миелозе и др.

Rp.: «Vinblastin» 0,005
D. t. d. N. 25 in ampul.

S. Вводят внутривенно, растворив в 5 мл приложенного растворителя, 1 раз в неделю, начиная с дозы 0,1 мг/кг с постепенным увеличением до 0,15; 0,2; 0,25; 0,3 мг/кг

Винкамин — Vincaminum

Кристаллический алкалоид растения барвинка малого (*Vinca minor* L.)

Синонимы: Devinkan (ВНР), Мипогон

Выпускается в таблетках по 0,005 и 0,01 г и в ампулах по 1 мл 0,5% раствора

Хранение — список Б

Срок годности — 2 года

Гипотензивное и легкое успокаивающее средство, близкое к «Винкапану».

Применяется по тем же показаниям

Рр.: Sol. «Vincamin» 0,5% 1,0

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. По 1 ампуле внутримышечно 1 раз в сутки, с постепенным повышением до 3 или 2 раза по 2 ампулы в сутки. Инъекционную терапию девинкаином необходимо проводить только в стационарных условиях

Рр.: Tabul. «Vinkamin» 0,01

D. t. d. N. 50

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Винкапан — Vincapan (НРБ)
Тотальные алкалоиды растения
барвинка малого (*Vincapinnos L.*)
Выпускается в таблетках по
0,01

Хранение — список Б

Срок годности — 2 года

Гипотензивное средство.

Применяется при гипертонической болезни всех стадий, неврогенной тахикардии, а также при спазмах сосудов мозга

Рр.: Tabul. «Vincapan» 0,01

D. t. d. N. 50

S. Вначале по $\frac{1}{2}$ таблетки, затем по 1 таблетке 2—3 раза в день.

При получении необходимого эффекта назначается поддерживающая доза — по $\frac{1}{2}$ таблетки длительное время

Винкристин —

Vincristin (Франция)

Синонимы: Leurocristine, Oncovin

Выпускается в порошке в ампулах по 0,001 и 0,005. Прилагается растворитель

Хранение — список А

Срок годности — 3 года;

ВНР — 2 года (Oncovin)

Цитостатическое средство. Близок по строению к «Винбластину»

Применяется по тем же показаниям

Рр.: «Vincristin» 0,001 (0,005)

D. t. d. N. 6 in ampul

S. Внутривенно, растворив в 5—10 мл растворителя, 1 раз в неделю; можно в сочетании с 6-меркаптопурином, метотрексатом. Разовая доза — от 2 до 4 мг на кг веса тела больного. Курсовая доза — 6—8, до 32 мг

Виноградова порошки —
Pulveres Winogradovi

Поливитаминовый препарат.

Применяется при гипо- и авитаминозах В₁, В₂, РР, при беременности, в периоде реконвалесценции и т. д.

Rp.: Thiamini bromidi 0,005
Riboflavini 0,002
Acidi nicotiniци 0,005 (0,01)
Glucosi 0,16
M. f. pulvis
D. t. d. N. 50
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

**Винтерница экстракт черники
жидкий — Extractum Myrtilli
liquidum Winternitzi**

Вязущее (противопоносное)
средство.

Применяется главным образом
в детской практике самостоятель-
но и как вспомогательное сред-
ство при энтеритах, колитах, дис-
пепсии

Rp.: Fructus Myrtilli 500,0
Aquae destillatae q. s.
Acidi salicylici 0,5
Spiritus aethylici 2,0

MDS. По 1 столовой (чайной) ложке 2—3 раза в день

Приготовление: черничные ягоды с водой настаивают на водяной
бане в течение нескольких часов, после чего ягоды отжимают, а вытяжку
выпаривают до 500 частей. Затем добавляют раствор салициловой кис-
лоты в спирте

**Виола глазная
примочка желтая —
Collugium adstringens luteum
Violi**

Вязущее и антисептическое
средство.

Применяется при воспалитель-
ных заболеваниях конъюнктивы
в виде капель или примочек.
В последнем случае препарат
лучше развести 1 : 2—1 : 4

Rp.: Camphorae 0,1
Ammonii chloridi 0,15
Zinci sulfatis 0,3
Croci 0,02
Spiritus aethylici 70% 5,0
Aquae destillatae 25,0
MDS. Глазная примочка

Приготовление: настаивают в течение 3 суток камфору и шафран
на спирте, после чего добавляют остальные ингредиенты, растворенные
в воде, взбалтывают и фильтруют

Випарктин — Viparctin (ГДР)
Стерильный стабилизирован-
ный раствор яда гремушей змеи
Выпускается в ампулах по 1 мл
0,01% раствора
Хранение — список Б
Срок годности — 2 года

Биогенный препарат.

Применяется при миалгии,
люмбаго, ишиасе, аллергических
заболеваниях (бронхиальной астме
и др.), опоясывающем лишае, по-
линеврите и полиартритах и т. п.

Rp.: Sol. «Viparctin» 0,01% 1 ml
D. t. d. N. 5 in ampul.
S. Внутривенно по 0,1—0,2 мл через 3—5 дней.
Под кожу 0,4—0,5—0,75—1 мл раствора 1 раз
в 5 дней

Випералгин — Viperalgin (ЧССР)

Стерильный стабилизированный
раствор яда гадюки песчаной

Выпускается в ампулах по 1 мл
0,01% раствора

Хранение — список А

Срок годности — 3 года

Биогенный препарат.

Применяется при невралгии,
ишиасе, артритах, спондилитах,
облитерирующем эндартерите,
бронхиальной астме и др.

Rp.: Sol. «Viperalgin» 0,01% 1 ml

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. Под кожу, в кожу или в мышцу как «Випарктин».
Перед употреблением содержимое ампулы рас-
воряют в изотоническом растворе натрия хлорида

Випраксин — Vipraxinum

Водный раствор сухого яда га-
дюки обыкновенной

Выпускается в ампулах по 1 мл

Хранение — в прохладном, за-
щищенном от света месте

Срок годности — 3 года; пре-
парата из ЧССР — 4 года

Биогенный препарат.

По свойствам и применению ана-
логичен «Випарктину» и «Випе-
ралгину» (см.)

Rp.: Vipraxini 1,0

D. t. d. N. 6 in ampul.

S. По 0,2—0,4—0,6 мл внутривенно или внутримы-
шечно: в одно место — не более 0,4 мл

Вирапин — Virapin (ЧССР)

Препарат пчелиного яда.

Выпускается в ампулах, содер-
жащих по 0,002 очищенного пче-
линого яда, новокаина и изотони-
ческого раствора натрия хлорида
до 1 мл и в мази в тубах по 20,0,
содержащей в 1 г 0,15 мг пче-
линого яда

Хранение — в защищенном от
света месте

Срок годности — 2 года; ЧССР—
4 года

Биогенный препарат.

Применяется при миалгии, мио-
зите, невралгии, неврите, аллер-
гических заболеваниях и др.

Rp.: «Virapin» 1 ml

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. Под кожу по 1 мл раз в 2—5 дней. На курс
лечения — 5—10 инъекций

Витаблон — Vitablon (ПНР)

Состав на 1 ампулу:

Суапособalamini 0,001

Thiaini chloridi 0,1

Aquaе pro injectionibus 2 ml

Хранение — в защищенном от света месте

Срок годности — 2 года

Поливитаминовый препарат.

Применяется при дегенеративном изменении костного мозга, парезах и паралегиях, невралгии тройничного нерва, полиневрите и др.

Rp.: «Vitablon» 2 ml

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. В начале лечения (ударные дозы) внутримышечно по 1—2 ампулы в день, а после улучшения — 1—2 ампулы в неделю (поддерживающие дозы)

Витален — Vitalen

Препарат с многообразными свойствами. Обладает успокаивающим, кардиотоническим и мочегонным действием, способствует отделению желчи и желудочного сока, остановке кровотечений из внутренних органов; местное действие — вяжущее и антисептическое.

Применяется при вегетодистониях, неврозах, легких формах гипертиреоза, сниженной функции эндокринных желез и пр.

1. Rp.: Folii Salviae 15,0
Florum Helichrysi arenarii 5,0
Folii Urticae 5,0
Gemmae Betulae 8,0
Folii Uvae ursi 3,0
Herbae Adonidis vernalis 1,5
Folii Menthae piperitae 0,5
Corticis Frangulae 3,0
2. Rp.: Folii Salviae 15,0
Florum Helichrysi arenarii 5,0
Gemmae Betulae 8,0
Folii Uvae ursi 3,0
Herbae Adonidis vernalis 1,5
Folii Menthae piperitae 0,5
Corticis Frangulae 3,0
Herbae Gnaphalii uliginosi 3,0
3. Rp.: Folii Salviae 25,0
Florum Helichrysi arenarii 10,0
Folii Urticae 10,0
Gemmae Betulae 12,0
Folii Uvae ursi 3,0
Herbae Adonidis vernalis 3,5
Folii Menthae piperitae 1,5
Corticis Frangulae 3,0

4. Rp.: Foliae Salviae 25,0
Florum Helichrysi arenarii 10,0
Gemmae Betulae 12,0
Foliae Uvae ursi 3,0
Rhizomatis cum radicibus Valerianae 8,0
Foliae Menthae piperitae 1,5
Corticis Frangulae 3,0
MDS. Заварить 1 столовую ложку сбора на стакан кипятку, принимать по 1 столовой ложке три раза в день

Витакальцин — Vitacalcin
(ЧССР)

Состав на 1 таблетку:
Calcii phosphatis 0,24
Calcii lactatis 0,12
Calcii citratis 0,033
Calcii metasilicatis 0,016
Calcii gluconatis 0,046
Ergocalciferoli 100 ИЕ

Хранение — в сухом месте

Препарат для терапии наруше-
ний обмена кальция.

Применяют в периоде роста, при беременности, лактации, при ал-
лергических состояниях. Эффек-
тивнее хлорида кальция благо-
даря лучшему всасыванию солей
кальция и содержанию вита-
мина D

Rp.: Tabul. «Vitacalcin» N. 50

DS. По 2 таблетки 3 раза в день (взрослому).

По 1—2 таблетки 2 раза в день перед едой
(детям)

Витаседин — Vitasedin (ЧССР)

Состав на 1 таблетку:
Bromisovalii 0,25
Amidopyridini 0,05
Thiamini chloridi 0,003

Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте

Срок годности — 1 год

Дополнительный срок годности
после переконтроля — 6 мес.

Болеутоляющее и успокаиваю-
щее средство.

Применяют при бессоннице, го-
ловной боли, в климактерическом
периоде, дисменорее

Rp.: Tabul. «Vitasedin» N. 20

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Витахлорциклин —
Vitachlorcyclinum

Состав на 1 таблетку:
Chlortetracyclini 0,1
Thiamini chloridi 0,005
Riboflavini 0,002
Acidi ascorbinici 0,05

Хранение — в защищенном от
света месте

Комбинированный препарат ан-
тибиотика тетрациклина с вита-
минами.

Показания такие, как для хлор-
тетрациклина. См. также «Вито-
ксициклин». Обладает меньшими
побочными эффектами, чем хлор-
тетрациклин

Rp.: Tabul. Vitachlorcyclini N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Витогепат — Vitohepatum

Экстракт печени, содержащий цианокобаламин (10 мкг/мл), фолиевую кислоту и аминокислоты. Близок к венгерскому «Сирепару»

Выпускается в ампулах по 2 мл

Хранение — в прохладном, защищенном от света месте

Срок годности — 1 год

Антианемическое средство.

Применяется по тем же показаниям, что и «Цианокобаламин», а также при острых и хронических гепатитах. Может вызвать аллергические реакции

Rp.: Vitohepati 2,0

D. t. d. N. 20 in ampul.

S. По 1—2 мл внутримышечно раз в день

Витоксициклин — Vitoxycyclin

Состав на 1 таблетку (капсулу):
Oxytetracyclini 0,1

Acidi ascorbinici 0,05

Thiamini chloridi 0,005

Riboflavini 0,002

Срок годности в капсулах — 2 года

Препарат антибиотика широкого спектра действия с витаминами.

Применяется в тех же случаях, что и окситетрациклин (кишечные инфекции, риккетсы, стафилококковые инфекции внутренних органов и пр.), отличается лучшей переносимостью, меньшими аллергенными свойствами

Rp.: Tabul. (Caps.)

Vitoxycyclini N. 10

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

**Вихеркевича капли глазные —
Guttae ophthalmicae Vicherkevitschi**

Средство для лечения глаукомы

Rp.: Physostigmini salicylatis 0,05

Pilocarpini hydrochloridi 0,2

Cocaini hydrochloridi 0,03

Aethylmophini hydrochloridi 0,2

Solutionis Adrenalini hydrochloridi 0,1% gttis X

Aquae pro injectionibus 10,0

MDS. По 1—2 капли в глаза.

Частота закапывания зависит от тяжести заболевания

Вицедрин — Vicedrin (ЧССР)
Состав на 1 таблетку (драже):
Phenacetini 0,2
Chinini sulfatis 0,025
Ephedrini hydrochloridi 0,00375
Acidi ascorbinici 0,0125
Calcii gluconatis 0,18
Хранение — список Б

Жаропонижающее и противовоспалительное средство.

Применяют при простудных заболеваниях: гриппе, острых респираторных инфекциях верхних дыхательных путей, а также при лихорадке различного происхождения

Рр.: Dragee «Vicedrin» N. 20
DS. Начальная доза — 2 драже, через час снова 2 драже и затем по 1 драже через 3—4 ч

Вицеин — Viceinum

Средство для лечения катаракты. Применяется при катарактах любого происхождения (старческие, лучевые, контузионные и др.) при умеренном понижении остроты зрения (не ниже 0,5)

Рр.: Cysteini 0,2
Acidi glutaminici
Glycocoli aa 0,1
Solutionis Natrii adenosintriphosphatis 1% 0,5 мл
Thiamini bromidi 0,02
Acidi nicotiniци 0,03
Kalii iodidi 1,5
Calcii chloridi
Magnesii chloridi aa 0,3
Solutionis Natrii chloridi isotonicae ad 100,0
MDS. По 2 капли в большой глаз 3—4 раза в день

**Вишневого линимент
бальзамический —
Linimentum balsamicum
Vischnevsky**

Срок годности линимента № 1
— 1 год; после переконтроля —
— 6 мес.

Антисептическое средство, способствует регенерации тканей, очищению и росту грануляций.

Применяется для перевязок гнойных ран, пролежней, трофических язв, а также при поверхностных воспалительных процессах (тромбофлебиты, рожистое воспаление)

1. Рр.: Picis liquidae
Xeroformii aa 3,0
Olei Ricini
aut Olei jecoris Aselli ad 100,0
 2. Рр.: Solutionis Iodi spirituosae 10% 1,0
Picis liquidae 3,0
Olei Ricini 96,0
M. f. linimentum
DS. Для перевязок
-

Вишневого жидкость —
Liquor Vischnevsky

Местноанестезирующее средство.

Применяется в тех же случаях, что и 0,25% раствор новокаина (инфильтрационная анестезия). Отличается от последнего изотоничностью, большей силой и постоянством анестезии

Rp.: Natrii chloridi 5,0
Kalii chloridi 0,075
Calcii chloridi 0,125
Novocaini 2,5
Solutionis Acidi hydrochlorici 0,1 н. 9,0
Aquae pro injectionibus ad 1000,0
M. Sterilisetur!
DS. В операционную

ВНД-6 — VND-6

Поливитаминовый препарат.

Применяется при гипо- и авитаминозах В₁, РР, В₂, при невритах и т. п. Отличается малой болезненностью при инъекциях, пониженными аллергенными свойствами

Rp.: Novocaini
Thiamini bromidi $\bar{a}\bar{a}$ 1,0
Riboflavini 0,1
Acidi nicotinic (seu Natrii nicotinat) 0,3
Dimedroli 0,4
Aquae pro injectionibus ad 50,0
M. Sterilisetur!
DS. Внутримышечно по 5 мл; можно вместе с витамином В₁₂ (200—500 мкг), но не в одном шприце

Вовси капли — Guttae Vovsi

Коронарорасширяющее и кардиотоническое средство.

Применяется при стенокардии, иногда — при пароксизмальной тахикардии

Rp.: Tincturae Strophanthi 8,0
Solutionis Nitroglycerini 1% 2,0
MDS. По 3—5 капель на кусочке сахара под язык при приступе

Вода дегтярная — Aqua Picis

Антисептическое, фунгицидное и инсектицидное средство.

Применяется в дерматологии при экземе, псориазе, чесотке и пр.

Rp.: Picis liquidae 1,0
Aquaе destillatae 30,0
MDS. Наружное

Приготовление: деготь смешивают с водой и оставляют при частом взбалтывании на несколько дней. Затем жидкость фильтруют через бумагу, смоченную водой

Вода известковая —
Aqua Calcis

Кальцийсодержащий препарат.
Применяется внутрь при необходимости дополнительного введения кальция, наружно — в составе многих прописей

Rp.: Aquaе Calcis 100,0

MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день.

Приготовление: 10,0 негашеной извести гасят 200,0 дистиллированной воды, дают отстояться несколько часов, воду сливают и отбрасывают, а остаток обливают 500,0 холодной дистиллированной воды и оставляют стоять в хорошо закупоренном сосуде. Перед употреблением воду сливают с осадка и фильтруют, осадок вновь обливают холодной водой и препарат повторно используют по мере надобности

Вода косметическая —
Aqua cosmetica

Депигментирующее средство.
Применяется для выведения веснушек и хлоазмов в виде смазываний или как добавка к воде при умывании

1. Rp.: Kalii carbonatis 10,0

Aquaе destillatae 20,0

Aquaе Rosae 60,0

Balsami Hoffmani 20,0

2. Rp.: Bismuthi subnitratіs 5,0

Talci 20,0

Aquaе Rosae 75,0

3. Rp.: Sulfuris depurati 2,0

Glycerini 12,0

Spiritus camphorati 4,0

Spiritus Lavandulae

Oedocoloni aa 10,0

Aquaе destillatae 120,0

MDS. Наружное. Перед употреблением взбалтывать

Антисептическое и смягчающее кожу средство.

Применяется для смазывания рук при сухости кожи или при частом мытье с мылом

4. Rp.: Solutionis Ammonii caustici

Glycerini

Spiritus aethylici
Aquae destillatae āā 25,0
MDS. Наружное

Вода косметическая белая —
Aqua cosmetica alba

Применение — см. «Вода косметическая» № 1—3

Rp.: Zinci carbonatis 20,0
Magnesii carbonatis 10,0
Talci 5,0
Glycerini 20,0
Aquae Rosae 120,0
Spiritus Rosae 5,0
MDS. Наружное

Вода кровоостанавливающая —
Aqua haemostatica

Вяжущее и прижигающее средство.

Применяется как кровоостанавливающее средство при мелких повреждениях кожи

1. Rp.: Zinci sulfatis
Aluminis
Kalii sulfatis āā 1,5
Aquae destillatae 100,0
 2. Rp.: Cupri sulfatis
Aluminis āā 10,0
Aquae destillatae 130,0
Acidi sulfurici concentrati 1,3
MDS. Наружное, для обработки мелких травм
-

Вода морская искусственная —
Aqua marina factitium

Общеукрепляющее и тонизирующее физиотерапевтическое средство.

Применяется при подострых и хронических заболеваниях опорного аппарата, миозитах, мигалгии, ревматизме, хронических воспалительных процессах во внутренних органах, в том числе в малом тазу, болезнях обмена, дерматозах и пр.

1. Rp.: Natrii chloridi 4000,0
Magnesii sulfatis 100,0
Kalii sulfatis 25,0
Kalii bromidi
Kalii iodidi āā 1,0

2. Rp.: Magnesii sulfatis 1000,0
Calcii chloridi 100,0
Kalii sulfatis 25,0
Kalii bromidi
Kalii iodidi aa 1,0
MDS. На одну ванну

Вода розовая —
Aqua Rosae

Входит в состав многих прописей как отдушка

Rp.: Olei Rosae 1,0
Talcii 10,0
Aquae destillatae calidae 4000,0 (50—60°)
MDS. Наружное

Вода свинцовая —
Aqua Plumbi
Срок хранения — 1 год

Вяжущее средство.
Применяется для примочек и компрессов при ушибах, поверхностных воспалительных процессах на коже и слизистых оболочках

Rp.: Solutionis Plumbi subacetatis 2,0
Aquae destillatae 98,0
MDS. Наружное

Вода свинцово-борная —
Aqua Plumbi borata

Вяжущее и антисептическое средство.
Применяется по тем же показаниям, что и «Вода свинцовая»

Rp.: Aquae Plumbi
Aquae destillatae aa 50,0
Acidi borici 2,0
MDS. Наружное

Вода сулемово-квасцовая —
Aqua Aluminis cum
Hydrargyri dichlorido
Хранение — список А

Антисептическое и вяжущее средство.
Применяется в разведении 1 : 10—1 : 20 для дезинфекции предметов ухода за больными, а также для лечения кожных заболеваний. В последнем случае должна применяться очень осторожно!

Rp.: Hydrargyri dichloridi
Aluminis aa 1,0
Aquae Rosae 100,0
MDS. Наружное

Вода укропная —
Aqua Foeniculi

Применяется для подавления метеоризма, как отхаркивающее при сухом кашле, а также в различных микстурах для улучшения вкуса

Rp.: Olei Foeniculi 1,0
Talcii 10,0
Aquae calidae 1000,0
MDS. По одной столовой ложке 3—4 раза в день.

Приготовление: укропное масло растирают с тальком, смесь переносят в склянку с теплой водой и взбалтывают в течение 15 мин. После охлаждения жидкость фильтруют

Вода хлороформная —
Aqua Chloroformii

Средство для анестезии слизистой желудка.
Применяется при рвоте, икоте, болях в желудке, броидильных процессах в желудке

Rp.: Chloroformii 1,0
Aquae destillatae 200,0
MDS. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день

Вода чемериная —
Aqua Veratri

Срок годности — 1 год

Инсектицидное средство.
Применяется для борьбы с кожными паразитами (головные и лобковые вши и пр.)

Rp.: Tincturae Veratri
Aquae destillatae aa 100,0
MDS. Наружное

Войцеховского микстура —
Mixtura Wojczechowsky

Седативное средство.
Показания к применению — см. «Бехтерева микстура». Есть указания на эффективность в качестве обезболивающего средства при родах

Rp.: Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae 12,0—200,0
Natrii bromidi 6,0
Amidopyrini 3,0
Codeini 0,12
Phenobarbitali 0,3
MDS. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день

Воля мазь — Unguentum Woli

Антисептическое и противовоспалительное средство.
Применяется для лечения различных кожных заболеваний (экзема, псориаз и т. п.)

Rp.: Hydrargyri amidochloridi
Xeroformii aa 10,0
Bismuthi subnitratris 15,0
Paraffini 125,0
Autoli 250,0
M. f. unguentum
DS. Наружное

**Воробьева порошки —
Pulveres Worobjevi**

Противоэпилептическое сред-
ство.

Применяется главным образом при больших припадках. Обычно назначают в первую неделю порошки № 1 1—2 раза в день, во вторую — порошки № 2 2—3 раза в день, в третью неделю и в дальнейшем — порошки № 3 3 раза в день. Курс лечения — 3—4 месяца. Возможны и другие схемы применения (в частности, назначение порошков № 1—3 в зависимости от частоты припадков)

1. Rp.: Phenobarbitali
Diphenini aa 0,05
Acidi nicotinic 0,03
Spasmolytini 0,1
Coffeini 0,015
Acidi glutaminici 0,2
Glucosi 0,3
2. Rp.: Phenobarbitali 0,05
Diphenini 0,1
Acidi nicotinic 0,06
Acidi glutaminici 0,3
Spasmolytini 0,1
Coffeini 0,02
Glucosi 0,3
3. Rp.: Phenobarbitali
Diphenini aa 0,1
Acidi nicotinic 0,06
Acidi glutaminici 0,5
Spasmolytini 0,1
Coffeini 0,02
Glucosi 0,3
M. f. pulvis
D. t. d. N. 50
S. Принимать во время или после еды

**Восстановитель для волос —
Reductor capillaris**

Применяется для уничтожения седины. Жидкость втирают в волосы щеткой после предварительного мытья. Через некоторое время голову ополаскивают водой.

Rp.: Plumbi acetatis
Ammonii chloridi
Sulfuris āā 3,0
Spiritus aethylici 90 %
Glycerini āā 25,0
Aquae destillatae 200,0

MDS. Наружное, перед употреблением взбалтывать.

Приготовление: свинца ацетат и аммония хлорид растворяют раздельно в воде, затем оба раствора процеживают (через разные ватные тампоны) в склянку. Серу растирают в ступке и добавляют к ней при перемешивании глицерин, затем раствор из склянки. Полученную суспензию выливают, не процеживая, в склянку, добавляют этиловый спирт и все сильно взбалтывают

**Вотчала капли
Guttae Votschali**

Успокаивающее, коронарорасширяющее и кардиотоническое средство.

Применяется при приступах стенокардии. Пропись № 1 предназначена для более легких, № 2 — для более тяжелых случаев.

1 Rp.: Mentholi 0,5
Solutionis Nitroglycerini 1% 2,0
Tincturae Valerianae
Tincturae Convallariae āā 10,0

2. Rp.: Mentholi 0,2
Solutionis Nitroglycerini 1% 2,0
Tincturae Belladonnae 5,0
Tincturae Valerianae
Tincturae Convallariae āā 10,0
MDS По 10—12 капель на кусочке сахара под язык

**Воячека мазь —
Unguentum Vojatscheky**

Вяжущее и противовоспалительное средство, используется при остром рините

Rp.: Emplastri Plumbi simplicis 5,0
Olei Helianthi 10,0
Olei Bergamottae gtts III
M. f. unguentum
DS. Наружное

Вульнузан — Vulnusap (НРБ)
Стандартизованная эмульсия маточного рассола Поморинского озера в касторовом масле с ланолином

Содержит натрий, калий, кальций, магний, хлор, а также микроэлементы (железо, медь, кобальт, йод, селен и т. д.)

Выпускается в тубах по 30,0

Антисептическое средство, биогенный стимулятор.

Применяется для лечения вялотекущей раневой инфекции, ожогов, обморожений и т. п.

Rp.: «Vulpusan» 30,0

DS. Наносить на раневую поверхность слоем 2—3 мм;
разовая доза — не более 15,0

Галазолин — Halazolin (ПНР)
2-(4-tert-Бутил-2,6-диметил-
бензил)-2-имидазолина гидрохло-
рид

Синонимы: Otriven, Otrivin, Ху-
lometazolinhydrochlorid

Выпускается во флаконах по
10 мл 0,2% и 0,05% раствора (для
взрослых и детей)

Хранение — список Б
Срок годности — 3 года

Сосудосуживающее средство
(«непрямой» адреномиметик).

Применяется для лечения ост-
рых ринитов различного проис-
хождения. По свойствам и приме-
нению весьма близок к «Нафти-
зину»

Rp.: Sol. «Halazolin» 0,2% (0,05%) 10,0

DS. По 2—3 капли в каждую ноздрю 2—3 раза
в день

Галидор — Halidor (ВНР)
1-Бензил-1-(3-диметиламино-
пропоксн)-циклопентана фумарат
Синонимы: Venuscipium, Egyt-
201

Выпускается в ампулах по 2 мл
2,5% раствора и таблетках по 0,1

Хранение — список Б

Срок годности — ампулы — 3 го-
да, таблетки — 2 года

Миотропный спазмолитик.

Применяется при заболеваниях
периферических артерий, спазмах
желудочно-кишечного тракта, гас-
трите и язвенной болезни желудка
(в сочетании с антацидами)

Rp.: Sol. «Halidor» 2,5% 2 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Внутривенно или внутримышечно по 1 ампуле
2—3 раза в день

Rp.: Tabul. «Halidor» 0,1

D. t. d. N. 50.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Галоперидол — Haloperidol
(ВНР, Франция, Бельгия)
4'-фтор-4-{(1-[окси-4-(4'-хлор)-
фенил-пиперидино]}-бутирофенон
Синонимы: Aloperidin, Haldol,
Serenase, Serenase, Serenelfi

Выпускается в таблетках по
0,0015, ампулах по 1 мл 0,5%
раствора и во флаконах по 10 мл
0,2% раствора

Срок годности: ампул ВНР —
2 года; таблеток ВНР — 5 лет;
раствора — 2 года

Нейролептик («большой» транк-
виллизатор), антипсихотическое
средство

Применяют при шизофрении,
особенно при острых параноидных
состояниях, протекающих с несис-
тематизированным бредом, преоб-
ладанием галлюцинаций и психи-
ческих автоматизмов, а также
как успокаивающее при психопат-
ниях, реактивных состояниях,
эпилепсии. По седативному эф-
фекту близок к «Аминазину»,
не вызывает гипотензии и кол-
лапса

Rp.: Tabul. «Haloperidol» 0,0015
D. t. d. N. 50
S. По 1—2 таблетки 3—4 раза в день
Rp.: Sol. «Haloperidol» 0,5% 1 ml.
D. t. d. N. 20 in ampul.
S. По 0,3—1 мл внутримышечно
Rp.: Sol. «Haloperidol» 0,2% 10,0
DS. По 10—20 капель 1—3 раза в день

Галохин — Halochinum Противомаларийное шизонто-цидное средство.
7-Хлор-4[(3',5'-бис (диэтил-аминометил)-4'-оксифенил)-аминохинолин]аминохинолин Применяется для прекращения развития шизонтов
Синоним: Cyclochin
Выпускается в порошке и в таб-летках по 0,05 и 0,1
Хранение — список Б, в защи-щенном от света месте
Срок годности — таблетки ВНР — 3 года; ампулы и раствор — 2 года

Rp.: Halochini 0,01 (0,05)
D. t. d. N. 9 in tabul.
S. По 3 таблетки 1 раз в сутки (взрослому)

Гальманин — Galmaninum Подсушивающее, антисепти-ческое и кератолитическое сред-ство.
Состав: Acidi salicylici 1,0
Zinci oxydi 5,0
Talci
Amyli aa 22,0
Срок годности — 1 год

Rp.: Galmanini 50,0
DS. Наружное, присыпка для ног

Гальмаформ — Galmaform Антисептическое, подсушиваю-щее, дубящее, кератолитическое и дезодорирующее средство.
Состав: Solutionis Formaldehydi 2,0
Acidi salicylici 4,0
Magnesii carbonatis 20,0
Zinci oxydi 40,0
Talci 292,0
Olei odoratae 2,0

Rp.: Galmaformi 60,0
DS. Наружное, присыпка для ног

Галлера эликсир — Elixir Halleri Средство, возбуждающее сек-рецию желез желудка.
Применяется при гипоацидных гастритах, протекающих без ат-рофии слизистой желудка

Рр.: Acidi sulfurici puri 10,0
Spiritus aethylici 90% 30,0
MDS По 10—20 капель на стакан воды перед едой
или во время еды

Гаммалон — Gammalon (Япония)

γ-Аминобмасляная кислота
Синонимы: Aminalon GABA,
Gammar, Gammasol, Mielogen
Выпускается в таблетках по 0,25
Хранение: в обычных условиях
Срок годности — 2 года

Препарат способствует нормализации функции центральной нервной системы.

Применяется при ослаблении памяти, головных болях, головокружениях и т. п. явлениях, связанных с органическими поражениями мозга (травмы, церебральный атеросклероз), а также при задержке умственного развития у детей

Рр.: Tabul. «Gammalon» 0,25
D. t. d. N. 100
S. По 4—5 таблеток 3—4 раза в день

Гамона — Gamona (ВНР)

Выпускается в таблетках и в ампулах по 2 мл

Состав на 1 ампулу:

Gastrixon 0,0005

Halidori 0,05

Aq. pro injectionibus ad 2 ml

Состав на 1 таблетку:

Gastrixon

Amizyli aa 0,001

Halidori 0,15

Холинолитическое и спазмолитическое средство.

Применяется при гиперацидных формах язвенной болезни в острой и хронической стадии, при спастическом колите, энтероколите, холецистите, спазмах мочевых путей, а также при приступах желчно- и почечнокаменной болезни.

Примечание: гастриксон — эфир диметил-ксантинкарбоновой кислоты и тропина, близкий по свойствам к атропину. Отличается главным образом отсутствием центрального действия

Рр.: Sol. «Gamona» 2 ml.
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. При тяжелых заболеваниях по 2 ампулы 1—2 раза в день

Рр.: Tab. «Gamona» N. 20
DS. По 1—2 таблетки 3 раза в день с постепенным снижением по 1/2 таблетки 2—3 раза в день

**Гартмана жидкость —
Liquor Hartmani**

Анестезирующее и антисептическое средство.

Применяется в стоматологии для обработки дентина

Rp.: Thymoli 1,25
Spiritus aethylici 96%
Aetheris aethylici āā 1,0
MDS. В зубоврачебный кабинет

Гастрин — Gastrin

Препарат рефлекторно возбуждает секрецию желудочных желез, обладает адсорбирующим и легким послабляющим действием.

Применяется при гастритах, сопровождающихся понижением секреции и бройдильными или гнилостными процессами в желудке

Rp.: Pulveris radicis Gentianae 20,0
Pulveris corticis Frangulae
Pulveris carbonis Tiliae āā 10,0
Farinae Lini 40,0
M. f. pulvis
DS. По $\frac{1}{2}$ чайной ложки 1—2 раза в день

Гастрипон — Gastripon (ВНР)
8-(p-Фенилбензил)-атропиний-гидроксида бромид
Синонимы: Gastropin, Xenytgoriumbromid
Выпускается в таблетках по 0,005.
Хранение — список А

Холинолитик, близкий к атропину.

Применяется при гиперацидном гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменной болезни, колите, почечнокаменной болезни, болезненных менструациях. Полностью лишен центрального возбуждающего эффекта, свойственного атропину

Rp.: Tabul. «Gastripon» 0,005
D. t. d. N. 10
S. По 1—2 таблетки 3 раза в день

Гастробамат — Gastrobamat (ВНР)
Состав на 1 таблетку:
Gastriponi 0,008
Meprobamati 0,2
Хранение — список Б

Холинолитическое и седативное средство.

Применяется при органических и функциональных расстройствах желудочно-кишечного тракта: при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колитах

Rp.: Tabul. «Gastrobamat» N. 20
DS. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Гастрогел — Gastrogel (ЧССР)
Коллоидная гидроокись алюминия

Выпускается в таблетках по 0,5
Хранение — в сухом месте

Антацидное средство.

Применяют для снижения кислотности желудочного сока при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки и при гиперацидных состояниях. Близок по действию к «Алмагелю»

Rp.: Tabul. «Gastrogel» 0,5

D. t. d. N. 20

S. По 2—4 распушенные в воде таблетки несколько раз в день между приемами пищи

Гастрофилин — Gastrofilin (ЧССР)

Состав на 1 таблетку:

Dermatoli

Pancreatini aa 0,15

Natrii benzoatis

Natrii salicylatis aa 0,125

Papaverini hydrochloridi 0,0075

Хранение — список Б

Срок годности — 2 года

Средство, способствующее нормализации пищеварения.

Применяют при гастрите, гастроэнтерите; при гнилостных и броидильных процессах в желудке и кишечнике

Rp.: Tabul. «Gastrofilin» N. 50

DS. Вначале 3—10 таблеток в день.

После наступления улучшения дозу снижают до 1—3 таблеток в день

Гваякуран — Guajacuran (ЧССР)

3-(о-Метоксифенокси)-пропан-1,2-диол

Синонимы: Dermax, Gaiamar, Guaiphenesin, Guajamar, Guanar, Hustodil, Methphenoxydiol, Miocurin, Miorelax, Mucostop, Musku-relax, Myocain, Myorelax, Neuroton, Oresol, Propanosedyl, Reduton, Relaxyl G (БНР), Reorganin, Resil, Respenyl, Respil, Resyl, Robitussin, Sirotol, Tulyn

Выпускается в ампулах по 10 или 20 мл 5% раствора в 5% растворе глюкозы и в драже по 0,2

Хранение — список Б

Срок годности — 3 года

Центральный миорелаксант.

Применяется для расслабления мышц при ревматических артритах; для ослабления мышечных судорог при столбняке и спастических состояниях (спастические параличи, болезнь Литтля и т. п.), для купирования судорог при столбняке и отравлении стрихнином, при тяжелой лихорадке, для ослабления тонуса мышц при операциях, вправлении переломов и вывихов (без перевода на управляемое дыхание), шоковой терапии шизофрении и т. п. Обладает также успокаивающим действием подобно близкому по строению и эффекту мепротану (мепробамат, андаксин) и может применяться при невротических состояниях. В СССР проходит клинические испытания аналог гваякурана под названием «Мефедол»

Rp.: Dragee «Guaјасurаn» 0,2
D. t. d. N. 50
S. По 1 драже 3 раза в день (в качестве седативного средства)
Rp.: Sol. «Guaјасurаn» 5% 20 ml (10 ml)
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. Внутривенно по 10—20 мл

Гebra глицерин мыльный — Смягчающее кожу косметическое средство
Glycerinum saponatum Hebrae

Rp.: Saponis neutralis 10,0
Glycerini 40,0
MDS. Наружное.
Приготовление: мыло высушивают при 80—100°, растворяют на водяной бане в глицерине и фильтруют в горячем виде

Гebra линимент косметический — Антисептическое и смягчающее кожу средство.
Linimentum cosmeticum Hebrae Применяется как косметический препарат при поверхностных воспалительных заболеваниях кожи, а также при жирной коже

Rp.: Sulfuris praecipitati
Glycerini
Spiritus aethylici 70%
Kalii carbonatis
Aetheris aethylici āā 10,0
MDS. Наружное

Гebra мазь против веснушек — Косметическое средство. Остерегаться попадания на слизистые и в глаза
Unguentum antiphelidicum Hebrae

Rp.: Hydrargyri amidochloridi
Bismuthi subnitratіs āā 10,0
Unguenti Glycerini 20,0
M. f. unguentum
DS. Наружное. Применяется на ночь

Гebra мазь противочесоточная — Инсектицидное (акарицидное) средство.
Unguentum contra scabiem Hebrae Применяется при чесотке

Rp.: Sulfuris depurati
Picis liquidae āā 6,0
Saponis viridis 12,0
Calcii carbonatis praecipitati 5,0
Basis unguenti 12,0
M. f. unguentum

DS. Наружное.

Применять в течение недели, затем принять ванну

**Гebra спирт мыльный —
Spiritus kalinus Hebrae**

Антисептическое, дезодорирующее и раздражающее средство. Обезжиривает кожу.

Применяют как косметическое и гигиеническое средство, при жирной коже

1. Rp.: Saponis viridis 20,0
Spiritus aethylici 70% 8,0
Spiritus Lavandulae 3,0

Приготовление: зеленое мыло растворяют в смеси спиртов и фильтруют

2. Rp.: Olei Lini
Spiritus aethylici 70% āā 20,0
Solutionis Kalii caustici 50% 8,0
Spiritus Lavandulae 46,0
Spiritus aethylici 90% 26,0
Aquaе destillatae 19,0
MDS. Наружное.

Приготовление: при взбалтывании смешивают льняное масло, 70% спирт и раствор гидрата окиси калия, прибавляют смесь остальных ингредиентов и фильтруют

Гексамидин — Hexamidinum
5-фенил-5-этил-4,6-диоксогекса-
гидропиримидин

Синонимы: Desoxyphenobarbitone, Lepimidin, Lepsiral, Majso-
lin, Misolyne, Mizodin (ПНР),
Mylepsin (um), Primaclone, Pri-
midone, Prysoline, Sertan

Выпускается в порошке и таб-
летках по 0,125 и 0,25

Хранение — список Б, в за-
щищенном от света месте

Срок годности — 5 лет

Rp.: Hexamidini 0,25 (0,125).
D. t. d. N. 24 in tabul.
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Противоэпилептическое сред-
ство.

Применяют при больших эпи-
лептических припадках; при ма-
лых припадках и эквивалентах
менее эффективен

Гексенал — Hexenalum
1,5-Диметил-5-циклогексенил-барбитурат натрия
Синонимы: Hexanastab, Narcopat, Narcovenol, Noctivane и др.
Выпускается в ампулах и флаконах по 0,5 и 1,0 сухого препарата
Срок годности — 3 года; после переконтроля — 2 года

Неингаляционный общий анестетик (наркотик).

Применяется для внутривенного наркоза во всех областях хирургии и гинекологии, как самостоятельно при оперативных вмешательствах и диагностических процедурах длительностью до 30 мин, так и для вводного и базисного наркоза. Также применяется для купирования острого психомоторного возбуждения и судорог и т. д. Противопоказан при заболеваниях печени и почек, при паралитической непроходимости, лихорадке, гипоксии

Рр.: Hexenali 0,5 (1,0)

D. t. d. N. 3

S. Развести изотоническим стерильным раствором натрия хлорида до 2—5% раствора и вводить в вену медленно (!) до наступления наркоза

Гельмиразин — Helmirazin
(ЧССР)
Состав:
Piperazini citratis 16,4
Aquaе aromaticae ad 200,0
Выпускается во флаконах по 50 и 100,0
Хранение — в прохладном месте

Противоглистное средство, особенно удобное в детской практике.

По свойствам и применению аналогичен «Пиперазина адипинату»

Рр.: «Helmirazin» 100,0

DS. По 1 чайной ложке утром и на ночь через $\frac{1}{2}$ —1 ч после еды

Гематоген — Haematogenum
Препарат из дефибринированной крови убойного скота.
Выпускается во флаконах по 250 мл
Срок годности — 1 год; после переконтроля — 1 год

Антианемический препарат.

Применяется при легких формах железодефицитных анемий, алиментарной дистрофии, в периоде реконвалесценции

Рр.: Haematogeni 250,0

DS. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день

**Гематоген детский —
Haematogenum pro Infantibus**

Состав плитки:
Haemae siccae 2,5
Acidi ascorbinici 0,08
Sacchari q. s.
Melissae q. s.
Melis q. s.
Lactis spissatae q. s.

Выпускается в плитках по 50 г,
оформленных в виде шоколадных
Срок годности — 6 мес.

Rp.: Haematogeni pro Infantibus 50,0

DS. По 1—2 дольки 2—3 раза в день

Свойства и применение — см.
«Гематоген».

Применяется в детской практике

Гемовинил — Haemovinylium

3—5% раствор поливинилпирро-
лидона, имеющего молекулярный
вес 30 000—40 000

За рубежом препараты поли-
винилпирролидона выпускаются
под разными названиями: Kollid-
on (сухой препарат ПВП), Peris-
ton (2,5—3,5% раствор ПВП в изо-
тоническом растворе хлорида на-
трия), Plasmosan, Plasdone, Subs-
tosan, Vinisil

Выпускается в ампулах по 250
и 500 мл

Хранение — при температуре
не выше 20°

Срок годности — 1 год; после
переконтроля — 1 год.

Rp.: Sol. Haemovinyli 3—5%
250 (500) ml

D. t. d. N. 4

S. Внутривенно капельно (до 1 л в сутки)

Плазмозаменяющий раствор.

Применяют при травматичес-
ком и операционном шоке, острой
кровопотере, ожоговой болезни,
кишечной непроходимости

Гемодез — Haemodesum

Водно-солевой раствор, содер-
жащий 6% низкомолекулярного
(м. в. — 10 000—15 000) поливи-
нилпирролидона и ионы натрия,
калия, кальция, магния и хлора

За рубежом выпускаются ана-
логичные препараты Neocompen-
san, Periston H.

Выпускается во флаконах по
100, 250 и 400 мл

Хранение — при температуре не
выше 20°

Срок годности — 5 лет; после
переконтроля — 1 год

Детоксицирующее средство.

Применяется для снятия инток-
сикации организма при токсиче-
ских формах острых желудочно-
кишечных заболеваний (дизенте-
рия, диспепсия, сальмонеллез и
др.), ожоговой и лучевой болезни,
сепсисе и т. п., особенно у детей

Рр.: Sol. Haemodesi 6% 100 (250, 400) ml

D. t. d. N. 2

S. Внутривенно, капельно со скоростью не более 40—45 капель в минуту. Перед введением раствор подогревают до 35—36°

**Гемостимулин —
Haemostimulinum**

Состав на 1 таблетку:

Haematogeni sicci 0,15

Ferri lactatis 0,3

Cupri citratis 0,006

Glucosi 0,12

Хранение — в сухом месте

Срок годности — 3 года

Антианемический препарат.
Применяют при различных формах гипохромных анемий

Рр.: Tabul. Haemostimulini N. 24

DS. По 1 таблетке 3 раза в день во время еды, запивая разведенной соляной кислотой (10—15 капель на стакан воды)

Гемофин — Haemophirinum
0,2% водный раствор гемато-
порфирина, получаемого из эритроцитов крови человека

Выпускается в ампулах по 2 мл

Хранение — в защищенном от света месте

Срок годности — 1 год

Антидепрессант.
Применяется при депрессивных состояниях различного происхождения, неврастении, гипотонии с психоневрологическими проявлениями. Противопоказан при гипертонической болезни II и III стадии

Рр.: Haemophirin 2,0

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Внутримышечно от 1 до 5 мл ежедневно или через день

Гемофобин — Haemophobin
(ГДР)
Основным действующим веществом гемофобина является пектин, растворенный в изотоническом растворе натрия хлорида

Выпускается в ампулах по 1 мл

Хранение — список Б

Срок годности — 3 года

Гемостатическое средство.
Применяется при внутренних кровотечениях из паренхиматозных органов

Рр.: «Haemophobin» 1 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Под кожу по 1—2 мл 1—3 раза в день

Гендевит — Gendevitum

Состав:

Retinoli acetatis 3300 ИЕ (0,001)
Thiamini bromidi 0,00194
Riboflavini 0,0015
Pyridoxini hydrochloridi 0,002
Cyanocobalamini 0,00001
Acidi folici 0,0005
Nicotinamidi 0,01
Calcii pantothenatis 0,003
Acidi ascorbinici 0,075
Tocopheroli acetatis 0,005
Ergocalciferoli 250 ИЕ

Хранение — в герметической таре в сухом, защищенном от света месте

Срок годности — 1 год

Rp.: Dragee «Gendevit» N. 100
DS. По 1—2 драже в день

Поливитаминный препарат, отличающийся малыми дозами и «сбалансированным» составом.

Применяется при потребности в витаминах во время беременности и в течение первых 7 месяцев кормления; при повышенной физической нагрузке, в периоде реконвалесценции, в старческом возрасте для замедления угасания жизненных функций и т. д.

Гендон — Gendon (Голл.)

Сумма алкалоидов из корней растения раувольфия змеиная (*Rauwolfia serpentina* Benth.) Соответствует отечественному препарату раунатину (*Raunatinum*)

Синонимы: Giulini, Raupina, Rauidixin, Rauviloid, Rauwasan, Rivadesuin

Выпускается в таблетках по 0,002

Хранение — список Б

Rp.: Tabul. «Gendon» 0,002
D. t. d. N. 50

S. По 2 таблетки ежедневно после еды.

После понижения давления принимают по 1—2 драже в день

Симпатолитик.

Применяется при гипертонической болезни, особенно I и II стадии, симптоматической гипертонии, вегетативных неврозах, психозах, протекающих с возбуждением

Гепарин — Heparin (ВНР, ЧССР)

Мукоитинполисульфонокислота с мол. весом около 16 000

Синонимы: Liguamin, Pularin, Thromboliquin

Выпускается во флаконах по 5 мл с активностью по 5000 ЕД в мл

Хранение — в защищенном от света месте

«Прямой» антикоагулянт.

Применяется для профилактики послеоперационных тромбозов и эмболий, особенно при повышенной свертываемости крови, при операциях на кровеносных сосудах и др., а также для лечения тромбозов и эмболий (тромбофлебитов, тромбоза коронарных сосудов и др.). Противопоказан при

Срок годности препарата
СССР — 3 года; ЧССР — 4 года;
ВНР — 3 года

Хранение — в прохладном, защищенном от света месте

всех состояниях, чреватых кровотечением (язвенные заболевания, лейкозы, злокачественные новообразования с распадом, болезни свертывающей системы крови, состояние после операций на мозге и т. п.). При необходимости эффект гепарина можно нейтрализовать протаминсульфатом

Рр.: «Heparin» 5 ml. (25 000 ED)

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. Внутривенно одномоментно или капельно.

Дозы строго индивидуальны. При капельном введении гепарин разводят в 500 мл изотонического раствора натрия хлорида или в 5% растворе глюкозы

Гериоптил — Gerioptil (Швейцария)

Согласно проспекту фирмы, препарат содержит вещество, замедляющее наступление преждевременной старости

Общеукрепляющее средство.

Применяется при атеросклерозе (включая церебральный склероз со старческим синдромом Паркинсона и старческой депрессией), артропатии, хроническом астматическом бронхите, эмфиземе легких и т. п. Применяется также для восстановления функций после кровоизлияния в мозг и инфаркта миокарда на почве атеросклероза

Рр.: Caps. «Gerioptil» N. 100

DS. По 3—6 капсул ежедневно.

После 2 недель по 1 капсуле 1—3 раза в день

Гериплекс — Heriplex (СФРЮ)

Состав на 1 капсулу:

Aethyloestronoli 0,0005
Retinoli acetatis 1500 ME.
Calciferoli 100 ME.
Thiamini mononitratris 0,001
Nicotinamidi 0,01
Riboflavini 0,001
Calcii pantothenatis 0,003
Pyridoxini hydrochloridi 0,0005
Acidi folici 0,0001
Cyanocobalamini 0,0000005
Acidi ascorbinici 0,003
Tocopheroli acetatis 0,003
Rutini 0,005
Inositi 0,02

Комплексный препарат, содержащий витамины с микроэлементами.

Применяется как общеукрепляющее средство. По составу и показаниям к применению сходен с «Гендевитом»

Acidi glutaminici 0,0000218
Ferri 0,008
Calcii 0,04
Cupri 0,0011
Zinci 0,044
Mangani 0,001

Хранение — в сухом защищенном от света месте

Срок годности — 6 мес.

Rp.: Caps. «Heriplex» N. 60.
DS. По 1—2 капсулы 2—3 раза в день

Геровит — Herovit (ВНР)
Retinoli acetatis 250 ИЕ
Riboflavini 0,001
Thiamini chloridi 0,00075
Pyridoxini hydrochloridi 0,00025
Cyanocobalamini 0,0000005
Ergocalciferoli 75 ИЕ
Acidi ascorbinici 0,05
Tocopheroli acetatis 0,001
Nicotinamidi 0,015
Methylandrostendioli 0,0005
Cholini iodidi 0,1
Vikasoli 0,0025

Хранение — в герметической таре, в сухом, прохладном, защищенном от света месте

Срок годности — 6 мес.

Комплексный витаминный препарат.

Показания к применению — см. «Гендевит», «Гериплекс»

Rp.: Caps. «Herovit» N. 50
DS. По 1—2 капсулы 2—3 раза в день

Геровиталь Н₃ — Gerovital Н₃ (СРР)

Диэтиламиноэтанола парааминобензоата гидрохлорид. 2% раствор новокаина, приготовленный по методу проф. А. Аслан

Синонимы: Abdocain, Aethocain, Allocain(e), Ambocain, Aminocaine, Anästhocain, Analgocaina, Anesthesol, Anestil, Arecan, Aristokain, Atossicaina, Atoxicocain, Bagocain, Bancain, Biocaine, Candiocaina, Cérocain, Cetain, Chemocain, Chlorocaine, Clinocaine, Cocainum novum, Dentosan,

Препарат применяется при невритах, невралгии, атеросклерозе, ревматическом полиартрите, экземе и других заболеваниях, а также для профилактики спазмов кровеносных сосудов, предупреждения и лечения старости. Чаще используется как местный анестетик

Dorecain, Ecaïn, Ericain, Ethocain, Factor H₃, Falicain, Galecain, Genocaine, Geriocain, Gero-H₃-Aslan, Gravocaine, Hero-caine, Hillcain, Irocaine, Isocain, Juvocain, Londocaina, Lumbocain, Marecaine, Merocait, Minocain, My-nol, Naucain(e), Neocain, Novoad-llin, Novocain, Odontocaine, Om-nicain, Pancain, Pharmacaine, Pharmatonin, Planocaine, Polocai-ne, Procain, Protocaine, Pyga-cain, Sympatocain, Syntocain, Tu-bocain, Vetocain и др.

Выпускается в ампулах по 5 мл

Хранение — в защищенном от света месте

Rp.: Sol. «Gerovital H₃» 2% 5,0

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Внутримышечно по 1 ампуле 3 раза в неделю в течение месяца, далее по 1—2 ампулы еже-месячно

Гефифитин — Hefaephytinum
Состав на 1 таблетку:
Phytini 0,125
Cerevisae sicci 0,375
Срок годности — 4 года

Общеукрепляющее средство.
Применяют при общей слабости, пониженном питании, фурункуле-зе, малокровии и др.

Rp.: Tabul. Hefaephytini N. 20

DS. По 2—3 таблетки 1—2—3 раза в день

Геффе жидкость — Liqueur Heffe

Антисептическое, кератолити-ческое и обезжиривающее сред-ство.

Применяется в дерматологии при различных заболеваниях (се-борея, угри и пр.)

Rp.: Spiritus aethylici 10,0

Acidi borici 1,0

Acetoni 5,0

Resorcini 10,0

MDS. Наружное

Гидранол — Hydranol

Антисептическое, противопара-зитарное и дезодорирующее сред-ство.

Применяется для борьбы с кож-ными паразитами. Не следует на-носить мазь на волосистые участ-ки тела. Противопоказан при бо-лезнях почек, туберкулезе, экземе

Rp.: Lanolini 100,0
Saponis medicati 30,0
Glycerini
Spiritus aethylici 90% āā 10,0
Resorcini
Phenoli puri āā 3,0
Unguenti Hydrargyri cinerei 2,0
Olei Citri
Olei Lavandulae āā 10,0
Olei Bergamottae 5,0
M. f. unguentum
DS. Наружное

**Гидрокортизона ацетат —
Hydrocortisoni acetas**

17-Оксикортикостерона ацетат
Выпускается в виде 2,5% суспензии во флаконах по 5 мл в СССР, ВНР, ЧССР

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности препарата — ВНР — 2 года; ЧССР — 3 года

Глюкокортикоидный препарат. Применяется при артритах ревматического и другого происхождения, бурсите, тендовагините, а также в качестве местного вспомогательного средства при системной глюкокортикоидной терапии

Rp.: Susp. Hydrocortisoni acetatis

2,5% 5 ml

D. t. d. N 3

S. По 5—25 мг (0,2—1 мл) внутри- или околосоу- ставно

**Гидролизин — Hydrolysinum
(JI-103)**

Продукт, получаемый при кислотном гидролизе белков крови крупного рогатого скота и лишенный анафилактических свойств

Выпускается в ампулах и флаконах по 250 и 500 мл

Хранение — при температуре 4—6°

Срок годности — 1 год 6 мес.

Препарат для парентерального питания.

Применяют при заболеваниях, сопровождающихся белковой недостаточностью, при необходимости усиленного белкового питания, а также при невозможности питания через рот (после операции на пищеводе, желудке и др.)

Rp.: Sol. Hydrolysinum 250 (500) ml

D. t. d. N. 2 in ampul.

S. Внутривенно, под кожу или через зонд в желудок или тонкий кишечник

Гидроперит — Hydroperitum
Комплексное соединение перекиси водорода с мочевиной, содержащее около 35% перекиси водорода.

Синоним: Perhydrit
Выпускается в таблетках весом 1,5 г
Хранение — в сухом месте
Срок годности — 1 год, п/п — 6 мес.

Антисептическое средство, заменяет перекись водорода

Rp.: Hydroperiti 1,5
D. t. d. N. 6 in tabul.
S. 2 таблетки растворяют в стакане воды для полосканий горла

Гималина сульфат — Gimalini sulfas
Алкалоид, выделенный из скополли гималайской (*Scopolia stramonifolia*)

Синоним: Himalin
Выпускается в ампулах по 1 мл 0,04% раствора
Хранение — список А

Холинолитик, по действию близкий к атропину.

Применяется при острых желудочно-кишечных болях, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, спастическом колите, спастических запорах, почечных и печеночных коликах, холецистите, бронхиальной астме, для предоперационной подготовки и т. п.

Rp.: Sol. Gimalini sulfatis 0,04% 1 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. Под кожу по 0,3—0,5 до 1 мл

Гиндарина гидрохлорид — Gindarini hydrochloridum
Алкалоид гиндарин (тетрагидропальмитин) выделен из корней стегании гладкой (*Stephania glabra*). По своему строению относится к группе изохинолина

Выпускается в таблетках по 0,05 и ампулах (1% раствор по 1 и 2 мл)

Хранение — список Б, в темном месте

Срок годности — 1 год

Обладает седативным и адrenomитическим действием. Снижает артериальное давление, вызывает миорелаксацию. В больших дозах действует противосудорожно и как большой транквилизатор.

Применяется при функциональных расстройствах нервной системы, неврастении, навязчивом двигательном неврозе, пресенильном и эпилептическом психозах, травматической энцефалопатии, упорной бессоннице, хроническом алкоголизме и наркомании (в стадии денаркотизации)

Rp.: Hyndarini hydrochloridi 0,05

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Solutionis Hyndarini hydrochloridi 1% 1 ml (2 ml)

D. t. d. N. 20 in ampul.

S. Подкожно по 1—2 мл 2—3 раза в день

Гипарез — Hyparez

Гипотензивное средство.

Применяется при I—II стадии гипертонической болезни. Хлорид калия лучше принимать отдельно в виде 2—5% раствора, по 1 столовой ложке вслед за приемом порошка

Rp.: Dichlothiazidi

Apressini aa 0,025

Reserpini 0,0001

Kalii chloridi 0,3

M. f. pulvis

D. t. d. N. 50

S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Гипостерол — Hiposterol

(Франция)

Фенил-этил-ацетамид

Выпускается в таблетках по 0,4

Синонимы: Antisterol, Hyposterol, Liosterin, Lipilisol, Normosterolo, Selral, Substerina

Препарат, ограничивающий эндогенный синтез холестерина в организме. Близок к отечественному цетамифену.

Применяется при гиперхолестеринемии любого происхождения, атероматозе, церебральном атеросклерозе, инфаркте миокарда, грудной жабе, эндартерите нижних конечностей, гипертонической болезни, хроническом нефрите, липоидном нефрозе и др.

Rp.: Tabul. «Hiposterol» 0,4

D. t. d. N. 20

S. По 3—5 таблеток в день после еды, запивая водой

Гипотирин — Hypotirinum

Состав на 1 таблетку:

Chinini hydrochloridi 0,05

Ergotamini tartratis 0,00015

Phenobarbitali 0,015

Pulveris radices Valerianae 0,1

Хранение — список А

Срок годности — 1 год

Седативное средство.

Применяют главным образом при тиреотоксикозе с явлениями повышенной возбудимости и неврастении

Rp.: Tabul. Hypotirini N. 20
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день.

Гирепин — **Hugerin** (ВНР)
Состав на 1 таблетку (драже):
Aminazini 0,025
Reserpini 0,0005
Diprazini 0,005
Хранение — список Б
Срок годности — 5 лет

Комбинированный препарат «больших» транквилизаторов. Применяют при различных психозах, связанных с возбуждением (см. «Аминазин»)

Rp.: Dragee «Hugerin» N. 50
DS. По 1 драже 2—3 раза в день

Гирша жидкость — **Liquor Hirschi**

Местноанестезирующее средство. Применяется для анестезии верхних дыхательных путей и глотки при бронхо- и эзофагоскопии

Rp.: Cocaini hydrochloridi 1,25
Solutionis Kalii sulfatis 2% 6,25
Solutionis Adrenalini hydrochloridi 0,1% 1,25
Solutionis Phenoli 0,5% 16,25
MDS. Наружное, в руки врача

Гистаглобулин — **Histaglobulinum**

Состав на 1 ампулу:
Histamini 0,0003
Globulini 0,018
Solutionis Natrii chloridi isotoni-
cae ad 3,0 ml
Хранение — в темном прохлад-
ном месте
Срок годности — не установлен

Антиаллергическое и десенсибилизирующее средство.

Применяется для лечения бронхиальной астмы, отека Квинке, нейродермита и других аллергических заболеваний. Противопоказан при лихорадке, менструациях и во время лечения глюкокортикоидами

Rp.: Histaglobulini 3,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. Под кожу по 2—3 мл через 2—3 дня (по 5—10 инъекций на курс лечения)

Гистидин — Histidin

L (+) α -амино- β -имидазолпропионовой кислоты моногидрохлорид

Синонимы: Cernhistine, Cloristin, Gastroistidina, Gerulcin, Histifan, Istidina, Istivis, Isto, Laristine, Larostidin, Plexamina, Stellidin, Ulcostidine

Выпускается в СССР и в ПНР в ампулах по 5 мл 4% раствора

Хранение — в защищенном от света месте

Срок годности — 2 года (ПНР)

Аминокислота, предшественник гистамина в организме.

Применяется при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Примечание: во время лечения давать больному в большом количестве аскорбиновую кислоту

Rp.: Sol. Histidini 4% 5 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Внутримышечно или подкожно по 1 ампуле в день в течение 3 недель

Глауцина гидробромид —

Glaucini hydrobromidum

4,5,7,8-тетраметилапорфина гидробромид или гидрохлорид

Синоним: Glauvent (НРБ)

Выпускается в таблетках по 0,05, а также в таблетках по 0,01 и 0,04 («Глауwent»)

Хранение — список Б

Срок годности — не установлен; глауwent таблетки НРБ — не ограничен

Противокашлевое средство. В отличие от кодеина, гидрокодона и т. п. не угнетает дыхания, не вызывает привыкания и пристрастия. В качестве осложнений могут наблюдаться гипотензия и головокружение

Rp.: Glaucini hydrobromidi

0,05 (0,01 aut 0,04)

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 1 таблетке 3 раза в день

Гливалан — Glyvalan

Смягчающее кожу косметическое средство

Rp.: Lanolini

Vaselini

Glycerini aa 5,0

M. f. unguentum

DS. Наружное. Для нанесения на лицо и руки

Гливенол — Glyvenol (СФРЮ)

Этил-3,5,6-три-*O*-бензил-*D*-глюкофуранозид

Синонимы: Polfavenol (ПНР), Tribenzozid

Выпускается в таблетках (драже) по 0,2 и в капсулах по 0,4

Хранение — в обычных условиях

Срок годности — 5 лет

Противовоспалительное средство, тонизирующее стенки вен.

Препарат применяется для лечения варикозных расширений вен, геморроя, флебитов и других нарушений венозного кровообращения.

Противопоказан в первой трети беременности

Rp.: Caps. «Glyvenol» 0,4
D. t. d. N. 20
S. По 1 капсуле 2 раза в день
Rp.: Drag. «Glyvenol» 0,2
D. t. d. N. 20
S. По 1 драже 2—3 раза в день

Гликоформал — Glycoformal

Дезинфицирующее — дедодорирующее и смягчающее кожу средство.

Применяется при избыточной потливости кожи ног

Rp.: Solutionis Formaldehydi 3% 75,0
Aquaе destillatae 15,0
Glycerini 10,0
MDS. Смазывать ступни ног ежедневно 1—2 раза

Глио-6 — Glio-6 (Франция)

Пиридоксина глюкоксилат

Выпускается в таблетках (драже) по 0,1 г

Противогипоксическое средство.

Препарат применяют при нарушениях периферического и коронарного кровообращения, связанных с атеросклерозом

Rp.: Tabul. (Dragee) «Glio-6» 0,1
D. t. d. N. 30
S. По 1 таблетке (драже) 3—4 раза в сутки, глотать не разжевывая, запивать небольшим количеством воды

Глицерин борно-квасцовый — Glycerinum Acidi borici aluminatum

Кровоостанавливающее и антисептическое средство.

Применяется для остановки кровотечения при мелких повреждениях кожи

Rp.: Aluminis 5,0
Acidi borici 10,0
Glycerini 100,0
MDS. Наружное

Глицерин борно-таниновый —
Glycerinum borotannicum

Антисептическое и вяжущее средство.

Применяется для смазывания слизистых при местных воспалительных процессах

Rp.: Acidi borici 1,0
Tannini 2,0
Glycerini 20,0

MDS. Наносить на пораженные участки кожи

Глицерин дегтярно-салициловый —
Glycerinum Picis liquidae salicylatum

Антисептическое и кератолитическое средство.

Применяется при кожных заболеваниях (см. «Вилькинсона мазь», «Лассара паста»)

Rp.: Saponis 17,0
Glycerini 72,0
Picis liquidae 10,0
Acidi salicylici 1,0

MDS. Наносить на пораженные участки кожи.

Приготовление: растворяют при нагревании мыло в 60,0 глицерина и при помешивании добавляют смесь дегтя с салициловой кислотой, растертую в 12,0 глицерина

Глицерин известковый сложный —
Glycerinum Calcis compositum

Препарат применяется для обработки мелких повреждений кожи вместо повязки

Rp.: Tragacanthae 10,0
Glycerini 50,0
Aquaе Calcis
Aquaе Rosae aa 70,0

MDS. Наносить на пораженные участки кожи

Глицерин ихтиоловый —
Glycerinum ichthyolatum

Антисептическое и противовоспалительное средство.

Применяется в гинекологии для пропитывания тампонов, вводимых во влагалище при аднекситах и пр.

Rp.: Ichthyoli 1,0
Glycerini 9,0
MDS. Наружное

Глицерин ихтиолово-мыльный —
Glycerinum Ichthyoli saponatum

Применение — см. «Глицерин ихтиоловый»

Rp.: Saponis 9,0
Glycerini 86,0
Ichthyoli 5,0
MDS. Наружное

Глицерин йодно-карболовый —
Glycerinum iodocarbolicatum

Антисептическое и фунгицидное средство.

Применяется при грибковых заболеваниях кожи

Rp.: Phenoli
Iodi āā 1,0
Kalii iodidi 2,0
Glycerini 100,0
MDS. Для смазывания кожи 1—2 раза в день

Глицерин йодно-мыльный —
Glycerinum Iodi saponatum

Антисептическое средство.
Применение — см. «Глицерин йодно-карболовый»

Rp.: Saponis 19,0
Glycerini 75,0
Iodi 2,0
Kalii iodidi 4,0
MDS. Наносить на пораженные участки кожи
Приготовление: мыло растворяют в 70,0 глицерина при нагревании, затем примешивают смесь остальных ингредиентов с 5,0 глицерина

Глицерин йодный —
Glycerinum iodatum

Применение — см. «Люголя раствор»

Rp.: Iodi 1,0
Kalii iodidi 0,5
Aquae destillatae 2,0
Glycerini 98,0
MDS. Наносить на пораженные участки кожи

Глицерин йодоформно-мыльный —
Glycerinum Iodoformii saponatum

Антисептическое средство.
Применяется при воспалительных заболеваниях кожи

5%
1. Rp.: Saponis 19,0
Glycerini 76,0
Iodoformii 5,0
10%
2. Rp.: Saponis 15,0
Glycerini 75,0
Iodoformii 10,0
20%
3. Rp.: Saponis 10,0
Glycerini 70,0
Iodoformii 20,0
50%
4. Rp.: Saponis 5,0
Glycerini 45,0
Iodoformii 50,0
MDS. Наносить на пораженные участки кожи

Глицерин карболово-молочно-кислый
Glycerinum Phenoli lacticum

Антисептическое средство.
Применение — см. «Глицерин йодоформно-мыльный»

1. Rp.: Phenoli 1,0
Acidi lactici 2,0
Glycerini 20,0
2. Rp.: Phenoli 2,0
Acidi lactici 4,0
Glycerini 20,0
3. Rp.: Phenoli 5,0
Acidi lactici 15,0
Glycerini 20,0

MDS. Наносить на пораженные участки кожи

Глицерин карболово-мыльный —
Glycerinum Phenoli saponatum

Свойства и применение — см. «Глицерин йодоформно-мыльный»

Rp.: Saponis 19,0
Glycerini 79,0
Phenoli 2,0

MDS. Наносить на пораженные участки кожи.

Приготовление: мыло при нагревании растворяют в глицерине и к горячему раствору прибавляют фенол

Глицерин салицилово-мыльный —
Glycerinum Acidi salicylici saponatum

Антисептическое и кератолитическое средство.

Применяется в дерматологии при заболеваниях кожи, сопровождающихся избыточным ороговением

Rp.: Saponis 19,0
Glycerini 76,0
Acidi salicylici 5,0

MDS. Наносить на пораженные участки кожи.

Приготовление: мыло растворяют в 60,0 глицерина и примешивают растертую салициловую кислоту в 16,0 глицерина

Глицерин с бурой —
Glycerinum cum Natrii tetraborate

Фунгицидное средство.
Применяется для обработки полости рта у детей при молочнице

Rp.: Natrii tetraboratis 1,0
Glycerini 6,0
MDS. Наружное

Глицерин серно-мыльный —
Glycerinum Sulfuris saponatum

Противопаразитарное средство.
Применяется при чесотке и дру-
гих паразитарных заболеваниях
кожи

Rp.: Saponis 15,0
Glycerini 75,0
Sulfuris praecipitati 10,0

MDS. Наносить на пораженные участки кожи.
Приготовление: мыло растворяют при нагревании в 60,0 глицерина,
затем перемешивают растертую взвесь серы в 15,0 глицерина

Глицерин с железом —
Glycerinum ferratum

Кровоостанавливающее средство.
Применяется наружно при мел-
ких повреждениях кожи

Rp.: Solutionis Ferri trichloridi 2,0
Glycerini 98,0
MDS. Наносить на пораженные участки кожи

Глицерин с окисью цинка
мыльный — Glycerinum cum
Zinci oxydo saponatum

Антисептическое и вяжущее
средство.
Применяется в дерматологии
при различных заболеваниях

Rp.: Saponis 12,0
Glycerini 68,0
Zinci oxydi 20,0

MDS. Наносить на пораженные участки кожи.
Приготовление: мыло растворяют при нагревании в 40,0 глицерина
и примешивают растертую цинка окись в глицерине (28,0)

Глицерин таниновый —
Glycerinum tannatum

Вяжущее и антисептическое
средство.
Применяется для смазывания
зева при воспалительных заболе-
ваниях

Rp.: Tannini 2,0
Spiritus aethylici 90% 3,0
Glycerini 45,0
MDS. Наружное

Глицерин хлороформный —
Glycerinum chloroformiatum

Анестезирующее и успокаиваю-
щее средство.
Применяется внутрь по 10—20
капель на прием как противорвот-
ное или наружно в виде растира-
ния при миозитах, радикулите
и пр.

1. Rp.: Chloroformii 1,0
Spiritus aethylici 90% 2,0
Glycerini 7,0
2. Rp.: Chloroformii
Spiritus aethylici aa 10,0
Glycerini 80,0
MDS. Наружное

**Глицерин яичный —
Glycerinum vitellinum**

Косметическое средство

Rp.: Vitelli ovi 40,0
Glycerini 50,0
MDS. Наружное.

Приготовление: желток яйца перемешивают в ступке, постепенно добавляя глицерин. Готовят ex tempore

**Глицериноспирт —
Glycerinum et Spiritus aethylici**

Антисептическое и смягчающее
кожу средство.

Применяется для обработки
кожи, а также в качестве ушных
капель при воспалении наружного
и среднего уха

Rp.: Glycerini
Spiritus aethylici 96% aa 10,0
MDS. Наружное

**Глицерофосфат —
Glycerophosphat**

Выпускается в виде гранул.
Состав: Calcii glycerophosphatis 10,0
Natrii glycerophosphatis 2,0
Sacchari 88,0

Хранение — в хорошо укупоренной таре

Препарат, содержащий фосфор.

Применяется как общеукрепляющее, тонизирующее средство при упадке питания, переутомлении, истощении нервной системы

Rp.: Granul. Glycerophosphati 100,0
DS. По $\frac{1}{2}$ —1 чайной ложке 2—3 раза в день

**Глицерофосфен —
Glycerophosphenum**

Состав на 1 таблетку:
Calcii glycerophospheni
Rhutini aa 0,15
Срок годности — 5 лет

Препарат, содержащий фосфор.

Применяется как общеукрепляющее, тонизирующее средство при упадке питания, переутомлении, истощении нервной системы, рахите (см. «Глицерофосфат»)

Rp.: Tabul. «Glycerophosphenum» N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Глория — Gloria

Вяжущее, сосудосуживающее и антисептическое средство.

Применяется местно для лечения острого ринита

Rp.: Mentholi 2,0
Camphorae tritae 1,0
Bismuthi subnitratiss
Acidi borici aa 8,0
Thymoli 1,0

MDS. Для вдвухания в нос по 0,5—1,0 2—3 раза в день

Гомфотин — GomphotinumСердечный гликозид из листьев харга кустарникового — *Gomphocarpus fruticosus*

Выпускается в таблетках по 0,0002

Хранение — список А

Срок годности — 3 года; контроль ежегодно

Сердечный гликозид, кардиотоническое средство.

По применению аналогичен «Дигоксину»

Rp.: Gomphotini 0,0002

D. t. d. N. 50 in tabul.

S. По 1—1/2 таблетки 2—3 раза в день; после достижения эффекта переходят на поддерживающие дозы — 1/2 таблетки 1—2 раза в день

Гордеева мазь цинхофеновая — Unguentum Cinchopheni Gordeevi

Противовоспалительное и подсушивающее кожу средство.

Применяется для лечения кожных проявлений экссудативного диатеза у детей, экземы

Rp.: Cinchopheni
Vaselini aa 10,0
Zinci oxydi
Tincturae Valerianae
Tincturae Convallariae aa 5,0
Unguenti Naphthalani 20,0

M. f. unguentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи

Гофунга паста — Pasta Hofungi

Хранение — список А

Препарат применяется в стоматологической практике для умерщвления пульпы зуба

Rp.: Acidi arsenicosi anhydrici 5,0
Tannini 3,0
Olei Cinnamomi
Cresoli q. s.
ut f. pasta
DS. В руки врача

Гранулы шипучие лимонные —
Granulae aërophorae citrices

Препарат применяется в качестве средства, стимулирующего секрецию желудка, при гипоацидных гастритах, а также как питье приятного вкуса

Rp.: Natrii hydrocarbonatis 260,0
Sacchari 500,0
Olei Citri 3,0
Spiritus aethylici 90% 80,0
Acidi tartarici 200,0
Acidi citrici 40,0
M. f. granulae

DS. По 1 чайной ложке на стакан воды перед едой.
Приготовление: соду, половину сахара, лимонное масло и 50,0 спирта смешивают, высушивают и гранулируют

Гращенкова микстура —
Mixtura Gratschenkovi

Успокаивающее средство.
По применению аналогична «Бехтерева микстура»

I	II
Rp.: Natrii bromidi	6,0
Chlorali hydrati āā 4,0	10,0
Tincturae Valerianae 10,0	5,0
Phenobarbitali 0,2	0,2
Aquae destillatae 200,0	200,0
MDS. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день	

Гризеофульвин — Griseofulvinum

7-Хлор-2', 4,6-триметокси-6'-метилгризен-2'-дион-3,4

Синонимы: Biogrisin FP, Delmofulvina, Fulcin, Fulvicin, Fulvina, Fulvistatin, Fungivin, Greosin, Gricin, Grifulin, Grifulvin, Grisactin, Griseofuline, Grisovin, Lamoryl, Likuden, Neo-Fulcin, Sporostatin

Выпускается в таблетках по 0,125 и в виде 1,5% суспензии

Хранение — список Б, в сухом месте при комнатной температуре

Срок годности: таблеток — 3 года, после переконтроля — 6 мес.

Противогрибковый препарат.

Применяется для лечения больных, страдающих паршой, трихофитией и микроспорией волосистой части головы и гладкой кожи, эпидермофитией гладкой кожи, а также поражением ногтей, вызванными патогенными грибами (онихомикозами). Препарат способен избирательно накапливаться в ногтях и волосах

Rp.: Griseofulvini 0,125
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день во время еды
Rp.: Suspensionis Griseofulvini
1,5% 100,0
DS. По 1 чайной ложке 2—3 раза в день (детям до 3 лет)

**Губка гемостатическая —
Spongia haemostatica**

Высушенная, особым образом
приготовленная плазма человека
с добавлением хлорида кальция
и аминокaproновой кислоты

Выпускается во флаконах по
50 и 100 г в сухом виде

Хранение — в сухом темном
месте

Срок годности — 1 год

Кровоостанавливающее средство
для местного применения.

Используется для остановки ин-
тенсивных капиллярных кровоте-
чений, обычно при операциях (на
костях, на мозге и др.)

Rp.: Spongiae haemostaticae

50,0 (100,0)

DS. Наносить на кровоточащую поверхность сте-
рильным инструментом

Гужиенко паста — Pasta Guzienco

Противоаллергическое и про-
тивовоспалительное средство.

Применяется при заболеваниях
кожи (экземы, дерматиты, нейро-
дермит и пр.)

Rp.: Solutionis Dimedroli spirituosae 10% 10,0

Pastae Zinci 100,0

M. f. pasta

DS. Наносить на пораженные участки кожи

**Гульяна мазь —
Unguentum Guljani**

Мазь, содержащая антибиотик
широкого спектра действия.

Применяется для лечения воспа-
лительных заболеваний кожи, в
том числе вызванных стафилокок-
ками и стрептококками

Rp.: Chlortetracyclini hydrochloridi 1,0

Lanolini

Vaselini aa 10,0

M. f. unguentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи

**Гуляра примочка свиццовая —
Aqua plumbi Goulardi**

Вяжущее, противовоспалитель-
ное и антисептическое средство.

Применяется наружно при мел-
ких повреждениях кожи и ушибах

Rp.: Liquoris Plumbi subacetatis 1,0

Spiritus aethylici 40% 4,0

Aquae destillatae 45,0

MDS. Наносить на пораженные участки кожи

Дайтек — Dytac (Англия)
2,4,7-Триамино-6-фенилптеридин
Синонимы: Noridil, Teriam, Triamteren, Triarene, Trispan
Выпускается в капсулах по 0,05

Диуретик.
Применяется при отеках на почве сердечной недостаточности, цирроза печени и др. Препарат мало влияет на солевой баланс и кислотно-щелочное равновесие. Усиливает эффект сердечных гликозидов. Советский аналог разрешен к клиническим испытаниям под названием «Птерофен»

Rp.: «Dytac» 0,05
D. t. d. N. 20 in capsul. gelat.
S. По 1 капсуле 1—3 раза в день после еды. Соблюдать осторожность в применении препарата в отношении беременных, особенно в первые три месяца

**Дакена раствор антисептический—
Solutio Natrii hypochlorosi Dakini**

Антисептическое и дезинфицирующее средство.
Применяется для дезинфекции неметаллического инструментария и предметов ухода за больными, выделений инфекционных больных и пр., а также для обработки инфицированных ран

Rp.: Calcariae chloratae 20,0
Natrii carbonatis 14,0
Acidi borici 4,0
Aquae destillatae 1000,0
MDS. Для дезинфекции

Дарье мазь —Unguentum Darie

Антисептическое, противовоспалительное и кератолитическое средство.

Применяется для лечения воспалительных заболеваний кожи (псориаз и пр.)

Rp.: Hydrargyri oxydi flavi 1,0
Acidi salicylici
Resorcini aa 0,3
Axungiae porcinae
Vaselini
Lanolini aa 10,0
M. f. ung.
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Даукарин — Daucarinum
Экстракт из семян моркови
(*Daucus carota*)
Выпускается в таблетках по 0,02
Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте

Миотропное спазмолитическое
средство.
Применяют при хронической
коронарной недостаточности

Rp.: Daucarini 0,02
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день за $\frac{1}{2}$ ч до еды

Дегранол — Degranol (BHP)
1,6-Бис-(2-хлорэтиламино)-1,6-
дидезокси-D-маннита дигидрохлор-
рид

Синонимы: Mannitlost, Manno-
müstinedihydrochrolid

Выпускается в драже по 0,05
и в ампулах по 0,05 сухого пре-
парата

Хранение — список А
Срок годности — 5 лет

Цитостатическое средство.

Применяют для лечения злока-
чественных заболеваний крови,
при хронической лимфоидной и
миелоидной лейкемии, а также
лимфогранулематозе. В более тя-
желых случаях назначают инъек-
ции, в менее тяжелых — драже

Rp.: Dragee «Degranol» 0,05
D. t. d. N. 100
S. По 1 драже в день или 2 драже через день

Rp.: «Degranol» 0,05
D. t. d. N. 5 in ampul.
S. По 1—2 ампулы через день, разведя в 5—10 мл
изотонического раствора натрия хлорида, строго
внутривенно

Дезоксикортикостерона ацетат
(ДОКСА) — *Desoxycorticosteroni*
acetat

11-дезоксикортикостерон аце-
тат

Синонимы: Arcort, Cortarmour,
Cortate, Cortenil, Cortesan, Cor-
tinaq, Cortiron, Decorteron, De-
costrate, Decosteron, Dekorton,
Dorcostrin, Doxo, Steraq и др.

Выпускается в ампулах по 1 мл
0,5% масляного раствора и таб-
летках 0,05 и 0,1

Хранение — список Б

Срок годности ампул — 3 года;
дополнительно после переконт-
роля — 2 года

Срок годности таблеток для
сублингвального применения —
4 года; после переконтроля —
1 год 6 мес.

Минералокортикоид.

Применяется при болезни Ад-
дисона, временном понижении
функции коры надпочечников (ад-
дисонизм), при астении, миасте-
нии, общей мышечной слабости,
гипохлоремии

Rp.: Desoxycorticosteroni acetatis 0,05 (0,1)

D. t. d. N. 5 in tabul.

S. По 1 таблетке имплантируют в подкожную клетчатку через 3—4 мес.

Rp.: Solutionis Desoxycorticosteroni acetatis oleosae 0,5% 1,0

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Внутримышечно по 1 мл через день

Дезопимон — Desopimom (ВНР)

Пара-хлор-а,а-диметил-фенил-этиламина гидрохлорид

Синонимы: Avicol, Chlorphen-terminumhydrochlorid, Lucofen(e), Pre-Sate

Выпускается в таблетках по 0,025

Хранение — список А

Срок годности — 3 года

Анорексигенное средство.

Свойства, показания и противопоказания к применению — см. «Мефолин», «Фепранон»

Rp.: Tabul. «Desopimom» 0,025 N. 50

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Дезурол — Desurol (ЧССР)

Состав на 1 драже:

Methyleni coerulei 0,03

Papaverini hydrochloridi 0,0065

Phenylii salicylatis 0,02

Extr. Belladonnae sicci 0,004

Phenolphthaleini 0,0005

Хранение — список Б

Антимикробное, спазмолитическое и противовоспалительное средство.

Применяют как вспомогательное средство при инфекциях мочевых путей

Rp.: Dragee «Desurol»

D. t. d. N. 50

S. По 3 драже 3—4 раза в день.

Примечание: драже проглатывают, не разжевывая, запив водой

Декамевит — Decamevit

В состав желтого драже входит:

Retinoli acetatis 0,002

Tocopheroli acetatis 0,01

Thiamini chloridi 0,02

aut Thiamini bromidi 0,0258

Riboflavini 0,01

Acidi folici 0,005

Rutini 0,02

Methionini 0,2

Комплексный витаминный препарат.

Применяют при авитаминозе и гиповитаминозе, явлении преждевременного старения, одряхления организма, а также при умственном и физическом истощении, расстройстве сна и аппетита, общей слабости и т. д.

В состав драже серого цвета входит:

Cyanocobalamin 0,0001

Acidi ascorbinici 0,2

Nicotinamidi 0,05

Хранение — в сухом прохладном месте

Срок годности — 1 год

Rp.: Drag. «Decamevit» N. 50

DS. По 1 драже желтого и серого цвета 1—2 раза в день

Декамин — Decaminum

1,10-Декаметилен-бис-(4-аминохинальдиний оксида) дихлорид
Синонимы: Danical, Decabis, Dekadin, Dequadin, Dequalinumchlorid, Dequalonum, Dequaspon, Evazol, Gargilon, Novapontroche, Oralgol, Osangin, Polycidine, Quoticidine, Sanoral, Sorot

Выпускают в виде карамелей по 0,00015 и в виде 0,5 и 1% мази

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности карамели и мази — 1 год

Фунгицидное и бактерицидное средство.

Применяется для лечения заболеваний, вызванных дрожжеподобными грибами (молочницы, кандидамикозы кожи, ногтевых валиков и ногтей), а также для лечения воспалительных заболеваний полости рта и глотки (ангины, тонзиллиты, стоматиты, фарингиты, глосситы)

Rp.: Decamini 0,00015

D. t. d. N. 10

S. Карамель с декамином (1—2 штуки) помещают в рот под язык или за щеку, где она постепенно растворяется 1—2 раза в день. При тяжелых инфекциях — каждые 2 ч

Rp.: Ung. Decamini 0,5% (1%) 20,0

DS. Наружное. Не применять вместе с мылом (инактивация препарата)

Дексаметазон — Dexamethason (СФРЮ)

9 α -фтор-16 α -метилпреднизолон

Синонимы: Arcodexan, Cortidrona, Decacort, Decadran, Decadron, Dectan, Deltafluoren, Decacort, Dexadrol, Dexapot, Dexason, Fluormone, Fluorocort, Fluorodelta, Fortecortin, Hexadrol, Isnacort, Maxidex, Megacortin, Millicorten (Швеция), Novocort, Opticorten, Oradexon, Policort, Pro-dexona, Spoloven, Superprednol,

Синтетический аналог глюкокортикоидов. Примерно в 7 раз активнее преднизолона и в 35 раз — кортизона.

Применяется для лечения аллергических заболеваний (бронхиальная астма и пр.), шока, ревматизма и полиартритов, острог лейкоза и лимфосаркомы, коллагенозов, кожных заболеваний (экзема, псориаз), подострой дистрофии печени и пр. Методы лечения и противопоказания те же, что

Triamcimetil, Vasodex, Visumetazone

Выпускается в таблетках по 0,0005; 0,001 и в ампулах по 1 мл 0,4% раствора

Хранение — список Б

Срок годности таблеток СФРЮ — 3 года, ЧССР — 5 лет; СССР — 6 лет; ампул — 3 года

и для других глюкокортикоидов (хронические инфекции, обострение язвенной болезни желудка, стероидный диабет, кушингизм, атрофия коркового слоя надпочечников и т. п.)

Rp.: Tabul. «Dexamethason» 0,0005 (0,001)

D. t. d. N. 100

S. Начиная с 0,003 в сутки, дозу постепенно снижают до 0,001 в сутки в 2—3 приема

Rp.: Sol. «Dexamethason» 0,4% 1 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Внутривенно капельно при шоке по 1—3 ампулы, разведя их содержимое в 250—500 мл 5% раствора глюкозы

Делипин — Delipin

Срок годности — 1 год

Комплексный витаминный препарат с фенобарбиталом. Обладает успокаивающим действием. Применяется при атеросклерозе сосудов мозга

Rp.: Acidi ascorbinici

Methionini aa 0,3

Pyridoxini hydrochloridi 0,05

Phenobarbitali 0,03

M. f. pulvis

D. t. d. N. 50

S. По 1 порошку 2—3 раза в день после еды

Делицкого—Митрошенко
жидкость — **Liquor Delizky—**
Mitroschenko

Антисептическое средство.

Применяется для обработки незначительных поверхностных повреждений кожи

Rp.: Furacilini 0,02

Spiritus aethylici 3,0

Collodii 100,0

MDS. Наружное

Делмезон — Delmeson (ФРГ)
21-Дезокси-6- α -метил-9- α фтор-преднизолон

Синонимы: Cortilet, Delmeron, Fluolon, Fluorometholon, Neo-Oxylon, Oxylone

Выпускается в виде 0,02% мази и крема в тубах по 5,0 и 20,0 и в специальных флаконах по 20,0 для образования пены.

Срок годности — 3 года

Синтетический препарат глюкокортикоидов, противовоспалительное и противоаллергическое средство.

Показания и противопоказания к применению — см. «Синалар», «Фторокорт» и т. п.

Rp.: Ung. «Delmeson» 0,02% 5,0 (20,0)
DS. Наносить на пораженную поверхность 2—6 раз
в день

Демалгон — Demalgon (BHP)

Состав на 1 таблетку:

Carbromali 0,18

Amidopyrini 0,27

Хранение — список Б, в месте,
защищенном от света

Болеутоляющее и жаропонижающее средство.

Применяют при головной боли, невралгии, неврите, ишиасе, синусите, ревматизме, полиартритах, инфекционных заболеваниях и т. п.

Rp.: Tabul. «Demalgon» N. 10

DS. По 1—2 таблетки 1—3 раза в день

**Демьяновича жидкость —
Liquor Demjanovitschi**

Противопаразитарное (акарицидное) средство. Применяется при чесотке. Пораженные места смазывают дважды раствором № 1, а после высыхания — раствором № 2

1. Rp.: Solutionis Natrii thiosulfatis 60% 100,0

DS. Наружное

2. Rp.: Solutionis Acidi hydrochlorici 6% 100,0

DS. Каждый из растворов готовят и отпускают отдельно

**Демьяновича паста —
Pasta Demjanovitschi**

Акарицидное средство.
Применяется для лечения чесотки

Rp.: Natrii thiosulfatis 80,0

Saponis viridis

Aquae destillatae aa 10,0

M f. pasta

DS. Наносить на пораженные участки

Дента — Denta

Состав:

Chlorali hydrati

Camphorae aa 3,33

Spiritus aethylici 96% ad 10,0

Выпускается во флаконах по
10 мл.

Срок годности — 3 года

Болеутоляющее средство.

Применяется при зубной боли

Rp.: Guttae Dentae 10 ml

DS. Смочить вату раствором и положить на больной зуб

Депиляторий — Depilatorium

Препарат применяется для удаления волос с кожи. Накладывают на кожу 2—3 раза в течение 5—7 дней

Rp.: Barii sulfidi 50,0
Plumbi carbonatis
Amyli āā 25,0
MDS. Наружное

Депрессин — Depressinum.
Порошки Мясникова —
Pulveres Mjasnikovi

Гипотензивное средство.
Применяется при гипертонической болезни во всех стадиях. Рекомендуется одновременно принимать 10% раствор хлорида калия по 1 столовой ложке (после приема порошка)

Rp.: Reserpini 0,0001
Aethaminali-natrii 0,05
Dibazoli 0,02
Dichlothiazidi 0,025
M. f. pulvis
D. t. d. N. 50
S. По 1 порошку 3 раза в день

Депурган — Depurgan (ЧССР)

Состав на 1 драже:
Aloini 0,016
Phenolphthaleini 0,032
Extracti Strychni 0,004
Extracti Belladonnae 0,0012
Хранение — список Б

Слабительное средство.
Применяют при атонических и спастических запорах

Rp.: Dragee «Depurgan» N. 20
DS. По 1—3 драже на ночь. Драже проглатывают, не разжевывая

Дерла — Derla (ЧССР)

Состав на 1 таблетку:
Cupri sulfatis 0,6
Natrii hydrocarbonatis
Acidi tartarici
Acidi borici
Zinci sulfatis āā 0,1

Вяжущее и антисептическое средство. Применяют при мокнущих экземах, трофических язвах, кольпитах

Хранение — в сухом месте

Rp.: Tabul. «Derla» N. 20
DS. По 1—2 таблетки на литр воды для спринцевания. 1 таблетку на 1 л воды для компрессов и полосканий

Дермазулен — Dermazulen (ЧССР)

Противовоспалительное средство.

Состав:

Chamazuleni

Ol. Chamomillae aetherae āā 0,1

Basis unguenti ad 100,0

Выпускается в тубах по 30,0

При язвах голени перед нанесением мази «Дермазулен» следует очистить нижнюю часть язвы от некротической ткани и микробной флоры

Примечание: хамазулен (диметулен, 7-этил-1,4-диметил-азулен) — противовоспалительное и противоаллергическое средство, выделенное из ромашки (*Matricaria Chamomilla*)

Rp.: Unguenti «Dermazulen» 30,0

DS. Наносить на рану небольшой слой мази

Дермозолон — Dermosolon (ВНР)

Выпускается в тубах по 5,0

Состав на 1 тубу:

Prednisoloni 0,025

Enteroseptoli 0,15

Basis unguenti ad 5,0

Хранение — в защищенном от света месте

Противовоспалительное средство.

Применяется при экземах различного происхождения, язве голени, поверхностных поражениях кожи и др. Мазь «дермозолон» снимает воспалительные процессы и зуд, а также аллергические реакции кожи. Антисептик энтеросептол, входящий в ее состав, предохраняет от микробных поражений кожи (см. также «Синалар-Н», «Оксикорт» и т. п.)

Rp.: Unguenti «Dermosolon» 5,0

DS. Обмазывать пораженную область кожи тонким слоем мази 1—3 раза в день. Смазанную область рекомендуется обвязывать марлевой повязкой, так как энтеросептол загрязняет бельё

Дермофил — Dermofil

Антисептическое, подсушивающее и дезодорирующее средство.

Применение — см. «Гальманин»

Rp.: Aluminis usti 10,0

Calcii sulfatis usti

Acidi borici āā 50,0

Amyli Oryzae

Talcii āā 250,0

Olei Citri 3,0

Mentholi 1,0

M. f. aspersio

DS. Наружное, присыпка

Десмол — Desmol

Антисептическое, подсушивающее, дезодорирующее и вяжущее средство.

Применяется для смазывания кожи при излишней потливости

Rp.: Glycerini
Formalini aa 5,0
Spiritus aethylici 70% 100,0
Mentholi 1,0
Cumarini 0,025
Olei odorati gtts XX
MDS. Наружное

Детурид — Deturid

Фенилэтилацетилмочевина
Синонимы: Äthylphenacemid,
Benuride, Ethylphenacemide, Ethylphenacemide, Pheneturide,
Trinuride

Выпускается в таблетках по 0,2

Хранение — список Б

Срок годности — не установлен

Противоэпилептическое средство. По строению и действию близок к «Фенацемиду», менее токсичен.

Применяется при всех формах эпилепсии, главным образом при резистентности к другим противоэпилептическим средствам. Противопоказан при поражениях печени и почек, угнетении кровотока, депрессии

Rp.: Tabul. «Deturid» 0,2
D. t. d. N. 60
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день после еды

Дефебрин — Dephebrin

Состав на 1 суппозиторий:

Salicylamidi 0,6

Amidopyrini

Phenacetini aa 0,2

Coffeini 0,02

Olei Cacao 0,2

Хранение — в сухом защищенном от света месте

Анальгетическое и жаропонижающее средство.

Применяется при простудных заболеваниях, головной боли, при невралгических заболеваниях в тех случаях, когда пероральный прием невозможен

Rp.: Supp. Dephebrini N. 10
DS. По 1 суппозиторию 2—3 раза в день

Дехолин — Decholinum

Натрия дегидрохолат

Синонимы: Acidum dehydrocholeum, Acolen, Bilalpin, Biledrol, Biliron, Bilostat, Carachol, Cholagon, Cholamin, Cholepatin, Chologen, Chologonum, Cistocolin, Dechocid, Decol, Dehydrochol (ЧССР), Dicolan, Didrocolo, Dilaibil, Epasanol, Feliflux, Hillcholin, Natrii dehydrocholas, Supgachol, Syngachol и др.

Выпускается в ампулах по 5 мл 5% раствора

Хранение — в защищенном от света месте

Желчегонное — холеретик.

Применяется при хроническом холецистите, холангите, желчнокаменной болезни и пр. Под названием «Хологон» выпускается в таблетках по 0,25, аналогичен по действию дегидрохолевой кислоте

Rp.: Sol. Decholini 5% 5 ml

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. Внутривенно медленно 1 раз в день

Диарил — Diadril (СФРЮ)

1-(п-Хлордифенилметил)-4-(М-метилбензил)-пиперазина дигидрохлорид

Синонимы: Ancolan, Bonadettes, Bonamine, Calmonal, Chiclida, Histamethine, Histamethizine, Itinerol, Marex, Meclozin, Navicalm, Parachloramine, Postafen(e), Sabari, Sea Legs, Suprimal, Travelon, Vomisseis

Выпускается в таблетках по 0,025

Хранение в сухом месте

Противогистаминное, противорвотное и успокаивающее средство пролонгированного действия.

Применяют при крапивнице, ангионевротическом отеке, аллергическом дерматозе, экземе, бронхиальной астме; при аллергических осложнениях после приема пищи или лекарств и для лечения и профилактики кинетозов, для усиления эффекта снотворных и др.

Примечание: препарат не следует назначать водителям транспорта

Rp.: «Diadrili» 0,025

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день.

Диазолин — Diazolinum

9-Бензил-1,2,3,4-тетрагидро-3-метил-γ-карболина нафталин-1,5-дисульфонат

Синонимы: Diasolin, Fabahistin, Incidal, Incidan, Mebhydrolin, Omeril

Выпускается в порошке и в таблетках по 0,05 (0,1)

Антигистаминный препарат.

Применяется при лечении аллергических заболеваний: крапивницы, сывороточной болезни, ангионевротического отека, сенной лихорадки, дерматитов, зуда, аллергических реакций, связанных с применением антибиотиков, и т. п. Отличается отсутствием успо-

Хранение — список Б, в таре, предохраняющей от действия влаги и света; таблетки — в защищенном от света месте

Срок годности: порошка — 2 года; после переконтроля — 1 год

Rp.: Diazolini 0,05 (0,1)

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 1 таблетке 2 раза в день после еды

Диакарб — Diacarbium

2-Ацетиламино-1,3,4-тиадиазол-5-сульфамид

Синонимы: Acetazolamide, Albox, Anicar, Dehydratin, Diamox, Diluran, Diuramid (НРБ), Diuretex, Diuribeta, Diutazol, Edetox, Ederen, Eumicton, Fonurit (ВНР), Lediamox, Nephramid, Odemin, Renamid, Sulfadiurine

Хранение — в обычных условиях

Срок годности — 5 лет (ПНР)

Rp.: Diacarbi 0,25

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 1 таблетке 1 раз в день

Диал — Dial (Швейцария)

5,5-Диаллилбарбитуровая кислота

Синонимы: Allobarbitol, Allobarbitone, Allylbarbitural, Alnox, Barballyl, Barbidal, Curral, Diadol, Diafanal, Diagen, Diallymal, Diallynal, Dormallyl, Novallyl, Sedormed

Выпускается в таблетках по 0,1

Хранение — список Б

Срок годности — 3 года

Rp.: Tabul. «Dial» 0,1

D. t. d. N. 10

S. По 1 таблетке на ночь за 1/2 ч до сна

Диафеин — Diarpheinum

Состав на 1 таблетку:

Analgini

Amidopyrini aa 0,25

Coffeini-natrii benzoatis 0,05

Phenobarbitali 0,02

Хранение — список Б

Срок годности — 1 год

каивающего и снотворного действия, а также постепенным развитием эффекта

Диуретик — ингибитор карбоангидразы.

Применяют как мочегонное средство при отеках различного происхождения, а также для лечения глаукомы, эпилепсии и т. п. Рациональным является совместное назначение с ртутными мочегонными

Снотворное.

Применяется при бессоннице, связанной с неврозами, неврастенией, истерией и депрессией, а также после операций

Болеутоляющее и жаропонижающее средство.

Применяют при головной боли, невралгии, лихорадочных состояниях, радикулите, миозите и т. д.

Rp.: Tabul. Diapheini N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

**Диафенилсульфон —
Diaphenylsulfonium**
4,4'-Диаминодифенилсульфон
Синонимы: Avlosulfon, Croysul-
fone, Darson, Diphenason, Diphone,
Disulone, Dumitone, Eporal,
Novophone, Protogen, Sulfona,
Sulfonmere, Udolac

Выпускается в виде порошка
и таблеток по 0,025 и 0,05
Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте
Срок годности порошка — 2 го-
да; таблеток — 3 года

Противолепрозный препарат. Ока-
зывает антибактериальное дейст-
вие против микобактерий лепры
и туберкулеза. Предложен также
для лечения больших герпетIFORM-
ным дерматитом Дюринга. При
применении диафенилсульфона
противопоказан прием амидопи-
рина и барбитуратов

Rp.: Diaphenylsulfoni 0,025 (0,05)

D. t. d. N. 40 in tabul.

S. По 1 таблетке 2 раза в день (в первые 2 недели
лечения), в следующие 3 недели — по 0,1 2 раза
в день. После 2-недельного перерыва проводят
второй цикл по той же схеме. Курс лечения со-
стоит из 4 циклов

Диботин — Dibotin (Англ.)
1-Фенилэтилбигуанида гидро-
хлорид

Синонимы: Abetal, Adiabetin,
Adinsoral, Betoral, Debeone, De-
binyl, Diabenide, Diabex, Diab-
Oral «Hofmann», Dibein, Dibo-
phen, Diguabet, Feguanide, Fen-
formin, Fenormin, Insoral, Kata-
glicina, Phenformin

Выпускается в таблетках по
0,00025

Срок годности — 5 лет

Антидиабетическое средство.
Применяется в легких и средней
тяжести случаях диабета, особен-
но тогда, когда наступила рези-
стентность к инсулину и сульфа-
ниламидам. Обычно комбинируют
с антидиабетическими средствами
других групп

Rp.: Tabul. «Dibotin» 0,00025

D. t. d. N. 100

S. По 1 таблетке в день; каждую неделю суточный
прием увеличивается еще на 1 таблетку, доходя,
при надобности, до 4—5 таблеток в сутки

Диваскол — Divascol (ЧССР)
2-Бензил-2-имидазолина гидро-
хлорид

Синонимы: Antitens, Artonil,
Benim, Benzol, Benzazolinhydro-
chlorid, Benzidazol, Benzimidon,

α -Адренолитик.
Применяется при функциональ-
ных расстройствах периферичес-
кого кровообращения, местных
повреждениях тканей, глазных
заболеваниях: ожоги, конъюнкти-

Benzolin, Cyclocol, Diladon, Dilazolin, Imidalin, Lambral, Oliten-sol, Peripherine, Pervasol, Prefaxil, Priscol, Priscoline, Prodil, Tolazolin, Toline, Tolpal, Vasidin, Vasimid, Vasodil, Vasodilatan, Vasodilatin

Выпускается в таблетках по 0,025 и в ампулах по 1 мл 1% раствора

Хранение — список Б

виты, глаукома, заболевания глазного дна и зрительного нерва сосудистого происхождения

Rp.: Tabul. «Divascol» 0,025

D. t. d. N. 50

S. По $\frac{1}{2}$ —1 таблетке во время еды или после еды. В дальнейшем дозу повышают до 3—4 таблеток в день

Rp.: Sol. «Divascol» 1% 1,0

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По $\frac{1}{2}$ —1 ампуле 1—3 раза в день подкожно, внутримышечно или внутривенно (медленно)

Дивенал — Divenal

Состав на 1 таблетку:

Dibazoli

Paraverini hydrochloridi $\bar{a}\bar{a}$ 0,02

Phenobarbitali 0,015

Хранение — список Б

Срок годности — 1 год

Успокаивающее и спазмолитическое средство.

Применяют при спазмах периферических сосудов, стенокардии, спазмах гладкомышечных органов и пр.

Rp.: Tabul. Divenali N. 10

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Дигидроэрготамин —

Dihydroergotamin (ЧССР)

Метансульфонат дигидроэрготамина

Синонимы: Diergotan, Dihydroergotaminmesylat, Dihyergot, Dii-dergot, Ergotex

Выпускается в каплях по 10 мл 0,2% раствора и в ампулах по 1 мл 0,1% раствора

Хранение — список Б

Срок годности — 3 года

α -Адренолитик.

Применяется при острых приступах мигрени, головных болях после сотрясения мозга, болезни Рейно, эндартериите и пр.

Rp.: Sol. «Dihydroergotamin» 0,1% 1,0

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Внутримышечно по 0,5 1 мл

Rp.: Sol. «Dihydroergotamin» 0,2% 10 ml

DS. По 5—20 капель 2—3 раза в день

Дигитесал — Digitalis (ЧССР)

Состав на 1 таблетку:

Theobromini 0,3

Digitoxini 0,00005

Хранение — список А, в сухом, защищенном от света месте

Срок годности — 3 года

Рр.: Tabul. «Digitalis» N. 20

DS. По 1 таблетке 3 раза в день

Кардиотоническое и мочегонное средство.

Применение — см. «Дигитоксин».

Дигитоксин — Digitoxinum

Гликозид, содержащийся в листьях наперстянки пурпурной (*Digitalis purpurea*)

Синонимы: Cardigin, Carditalin, Carditoxin, Cordalen, Cristapurat, Crystodigin, Digacin, Digazon, Digicoryl, Digicristin, Digilong, Digipan, Digisidin, Digistrat, Digin, Digitoxinol, Digitrin, Digo-tin, Dixin, Foxalin, Gladilon, Glucodigin, Lanatoxin, Prodigal, Purodigin, Purpleuren, Purpurid, Unidigin

Выпускается в таблетках по 0,0001 в СССР, ВНР и ЧССР

Хранение — список А, в сухом защищенном от света месте

Срок годности таблеток — 3 года (ВНР); срок годности драже ЧССР — 6 лет

Рр.: Digitoxini 0,0001

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 1 таблетке 3 раза в день

Кардиотоническое средство.

Применяют при хронической сердечной недостаточности с нарушением кровообращения II и III степени, тахикардической форме мерцательной аритмии. Желательно совместное применение хлорида или ацетата калия. Противопоказан при стенокардии, инфаркте миокарда, желудочковой пароксизмальной тахикардии, блокаде проводящих путей сердца, сопровождающейся брадикардией. Обладает весьма выраженными кумулятивными свойствами

Дигоксин — Digoxin (ВНР)

Гликозид, содержащийся в листьях наперстянки шерстистой (*Digitalis lanata Ehr.*)

Синонимы: Cedoxin, Coragoxine, Cordioxil, Digacin, Digazolan, Digitab, Digolan, Digosin, Digosina, Digostip, Dixina, Lanacordin, Lanacrist, Lanicor, Lanoral, Lanoxin, Natidigoxine, Oxydigitoxin, Rougoxin

Выпускается в таблетках по 0,00025 г и в ампулах по 2 мл 0,025% раствора

Хранение — список А, в защищенном от света месте

Срок годности таблеток и ампул — 3 года

Кардиотоническое средство.

По показаниям и противопоказаниям аналогичен «Дигитоксину». При энтеральном применении кумулирует меньше, чем дигитоксин, при внутривенном — выводится почти так же быстро, как и строфантин

Rp.: Tabul. «Digoxin» 0,00025

D. t. d. N. 10

S. Для скорой пероральной дигитализации 1—2 таблетки в течение 1—2 дней

Rp.: Sol. «Digoxin» 0,025% 2,0

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. Внутривенно по 1 мл в 20—40 мл 20—40% раствора глюкозы

Дийодтирозин —

Diiodthyrosinum

1-β-(3,5-Дийод-4-оксифенил)-
α-аланин

Синонимы: Agontan, Apothylin, Biiodtyrosin, Cemiod, Dityrin, Flavianina, Iodgorgon, Itir, Iodoglobin

Выпускается в таблетках по 0,05

Хранение — список Б

Срок годности — 5 лет

Тиреостатическое средство.

Применяется при лечении тиреотоксикоза вместе с мерказолилом или метилтиоурацилом для предотвращения увеличения зуба, а также самостоятельно при легких формах гипертиреоза и на последних этапах подготовки к струмэктомии

Rp.: Diiodthyrosini 0,05

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день после еды

Дикаптол — Dicaptol (BHP)

2,3-димеркаптопропанол

Синонимы: Antoxol, BAL, Valistab, Dimercaprol, Dimercaptol, Dimersol, Dipanol, Dithioglycerin, Mercaprol, Panobal, Sulfactin

Выпускается в ампулах по 1 мл 10% раствора в бензилбензоате и в оливковом масле

Хранение — список Б

Срок годности — 5 лет

Противоядие при остром и хроническом отравлении мышьяком и металлами.

Применяется также для лечения болезни Вильсона (гепатолентикулярная дегенерация)

Rp.: Sol. «Dicaptol» 10% 1 ml

D. t. d. N. 6 in ampul.

S. Внутримышечно (глубоко в ягодичную мышцу)

При острых отравлениях — в 1-й день вводят по 4—6 ампул в день; во 2—4-й день — до 3 раз; в 5—6 день — 1 раз в день

Дикафен — Dicaphenum

Состав на 1 таблетку:

Analgin

Phenacetini aa 0,25

Coffeini-natrii benzoatis 0,05

Codeini 0,015

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 1 год

Болеутоляющее и жаропонижающее средство.

Применяют при головной боли, невралгии, лихорадочных заболеваниях и т. п.

Rp.: Tabul. Dicarpheni N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Диколин — Dicolinum

β-Диэтиламиноэтилового эфира
1,6-диметилпиперидиновой кис-
лоты дийодметилат

Выпускается в таблетках по
0,05 и 0,1 и в ампулах 1 и 2 мл
1% раствора

Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте

Срок годности — 2 года

Ганглиолитик.

Применяют при гипертоничес-
кой болезни, гипертонических
кризах, спазмах периферических
сосудов, спазмах гладкой муску-
латуры, органов брюшной поло-
сти, при язвенной болезни желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки
и т. п.

Rp.: Dicolini 0,05 (0,1)

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Dicolini 1% 1 ml (2 ml)

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 1 мл внутримышечно 2 раза в день

Дикумарин — Dicumarinum

Ди-(4-оксикумаринил-3)-метан

Синонимы: Acavyl, Antipro-
trombin, Antitrombosin, Bishydro-
oxocoumarin, Cuma, Cumarene, Di-
coumal, Dicoumarin, Dicuman, Di-
cumarol, Dicumol, Dufalone, Ку-
моран, Medicumarin, Melitoxin,
Symptarin, Temparin, Trombosan

Выпускается в виде порошка
и таблеток по 0,1

Хранение — список А, порошок
в хорошо укуповенной таре, пре-
дохранивающей от действия света,
таблетки — в защищенном от све-
та месте

Антикоагулянт непрямого дей-
ствия.

Применяется при коронарной
недостаточности, для профилакт-
тики и лечения тромбозов, тром-
бофлебитов, эмболий, тромбоем-
болических осложнений, при ин-
фаркте миокарда. При лечении
дикумарином необходимо тща-
тельно следить за общим состоя-
нием больного и картиной сверты-
ваемости крови. Прекращать ле-
чение дикумарином следует посте-
пенно, снижая дозу и увеличивая
интервал между приемами. При
кровотечениях назначение препа-
рата прекращается и больному
вводят витамин К₁, но не викасол!
Не следует назначать дикумарин
во время менструаций (за 2 дня
до менструаций прекратить прием
препарата) и в первые дни после
родов. Одновременно с дикумари-
ном не следует назначать салици-
латы (опасность кровотечения).
Ослабляют действие дикумарина
барбитураты

Rp.: Dicumarini 0,05 (0,1)

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. В 1-й день по 0,05 (0,1) 3 раза, во 2-й день — 0,05 (0,1) в сутки. Лечение проводится курсами по 3—4 дня с перерывами между ними 2—3 дня и более. Высшая разовая доза для взрослых — 0,1, суточная — 0,3 г

Диланизид — Dilanisidum

Новогаленовый препарат, содержащий раствор (в 20% спирте) суммы гликозидов наперстянки шерстистой (*Digitalis lanata*)

Выпускается в ампулах по 1 мл

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — ежегодный контроль

Кардиотоническое средство.

Применяется в тех же случаях, что и «Дигитоксин». Действует быстрее, кумулятивные свойства менее выражены

Rp.: Dilanisidi 1,0

D. t. d. N. 6 in ampul.

S. По 0,5—1 мл в вену в 20 мл 0,9% раствора хлорида натрия

Дильминал — Dilminal (ГДР)

Выпускается в драже, содержащих по 2 энзимных единицы каллигиназы

Хранение — список Б, при температуре не выше 15°

Срок годности — 1 год 6 мес.

Сосудорасширяющее средство.

Применяется при нарушении кровоснабжения органов и тканей, а также при нарушениях циркуляции крови, связанных со старостью и климактерическим периодом. Близок по действию к паутину (каликреину)

Rp.: Dragee «Dilminal» N. 20

DS. Вначале по 2 драже 3 раза в день, постепенно дозу уменьшают. Принимать натощак или перед едой

Димекарбин — Dimecarbiniim

1,2-Диметил-3-карбэтокси-5-оксиндол

Синонимы: Dimecarbin, Mecarbinat

Выпускается в таблетках по 0,02

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности таблеток — 4 года

Спазмолитическое и гипотензивное средство.

Применяется для лечения гипертонической болезни I, II и III стадий, более эффективен при I и II стадиях. Препарат можно комбинировать с другими гипотензивными средствами

Rp.: Dimecarbini 0,02

D. t. d. N. 50 in tabul.

S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Димеколин — Dimecolinum
β-Диметиламиноэтилового эфира
1,6-диметил-пиперидиновой кисло-
ты дийодметилат

Синонимы: Dimecolonii iodidum,
Dimelin

Выпускается в таблетках по
0,025 и 0,05 и в ампулах по 1 *мл*
1% раствора

Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте

Срок годности — 5 лет (табле-
ток, покрытых оболочкой); ам-
пул 1% — 1 год; после перекон-
троля — 6 мес.

Ганглиолитик.
Показания — см. «Диколин».
Примерно вдвое активнее послед-
него

Rp.: Sol. Dimecolini 1% 1 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 0,5—1 *мл* внутримышечно 1—2 раза в день

Rp.: Dimecolini 0,025 (0,05)

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 1 таблетке 2 раза в день

Димэстрол — Dimoestrolum
Диметилловый эфир диэтил-
стильбэстрола

Синонимы: Depot-Östromon, Di-
methyl-Oestrogen, Östrastilben D

Выпускается в ампулах по 2 *мл*
0,6% масляного раствора

Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте

Срок годности — 5 лет

Синтетический заменитель эс-
трогенов.

Применяют по тем же показа-
ниям, что и другие эстрогены
(см. «Эстрадиол»)

Rp.: Solutionis Dimoestrolis oleosae 0,6% 2 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Внутримышечно по 1 инъекции в неделю

Динезин — Dinezinum
10-(2-Диэтиламиноэтил)-феноти-
азина гидрохлорид

Синонимы: Antipar, Aparka-
zin, Casantin, Deparkin (ЧССР),
Diethazine, Diparcol, Latibon, Par-
kazin (ВНР), Thiantan

Выпускается в драже по 0,1;
0,125; 0,05 и в ампулах по 5 *мл*
(парказин)

Хранение — список Б

Срок годности драже — 4 года

Центральный холинолитик.

Применяется для лечения пар-
кинсонизма, болезни Паркинсона,
тормозной дистонии и др.

Rp.: Dinezini 0,1 ((0,05)

D. t. d. N. 20 in dragee

S. По 1—2 драже 3—5 раз в день

Rp.: Sol. «Parkazin» 5 ml

D. t. d. N. 5. in ampul.

S. Внутримышечно по 2—5 мл инъекции применяют в тяжелых случаях в начале курса лечения или в случае невозможности перорального приема драже

Динил — Dinil (ЧССР)

Состав на 1 таблетку:

Amidopyrini 0,2

Diali 0,018

Acidi butylaethylbarbiturici 0,012

Phenacetini 0,2

Coffeini 0,05

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Болеутоляющее и успокаивающее средство при головной боли, зубной боли, невралгии и т. п.

Rp.: Tabul. «Dinil» N. 10

DS. При сильных болях по 1 таблетке через час.

Максимальная доза — 3—4 таблетки в день

Диоспонин — Diosponinum

Сухой очищенный экстракт из корневищ и корней диоскореи кавказской (*Dioscorea caucasica* Lipsky)

Содержит сумму водорастворимых стероидных сапонинов (не менее 30%)

Выпускается в таблетках по 0,1

Хранение — список Б, в сухом защищенном от света месте

Срок годности — 1 год 6 мес.

Гипохолестеринемическое средство.

Применяют при атеросклерозе

Rp.: Diosponini 0,1

D. t. d. N. 30 in tabul.

S. По $\frac{1}{2}$ —1 таблетке 2 раза в день (после еды) в течение 10 дней, затем делают перерыв на 4—5 дней

Диотилан — Diotilan (ВНР)

Натриевая соль диоктилсульфогидратной кислоты

Синонимы: Abilax, Coloxyl, Defilin, Dioctylal, Dollax, Doxolan, Eosan, Mollax, Natriumdioctyl-

Слабительное средство.

Применяют при хроническом запоре

sulfosuccinat, Velmol, Viforlax
Выпускается в таблетках по 0,1
Хранение — список Б

Рр.: «Diotilan» 0,1

D. t. d. N. 10 in tabul.

С. По 1—2 таблетки на ночь. Максимальная доза —
3 таблетки

Дипасалин — Diposalinum

Состав на 1 таблетку:

1. Papaverini hydrochloridi
Salsolini hydrochloridi aa 0,025
Theobromini 0,25
Phenobarbitali 0,015
2. Papaverini hydrochloridi
Salsolini hydrochloridi aa 0,025
Theobromini 0,15
Dibazoli 0,02
Phenobarbitali 0,015
3. Dibazoli 0,02
Papaverini hydrochloridi
Salsolini hydrochloridi aa 0,025
Theobromini 0,25
Phenobarbitali 0,015

Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте

Срок годности — 2 года

Сосудорасширяющее и успокаивающее средство.

Применяют при коронарной недостаточности, иногда — при отеках сердечного происхождения

Рр.: Tabul. Dipasalini N. 100

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Дипасфен — Dipasphenum

Состав на 1 таблетку:

Pasomycini
Dibiomycini
Phenoxymethylpenicillini
aa 0,04167 (0,083)

Хранение — список Б, при температуре не выше 20°

Срок годности — 2 года

Комбинированный препарат антибиотиков.

Применяется при различных кишечных инфекциях, при заболеваниях верхних дыхательных путей

Рр.: Dipaspheni 0,125 (0,25)

D. t. d. N. 20 in tabul.

С. По 1 таблетке через 1 ч после еды 1—2 раза в день профилактически. По 1 таблетке 3—4 раза в день с лечебной целью

**Диплацина дихлорид —
Diplacini dichloridum**

1,3-Бис-(β-платинесцинийэтокси)-бензол дихлорид

Антидеполяризующий мнорелаксант.

Применяется для расслабления мускулатуры при операциях,

Синоним: *Diplazin*
Выпускается в ампулах по 5 мл
2% раствора
Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте
Срок годности — 3 года; после
переконтроля — 2 года

вправлении переломов и вывихов,
столбняке, отравлениях судорож-
ными ядами и т. п. при условии
проведения управляемого дыха-
ния

Rp.: *Solutionis Diplacini dichloridi 2% 5,0*
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. Для внутривенного введения

Дипразин — *Diprazinum*
10-(2-Диметиламинопропил)-фе-
нотиазина гидрохлорид

Синонимы: *Allergan, Atosil, Di-
tarr, Fargan, Fenazil, Fenergan,
Hiberna, Lergigan, Phargan, Phe-
nergan, Pipolphen (БНП), Proaza-
min, Procit, Promazinamide, Prometh-
azinhydrochlorid, Prothazin, Rom-
ergan, Tanidil, Thiorgan, Vallergin*
Выпускается в драже по 0,025
и в ампулах по 1 мл 2,5% и по
5 мл 0,5% раствора
Хранение — список Б
Срок годности — 5 лет

Антигистаминное, седативное,
холинолитическое и адренолити-
ческое средство.

Применяется при аллергических
заболеваниях (крапивница, отек
Квинке, сывороточная болезнь,
лекарственные аллергии и пр.),
при укачивании, синдроме Менье-
ра. В хирургии применяется для
премедикации по тем же показа-
ниям, что и «Аминазин»

Rp.: *Diprazini 0,025*
D. t. d. N. 6. in dragee
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день (после еды)
Rp.: *Sol. Diprazini 2,5% 1 ml*
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. По 1 мл внутримышечно

Дипрофен — *Diprophenum*
2-Ди-*n*-пропиламиноэтилового
эфира дифенилтиоуксусной кис-
лоты гидрохлорид

Синонимы: *Dipropenhydrochlorid,
Diprofen*
Выпускается в таблетках по
0,025 и 0,05 и в порошке
Хранение — список Б, в сухом
защищенном от света месте
Срок годности — 4 года

Спазмолитическое средство.
Применяют при спазмах крове-
носных сосудов (болезнь Рейно,
облитерирующий эндартерит), а
также при спазмах полых органов

Rp.: Dipropheni 0,025 (0,05)
Sacchari 0,2
M. f. pulvis
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Rp.: Dipropheni 0,025 (0,05)
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Дипрофиллин — Diprophyllinum
7-(2,3-Диоксипропил)-теофиллин

Синонимы: Aristophyllin, Astrophyllin, Coronal, Coronarin, Glyfyllin, Glyphyllin, Isophylline, Neutraphylline, Solufyllin, Теофене, Thefylan

Выпускается в порошке, таблетках по 0,2 и в ампулах по 10 мл 2,5% и по 5 мл 10% раствора
Хранение — список Б, в сухом месте

Срок годности ампул — 3 года;
таблеток — 4 года

Спазмолитическое средство.
По показаниям к применению аналогичен «Эуфиллину»

Rp.: Solutionis Diprophyllini 2,5% 10,0 aut 10% 5,0
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. По 10 мл в вену 1—2 раза в день.

П р и м е ч а н и е: 10% раствор дипрофиллина вводят внутримышечно по 3—5 мл

Rp.: Diprophyllini 0,2
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 2—4 раза в день

Rp.: Diprophyllini 0,2
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке 2—4 раза в день

Дисульформин — Disulforminum
1,4,4'-N-триметилен-бис-(4-сульфанилил)-сульфаниламид

Выпускается в порошке и в таблетках по 0,5 и 1,0

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Сульфаниламидный препарат.
В связи с плохим всасыванием применяется для лечения острых и хронических энтероколитов, микробной дизентерии и других микробных заболеваний пищеварительного тракта

Rp.: Disulformini 0,5 (1,0)

D. t. d. N. 10

S. По 1,0 6 раз в день с постепенным снижением дозы (через 2—3 недели), затем по 0,5 4 раза в день в течение 1 $\frac{1}{2}$ —3 мес.

Дитилин — Dithylinum

β -Диметиламиноэтилового эфира янтарной кислоты дийодметилат (диацетилхолина йодид)

Синонимы: Anectine, Ascuron, Brevidil M., Celocurin(e), Compound 48-268, Curacholan, Curacholin, Curacit, Curalest, Diacetylcholin, Elcurin, Leptosuccin, Lysthenon (ФРГ), Midarine, Muscuryl, Myoplegine, Myo-Relaxin (ГДР), Pantolax, Paranoval, Quelicin, Relaxine, Scoline, Succicuran, Succicurariumchlorid, Succinolin, Succinyl-Asta, Succinylcholin, Succinylidicholin, Sucolin, Sucostrine chloride, Suxamethonium, Suxameton, Sux-Cert, Suxinyl, Syncurol, Syntocur, Taquicurin, Ultrapal и др.

Выпускается в ампулах по 2 и 5 мл 1% раствора

Хранение — список А

Срок годности миорелаксина (ГДР) — 3 года, листенона (ФРГ) — 15 мес., дитилина — 2 года

Деполаризующий миорелаксант

Применяется по тем же показаниям, что и «Диплацин». Отличается от последнего кратковременностью действия (3—7 мин). Препарат можно применять у больных миастенией. Прозерин усиливает действие дитилина. При применении больших доз возможна рекураризация и потеря калия мышцами

Rp.: Solutionis Dithylini 1% 2,0 (5,0)

D. t. d. N. 6 in ampul.

S. Для внутривенного введения

Дитримин — Ditrimum

3,3'(N,N')-диметилаэтилендиамино)-бис-(пропил-3,4,5-триметоксibenзоат)

Выпускается в таблетках по 0,03 и 0,06

Синонимы: Andiamine, Corimon, Dilancor, Hexabendin, Hexobendin, Ustimon

Хранение — список Б, в сухом, защищенном от света месте

Спазмолитическое средство.

Применяется при хронической коронарной недостаточности. Понижения артериального давления не вызывает

Рр.: Ditrimini 0,03 (0,06)

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 1—2 таблетки 3 раза в день. Детям — соответственно возрасту

Дифенин — Dipheninum

5,5-Дифенил-гидантоин-натрий

Синонимы: Alespin, Antilepsin, Antisacer, Auratile, Dantoine, Difhydan, Dilantin, Diphedan (ВНР), Ерамин, Epelin, Fenantoin, Hidantal, Hydantoin, Phenytain, Sodanton (ЧССР), Tacosal, Zentropil и др.

Выпускают в таблетках по 0,1

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 4 года

Противоэпилептическое средство.

Применяют при лечении больших судорожных припадков

Рр.: Diphenini 0,1

D. t. d. N. 15 in tabul.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день во время или после еды

Дихлотиазид — Dichlothiazidum

6-Хлор-7-сульфамил-3,4-дигидро-1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксид

Синонимы: Dichlotride, Dihydan, Dihydrochlorothiazide, Hydrochlorothiazid, Hydro-Diuril, Hydro-Saluric, Hydrothide, Hypothiazid (ВНР), Nefrix, Novodiur(ex), Oretic, Panurin, Unazid (СФРЮ), Urodiazin, Vetidrex

Выпускается в таблетках по 0,025

Хранение — список Б, в герметической таре

Срок годности — 5 лет (гипотиазид ВНР — 5 лет)

Мочегонное средство (салуретик).

Применяют при застойных явлениях в малом и большом круге кровообращения, а также при гипертонической болезни в сочетании с гипотензивными средствами. Может длительно применяться, так как сравнительно мало влияет на баланс электронов. Возможные осложнения: гипокалиемия, гиперурикемия, гипергликемия

Рр.: Dichlothiazidi 0,025

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 1—2 таблетки 1—2 раза в день

Дицинон — Dicynon (СФРЮ)
3-Диэтиламмония 1,4-диокси-
бензен-сульфонат
Синонимы: Cyclopamine, Di-
cynone, Etamsylat, Ethamsy-
late
Выпускается в таблетках по
0,25 и в ампулах по 2 мл 12,5%
раствора

Кровоостанавливающее сред-
ство, по структуре и действию
близкое к отечественному «Вика-
солу». Обладает свойствами вита-
мина К, применяется по тем же
показаниям

Rp.: Tabul. «Dicynon» 0,25
D. t. d. N. 20
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день
Rp.: Sol. «Dicynon» 12,5% 2 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. По 1 ампуле

Диэтифен — Diaethiphenum
4,4-Диэтиламиноэтокси- α , β -ди-
этилдифенилэтана дигидрохло-
рид
Синонимы: Coralgil, Coralgina,
Dolgin, Trimanyl
Выпускается в таблетках по
0,025 и в ампулах по 5 мл 0,2%
раствора
Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте
Срок годности таблеток — 4 го-
да; 0,2% раствора — 2 года; после
переконтроля — 1 год

Спазмолитическое средство.
Применяется для лечения и про-
филактики стенокардии

Rp.: Sol. Diaethipheni 0,2% 5,0
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. По 1 ампуле 1 раз в день строго внутривенно
Rp.: Diaethipheni 0,025
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке 3 раза в день после еды

**Длусского мазь — Unguentum
Dlussky**

Кератолитическое средство.
Применение — см. «Адоль»

Rp.: Acidi salicylici 5,0
Mentholi 1,0
Cerae
Olei Olivarum aa 40,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженный участок кожи

Добралин — Dobralin

Кератолитическое средство.
Применение — см. «Адолъ»

Rp.: Emplastri Plumbi 150,0
Olei Olivarum 75,0
Acidi salicylici 10,0
Spiritus aethylici 90% 20,0
Acidi lactici 3,0
M. f. pasta

DS. Наносить на пораженный участок кожи.

Приготовление: растапливают смесь пластыря с оливковым маслом, отдельно растворяют остальные ингредиенты и смешивают с полустывшей массой

Добронравова капли — Guttae
Dobronravovi

Седативное средство.
Применяется при неврозах, нервности, бессоннице и пр.

Rp.: Tincturae Valerianae 6,0
Tincturae Menthae 1,0
Aetheris aethylici 3,0
MDS. По 15 капель на прием

Доверов порошок — Pulvis
Doveri
Хранение — список А

Противокашлевое и отхаркивающее средство.

Применяется при различных заболеваниях, сопровождающихся кашлем

1. Rp.: Opii
Pulveris radicis Ipecacuanhae āā 0,01
Sacchari lactis 0,08
 2. Rp.: Opii
Pulveris herbae Thermopsidis āā 0,01
Sacchari 0,08
 3. Rp.: Opii 0,01
Kalii sulfatis 0,06
Ammonii chloridi 0,3
M. f. pulvis
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 2—3 раза в день
-

Доматрин — Domatrin (ВНР)
Состав на 1 таблетку:
Methylhomatropini bromidi 0,002
Thebaini hydrochloridi 0,00021
Codeini hydrochloridi 0,00038
Papaverini hydrochloridi 0,00044
Narcotini hydrochloridi 0,00228
Morphini hydrochloridi 0,0067

Холинолитическое, спазмолитическое и обезболивающее средство.

Применяют при заболеваниях желудка (кардиалгия, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, пилороспазм, гастрические кризы и т. п.), а также при стенокардии

Хранение — список А, в защищенном от света месте

для прекращения приступов и улучшения самочувствия, для потенцирования ингаляционного наркоза, подавления слюноотделения, прекращения рвоты и т. п.

Rp.: Tabul. «Domatrin» N. 10
DS. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Донована жидкость — **Liquor Donovanii**

Противосифилитическое средство.

Хранение — список А

Изредка применяется для лечения третичного висцерального сифилиса и нейросифилиса

Rp.: Acidi arsenicosi anhydrici 0,03
Hydrargyri diiodidi 0,24
Kalii iodidi 2,4
Aquaе destillatae 72,0
MDS. По $\frac{1}{2}$ чайной ложки 3 раза в день

Допан — **Dopanium**

Цитостатическое средство.

6-метил-5-бис-(2-хлорэтил)-амино урацил

Применяют при лимфогранулематозе (во II и III, иногда при удовлетворительном состоянии кроветворения и в IV стадии), хроническом миелоидном лейкозе

Синоним: Chlorethylaminouracil
Выпускается в таблетках по 0,002

Хранение — список А

Срок годности — 4 года

Rp.: Dopani 0,002
D. t. d. N. 6 in tabul.

S. Разовая доза для взрослых — 4—6 таблеток в день. Дается 1 раз в 5 дней, всего 5—7 раз. Разовая доза для детей из расчета 0,2 мг на 1 кг веса тела

Дроперидол — **Droperidol** (ВНР)

Нейролептическое средство, относящееся к группе бутирофенонов (см. «Галоперидол»).

p-Фтор-γ-[4-(2-оксо-1-бензимидазолинил)-1,2,3,6-тетрагидро-1-пиридил]-бутирофенон

Применяют при предоперационной подготовке пожилых, ослабленных или больных, при хирургических вмешательствах в брюшной и грудной полостях, а также при ортопедических операциях. Препарат обладает противошоковым и противорвотным действием. Применяется в психиатрии в тех же случаях, что и «Галоперидол» (см.), а также для обезболивания при операциях, проводимых методом нейролептанальгезии в сочетании с фентанилом (см. «Таламонал»)

Синонимы: Dehydrobenzperidol (Швейц., Фр.), Deidrobenzperidolo, Droletan, Inapsin(e)

Выпускается в ампулах по 10 мл 0,25% раствора

Хранение — список Б

Срок годности ампул ВНР — 2 года

Rp.: Sol. «Droperidol» 0,25% 10 ml

D. t. d. N. 6. in ampul.

S. Для операционной подготовки — 1—2 мл за полчаса до операции. Для обезболивания операций — 2—5 мл внутривенно или в виде капельной инфузии

**Дрягина микстура — Mixtura
Drjagini**

Успокаивающее средство.
Показания к применению аналогичны показаниям для «Бехтерева микстуры»

Rp.: Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae 6,0—200,0
(12,0—200,0)

Natrii bromidi

Chlorali hydrati āā 4,0

Codeini 0,12

Tincturae Valerianae 4,0 (6,0)

MDS. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день

Дуплекс — Duplex

Водный раствор стрихнина нитрата 0,1% и натрия арсената 1%
Выпускается в ампулах по 1 мл
Хранение — список А
Срок годности — 3 года

Общеукрепляющее и тонизирующее средство.

Применяют при истощении, неврозах, легких формах анемий и пр.

Rp.: Duplex 1,0

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 1 мл в день под кожу

Дустундан — Dustundanum

Состав:

Acidi undecylenici 5,0

Zinci undecylenatis

Salicylamidi āā 10,0

Talci 75,0

Срок годности — 1 год

Противогрибковое средство.

Применяют для лечения эпидермофитии и кандидамикозов кожи

Rp.: Dustundani 100,0

DS. Припудривать пораженные участки кожи

**Дьякова мазь — Unguentum
Djakovi**

Противопаразитарное (акарицидное) средство.

Применяется для лечения различных форм чесотки

Rp.: Sulfuris praecipitati 125,0
Saponis medicati
Amyli aa 50,0
Aquae destillatae 350,0
M. f. unguentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи.

Приготовление: серу, крахмал и мелко настроганное мыло кипятят с водой до образования жидкой однородной массы

Дюрана жидкость — Liqueur
Dugandi

Желчегонное средство (холекинетик).

Применяется при желчнокаменной болезни, холециститах

Rp.: Olei Terebinthinae rectificati 5,0
Aetheris aethylici 15,0
MDS. По 15—20 капель на прием

Жавеля жидкость — Liqueur
Javelle

Дезинфицирующее средство.

Применяется для дезинфекции помещений, предметов ухода за больными и пр. Обладает отбеливающими свойствами, повреждает кожу и слизистые!

Rp.: Calcii hypochlorosi 20,0
Kalii carbonatis 14,0
Aquae destillatae 240,0
MDS. Для дезинфекции.

Приготовление: хлорную известь растирают с 40,0 воды, добавляют раствор поташа в остальном количестве воды. После отстаивания жидкость фильтруют

Жектофер — Gectofer (ФРГ)
Нейтральное комплексное соединение железо-сорбитоловой соли и лимонной кислоты

Выпускается в ампулах по 2 мл с содержанием 0,1 трехвалентного железа

Хранение — в прохладном, защищенном от света месте

Срок годности — 3 года

Железосодержащий препарат.

Применяется при железодефицитном состоянии с анемией и без анемии

Rp.: «Gectofer» 2 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Внутримышечно. Суточная доза для взрослых составляет 1,5 мг железа на 1 кг веса тела

Желатин глицириновый —
Gelatina glycerinata

Индифферентная мазевая основа

Рр.: *Gelatinae medicinalis* 15,0—25,0
Aquae destillatae 25,0
Glycerini 50,0

MDS. Для приготовления мазей.

Приготовление: желатину дают набухнуть в воде, прибавляют глицерин и нагревают на водяной бане

Желатин для внутреннего употребления жидкий — *Gelatina li-
quida ad usum internum*

Кровоостанавливающее средство.

Применяется внутрь при умеренных внутренних кровотечениях у детей

Рр.: *Gelatinae medicinalis* 10,0
Aquae destillatae q. s.
Acidi citrici 1,0
Sirupi corticis
Aurantii ad 100,0

MDS. По 1 чайной ложке 3 раза в день.

Приготовление: желатин с водой кипятят до получения 80 мл жидкости, после охлаждения фильтруют и добавляют лимонную кислоту и сироп померанцевых корок

Желатиноль — *Gelatinolum*

Представляет собой 8% раствор частично расщепленного пищевого желатина; получается путем тепловой обработки желатина с добавлением натрия хлорида

Выпускается в ампулах по 250 и 500 мл

Хранение — в прохладном месте

Срок годности — 3 года

Плазмозаменяющее средство.

Применяют при геморрагическом, операционном и травматическом шоке различной этиологии I—II степени, при подготовке к операции

Рр.: *Gelatinoli* 250 (500) ml

DS. Внутривенно и внутриаартериально. Назначают однократно и повторно. При острой кровопотере и шоке рекомендуется струйное введение (100—150 капель в минуту) до достижения нормального уровня артериального давления. За один раз можно вводить до 2000 мл

Желчь медицинская консервированная — Chole conservata medicata

Синонимы: Bilarin, Fel medicinale

Выпускается во флаконах по 250,0

Хранение: в темном прохладном месте. Перед употреблением взбалтывают

Срок годности — 2 года 6 мес.

Биогенный препарат.

Применяется наружно при острых и хронических артрозах, артритах, бурситах, тендовагинитах, спондилоартрозе, вторичных радикулитах, при травматических инфильтратах мягких тканей (ушибы, растяжения связок, подкожные кровоизлияния), без нарушений целостности костей и кожи. В комплексе с другими методами лечения желчь медицинская применяется при деформирующих спондилоартрозах, ожоговых рубцах, остеомиелитах. Противопоказана при нарушении целостности кожи, воспалительных процессах, гнойничковых заболеваниях кожи, лимфангитах, лимфаденитах

Rp.: Choles medicinalis 250,0

DS. Применяется в виде компрессов, накладывают на кожу в области поражения, покрывают вощеной бумагой с тонким слоем ваты и обвязывают бинтом. Компрессы меняют ежедневно. Курс лечения — 6—30 дней. После перерыва в 1—2 месяца курс лечения повторяют

Жидкость антисептическая — Liquor antisepticum

Антисептическое средство.

Применяется для обработки кожи при гнойничковых заболеваниях, для обработки гнойных ран, для обработки слизистых (поло-скание горла и т. п.) в разведении 1 : 10 — 1 : 20

Rp.: Natrii tetraboratis 1,0

Solutionis Hydrogenii
peroxydi dilutae 20,0

MDS. Наружное.

1 столовую ложку жидкости развести в 1—2 стаканах кипяченой воды

Жидкость белковая — Liquor albuminatus

Общеукрепляющее средство. Применяется при умеренной алиментарной дистрофии и гипопро-теинемиях различного происхождения

Rp.: Plasmatis sterilisati 1000,0
Sirupi simplicis 350,0
Spiritus aethylici 90% 50,0
Glycerini 20,0
Solutionis Vanilini 10% gtts II
MDS. По 1—2 столовых ложки 4—6 раз в день
(до 200 мл в день)

Жидкость глицерино-хлороформная — *Liquor Glycerini chloroformiatus*

Обезболивающее средство.
Применяется у детей при затрудненном прорезывании зубов

Rp.: Glycerini 10,0
Chloroformii
Tincturae Croci
Aquae destillatae āā gtts X
MDS. Втирать жидкость в десны несколько раз в день

Жидкость для лечения обморожений — *Liquor ad perniones*

Вяжущее, противовоспалительное и антисептическое средство.
Применяется для лечения и профилактики осложнений при обморожениях I—II степени

Rp.: Acidi tannici
Resorcini
Ichthyoli āā 10,0
Aquae destillatae 50,0
MDS. Смазывать отмороженные части тела несколько раз в день

Жидкость ментоловая анестезирующая — *Liquor Mentholi anaestheticus*

Обезболивающее средство.
Применяется для анестезии слизистых

Rp.: Mentholi 3,0
Chloroformii 7,0
Aetheris aethylici 12,0
MDS. Для местной анестезии

Жидкость мозольная — *Liquor ad clavos pedum*

Все прописи обладают кератолитическими свойствами.
Способ употребления — см. «Адол»

I. Rp.: Acidi salicylici
Sol. Acidi lactici 68% āā 1,5
Collodii 8,0

2. Rp.: Acidi salicylici
Acidi lactici āā 2,0
Collodii elastici 10,0
3. Rp.: Acidi salicylici
Spiritus aethylici 96% āā 1,0
Collodii 8,0
Viridis nitentis 0,01
4. Rp.: Acidi salicylici 3,0
Spiritus aethylici 90% 5,0
Collodii 42,0
Chlorophylli q. s.
5. Rp.: Acidi salicylici 1,2
Collodii 7,5
Olei Ricini
Acidi lactici āā 0,2
6. Rp.: Acidi salicylici
Acidi lactici āā 8,0
Collodii 84,0
7. Rp.: Acidi salicylici 2,0
Acidi lactici 1,0
Collodii 16,0
8. Rp.: Acidi salicylici 2,0
Aetheris aethylici 4,0
Olei Terebinthinae 1,0
Collodii 16,0
9. Rp.: Acidi salicylici 6,0
Terebinthinae 4,0
Acidi lactici 5,0
Collodii 50,0
10. Rp.: Acidi salicylici
Acidi lactici āā 5,0
Collodii 35,0
Terebinthinae 5,0
11. Rp.: Acidi salicylici 10,0
Collodii 50,0
12. Rp.: Acidi salicylici
Acidi lactici āā 1,0
Collodii 10,0
Mentholi 0,1
13. Rp.: Acidi salicylici 3,0
Acidi lactici 1,0
Collodii 7,0
Terebinthinae 1,0

14 Rp.: Acidi salicylici 3,0
Spiritus aethylici 90% 5,0
Collodii 42,0

15. Rp.: Collodii 15,0
Acidi lactici 1,0
Acidi salicylici 2,0
MDS. Наружное

**Жидкость против веснушек — Li-
quor antiphehidicus** Кератолитическое, смягчающее
кожу и антисептическое средство.
Применяется в косметических
целях (для выведения веснушек)

Rp.: Hydrargyri amidochloridi
Solutionis Ammonii caustici āā 1,0
Aquae Rosae
Glycerini āā 150,0
Odecoloni 50,0
Spiritus camphorati 10,0
Talcii 5,0
MDS. Натирать ваткой лицо 2 раза в день

**Жидкость против зуда — Liquor
antipruriticus** Противозудное и антисептиче-
ское средство.
Применяется при зуде кожи
различной этиологии в виде сма-
зываний или примочек

1. Rp.: Thymoli 1,0
Spiritus aethylici 90% 5,0
Aquae destillatae 200,0

2. Rp.: Resorcini 1,5
Natrii tetraboratis 0,4
Thymoli 0,2
Glycerini 1,5
Spiritus aethylici 90% 12,0
Aquae destillatae ad 100,0

3. Rp.: Mentholi 1,0
Aetheris aethylici
Spiritus aethylici āā 15,0
Glycerini 8,0
Aquae destillatae ad 100,0

4. Rp.: Chlorobutanoli hydrati 1,5
Spiritus aethylici 90% 20,0
Glycerini 30,0
Liquoris Burowi
Aquae destillatae āā 25,0
MDS. Наносить на пораженные участки кожи

**Жидкость против пота — Liquor
contra sudorem**

Все прописи снижают секрецию потовых желез, обладают антисептическими свойствами, применяются при излишней потливости

1. Rp.: Natrii tetraboratis
Acidi salicylici āā 3,0
Acidi borici 1,0
Glycerini
Spiritus aethylici 96% āā 12,0
2. Rp.: Balsami peruviani aut Vinylini 1,0
Acidi formicij
Chlorali hydrati āā 5,0
Spiritus aethylici absoluti 89,0
3. Rp.: Solutionis Formaldehydi
Aquaе destillatae āā 100,0
4. Rp.: Acidi chromici 1,0
Aquaе destillatae 50,0
5. Rp.: Betanaphtholi 2,0
Glycerini 5,0
Spiritus aethylici 70% 93,0
6. Rp.: Natrii benzoatis 2,0
Aquaе Lavandulae
Aquaе Menthae piperitae
Aquaе Citri
Tincturae Myrrhae
Tincturae Quillajae āā 5,0
7. Rp.: Kalii permanganatis 0,12
Natrii tetraboratis 0,24
Aquaе destillatae 1000,0
MDS. Обмыв теплой водой потеющие участки кожи.
смазывать их несколько раз в день

**Жидкость против экземы — Li-
quor contra eczemat**

Средство умеряет боль и зуд при обострении экземы, способствует заживлению мокнущей экземы

- Rp.: Natrii hydrocarbonatis 4,0
Kalii hydrocarbonatis 2,0
Aquaе destillatae 220,0
Glycerini 3,0
Tincturae Opii simplicis 2,0
MDS. Для примочек к пораженным участкам кожи

**Жидкость охлаждающая — Liquor
refrigerans**

Указанные прописи позволяют существенно снизить температуру лекарственных препаратов, продуктов и т. п.

Применяются в бытовых целях

1. Rp.: Ammonii chloridi 300,0
Kalii nitratis 100,0
Kalii chloridi 600,0
Aquaе frigidaе 1000,0
2. Rp.: Ammonii chloridi
Kalii nitratis āā 500,0
Natrii sulfatis crystallisati 800,0
Aquaе frigidaе 1000,0—1500,0—2000,0
MDS. Смесь порошков обливается водой

**Жидкость щелочная — Liquor
alcalinus**

Применяется для размягчения выделений в ушах, носовых ходах. Способ употребления — см. «Бахона капли»

1. Rp.: Natrii tetraboratis 0,5
Natrii carbonatis 1,5
Aquaе destillataе
Aquaе Rosae āā 75,0
2. Rp.: Natrii carbonatis 1,5
Aquaе destillataе
Aquaе Rosae āā 75,0
MDS. Наружное

**Житнюка присыпка — Asper-
sio Zhitnyuky**

Антимикробное, подсушивающее и местноанестезирующее средство.

Применяется для лечения пролежней

1. Rp.: Glucosi 135,0
Chlortetracyclini hydrochloridi 5400000 ED
Streptocidi 60,0
Xeroformii 45,0
Anaesthesini
Acidi borici āā 15,0
2. Rp.: Streptocidi 20,0
Acidi borici
Anaesthesini āā 5,0
Xeroformii 20,0
Sacchari 50,0
M. f. aspersio
DS. Наносить на пораженные участки кожи

**Здренко М. Н. сборы для при-
готовления микстуры — Species
Zdrenko**

В состав одной упаковки входит:

- Сбора № 1—270,0
Сбора № 2 — 150,0
Калия нитрата — 450,0
Кислоты салициловой — 9,0

Препарат обладает сокогонным, желчегонным, послабляющим, мочегонным и успокаивающим действием.

Применяется в основном как симптоматическое средство при папилломатозе мочевого пузыря и анацидных гастритах

№ 1

Rp.: Rhizomatis Calami
Radice Althaeae
Radice Berberis
Rhizomatis cum radicibus Valerianae
Radice Inulae
Radice Iridis flavae
Rhizomatis Nupharis lutei
Radice Filipendulae hexapetalae
Radice Symphyti officinalis
Radice Rumicis
Baccarum Juniperi āā 20,0
Fructuum Rhamni catharticae 50,0

№ 2

Rp.: Herbae Gratiolae officinalis 3,0
Herbae Thalictri minoris
Herbae Adonidis vernalis
Herbae Ajugae Laxmani
Herbae Phlomidis pungentis
Herbae Urticae dioicae
Herbae Tormentillae
Florum Convallariae
Folii Menthae piperitae
Florum Tanacetii
Folii Pefastis officinalis.
Herbae Leonuri
Florum Chamomillae
Herbae Xeronthemi annui
Herbae Polygoni avicularis
Florum Millifolii
Folii Salviae
Herbae Salviae aethiopis
Florum Helichrysi arenarii
Herbae Artemisiae vulgaris
Herbae Bidentis
Herbae Equiseti āā 7,0

Сбор № 1

Аира корня
Аллея лекарственного корня
Барбариса обыкновенного корня
Валерианы корня и корневища
Девасила корня
Касатика желтого корня
Кубышки желтой корня или кувшинки белой корня
Лабазника шестилепестного корня
Окопника жесткого корня
Шавеля конского корня
Можжевельника обыкновенного ягод по 20,0
Жостера ягод 50,0

Сбор № 2

Агрона лекарственного травы 3,0
Василистника малого травы

Горлицы весеннего травы
 Живучки Лаксмана травы
 Зопника колючего травы
 Крапивы двудомной травы
 Лопуха серебристой травы
 Ландыша майского цветов
 Мята перечной листа
 Пижмы (дикой рябины) цветов
 Подбела лекарственного листа
 Пустырника пятилопастного травы
 Ромашки аптечной цветов
 Сухоцвета однолетнего травы
 Горца птичьего (спорыша) травы
 Тысячелистника обыкновенного цветов
 Шалфея лекарственного листа
 Шалфея эфиопского травы
 Цмина песчаного цветов
 Полыни обыкновенной (чернобыльника) травы
 Череды трехраздельной травы
 Полевого хвоща травы по 7,0

Приготовление микстуры: 270,0 сбора № 1 загружают в 5-литровую колбу, заливают 4 л воды, нагревают до кипения, кипятят 30 мин с обратным холодильником, добавляют половину сбора № 2 (75,0) и кипячение продолжают еще 30 мин. Затем фильтруют через 3 слоя марли. К оставшейся после слива массе добавляют 3,5 л воды и кипятят 30 мин, затем загружают вторую половину сбора № 2 (75,0) и снова кипятят 30 мин. Профильтрованные 2 горячих слива объединяют и в них растворяют нитрат калия из расчета 75,0 на 1 л и салициловую кислоту 1,5 на 1 л и тщательно перемешивают.
 Срок годности сбора — 2 года

Зеленина капли — *Guttae Zelenini*

Успокаивающее и кардиотоническое средство.
 Употребляется при кардионеврозах, особенно сопровождающихся брадикардией

Rp.: Tincturae Convallariae
 Tincturae Valerianae $\bar{a}\bar{a}$ 10,0
 Tincturae Belladonnae 5,0
 Mentholi 0,2 (0,1)
 MDS. По 20—25 капель 2—3 раза в день

Зидмана жидкость — *Liquor Zidmani*

Солевое плазмозамещающее и детоксицирующее средство.
 Применяется при дегидратации организма, при ацидозе

Rp.: Natrii chloridi 6,0
Natrii hydrocarbonatis 1,0
Aquae pro injectionibus 1000,0
M. Sterilisetur!
DS. Для внутривенного введения

Золотовой — Костомаровой порошки — Pulveres Zolotovae — Kostomarovae

Успокаивающее, спазмолитическое и анальгезирующее средство. Применяется при стенокардии, вегетативных неврозах и т. п.

Хранение — список А

1. Rp.: Themisali 0,5
Phenobarbitali
Papaverini hydrochloridi $\bar{a}\bar{a}$ 0,02
Bromisovalii 0,2
Amidopyrini 0,3
Atropini sulfatis 0,00025

 2. Rp.: Themisali 0,5
Papaverini hydrochloridi
Phenobarbitali $\bar{a}\bar{a}$ 0,02
Bromisovalii 0,2
Amidopyrini 0,3
Atropini sulfatis 0,00025
Acidi acetylsalicylici 0,25 (0,5)
M. f. pulvis
D. t. d. N. 50
S. По 1 порошку 2—4 раза в день
-

Зорина порошки (таблетки) — Pulveres (Tabulettae) Zorini

Спазмолитическое (бронхолитическое) и успокаивающее средство.

Применяется при бронхиальной астме для урежения и ослабления приступов

Rp.: Platyphyllini hydrotartratis 0,001
Papaverini hydrochloridi
Salsolini hydrochloridi
Dibazoli $\bar{a}\bar{a}$ 0,01
Euphyllini
Barbamyli $\bar{a}\bar{a}$ 0,025
Themisali 0,5
M. f. pulvis
D. t. d. N. 50
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Иастил — Iastil (ЧССР)

Состав на 1 таблетку:
Antipyrini 0,8
Coffeini 0,08
Iodantipyrini 0,013
Ephedrini hydrochloridi 0,05
Novocaini 0,01

Хранение — список Б

Бронхолитическое и анальгезирующее средство.

Применяется при бронхиальной астме, хроническом бронхите и т. п.

Рр.: Tabul. «Iastil» N. 10
DS. По 1—3 таблетки в день

**Иванова-Смоленского микстура—
Mixture Ivanovi-Smolensky**

Успокаивающее средство.
По применению аналогично «Бехтерева микстура». Может употребляться как легкое снотворное (по 2 столовые ложки)

Рр.: Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae 8,0—200,0
Natrii bromidi
Amidopyrini
Barbitali natrii āā 3,0
MDS. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день

Изадрин — Isadrinum

Изопропиленорадреналина гидрохлорид

Синонимы: Alidril, Alotec, Aludrin, Asmadren, Astmo, Bronchomister, Bronchodilatin, Dolomit, Euspiran (ЧССР), Isadren, Isoprenalin, Ispranal, Neodrenal, Nephrenal, Norisedrin, Novodrin (ГДР), Propylon, Sanasma, Solvasma и др.

Выпускается в таблетках по 0,005 и во флаконах по 10 и 25 мл 0,5% раствора

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности: раствора — 4 года; таблеток — 4 года

β-Адреномиметик. Применяется для купирования и предупреждения приступов бронхиальной астмы, а также при астматических бронхитах, эмфиземе легких и пневмосклерозе.

Рр.: Isadrini 0,005
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1 таблетке под язык
Рр.: Sol. Isadrini 0,5% 10 ml
DS. По 0,5—1 мл для ингаляций при приступе бронхиальной астмы

Изафенин — Isapheninum
Бис-3-(*n*-ацетоксифенил)-иза-
тин

Синонимы: Acelax, Acetalax, Acetphenolisatin, Asitin, Bisatin, Brocatine, Bydolax, Ciracen, Con-
tax, Curalax, Diasatin, Ditin, En-
dophenolphthalein, Eulaxin, Gar-
dalaxan, Granulax, Isalax, Isaphen,
Isocrin, Laxaseptol, Laxigen (ПНР),
Laxocol, Neolax, Normalax, Nou-
rilax, Phenylisatin, Prulax, Purga-
seen, Purgophen, Taxin

Выпускается в таблетках по
0,01

Хранение — список Б, в сухом
месте

Срок годности — 2 года

Rp.: Isaphenini 0,01

D. t. d. N. 6 in tabul.

S. По 1 таблетке 2 раза в день

Слабительное средство.

Применяется при привычном
запоре, атонии кишечника и пр.

ИзOVERин — Isoverinum
N-изоамилпентаметилен-1,5-
диамина дигидрохлорид

Выпускается в таблетках по
0,1 и в ампулах по 1 мл 2% и 5%
раствора

Хранение — список Б

Срок годности ампул — 3 года

Дополнительный срок годности
после переконтроля — 1 год

Срок годности таблеток — 2 го-
да

Rp.: Isoverini 0,1

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Solutionis Isoverini 5% (2%) 1 ml

D. t. d. N. 6 in ampul.

S. По 1 мл в мышцы

Стимулятор сокращений матки,
ганглиолитик.

Применяют в качестве родоуско-
ряющего средства, для ускорения
сокращения мускулатуры матки
в послеродовом периоде, для ле-
чения поздних токсикозов бере-
менности, сопровождающихся ги-
пертонией

Изонал — Izonal (ЧССР)

Состав на 1 таблетку:

Bromisovali 0,3

Phenobarbitali 0,03

Хранение — список Б

Срок годности — 5 лет

Успокаивающее средство.

Применяется при легкой форме
бессонницы, беспокойстве, невра-
стеническом синдроме, пароксиз-
мальной тахикардии

Rp.: Tabul. «Isonal» N. 20

DS. В качестве успокаивающего средства 2—3 раза в день по $\frac{1}{2}$ — 1 таблетке, в качестве снотворного средства — 2—4 таблетки за полчаса перед сном

Изонитрозин — Isonitrosinum
1-Диметиламино-2-изонитрозо-
бутано-3-гидрохлорид
Выпускается в ампулах по 3 мл
40% раствора
Хранение — список Б в темном
месте

Срок годности — 1 год

Реактиватор холинэстеразы.
Применяется для лечения отравлений, вызванных фосфорорганическими соединениями (инсектициды) в сочетании с холинолитиками (атропин и др.)

Rp.: Sol. Isonitrosini 40% 3,0

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 3 мл в вену или в мышцы (при коме). Повторять инъекции через полчаса до прояснения сознания

Изоприн — Isoprinum (ВНР,
НРБ)
N, N'-диизопропилпутресцина
дигидрохлорид
Выпускается в таблетках по
0,05 и в ампулах по 2 мл 2% раствора

Гипотензивное средство.
Применяется при гипертонической болезни (I и II стадии), гипертонических кризах, спазмах периферических сосудов

Хранение — список Б
Срок годности таблеток ВНР —
4 года
Срок годности таблеток НРБ
не ограничен
Срок годности ампул — 1 год

Rp.: Tabul. «Isoprin» 0,05

D. t. d. N. 10

S. По 1 таблетке 2—3 раза в ден.

Rp.: Sol. «Isoprin» 2% 2 ml

D. t. d. N. 6 in ampul.

S. По 1 мл 1—2 раза в день под кожу

Изопропамид — Isopropamid
(ВНР)
2,2-Дифенил-4-диизопропил-
аминобутирамидметилгидроксида
йодид

Синонимы: Darbid, Dipramid,
Isopropamidiodid, Isoproponi iodidum,
Marygin-M, Piacamide,

Холинолитическое средство, по свойствам близкое к атропину.

Применяют при нарушении моторной и секреторной функции желудочно-кишечного тракта (язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, гастроудоденит, пилороспазм, колит, энтероколит,

Priamide, Priazimide, Sanulcin, диспепсия), а также при спастическом бронхите, астматической
Tugimid(e) одышке и пр.
Выпускается в таблетках по 0,005
Хранение — список Б

Rp.: Tabul. «Isoprogamid» 0,005
D. t. d. N. 30
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день перед едой, запивая небольшим количеством жидкости

Изоптин — Isoptin (СФРЮ) Коронарорасширяющее средство.
2-(3,4- Диметоксифенил) -2 - изо- Применяется при стенокардии
пропил-5-(*N*-метил - *N* - гомовератриламино)-валеронитрила гидро-
хлорид
Синонимы: Dilacorin, Iproveratril, Vasolan, Verapamilhydrochlorid
Выпускается в драже по 0,005
Хранение — список А
Срок годности таблеток
СФРЮ — 3 года

Rp.. Dragee «Isoptin» 0,005
D. t. d. N. 20
S. По 1 драже 2—3 раза в день

Изофетил — Isofetil (СФРЮ) Противотуберкулезное средство
4,4'-бис-(Изопентилокси)-тио- II ряда, близкое к «Этоксиду».
карбанилид Применяется по тем же показаниям
Синонимы: Dat-Wander, Disoxyl, Isoxyl, Sarbamyl, Thiocarlid, Tiocarlid
Выпускается в таблетках по 0,5

Rp.: Tabul. «Isofetil» 0,5
D. t. d. N. 100
S. По 1 таблетке 2—4 раза в день

Имизин — Imizinum Антидепрессант. Применяется при депрессивных состояниях различной этиологии. Нельзя сочетать с ингибиторами МАО и препаратами щитовидной железы
N-(3-Диметиламинопропил) иминодобензила гидрохлорид
Синонимы: Antidepressin (СРР), Deprenil, Deprimin, Deprinol, Dupartrin, Eupramin, Imidobenzyle, Imipramil, Imipramin(e), Irmin, Melipramin (ВНР), Surplix, Tofranil

Выпускается в таблетках (драже) по 0,025 и в ампулах по 2 мл 1,25% раствора

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности ампул — 2 года, драже — 4 года, после перекон-троля — 1 год

Rp.: Imizini 0,025

D. t. d. N. 50 in tabul.

S. По 1 таблетке 2—4 раза в день, через несколько дней дозу увеличивают до 0,05 г 3—4 раза в день

Rp.: Sol. Imizini 1,25% 2 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Внутримышечно, начиная с 2—6 мл в сутки в 2—3 приема и увеличивая дозу к 10-му дню до 12 ампул в сутки. Затем больного переводят на прием таблеток внутрь

Имифос — Imiphosum

2-Метил-тиазолидо-3-фосфорной кислоты диэтиленимид

Хранение — список А, в защищенном от света месте

Срок годности — 1 год; после перекон-троля — 6 мес.

Цитостатическое средство.

Применяют при лечении больных полицитемией (эритремией)

Rp.: Imiphosi 0,05

D. t. d. N. 6 in ampul.

S. Внутривенно или внутримышечно через день. Растворение препарата производят в 10—20 мл изотонического раствора натрия хлорида непосредственно перед употреблением

Имферон — Imferon (Англия)

Раствор железо-декстранового комплекса для парентерального применения

Выпускается в ампулах по 2 мл с содержанием железа 0,1 в ампуле

Хранение — в прохладном месте

Железосодержащий препарат.

Применяется при дефиците железа в организме (гипохромные анемии)

Rp.: Sol. «Imferon» 2 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Внутримышечно. При весе тела до 5 кг — 0,5 мл, от 5 до 9 кг — 1 мл, от 9 до 45 кг — 2 мл, свыше 45 кг — 2—5 мл в сутки

Инга-17 — Inha-17 (НРБ)
Пара-ацетиаминбензальдегид-
изоникотиноилгидразон
Выпускается в таблетках по 0,3
Хранение — список Б
Срок годности — не ограничен

Противотуберкулезное средство.
Применяют при свежих формах
туберкулеза легких в фазах ин-
фильтрации и распада

Рр.: «Inha-17» 0,3
D. t. d. N. 50 in tabul.
S. По 1 таблетке 1—3 раза в день после еды (по 0,005—
0,01 на килограмм веса тела больного в сутки
в 2—3 приема)

Ингакамф — Inhasamph
Состав:
Camphorae 0,3
Mentholi 0,17
Methylii salicylatis 0,08
Olei Eucalypti 0,1
Этой смесью пропитана вата,
заклученная в пластмассовый па-
трон (карандаш)
Срок годности — 1 год

Антисептическое, противовос-
палительное и сосудосуживающее
средство.
Применяется при острых рини-
тах и катарах верхних дыхатель-
ных путей

Рр.: Inhasamphi N. 1
DS. Нюхать при насморке 3—4 раза в день

Ингалипт — Inhalyptum
Состав 1 флакона:
Norsulfazoli-natrii
Streptocidii-natrii aa 0,75
Thymoli
Olei Eucalypti
Olei Menthae aa 0,015
Spiritus aethylici 1,8
Glycerini 2,1
Solventi ad 30,0
Герметический флакон снаря-
жен сжатым азотом (давление —
5 атм) и снабжен распылителем
для создания аэрозоля
Хранение — в обычных усло-
виях
Бережь от механических по-
вреждений!

Антисептическое и противовос-
палительное средство.
Применяется при воспалитель-
ных заболеваниях полости рта
(ларингиты и фарингиты, тонзил-
литы, стоматиты и т. п.)

Рр.: Inhalypti 30,0
DS. Орошать из флакона пораженные участки по-
лости рта

Ингалон — Inhalon

По свойствам аналогичен «Ингакамфу».

Применяется при острых воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей

Rp.: Phenoli 4,0
Mentholi 1,0
Olei Menthae piperitae 8,0
Olei Eucalypti 9,0
Olei Lavandulae 3,0
Olei Cacao
Cerae āā 50,0
Olei Vaselini 850,0

MDS. 10 мл жидкости помещают в посуду, которую слегка подогревают на водяной бане и вдыхают пары

Ингаляция против кашля — Inhalatio contra tussim

Все прописи обладают антисептическими, анестезирующими и отхаркивающими свойствами.

Применяются при сухом кашле различного происхождения (бронхиты, коклюш и т. п.)

1. Rp.: Ammonii chloridi
Olei Terebinthinae āā 1,0
Aquaе destillatae 100,0

2. Rp.: Mentholi
Eucalyptoli āā 1,0
Olei Thymi
Olei Lavandulae āā 5,0
Tincturae Anisi 10,0
Spiritus aethylici 90% 100,0

MDS. Чайную ложку жидкости вливают в чашку с кипящей водой, опрокидывают на сосуд воронку и через суженное отверстие воронки вдыхают теплые пары

3. Rp.: Chloroformii 15,0
Aetheris aethylici 30,0
Olei Terebinthinae 5,0

MDS. Налить чайную ложку смеси на сложенный платок и держать его на расстоянии 5—7 см от рта

4. Rp.: Kalii bromidi 5,0
Ammonii bromidi 2,5
Extr. Belladonnae 0,1
Aquaе destillatae 96,0

5. Rp.: Iodi
Kalli iodidi āā 0,25
Spiritus aethylici 15,0
Aquaе destillatae 120,0

MDS. Для паровой ингаляции. Смешивают 1 столовую ложку с $\frac{1}{4}$ л уксуса и $\frac{1}{4}$ л настоя шалфея, нагревают и вдыхают пары

Ингаляция против мигрени — In-
halatio ad hemigraniam

Препарат обладает рефлектор-
ным действием, применяется при
мигрени

Rp.: Olei Lavandulae gtts IV
Olei Caryophyllii gtts XV
Olei Cinnamomi gtts VIII
Camphorae 12,0
Acidi acetici 120,0
MDS. Нюхать при приступах мигрени

Ингаляция против насморка —
Inhalatio contra cozzum

Все препараты обладают анти-
септическими свойствами; рас-
творы по прописям N 1 и 6 —
также и анестезирующим дейст-
вием.

Применяется при хронических
атрофических ринитах

1. Rp.: Picis liquidae 4,0
Camphorae 1,0
Aetheris aethylici 7,0
 2. Rp.: Phenoli
Spiritus aethylici 90% āā 5,0
Solutionis Ammonii caustici 6,0
Aquae destillatae 10,0
 3. Rp.: Phenoli 10,0
Olei Terebinthinae 5,0
Spiritus aethylici 90% 20,0
Solutionis Ammonii caustici 12,0
 4. Rp.: Mentholi 5,0
Spiritus aethylici 96% 39,0
Solutionis Ammonii caustici 25% 6,0
 5. Rp.: Phenoli
Olei Eucalypti
Iodi āā 1,0
Solutionis Ammonii caustici 4,0
Spiritus aethylici 95% 2,0
MDS. Смесью намочить платочек или вату и ню-
хать несколько раз в день
 6. Rp.: Solutionis Iodi spirituosae 5,0
Chloroformii 10,0
Phenoli gtts XV
MDS. 1—2 раза в день брать по 5—6 капель смеси
в пробирный цилиндр, разогревать в теплой
воде и втягивать пары через нос
-

Ингаляция против астмы — Inhalatio antiasthmatica

Отхаркивающее средство, обладающее умеренным бронхолитическим действием.

Применяется при приступах бронхиальной астмы

Rp.: Balsami peruviani aut Vinylini 5,0

Acidi benzoici

Olei Terebinthinae $\bar{a}\bar{a}$ 10,0

Aetheris aethylici 2,5

MDS. Нагреть склянку в руке, открыть и нюхать из горлышка

Индерал — Inderal (Англия, СФРЮ)

1-Изопропиламино-3-(1-нафтил-окси)-пропан-2-ола гидрохлорид

Синонимы: Anaprilinum (СССР) Dositon, Eraldin, Propranololhydrochlorid, Sumial, Obsidan

Выпускается в таблетках по 0,01 и 0,04 и в ампулах по 1 и 5 мл 0,1% раствора

Срок годности таблеток и ампул СФРЮ — не ограничен

β -Адренолитик.

Применяется для лечения стенокардии, сердечных аритмий, сопровождающихся тахикардией и связанных с повышением возбудимости миокарда, феохромоцитомы. В сочетании с препаратами наперстянки может применяться при мерцательной аритмии. Противопоказан при декомпенсированной сердечной недостаточности, бронхиальной астме

Rp.: Tabul. «Inderal» 0,01 (0,04)

D. t. d. N. 50

S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Rp.: Sol. «Inderal» 0,1% 1 (5) ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Содержание ампулы вводить в вену медленно (в течение минуты), разведя предварительно 0,9% стерильным раствором хлорида натрия

Индигокармин — Indigocarminum

Динатриевая соль 5,5-дисульфоиндиго

Синонимы: Carminum coeruleum, Cystoseva

Выпускается в ампулах по 5 мл 0,4% раствора

Хранение — в защищенном от света месте

Срок годности — 2 года; после переконтроля — 1 год

Краситель, быстро и полно выделяющийся почками.

Применяют для исследования выделительной функции почек и динамической деятельности почечных лоханок и мочеточников

Rp.: Sol. Indigocarmini 0,4% 5,0

D. t. d. N. 6 in ampul.

S. Внутривенно по 4—5 мл; выделение почками контролируется при цистоскопии

Индопан — Indopanium
α-Метилтриптамина гидрохлорид

Выпускается в таблетках по 0,005 и 0,01

Хранение — список А

Срок годности таблеток, покрытых оболочкой, — 4 года

Антидепрессант, ингибитор МАО.

Применяется в психиатрии для лечения депрессии различного происхождения. Противопоказан при гипертонии, параноидных состояниях. Нельзя сочетать с имизином, другими антидепрессантами, симпатомиметиками

Rp.: Indopani 0,005 (0,01)

D. t. d. N. 30 in tabul.

S. По 1 таблетке утром и днем, постепенно увеличивая дозу до 40 мг

Индоцид — Indocid (СФРЮ)
1-(*n*-Хлорбензоил)-5-метокси-2-метилиндол-3-ил-уксусная кислота

Синонимы: Amipo, Inacid, Indacin, Indomee, Indometacinum, Indomethacinum, Metindol (ПНР)
Выпускается в таблетках по 0,025

Хранение — список Б

Срок годности — 3 года

Противоревматическое и противовоспалительное средство.

Применяется при ревматизме, ревматоидном артрите, остеоартрите, подагрическом артрите и пр.

Rp.: Tabul. «Indocid» 0,025

D. t. d. N. 30

S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Инкрепан — Increpanum

Сухой экстракт из поджелудочной железы крупного рогатого скота. Содержит комплекс нуклеиновых кислот и белковое вещество, обладающее активностью фермента рибонуклеазы

Выпускается в таблетках по 0,25 и 0,5

Хранение — в сухом прохладном месте

Срок годности — 1 год

Гипотензивное средство.

Применяется при гипертонической болезни

Rp.: Increpani 0,25 (0,5)

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 1—2 таблетки 3—4 раза в день

**Иноземцева капли — Cuttae Ino-
semzewi**

Хранение — список А

Препарат оказывает сокогонное действие, снижает моторику кишечника, подавляет бродильные процессы в желудке и кишечнике.

Применяется при острых гастритах, гастроэнтеритах вместе с химиотерапевтическими средствами

Rp.: Extracti Strychni spirituosi sicci 1,0
Tincturae Opii simplicis 120,0
Tincturae Rhei amarae spirituosae 480,0
Tincturae Castorei 20,0
Spiritus aetherei
Tincturae Valerianae aetherae āā 240,0
Olei Menthae piperitae 5,0
MDS. По 15—20 капель 1—2 раза в день

Инсектин — Insectinum

Болеутоляющее средство.

Применяется для лечения укусов кровососущих насекомых. Оказывает и профилактическое действие за счет репеллентных свойств

Rp.: Mentholi 4,0
Spiritus aetherei
Magnesii carbonatis āā 16,0
Olei Caryophyllorum 1,0
Vaselini 16,0
MDS. Смазывают зудящие участки тела

Интенсаин — Intensain (СФРЮ)

3-(β-Диэтиламиноэтил)-4-метил-7-(карбэтоксиметокси)-2-оксо-(1,2-хромена) гидрохлорид

Синонимы: Carbochloleum, Chromonag, Intensacrom, Intercordin

Выпускается в драже по 0,075

Хранение — список Б

Срок годности — 3 года

Миотропный спазмолитик, коронарорасширяющее средство.

Применяется для систематического лечения стенокардии, инфаркта миокарда

Rp.: Drag. «Intensain» 0,075
D. t. d. N. 30 (100)
S. В начале лечения назначают по 2 драже 3 раза в день. При необходимости дают по 2 драже 4 раза в день. После улучшения состояния больного дозу уменьшают до 1 драже 3—4 раза в день

Интрайодин — Intraiodin (ЧССР)

2-Окситриметилен -бис - (триметиламмоний гидроксид) дийодид
Синонимы: Agojodile, Azoiodina, Dijodos, Dovine, Ediodina, Endiol, Endojodin, Fedajodo, Hydroxytrimethonium-iodid, Iodisan, Iodoxil, Iodopropano, Prolonii iodidum, Propiodal, Trijodina, Yodorgan

Выпускается в ампулах по 5 мл 2% и 5% раствора

Хранение — в защищенном от света месте

Йодсодержащий препарат.

Применяется при сифилисе, острой форме чешуйчатого и красного лишая, при рассеянном склерозе, внутрочерепном и спинальном арахноидите, глубоких микозах

Rp.: Sol. «Intraiodin» 2% (5%) 5 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 1 ампуле 2% или 5% интрайодина внутримышечно через день или 2 раза в неделю

Инфекундин — Infecundin (ВНР)

Состав на 1 таблетку:
Norethynodreli 0,0025
Mestranoli 0,0001

Хранение — список Б
Срок годности — 5 лет

Гормональное противозачаточное средство для перорального применения. Кроме того, применяют при аменорее, олигоменорее, функциональных кровотечениях, дисменорее и алгоменорее, при предменструальном синдроме и т. д.

Rp.: Tabul. «Infecundin» N. 200

DS. По 1 таблетке ежедневно с 5-го по 25-й день менструального цикла, считая от 1-го дня кровотечения

Инфузин солевой ЦИПК — Infusinum

Синоним: Федорова и Васильева жидкость — Ligoq Feodorigvi — Vasilyevi

Состав:

Natrii chloridi 8,0
Kalii chloridi 0,2
Calcii chloridi 0,25
Magnesii sulfatis 0,05
Natrii hydrocarbonatis 0,8
Natrii phosphatis 0,138
Aquae pro injectionibus ad 1000,0

Срок годности ампул — 2 года

Солевой плазмозамещающий раствор.

Применяется при умеренной кровопотере и шоке, при обезвоживании организма

Rp.: Infusini 1000,0

DS. Внутривенно капельно.

Приготовление: соли растворяют в воде для инъекций, раствор насыщают углекислотой до pH = 6,0—6,4 и стерилизуют в запаянных ампулах в автоклаве при 1,5 атм в течение 30 мин

Иогистрин — Iohystrin (ГДР)
Состав на 1 таблетку:
Strychnini hydrochloridi 0,0005
Calcii methylarsenicosi 0,001
Iohimbini hydrochloridi 0,003
Methyltestosteroni 0,005

Препарат для лечения различных форм импотенции

Хранение—список А

Rp.: Tabul. «Iohystrin» N. 50

DS. По 1—6 таблеток в день с постепенным понижением до 1—3 таблеток в день

δ-Иохимбин — δ-Yohimbin (ГДР)

Тетрагидросерпентин
Алкалоид раувольфии змеиной
(*Rauwolfia serpentina*)
Синонимы: Ajmalicin, Akuamigin, Alkaloid F, Hydrosarpan, Raumalina, Rauvasan, Sarpan, Tensyl

Симпатолитик.

Применяется для лечения начальной стадии гипертонической болезни, а также для лечения психозов

Выпускается в таблетках по 0,002

Хранение — список Б

Срок годности — 3 года

Rp.: Tabul. «δ-Yohimbin» 0,002

D. t. d. N. 50

S. По 1 таблетке 1—2 раза в день после еды

Иохимбин — Iohimbin (ЧССР)
Метиловый эфир иохимбовой кислоты
Синонимы: Corymbin, Corypin, Johimbin, Quebrachin, Yohimbin, Yohimvetol

α-Адренолитическое средство.

Применяется при импотенции, выражающейся в снижении эрекции

Выпускается в таблетках по 0,005 и в ампулах по 1 мл 1% раствора

Хранение — список Б

Срок годности — 3 года

Rp.: Tabul. «Iohimbin» 0,005

D. t. d. N. 10

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Sol. «Iohimbin» 1% 1 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 1 мл под кожу 1—2 раза в день

Ипразид — Iprazidum

2-Изопропил-1-изоникотиноил-гидразин

Синонимы: Attivina, Fosfazide, Iproniazid, Ipronid, Ipronin, Marsalid, Marsilid, Rivivol

Выпускается в таблетках по 0,01; 0,025 и 0,05

Хранение — список Б

Антидепрессант, ингибитор МАО.

Показания и противопоказания к применению — см. «Индопан». Более токсичен, вследствие чего применяется ограниченно. Может вызвать ортостатический коллапс, поражение печени, анемию. Нельзя сочетать с другими антидепрессантами, резерпином. Эффективен при стенокардии

Rp.: Iprazidi 0,01 (0,025) (0,05)

D. t. d. N. 50 in tabul.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Ипронал — Ipronal (ПНР)

5-аллил-5-(β-оксипропил)-барбитуровая кислота

Синонимы: Aheen, Centralgil, Vasalgin (ВНР)

Выпускается в таблетках по 0,05 и 0,1

Хранение — список Б

Успокаивающее и анальгетическое средство.

Применяется при мигрени, вазомоторных головных болях, вазомоторных расстройствах в периоде полового созревания, болезни Рейно, в менструальном периоде и т. п.

Rp.: Tabul. «Ipronal» 0,05 (0,1)

D. t. d. N. 30

S. По 1—2 таблетки 3 раза в день в течение 6 недель

ИФ-12 — IF-12 (ПНР)

Состав на 1 таблетку:

Suapocobalamini 0,00001

Intrinsic factoris 0,191

Extracti Hepatis 0,008

Cobalti chloridi 0,001

Хранение — в защищенном от света месте

Антианемическое средство.

Применяется при злокачественном малокровии, анемиях различной этиологии. См. также «Бифактон».

Примечание: Intrinsic factor (внутренний фактор Касла) — экстракт из слизистой желудков животных, усиливающий кроветворное действие и резорбцию цианокобаламина

Rp.: Tabul. «IF-12» N. 20

DS. В тяжелых случаях анемии назначают по 2 таблетки 3—4 раза в день. Поддерживающее лечение — 1—2 таблетки в день

Ихтиолин — Ichthyolin

Противовоспалительное и подсушивающее средство.

Применяется при экземе и различных дерматитах, сопровождающихся мокнутием

Rp.: Resorcini 8,0
Ichthyoli 4,0
Zinci oxydi
Amyli aa 16,0
Aquaе destillatae 7,0
Vaselini 30,0
Lanolini 19,0
M. f. unguentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи

ИЭР-1 — IER-1

Состав:

Saponis liquidi 12,0

Boli albae 40,0

Glycerini 10,0

Срок годности — 1 год

Защитное средство для предохранения кожи рук при работе с агрессивными и раздражающими веществами, органическими растворителями, минеральными маслами, лаками, красками, смолами, скипидаром

ИЭР-2 — IER-2

Состав:

Paraffini 20,0

Ceresini 15,0

Olei Vaselini 65,0

Срок годности — 1 год

Rp.: IER-1 50,0 (100,0)

IER-2 50,0 (100,0)

DS. Нанести пасту тонким слоем на руки перед работой

Йодантокс — Iodantox (ЧССР)

Гексаметилентетрамина метилйодид

Синонимы: Iodaseptine, Iodometine, Iodorgon, Scleramine

Выпускается в ампулах по 3 и 5 мл. В 1 ампуле содержится 2%, 6% или 10% связанного йода

Хранение — в темном, защищенном от света месте

Йодсодержащий препарат.

Применяется как химиотерапевтическое средство при заболеваниях мочевыводящих путей

Rp.: Sol. «Iodantox» 2% (6%, 10%) 3—5 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Внутримышечно или внутривенно (медленно) через день или 2 раза в неделю по 3—5 мл 2%, 6% или 10% раствора

Йодинол — Iodinolum

Состав:
Iodi 0,1
Kalii iodidi 0,3
Spiritus polyvinylci 0,9
Aquaе destillatae ad 100,0

Антисептическое средство.
Применяется для лечения хронических тонзиллитов, отитов, периодонтита, озоны, трофических язв и пр. в виде промываний, полосканий, инстилляций, примочек

Rp.: Sol. Iodinoli 100,0
DS. Для промывания лакун при хроническом тонзиллите 1 раз в 2—3 дня. На 4—5 процедур

Йодолипол — Iodolipolum

Йодированное масло (29—31 % йода)
Синонимы: Iodatol, Iodipin, Iodolein, Lipiodol
Выпускается в ампулах по 5, 10 и 20 мл

Хранение — в прохладном, защищенном от света месте
Срок годности — 4 года
Дополнительный срок годности после переконтроля — 12 месяцев

Йодсодержащий препарат.
Применяют в качестве контрастного средства для рентгенологических исследований полых органов: трахеи и бронхов, матки и фаллопиевых труб

Rp.: Sol. Iodolipoli 5 (10, 20) ml
D. t. d. N. 3 in ampul.
S. Для бронхографии препарат вводят через катетер, вставленный в носовую полость в трахею. Для метро- и сальпингографии вводят в полость матки 3—4 мл препарата

Йод-салол — Iod-Salolum

Синоним: Давида жидкость — Liquor Davidi

Йодсодержащий препарат. Показания — см. «Интрайодин»

	I	II
1. Rp.:	Iodi 2,0	2,0
	Olei Persicorum 50,0	100,0
	M. Sterilisetur!	
2. Rp.:	Olei Persicorum 50,0	2,0
	Phenylis salicylatis 20,0	100,0
	M. Sterilisetur!	

DS. Оба раствора отпускаются отдельно, перед употреблением смешиваются. Вводят внутримышечно по 10 мл 1 раз в неделю

Йодтесал — Iodthesal

(ЧССР)

Состав на 1 таблетку:

Theobromini 0,3

Intraiodini 0,0932

Хранение — список Б

Антисклеротическое средство.

Применяется при гипертонической болезни, атеросклерозе, стенокардии, бронхиальной астме

Rp.: Tabul. «Iodthesal» N. 20

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день после еды

Йодхинопирипирин — Iodchinopyri-
пинСиноним: Рубашкина раствор —
Solutio Rubaschkini

Йодсодержащий препарат.

Показания к применению см. —
«Интрайодин»

Rp.: Iodi 0,6

Antipyripi 4,0

Chinini hydrochloridi 3,0

Aquaе pro injectionibus 40,0

M. Sterilisetur!

DS. Подкожно по 10 мл 1 раз в день или по 5 мл
2 раза в день.

Приготовление: готовят 2 раствора.

1. Иода 0,6, антипирина 4,0 и 10,0 воды.

2. Хинина гидрохлорида 3,0 и 30,0 воды. Оба раствора смешивают и кипятят 10 мин, добавляют остальное количество воды (до 40 мл), фильтруют, стерилизуют при 100° в течение 30 мин

Йопагност — Iopagnost (ЧССР)2-этил-3-(3'-амино-2,4,6'-три-
йодбензил) пропионовая кислота
или α -(3-Амино-2,4,6-трийодфе-
нил) масляная кислота; иопано-
вая кислотаСинонимы: Acidum iopanoicum,
Bilijdon, Biliopaco, Bilipac, Bi-
lorac, Bilumbrol, Choladine, Cho-
le-Contrast, Cistobil, Cistotel, Co-
legraf, Colepax, Felombrine, Io-
dopanoic acid, Iopan, Iodtriol,
Panjoraque, Telepaque, Teletrast

Выпускается в таблетках по 0,5

Хранение — в прохладном, за-
щищенном от света местеСрок годности таблеток — 3 го-
даПероральное контрастное веще-
ство для холецистографии

Rp.: Tabul. «Iopagnost» 0,5

D. t. d. N. 6

S В 19 ч с десятиминутным интервалом проглотить
(не раскусывая) все 6 таблеток

Каглюсал — Caglusal (ЧССР)
Состав: сушеная морковь в порошке, глюкоза, минеральные соли, витамины
Хранение — в сухом, защищенном от света месте

Препарат применяется для диетического лечения простой диспепсии у грудных детей

Rp.: Tabul. «Caglusal» N. 25
DS. 1 таблетку растворяют в 20 мл воды, кипятят.
После охлаждения смеси до температуры тела последней кормят ребенка ложечкой или через соску

Казеина гидролизат — Hydrolysatum Caseini
Выпускается в ампулах по 250 мл и во флаконах по 200 и 400 мл
Хранение — при температуре 10–23°
Срок годности — 5 лет

Препарат, содержащий все незаменимые аминокислоты.
Применяют в качестве источника белка для парентерального питания человека

Rp.: Sol. Hydrolysatii caseini 250 ml
D. t. d. N. 2 in ampul.
S. Внутривенно, капельно

Калаброн — Calabron (ЧССР)
Препарат представляет собой смесь бромида и лактабионата кальция, содержащую 7,5% кальция и 15% брома
Выпускается в ампулах по 20 мл 12,4% раствора и в гранулах
Хранение — в защищенном от света месте

Препарат брома, обладает седативным действием.

Применяется при неврастении и неврозе, депрессии, при неврозах сердца и других органов, бессоннице, аллергических дерматозах и т. п.

Rp.: Sol. «Calabron» 12,4% 10 ml
D. t. d. N. 5 in ampul.
S. Внутривенно или внутримышечно по 1 ампуле 2–3 раза в неделю
Rp.: Granulae «Calabron» 100,0
DS. По 1/2 — 1 чайной ложке 3 раза в день

Калимин — Kalymin (ГДР)
3-(Диметилкарбамоилокси) - 1-метил-пиридинийоксида гидробромид
Синонимы: Mestinin, Pyridosigminbromid

Антихолинэстеразное средство.
Применяется при миопатии, миастении, при атонии кишечника и мочевого пузыря, особенно после операций, при различных поражениях нервной системы (невриты и

Выпускается в ампулах по 1 мл радикулиты, параличи, парезы
0,1% раствора, в таблетках по и пр.)
0,02 (мите) и драже по 0,06
(форте)

Хранение — список Б

Срок годности: таблеток — 3 го-
да, ампул — 5 лет

Rp.: Tabul. «Kalymin mite» 0,02
D. t. d. N. 10
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Dragee «Kalymin forte» 0,06
D. t. d. N. 20
S. По 1 драже 2—3 раза в день

Rp.: Sol. «Kalymin» 0,1% 1 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. По 1—2 ампулы внутримышечно каждые 4—6 ч
(в послеоперационном периоде)

Калидон — Kaliodon

Йодсодержащее средство.

Применяется для лечения лег-
ких форм гипертиреоза, а также
для лечения заболеваний верхних
дыхательных путей (как отхарки-
вающее средство)

Rp.: Kalii iodidi 6,0
Calcii carbonatis depurati 0,3
Sacchari 0,6
Gummi arabici 2,4
Gluteni (Triticini) 5,4,
M. f. pilulae N. 30
DS. По 1—2 пилюли 2—3 раза в день.

Приготовление: мельчайшая смесь йодида калия, мела, сахара и ара-
вийской камеди смачивается водой для получения пилюльной массы.
Пилюли обволакиваются тестом из глютена (тритицина), высушиваются
и покрываются оболочкой

Калия оротат — Kalii orotas

Калиевая соль урацил 4-карбо-
новой кислоты

Синонимы: Diogon, Ogorur; са-
ма кислота известна под названи-
ями: Lactinium, Orodin, Orotics,
Orotyl, Vitamin B₁₃

Выпускается в таблетках по
0,25 и 0,5

Хранение — в обычных усло-
виях

Срок годности — 2 года; после
переконтроля — 1 год

Стимулятор регенерации.

Применяется при легких фор-
мах лейкопении и агранулоци-
тоза, при лучевой терапии, ин-
фаркте миокарда, в периоде ре-
конвалесценции, при заболева-
ниях печени и желчных путей,
хронической сердечной недоста-
точности II и III стадии, наруше-
нии сердечного ритма и т. п.

Rp.: Kalii orotatis 0,25 (0,5)
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1—2 таблетки (0,25 г) 2—3 раза в день

Каловат — Calovat (ЧССР)

Состав мази:
Methylis salicylatis 8,3
Acidi salicylici 1,0
Extracti fructus Capsici 1,66
Olei Sinapis aetherei 0,22
Camphorae 0,83
Mentholi 0,66
Chloroformii 2,66
Extracti Arnicae 5,0
Olei aetherei 1,0
Basis unguenti ad 100,0
Выпускается в тубах по 30,0

Раздражающее, противовоспалительное и болеутоляющее средство.

Применяется при миозитах, радикулитах, полиневритах, полиартритах и пр.

Rp.: Ung. «Calovat» 30,0
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Калтабор — Kaltabor

Препарат, содержащий бораты.
Применяется для лечения эпилепсии

Rp.: Natrii tetraboratis 8,0
Kalii hydrotartratis 20,0
Sacchari 40,0
Aquae destillatae ad 100,0
MDS. По 1 чайной или десертной ложке 3 раза в день

Кальсотиос — Calsothios (ЧССР)

Каждая ампула содержит 10 мл 10% водного раствора тиосульфата кальция

Хранение — в обычных условиях

Препарат для кальциевой терапии.

Применяется при недостатке кальция в организме, рахите, аллергических состояниях, легочном и желудочном кровотечениях и т. п. Препарат несовместим с растворами, имеющими кислую реакцию

Rp.: Sol. «Calsothios» 10% 10 мл
D. t. d. N. 5 in ampul.
S. Внутривенно очень медленно по 1—2 ампулы в день

Кальцевит — Calcevit (ВНР)
Состав ампулы:
Calcii gluconatis 0,5
Acidi ascorbinici 0,25
Aquaе pro injectionibus ad 5 ml
Хранение — в защищенном от
света месте
Срок годности — 1 год

Кальцийсодержащий препарат.
Применяют в качестве противо-
воспалительного средства при фа-
рингите, ларингите, ангине, брон-
хите, пневмонии, плеврите, ал-
лергических реакциях, а также
при переломах костей и остео-
порозе

Rp.: «Calcevit» 5 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. По 1 мл 2—3 раза в день внутривенно или внутри-
мышечно

Кальцекс — Calcex
Содержит в 1 таблетке 0,5
комплексной соли гексаамилен-
тетрамина и хлорида кальция
Срок годности — 3 года

Противовоспалительное сред-
ство.
Применяется при простудных
заболеваниях

Rp.: Tabul. Calcex N. 10
DS. По 1—2 таблетки 3—4 раза в день

**Кальций-кардиамид — Calcium-
Cardiamidum (ПНР)**
Состав на 1 таблетку:
Cordiamini 0,252
Calcii rhodanidi 0,11
Хранение — список Б

Аналептическое и кардиотони-
ческое средство.

Применяется при недостаточности
кровообращения, ослаблении
сердечной мышцы, коллапсе и т. п.

Rp.: Tabul. «Calcium-Cardiamidum» N. 20
DS. По 1—2 таблетки 3 раза в день

**Кальция глютамат — Calcii glu-
tamas**

Выпускается в ампулах по 10 мл
10% раствора

Хранение — в прохладном, за-
щищенном от света месте

Срок годности — 1 год
Дополнительный срок годности
после переконтроля — 1 год

Препарат, улучшающий про-
цессы обмена в мозгу. Приме-
няется при психических расстрой-
ствах на почве церебрального ате-
росклероза, посттравматической
эпилепсии, при пресенильных пси-
хозах и т. п.

Rp.: Solutionis Calcii glutamatis 10% 10 ml
D. t. d. N. 20 in ampul.
S. Внутривенно. По 10 мл 10% раствора ежедневно
или через день

Кальция пантотенат — *Calcii pantothenas*

Кальциевая соль пантотеновой кислоты

Выпускается в таблетках по 0,1 и в ампулах по 2 мл 20% раствора

Хранение — в сухом, защищенном от света месте

Срок хранения таблеток — 2 года

Срок годности ампул — 1 год

Дополнительный срок годности ампул после переконтроля — 6 мес.

Rp.: *Calcii pantothenatis* 0,1

D. t. d. N. 50 in tabul.

S. По 1—2 таблетке 2—4 раза в день

Rp.: *Solutionis Calcii pantothenatis* 20% 2,0

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 2 мл 1 раз в день внутримышечно

Каметон — *Cametonum*

Состав на 1 флакон:

Chlorobutanoli hydratis

Camphorae

Mentholi

Olei Eucalypti 0,1

Olei Vaselini 9,6

Phreoni 20,0

Герметический флакон снаряжен для распыления аэрозоля

Хранение — в обычных условиях (при температуре не выше +40°). Беречь от механических повреждений!

Срок годности — 1 год

Rp.: *Cametoni* 30,0

DS. Для ингаляций 3—4 раза в день

Распыление препарата производится при вдохе в течение 1—2 с. Процедуру повторяют 2—4 раза в течение 1—2 мин

Камфедрин — *Camphedrin* (ГДР)

Состав: *Ephedrini hydrochloridi* 0,005

Camphorae 0,15

Olei Persicorum ad 1 ml

Выпускается в ампулах по 1 мл

Хранение — список Б

Срок годности — 5 лет

Кардиотоническое средство.

Применяют при сердечной слабости, пневмонии, астме и др.

Препарат витамина группы В. Применяют при различных патологических состояниях, связанных с нарушением обменных процессов, при полиневритах, парестезиях, экземе, аллергических реакциях (дерматиты, сенная лихорадка и др.), трофических язвах, ожогах, катарах верхних дыхательных путей, бронхитах, бронхиальной астме

Rp.: Sol. «Camphedrin» 1 ml
D. t. d. N. 5 in ampul.
S. Внутримышечно по 2—4 мл 1—3 раза в день

Камфйод — Camphiodum
Состав на 1 драже:
Iodi 0,0005
Kalii iodidi 0,005
Bromcamphorae
Pulv. rhizomatis cum radicibus
Valerianae aa 0,1
Extracti Valerianae spissi 0,05
Хранение — в защищенном от
света месте

Йодсодержащий препарат.
Применяется для лечения лег-
ких и умеренно выраженных форм
гипертиреоза, сопровождающихся
повышенной нервной возбуди-
мостью

Rp.: Drag. Camphiodi N. 50
D. S. По 1 драже 2 раза в день после еды. Курс
лечения — 20 дней, повторение — через 10 дней

Камфодал — Camphodalum
Состав на 1 драже:
Iodi 0,0005
Kalii iodidi 0,005
Phenobarbitali 0,01
Bromcamphorae
Pulveris rhizomatis cum radicibus
Valerianae aa 0,1
Extr. Valerianae spissi 0,05

Йодсодержащий препарат.
Показания к применению —
см. «Камфйод»

Rp.: Drag. Camphodali N. 50
D. S. По 1 драже 2 раза в день после еды

Камфоний — Camphonium
Дийодметилат *N*-(диметиламино-
пропил)-камфидина. Аналогичный
дисульфометилат известен под на-
званиями: Baratol, Camphidonium,
Méthocamphoni methylsulfas, Os-
tensin, Ostensol, Trimethidinium-
methosulfat
Выпускается в таблетках 0,01
и 0,05 и в ампулах по 1 мл 1%
раствора

Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте

Ганглиолитик.
Применяется при гипертониче-
ской болезни, облитерирующем
эндартериите, язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной
кишки, для контролируемой ги-
потонии при операциях

Rp.: Solutionis Camphonii 1% 1,0
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. По 0,5—1 мл внутримышечно (внутривенно)
Rp.: Camphonii 0,01 (0,05)
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Камфопирин — Camphoryrin (ГДР) Анальгетическое и противоревматическое средство.
Состав: Применяют при ревматизме, полиартрите, неврите, невралгии и мигрени и т. п.
Acidi camphosulfonici 0,4
Amidopyrini 0,1
Acidi salicylici 0,12
Aquaе pro injectionibus ad 5 ml
Хранение в обычных условиях

Rp.: «Camphoryrin» 5 ml
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. По 1 ампуле в день под кожу или внутримышечно

Камфофенол — Camphophenolum Антисептическое средство.
Применяется в стоматологии
Rp.: Camphorae 2,0
Phenoli puri 1,0
MDS. Вату, смоченную жидкостью, положить на зуб

Камфоцин — Camphocinum Анальгезирующее и противовоспалительное средство.
Применение — см. «Апон»

1. Rp.: Acidi salicylici 3,0
Methylii salicylatis
Olei Terebinthinae āā 10,0
Olei Ricini 5,0
Camphorae 15,0
Tincturae Capsici ad 100,0

2. Rp.: Acidi salicylici
Camphorae āā 10,0
Spiritus aethylici 30,0
Methylii salicylatis 40,0
Tincturae Capsici 50,0
MDS. Для растирания

Канавит — Kanavit (ЧССР)
2-метил-3-фитил-1,4-нафтохинон
Синонимы: Aqua-Mephyton, Kanakion, Kasyn, Kativ-N, Keipole, Mephyton, Mono-Kay, α -Phyllochinon, Phytomenadion, Phytonadione, Vitamin K₁

Выпускается в ампулах по 1 мл
1% раствора

Хранение — список Б
Срок годности — 1 год

Препарат витамина К.
Применяется при кровотечениях и при передозировке «непрямых» антикоагулянтов

Rp.: Sol. «Kanavit» 1% 1 ml
D. t. d. N. 5 in ampul.
S. При сильном кровотечении вводится 1—2 ампулы внутривенно. Через 2—3 ч дозу можно повторить

Капли желудочные — Guttae stomachicae

Хранение N 4 — список А

Все прописи обладают рефлекторным сокогонным действием.

Применяются при гипоацидных гастритах, пониженном аппетите и пр.

1. Rp.: Tincturae Chinae compositae
Tincturae Rhei spirituosae
Tincturae Zingiberis aa 10,0
2. Rp.: Rhizomatis Zedoariae 16,0
Rhizomatis Calami
Rhizomatis Galangae aa 8,0
Fructus Lauri
Florum Caryophylli aa 3,0
Florum Chamomillae
Florum Anisi vulgaris
Fructus Carvi aa 4,0
Corticis Aurantii
Florum Macidis aa 2,0
Aquae Menthae piperitae
Spiritus aethylici 90% aa 96,0
Aetheris aethylici 1,0

Приготовление: измельченное растительное сырье настаивают в течение 5 дней на смеси этилового спирта и мятной воды, после чего жидкость сливается, в нее же отжимают сухой остаток. По отстаивании жидкость процеживают и добавляют эфир

3. Rp.: Radicis Calami concisi
Rhizomatis Galangae
Radicis Gentianae
Radicis Zedoariae aa 25,0
Coccionelli 4,0
Radicis Rhei 12,5
Fructus Cardamomi 6,0
Corticis Aurantii 15,0
Herbae Cnicus benedictis 25,0
Spiritus aethylici q. s. до получения 1 л настойки.
MDS. По 20—25 капель 3 раза в день во время еды.

Приготовление: растительное сырье настаивают на спирте несколько дней, отжимают и процеживают

4. Rp.: Tincturae Opii simplicis 10,0
Tincturae Menthae piperitae 20,0
Tincturae Absinthii 30,0
Tincturae Valerianae 40,0

MDS. По 10—20 капель на прием.

Смесь настоек № 4 обладает также болеутоляющим и противопоносным свойствами. Применяется при острых гастроэнтеритах

**Капли зубные — Guttae odont-
halgicae**

Все прописи используются в стоматологии для обезболивания дентина при осложненном кариесе и т. д. После кратковременного усиления боли наступает анестезия

1. Rp.: Olei Menthae piperitae 3,1
Camphorae 6,4
Spiritus aethylici 96% 33,5
Tincturae Valerianae 57,0

2. Rp.: Camphorae
Chlorali hydrati
Mentholi aa 2,0

3. Rp.: Thymoli 1,25
Spiritus aethylici 95%
Aetheris aethylici aa 1,0

MDS. Вату, смоченную лекарством, поместить в дупло

**Капли камфорно-валериановые —
Guttae Camphorae valerianatae**
Срок годности — 1 год

Применяется при хронической сердечно-сосудистой недостаточности

- Rp.: Camphorae 10,0
Tincturae Valerianae ad 100,0
MDS. По 20 капель 2—3 раза в день

**Капли квасцовые глазные — Gut-
tae ophthalmicae aluminatae**

Вяжущее и антисептическое средство.

Применяется для лечения конъюнктивитов и т. п.

- Rp.: Aluminis 0,1
Aquae pro injectionibus 10,0
MDS. Глазные капли

Капли ландышево-валериановые — *Guttae tincturarum Valerianae et Convallariae*

Срок годности — активность контролируют ежегодно

Срок годности — 2 года

Успокаивающее и кардиотоническое средство.

Применяется при функциональных нарушениях работы сердца (вегетоневрозы)

Rp.: Tincturae Valerianae
Tincturae Convallariae $\bar{a}\bar{a}$ 10,0
MDS. По 20 капель 2 раза в день

Капли ландышевые сложные — *Guttae Convallariae compositae*

Хранение — список Б
Активность № 1, 2, 3, 4 контролируется ежегодно

Успокаивающее, кардиотоническое и коронарорасширяющее средство.

По применению аналогично «Зеленина каплям»

1. Rp.: Tincturae Valerianae
Tincturae Convallariae $\bar{a}\bar{a}$ 10,0
Tincturae Belladonnae 5,0
Solutionis Nitroglycerini 1% 2,0
Mentholi 0,2
 2. Rp.: Tincturae Convallariae
Tincturae Valerianae
Adonisidi $\bar{a}\bar{a}$ 10,0
 3. Rp.: Tincturae Convallariae
Tincturae Valerianae $\bar{a}\bar{a}$ 10,0
Extracti Crataegi fluidi 5,0
Mentholi 0,05
MDS. По 15—25 капель 2—3 раза в день
 4. Rp.: Natrii bromidi 4,0
Adonisidi 5,0
Tincturae Valerianae
Tincturae Convallariae $\bar{a}\bar{a}$ 10,0
MDS. По 10—20 капель на прием
-

Капли ландышевые с настойкой чилибухи — *Guttae Convallariae cum Tinctura Strychni*

Хранение — список А
Контроль активности ежегодно.

Общеукрепляющее и кардиотоническое средство.

Применяется при общей слабости, в периоде реконвалесценции и пр.

Rp.: Tincturae Convallariae 15,0
Tincturae Strychni 5,0
MDS. По 15 капель 2—3 раза в день

Капли ментоловые сложные — *Guttae Mentholi compositae*

Успокаивающее средство.

Применяется при вегетоневрозах с преобладанием ваготонии (брадикардия, поносы)

Rp.: Mentholi 0,2
Tincturae Valerianae 20,0
Tincturae Belladonnae 10,0
MDS. По 15—20 капель 1—2 раза в день

**Капли нашатырно-анисовые —
Liquor Ammonii anisatus**

Состав:
Olei Anisi 2,81
Solutionis Ammonii caustici 15,0
Spiritus aethylici 90% ad 100,0
Срок годности — 1 год; после
переконтроля — 1 год

Отхаркивающее средство.
Применяется при заболеваниях,
сопровождающихся сухим кашлем

Rp.: Liquoris Ammonii anisati 100,0
DS. По 5—10 капель 3—4 раза в день

**Капли противоастматические —
Guttae antiasthmaticae**

Капли по всем прописям обла-
дают кардиотоническим и отхар-
кивающим свойствами, отчасти
бронхолитическим действием, сти-
мулируют дыхание.

Применяются для лечения брон-
хиальной астмы, хронического
бронхита

1. Rp.: Tincturae Lobeliae
Tincturae Digitalis
Aquae Amygdalarum amara^{rum} aa 10,0
 2. Rp.: Tincturae Lobeliae
Tincturae Digitalis aa 5,0
Aquae Amygdalarum amara^{rum} 10,0
 3. Rp.: Tincturae Lobeliae 5,0
Aqua Amygdalarum amara^{rum} 15,0
MDS. По 10—15 капель 2—3 раза в день
-

**Капли против мигрени — Guttae
contra hemicranium**

Болеутоляющее и успокаиваю-
щее средство.

Применяется для купирования
приступов мигрени, а также при
головной боли иного происхожде-
ния

Rp.: Coffeini 1,0
Spiritus aethylici diluti 14,0
Chloroformii 12,5
MDS. По 15—20 капель через каждые $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ ч при
мигрени

Капли против насморка — *Guttae contra coryzam*

Хранение капель по прописям № 2 и 3 — список А

Сосудосуживающее средство.
Применяется при остром рините для прекращения секреции слизистой носа

1. Rp.: Solutionis Ephedrini hydrochloridi 2—3% aut 5% —10,0
Solutionis Adrenalini hydrochloridi 0,1% gttis X
2. Rp.: Cocaini hydrochloridi 0,2
Antipyrini 0,3
Solutionis Adrenalini hydrochloridi 0,1% 1,0
Aquae destillatae 10,0
3. Rp.: Solutionis Cocaini hydrochloridi 5% 5,0
Solutionis Adrenalini hydrochloridi 0,1% gttis V
MDS. По 1—2 капли в каждую ноздрю 2—4 раза в день

Капли противорвотные — *Guttae contra vomitum (Guttae antiemeticae)*

Препарат обладает противорвотным действием.
Применяется при рвоте различного происхождения (обычно при токсикозе беременности)

Rp.: Aquae Amygdalarum amagarum 5,0
Tincturae Strychni 1,0
MDS. По 10 капель на сахаре утром и вечером

Капли строфанта сложные — *Guttae tincturarum Strophanthi, Valerianae et Convallariae*

Активность контролируют ежегодно

Свойства и применение — см. «Капли ландышево-валериановые»

Rp.: Tincturae Strophanthi 5,0
Tincturae Convallariae
Tincturae Valerianae aa 10,0
MDS. По 25 капель 2—3 раза в день

Капли строфанта и настойки чилибухи — *Guttae tincturarum Strophanthi et Strychni*

Хранение — список Б (1,2)
Активность контролируют ежегодно

Свойства и применение — см. «Капли ландышевые с настойкой чилибухи»

Rp.: Tincturae Strophanthi
Tincturae Strychni aa 5,0
MDS. По 10 капель 2—3 раза в день

Капли сульфацило-дикаиновые — *Guttae ophthalmicae Albucidi et Dicaini* Антимикробное и анестезирующее средство.
Применяется при острых инфекционных конъюнктивитах

Rp.: Dicaini 0,05
Sulfacyli-natri 3,0
Benzylpenicillini-natrii 300 000 ED
Olei jecoris Aselli 10,0
MDS. Глазные капли.
Перед употреблением взбалтывать

Капли тимоловые — *Guttae Thymoli* Антисептическое средство.
Применяется при острых ринитах наряду с «Каплями против насморка»

Rp.: Thymoli 0,3
Linalooli 0,7
Olei Vaselini ad 100,0
MDS. По 2 капли 4—5 раз в день в нос

Капли щелочные — *Guttae alcalinae* Свойства и применение — см. «Бахона капли»

Rp.: Natrii hydrocarbonatis
Natrii sulfatis aa 1,5
Glycerini 4,0
Aquaе destillatae 30,0
MDS. Наружное

Капли эфирно-скипидарные — *Guttae Aetheris terebinthinatae* Желчегонное средство (холекинетик).
Применяется длительно для лечения желчнокаменной болезни и хронического холецистита

Rp.: Aetheris aethylici 20,0
Olei Terebinthinae rectificati 5,0
MDS. По 15—30 капель с сахарной водой утром и вечером

Капсин — *Capsinum* Показания к применению и свойства — см. «Апон»
Состав:
Methylii salicylatis 10,0
Tincturae fructus Capsici
Olei Hyoscyami aa 20,0
Срок годности — 2 года

Rp.: Capsini 50,0
DS. Наружное

Капситрин — Capsitrimum

Состав:

Tincturae fructus Capsici 27,0
Tincturae Hyperici 1,0
Saponis viridis 10,0
Solutionis Ammonii caustici
20% 6,0
Spiritus aethylici 60% 56,0

Свойства и показания к применению — см. «Апон»

Rp.: Capsitrimini 100,0
DS. Наружное, для растирания

Каптоль — Captol

Раздражающее средство.

Применяется для уничтожения перхоти при жирной себорее и для укрепления волос

Rp.: Chlorali hydrati 2,0
Tannini
Acidi tartarici aa 1,0
Olei Ricini 0,25
Spiritus aethylici 90% 65,0
Aquaе destillatae 35,0
Olei aetherei 1,0
MDS. Втирать в волосы, сопровождая массажем, утром и вечером.

Приготовление: хлоралгидрат, танин и виннокаменную кислоту растворяют в воде, а касторовое масло — в спирте, обе жидкости смешивают и добавляют отдушку

Каптосульфол — Captosulfol

Свойства и показания к применению — см. «Каптоль»

Rp.: Sulfuris praecipitati 3,5
Carbonei sulfidi 58,5
Carbonei tetrachloridi 21,0
Chloroformii 13,7
Olei Ricini 2,3
Aetheris et corrigentis ad 100,0
MDS. Втирать в кожу волосяного покрова утром и вечером по 1—2 мл

Карандаш горчичный — Stylus Sinapis

Раздражающее средство.

Применяется для отвлекающей терапии при радикулитах, миозитах, артритах, а также при заболеваниях внутренних органов (пневмония, бронхит и пр.)

Rp.: Mentholi 17,0
Cetacei 2,0
Olei Sinapis aetherei 1,0
MDS. Наносить на пораженные участки кожи.

Приготовление: смесь ментола и спермацета растапливают, добавляют эфирное горчичное масло и выливают в формы

Карандаш йодно-таниновый —
Stylus Iodo-tannatus

Антисептическое и вяжущее средство.

Применяется для лечения отморожений I—II степени

Rp.: Paraffini
Vasellini aa 25,0
Iodi 1,0
Tannini
Spiritus aethylici 90% aa 3,0

MDS. Наносить на пораженные участки кожи.

Приготовление: сплав парафина с вазелином смешивают с йодом, добавляют танин и этиловый спирт, выливают в формы

Карандаш кровоостанавливающий — Stylus haemostaticus

Смеси обладают прижигающими свойствами, благодаря чему применяются для остановки кровотечения при мелких повреждениях кожи

1. Rp.: Aluminis 95,24
Glycerini 4,76

Приготовление: квасцы расплавляют, добавляют глицерин и выливают в формы.

Срок годности — 1 год 6 мес.

2. Rp.: Aluminis 20,0
Aluminii sulfatis 78,0
Calcii oxydi 2,0

Приготовление: ингредиенты сплавляют и выливают в формы.
Карандаш ляписный

3. Rp.: Argenti nitratis 33,34
Kalii nitratis 66,66
MDS. Для прижигания поврежденных мест

Карандаш ментоловый — Stylus
Mentholi

Препарат применяется для отвлекающей терапии головной боли

Срок годности — 1 год

Rp.: Mentholi 20,0
Paraffini 80,0

Приготовление: к расплавленному парафину добавляют ментол и выливают в формы

2. Rp.: Olei Cacao 2,0
Cetacei 4,0
Mentholi
Chlorali hydrati āā 1,0
MDS. Для натирания кожи висков

Карбагель — Carbagelum

Состав:
Carbonis activati
Bentoniti āā 26,0
Collargoli 3,0
Amyli et
Sacchari ad 100,0

Выпускается в гранулах

Адсорбирующее и антисептическое средство.

Применяется при токсикоинфекциях, отравлениях, диспепсии и метеоризме

Rp.: Carbageli 100,0
DS. По 1 чайной ложке 3—4 раза в день

Карбантокс — Carbantox (ЧССР)

Состав на 1 таблетку:
Carbonis activati 0,35
Natrii thiosulfatis 0,025
Хранение — список Б

Свойства и применение — см. «Карбагель»

Rp.: Tabul. «Carbantox» N. 50
DS. Несколько раз в день по 2—4 таблетки

Карбахолин — Carbacholinum

Карбамоилхолинахлорид
Синонимы: Atonyl, Carbachol, Cholinergol, Dorlen, Doryl, Dura-choline, Enterotonin (ЧССР), Glaucomil, Hormotonin, Iricoline, Lentichol, Lentin, Moryl, Samoryl, Topocholin

Выпускается в таблетках по 0,001 и в ампулах по 1 мл 0,01% и 0,025% раствора

Хранение — список А

Холиномиметическое средство, по свойствам аналогичное естественному медиатору ацетилхолину, но более стойкое.

Применяется при атонии кишечника и мочевого пузыря, в том числе после операции, глаукоме (местно — в виде 0,5—1% раствора)

Rp.: Sol. Carbacholini 0,01% (0,025%) 1,0
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. По 1/2—1 ампуле под кожу 2 раза в день

Rp.: Carbacholini 0,001
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Карболен — Carbolenum
Активированный уголь
Выпускается в таблетках по 0,25 и 0,5
Хранение — в прохладном месте
Срок годности — 2 года; после переконтроля — 1 год

Адсорбирующее средство.
Применяется при диспепсии, метеоризме, пищевых интоксикациях, отравлениях алкалоидами, солями тяжелых металлов

Rp.: Carboleni 0,25 (0,5)
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1—2—3 таблетке 3—4 раза в день

Карденозин — Cardenosinum
(ГНП)
Синоним: Coramin-Adenosin
Состав на 1 таблетку:
Calcii-Cardiarnidi 0,325
Theophyllini 0,075
Adenosini 0,001
Состав одной ампулы:
Cordiamini 0,2
Theophyllini 0,075
Adenosini 0,001
Хранение — список Б, в защищенном от света месте
Срок годности: контролируется ежегодно

Препарат повышает тонус сосудов, усиливает сокращения сердца.

Применяется при недостаточности кровообращения, стенокардии, атероматозе коронарных сосудов, постинфарктном состоянии, сосудодвигательных расстройствах климактерического периода и т. п.

Rp.: Tabul. «Cardenosin» N. 20
DS. По $\frac{1}{2}$ —1 таблетке 3 раза в день после еды

Rp.: Sol. «Cardenosin» 1 ml
D. t. d. N. 5 in ampul.
S. Внутримышечно или внутривенно медленно по 1—2 ампулы в день.

Примечание: Внутривенное введение с 20—40% раствором глюкозы.

Кардиовален — Cardiovalenum
Состав:
Succi herbae Erysimi canescentis 17,0
Adonisidi 30,0
Tincturae Valerianae 46,9
Extracti Crataegi fluidi 2,0
Natrii bromidi 2,0
Camphorae 0,4
Spiritus aethylici 96% 1,6
Chlorobutanoli hydratis 0,25

Кардиотоническое и противоритмическое средство.

По свойствам, показаниям к применению и осложнениям близок к «Абигину», «Диланизиду» и др.

Выпускается во флаконах по 15 *мл*

Хранение — список Б

Срок годности — 1 год; после переконтроля — 1 год

Rp.: Cardiovaleni 15 ml

DS. По 15 капель 2—3 раза в день

Кардиотраст — Cardiotrastum

Диэтиламинная соль 3,5-дйод-4-пиридон-*N*-уксусной кислоты

Синонимы: Abrogen, Arteriodone, Diatrast, Diodon (ЧССР), Diodrast, Falitrast, Iopracyl, Jodopyracet, Jodumbran, Joduron B, Jorygacil, Leodrast, Neospekt, Neomethiodal, Nesylan, Nosydrast, Nosylan, Noviotrast, Ombradil, Oprenol, Pelviran, Periodil, Perurdil, Pyelodrast, Pyelombrine, Pyelosil, Pyraceton, Savac, Umbradil, Umbagnost, Umbralon, Uriodone, Urognost, Urograf, Vasiodone, Visciosol, Xumbradil, Yodopalina, Yoduron

Выпускается в ампулах по 20 *мл* 35%, 50% и 70% раствор выпускают с добавлением желатинины

Хранение — в темном прохладном месте

Срок годности — 2 года

Рентгеноконтрастный препарат.

Применяется для рентгеновского исследования кровеносных сосудов и сердца, а также почечных лоханок, мочеточников, мочевого пузыря. Для исследования почечных лоханок и мочеточников 35% раствор, подогретый до температуры тела, вводят внутривенно (медленно). При подкожном введении препарат разводят в изотоническом растворе натрия хлорида до общего объема 100 *мл*. По 50 *мл* этого раствора вводят подкожно в область правой и левой лопаток. Внутримышечно диодон вводят в ягодичную область. Для рентгенологического исследования крупных сосудов применяют 70% или 50% раствор кардиотраста. Препарат вводят в локтевую, в яремную или бедренную вену, а также в полости сердца или в аорту с помощью зонда

Rp.: Sol. Cardiotrasti 35% (50%, 70%) 20 ml

D. t. d. N. 2 in ampul.

S. Для внутривенного и подкожного введения

Карион — Karion (ВНР)

2-(Пиперидинометил)-циклогексанао гидрохлорид

Синонимы: Spiractin, Pimeclon

Выпускается в ампулах по 1 *мл* 1,5% раствора и по 2 *мл* 2,5% раствора

Хранение — список Б

Дыхательный аналептик.

Применяется при асфиксии новорожденных, параличе дыхания, вызванном наркотиками, расстройстве дыхания, при пневмонии и т. д.

Rp.: Sol. «Karion» 1,5% 1 ml (2,5% 2 ml)

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. Внутримышечно или внутривенно.

Новорожденным и младенцам: 5—15 *мг* внутривенно

**Кармановой микстура — Mixtura
Karmanowae**

Седативное средство.
Может применяться самостоя-
тельно по тем же показателям,
что и «Бехтерева микстура»,
а также вместе с «Кармановой
таблетками» для усиления дейст-
вия последних

Rp.: Natrii bromidi 8,0
Calcii chloridi 10,0
Codeini 0,2
Tincturae Strophanthi aut Adonisidi 5,0
Aquae destillatae 200,0
MDS. По 1 столовой ложке 2—4 раза в день

**Кармановой таблетки — Tabulet-
tae Karmanowae**

Противоэпилептическое сред-
ство.

1. Состав на 1 таблетку:
Phenobarbitali 0,1
Natrii bromidi 0,133
Codeini 0,01
Strychnini nitratis 0,001
Camphorae 0,017
Calcii glycerophosphatis 0,4
Pulveris rhizomatis cum radici-
bus Valerianae 0,042

Применяется для лечения боль-
ших припадков и эквивалентов.
Таблетки № 1 предложены для
более тяжелых случаев, таблетки
№ 2 — для более легких

2. Состав на 1 таблетку:
Phenobarbitali 0,05
Natrii bromidi 0,133
Codeini 0,01
Strychnini nitratis 0,001
Camphorae 0,017
Calcii glycerophosphatis 0,4
Pulveris rhizomatis cum radicibus
Valerianae 0,042

Хранение — список А
Срок годности — 4 года

Rp.: Tabul. Karmanowae N. 1 (N. 2)
D. t. d. N. 50
S. Применять по схеме

Карноль — Carnol

Кератолитическое средство.
Применяется для лечения мо-
золей. Способ употребления —
см. «Адоль»

Rp.: Acidi lactici
Acidi salicylici aa 5,0
Collodii 89,0
Acidi acetici 1,0
MDS. Наружное

**Карташова микстура — Mixture
Kartashovi**

Антисептическое и противовоспалительное средство.

Применяется для предупреждения осложнений при гриппе и острых респираторных заболеваниях вирусной этиологии

Rp.: Natrii salicylatis 1,0
Kalii iodidi 0,1
Solutionis Iodi spirituosae gttss VI
Aquae destillatae 200,0
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

**Карташова полоскание — Gargarisma
Kartaschovi**

Антисептическое и дезодорирующее средство.

Применяется при наличии дурного запаха изо рта, связанного с заболеваниями зубов или слизистой полости рта

Rp.: Thymoli 0,3
Mentholi 0,1
Spiritus aethylici 96% 10,0
MDS. По 4—5 капель на стакан воды для полоскания рта

**Кастеллани жидкость — Liquor
Kastellani**

Фунгицидное средство.

Применяется для лечения грибковых поражений кожи и ногтей (рубромития, эпидермофития, онихомикозы и пр.)

Rp.: Solutionis Fuxini spirituosae 10,0
Solutionis Phenoli 5% 100,0
Acidi borici 1,0
Resorcini 10,0
Acetoni 5,0

MDS. Наносить на пораженные участки кожи

Приготовление: свежеприготовленный насыщенный спиртовой раствор основного фуксина смешивают с раствором фенола, после фильтрации добавляют борную кислоту, через 2 ч — ацетон, еще через 2 ч — резорцин. Готовый препарат сохраняют в склянке оранжевого стекла

Капапресан — Capapresan (СФРЮ)

2-(2,6-Дихлорфениламино)-имидазолина гидрохлорид

Синонимы: Chlophazolin, Clopidin, Naemiton (ГДР)

Выпускается в таблетках по 0,000075; 0,00015 и 0,0003 и в ампулах по 1 мл 0,015% раствора

Хранение — список Б

Гипотензивное средство. Механизм действия не вполне выяснен.

Применяется для лечения всех форм гипертонической болезни. Побочные явления: сонливость, запоры, сухость во рту. Возможен ортостатический коллапс

Rp.: Tabul. «Catapresan» 0,000975
(0,00015 aut 0,0003)

D. t. d. N. 20

S. Начальная доза — по 1 самой малой таблетке
3—4 раза в день, поддерживающие дозы —
по 1 средней или большой таблетке 3 раза в день

Rp.: Sol. «Catapresan» 0,015% 1,0

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 1 мл под кожу, в вену или в мышцы, боль-
ной должен лежать

Катарро — Katarro

Противозачаточное (спермато-
цидное) средство

Rp.: Chinini sulfatis

Aluminis āā 0,005

Thymoli 0,01

Olei Casao 1,5

M. f. suppositorium vaginale

D. t. d. N. 20

S. По 1 суппозиторию во влагалище за 20 мин
до сношения

Каферид — Caferid

Препарат умеренно стимулирует
эритропоз и лейкопоз.

Состав на 1 таблетку:

Ferri oxydi

Flogum Calendulae āā 0,1

Хранение — список Б, в тем-
ном прохладном месте

Срок годности — 3 года

Дополнительный срок годности
после переконтроля — 2 года

Применяется для профилактики
поражения костного мозга при
лучевой терапии

Rp.: Tabul. Caferidi N. 50

DS. По 2 таблетки 3 раза в день

Квалидил — Qualidilum

1,6-бис-3'-Бензилхинуклидил-

1⁴-гексана дихлорид

Синоним: Qualidin

Выпускается в ампулах по 1,2

и 5 мл 2% раствора

Хранение — список А, в защи-
щенном от света месте

Срок годности: раствор — 2 го-
да, п/п—1 год, ампулы — 2 года

Антидеполярирующий миоре-
лаксант, по свойствам и примене-
нию аналогичный «Д-тубокура-
рину», «Диплацину» и др.

Rp.: Sol. Qualidili

2% 1,0 (2,0 aut 5,0)

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Из расчета по 2 мг/кг сухого вещества в вену
для полного расслабления мышцы

Кватера микстура — Mixtura Quateri

Седативное средство. Предложено для лечения неврозов, возникающих в климактерическом периоде

Рр.: Infusi rhizomatis et radicibus Valerianae 10,0
et folio Menthae 4,0—200,0
Natrii bromidi 3,0
Magnesii sulfatis 0,8
Amidopyrini 0,6
Coffeini-natrii benzoatis 0,4
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Кватерон — Quateronium
1,2-Диметил-3-диэтиламинопропилового эфира пара-*n*-бутоксibenзойной кислоты йодэтилат
Синонимы: Kvateleoron, Quateron

Ганглиолитик.
Показания к применению — см. «Камфоний»

Выпускается в таблетках по 0,02
Хранение — список Б
Срок годности — 2 года

Рр.: Quateroni 0,002
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Кверцетин — Quercetin
3, 4, 7, 3', 4'-Пентаоксифлаво
Синонимы: Flavin, Meletin, Quercetol, Quertine, Sophoretin

Препарат витамина Р.
Применяется в тех же случаях, что витамин Р и рутин (см.)

Выпускается в таблетках по 0,02
Хранение — в защищенном от света месте
Срок годности — 3 года

Рр.: Quercetini 0,02
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке 3—5 раз в день

Квиэтидин — Quietidin
1,4-Бис-(1-фенилизопропил)-пиперазина дигидрохлорид
Синоним: Diphenazin
Выпускается в таблетках по 0,05
Хранение — список Б

Нейролептик.
По показаниям к применению близок к «Аминазину»

Рр.: Quietidini 0,05
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Келлатрин — Khellatrinum

Состав на 1 таблетку:

Atropini sulfatis 0,00025

Papaverini hydrochloridi

Khellini aa 0,02

Хранение — список А

Срок годности — 4 года

Холинолитическое и спазмолитическое средство.

Применяется при спазмах кровеносных сосудов и органов брюшной полости, бронхиальной астме и пр.

Rp.: Tabul. «Khellatrinum» N. 10

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Келливерин — Khelliverinum

Состав на 1 таблетку:

Khellini 0,01

Papaverini hydrochloridi 0,02

Хранение — список Б

Срок годности — 4 года

Спазмолитическое средство.

Применяется при спазмах органов брюшной полости и мочевыводящих путей

Rp.: Tabul. «Khelliverinum» N. 10

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Келлотетрит — Khellotetrit

Состав на 1 таблетку:

Khellini 0,025

Erythriti 0,03

Хранение — список Б

Срок годности — 1 год

Коронарорасширяющее и спазмолитическое средство.

Применяется при стенокардии

Rp.: Tabul. „Khellotetrit” N. 10

DS. По 1 таблетке 1—3 раза в день после еды

● **Келлофиллин — Khellophyllin**
(ПНР)

Состав одной ампулы:

Khellini 0,025

Diprophyllini 0,2

Aquae pro injectionibus ad 1 ml

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Коронарорасширяющее и спазмолитическое средство.

Применяется при коронарной недостаточности, спазмах периферических кровеносных сосудов, гипертонической болезни, спазмах бронхов, отеках сердечного и почечного происхождения и т. д.

Rp.: «Khellophyllin» 1 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Внутримышечно по 1 ампуле 1—2 раза в день в течение 2—3 недель

Кетазон — Ketazon
4-(3-Оксобутил)-1,2-дифенилпи-
разолидин-3,5-дион

Синонимы: Chebutan, Chepirol,
Chetazol, Chetil, Chetopir, Copi-
rene, Gammachetone, Isolidin, Ke-
tofen, Ketophenylbutazonum, Re-
cheton, Reuchetal

Выпускается в драже по 0,25
и в ампулах по 5 мл 20% раствора
с добавлением 1% ксиканна

Противовоспалительное, проти-
воревматическое и болеутоляющее
средство. По строению и свойствам
близок к «Бутадиону».

Применяется при ревматизме,
ревматоидных артритах, подагре
и т. д. При лечении не следует
одновременно принимать «Ацетил-
салициловую кислоту» и другие
салицилаты

Rp.: Dragee «Ketazon» 0,25
D. t. d. N. 50
S. По 4—6 драже в первый день, постепенно снижая
дозу по 1—2 драже в день или через день

Rp.: Sol. «Ketazon» 20% 5,0
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. По 1—2 ампулы строго внутримышечно

Кефалозан — Kephaloson

Состав на 1 таблетку:

Amidopyridini 0,15

Antipyridini 0,13

Coffeini 0,013

Acidi citrici 0,005

Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте

Срок годности — 4 года; после
переконтроля — 2 года

Болеутоляющее и жаропонижа-
ющее средство.

Применяют при головной боли,
зубной боли, невралгии и пр.

Rp.: Kephalosani
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Кеффера жидкость — Liquor
Kefferi

Антисептическое и подсушива-
ющее средство.

Применяется при различных за-
болеваниях кожи, сопровождаю-
щихся мокнутием (экземы и пр.)

Rp.: Zinci oxydi
Gelatinae medicinalis āā 25,0
Glycerini 120,0
Aquaе destillatae 80,0
MDS. Наносить на пораженные участки кожи

Кинедрил — Kinedryl (ЧССР)

Состав на 1 таблетку:

Theophyllini 0,025

Coffeini 0,03

Хранение — список Б

Срок годности — 5 лет

Противорвотное средство.
Применяют при морской и воз-
душной болезни

Рр.: Tabul. «Kinedryl» N. 6

D. S. По $\frac{1}{2}$ —1 таблетке за $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ ч до отправле-
ния в путь

**Кислота аденозинтрифосфор-
ная — Acidum adenosintri-phos-
horicum**

Применяется в виде натриевой
и кальциевой солей: Natrii adeno-
sintriphosphas et Calcii adeno-
sintriphosphas

Синонимы натриевой соли:

Adenzima, Adepfos, Aterodin, Atri-
pi, ATF (ЧССР), АТР, Atrifos,
Atriphos (ВНР), Fosfobion, Glu-
cobasin, Myotriphos (ПНР), Pyra-
dene, Striadyne, Triadenyl, Tribi-
ofosfor, Trifosfodin, Trifosyl, Tri-
phosaden, Triphosadenine, Tripho-
sphodine

Натриевая соль выпускается
в ампулах по 1 и 2 мл 1% рас-
твора; монокальциевая соль — в
ампулах по 1 мл 3% раствора
в глицерине

Хранение — в прохладном ме-
сте (при температуре не выше 10°)

Срок годности АТФ ЧССР —
2 года; СССР — 1 год; после пе-
реконтроля — 6 мес.

Миотрифос (ПНР) — 1 год 6 мес.

Препарат представляет собой
один из продуктов энергетического
метаболизма.

Применяется при атрофиях и
дистрофиях мышц, в том числе и
сердечной мышцы, сердечных арит-
миях, сопровождающихся тахи-
кардией (пароксизмальная тахи-
кардия), спазмах венечных и пе-
риферических сосудов, при инфек-
ционных заболеваниях цен-
тральной нервной системы, пар-
кинсонизме и т. п.

Рр.: Sol. Natrii adenosintri-phosphatis 1% 1 (2) ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По $\frac{1}{2}$ —1 ампуле под кожу или в мышцу.

Рр.: Sol. Calcii adenosintri-phosphatis glycerinosae 3% 1 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Ампулу подогреть, добавить 3 мл изотонического
раствора натрия хлорида и ввести в/м

Кислота липоевая — Acidum lipoicum

5-(1,2-Дитиолан-3-ил)-пентановая кислота или 6,8-дитиооктановая кислота

Синонимы: Acidum thiocticum, Aciotico, Biletan, Heparlipon, α -Liponsäure, α -Liposäure, Protogen A, Servedasa, Thioctacid, Thioctan, Thioctsäure, Thioctacid, Tioctan, Tioctidasi

Выпускается в порошке и таблетках по 0,025

Хранение — в прохладном темном месте

Срок годности таблеток — 1 год

Препарат, близкий к витаминам группы В, обладает детоксицирующими свойствами, улучшает липоидный обмен и функцию печени.

Применяется при склерозе, гепатитах и циррозах печени различного происхождения и при хронических отравлениях солями тяжелых металлов

Rp.: Acidi lipoici 0,025
D. t. d. N. 50 in tabul.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Клеол — Cleolum

Срок годности — 8 лет; после переэконтроля — 4 года

Препарат предназначен для укрепления повязок на коже

Rp.: Colophonii 45,0
Spiritus aethylici 95% 37,0
Aetheris medicinalis 17,0
Olei Helianthi 1,0
MDS. Наружное

Климактерин — Klimacterin (ЧССР)

Выпускается в драже

Состав на 1 драже:

Oestradioli benzoatis 0,0000025

Pulveris Ovarii 0,03

Nitroglycerini 0,0002

Theobromini

Coffeini aa 0,025

Phenolphthaleini 0,006

Хранение — список Б

Срок годности — 4 года

Препарат эстрогена, комбинированный со спазмолитическими и успокаивающими средствами.

Применяют при ангионевротических явлениях, связанных с климаксом

Rp.: Dragée «Klimacterin» N. 50
DS. По 4—6 драже в день

Климарен — Klimaren (ПНР)

Состав 1 ампулы:
Oestradioli benzoatis 0,0025
Testosteroni isobutyris 0,05
Aq. pro injectionibus ad 1,0
Выпускается в ампулах по 1 мл
Срок годности — 2 года

Комбинированный препарат, содержащий женский и мужской половые гормоны. По показаниям и свойствам аналогичен препарату «Амбосекс»

Rp.: «Klimaren» 1 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 1 мл под кожу.

Частота инъекций — по схеме, приложенной к препарату

Климован — Klimovan (ВНР)

Состав на 1 таблетку:
Aethinylloestradioli 0,00001
Aethinyltestosteroni 0,01
Состав на 1 ампулу (1 мл масляного раствора или суспензии):
Oestradioli benzoatis 0,0025
Progesteroni 0,0125
Olei Persicorum ad 1 ml

Комбинация эстрогена и прогестерона.

Применяется при первичной и вторичной гипофункции яичников, дисменорее, метроррагиях, привычных выкидышах и пр.

Rp.: Tabul. «Klimovan» N. 50

DS. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Rp.: Susp. «Klimovan» 1 ml

D. t. d. N. 20 in ampul.

S. По 1—3 ампулы в день внутримышечно

KN — KN

Состав на 1 таблетку:
Florum Calendulae 0,25
Acidi nicotiniци 0,1
Хранение — список Б

Препарат применяется в качестве симптоматического средства у больных с новообразованиями пищевода, желудка и кишечника

Rp.: Tabul. KN N. 50

DS. По $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ таблетки, в дальнейшем по $\frac{1}{2}$ —2 таблетки 2 раза в день

Книдомон — Cnidomonum

Состав:
Extracti Cnidii spirituosus 15,0
Basis unguenti 85,0
Выпускается в тубах по 20 г
Хранение — в прохладном месте

Противопаразитарное средство.

Применяется местно для лечения трихомонадного кольпита у женщин

Rp.: Ung. Snidomoni 20,0

DS. Мазь вводится во влагалище. Перед применением мази производят спринцевание теплой водой, 3% раствором перекиси водорода или 2% раствором гидрокарбоната натрия

Ковтуновича мазь —
Unguentum Kovtunovitschi

Антисептическое средство.
Применяется для лечения поверхностных повреждений кожи (вместо повязки)

Rp.: Colofonii 10,0
Iodoformii 5,0
Olei Helianthi ad 100,0
MDS. Наружное

Кокарбоксилаза —
Cocarboxylasum (ПНР)
Пирофосфорный эфир тиаминна
Синонимы: Berolase, Biosyth,
Bioxilasi, Bivitasi, B-Neuran,
B-Neurox, Cobilasi, Cocarbil, Co-
carbina, Cocarbosyl, Cocarbossi-
lasi, Co-Carbox, Cocarboxylase,
Coenzyme-B, Diphosphothiamin,
Pyruvodehydrase, Tiaminasi, Vi-
biasi, Vitaneurina

Кофермент многих окислитель-
ных реакций.

Применяется при коме, коматоз-
ном состоянии и ацидозе при са-
харном диабете, ацидозе другой
этиологии, нарушении сердечного
ритма, недостаточности коронар-
ного кровообращения, а также при
легких формах рассеянного скле-
роза

Выпускается в ампулах по 0,05
сухого вещества с приложением
растворителя

Хранение в запаянных ампулах
при температуре не выше 5°

Срок годности ПНР — 3 года

Rp.: Cocarboxylasi 0,05
D. t. d. N. 30 in ampul.

S. Растворить перед применением в прилагаемом
растворителе; вводить внутримышечно по 1 мл
1—2 раза в день

Коллодий — Colloidium
Срок годности — 3 года; после
переконтроля — 1 год

Препарат образует на коже по-
лупроницаемую пленку. Обладает
антисептическими свойствами.

Применяется для крепления по-
вязок, для обработки мелких по-
верхностных повреждений кожи

Rp.: Colloxylini 4,0
Spiritus aethylici 20,0
Aetheris medicinalis 76,0
MDS. Наружное

Коллодий глицериновый —
Collodium glycerinatum
Срок годности — 3 года; после
переконтроля — 1 год

По сравнению с «Коллодием»
медленнее сохнет, смягчает кожу

Rp.: Collodii 30,0
Glycerini 40,0
MDS. Наружное

Коллодий
кровоостанавливающий —
Collodium haemostaticum
Срок годности — 3 года; после
переконтроля — 1 год

Препарат применяется для обра-
ботки свежих поврежденных кожи

Rp.: Collodii 50,0
Phenoli
Acidi tannici aa 2,5
Acidi benzoici 1,5
MDS. Наружное

Коллодий сулемовый — Collodium
Hydrargyri dichloridi
Хранение — список А
Срок годности — 3 года; после
переконтроля — 1 год

Препарат ртути.
Применяется местно для лече-
ния особо упорно протекающих
случаев некоторых заболеваний
кожи (псориаз, красный плоский
лишай, стригущий лишай, чесотка
и др.) кожных проявлений вто-
ричного сифилиса

1. Rp.: Hydrargyri dichloridi 1,0
Collodii 25,0
Olei Lini 1,0
2. Rp.: Hydrargyri dichloridi 1,0
Collodii 100,0

MDS. Пораженные места смазывают раз в день.
Избегать попадания на здоровую кожу

Коллодий эластичный —
Collodium elasticum
Срок годности — 3 года; после
переконтроля — 1 год

Свойства и показания — см.
«Коллодий». Отличается большей
длительностью пребывания на ко-
же после применения

1. Rp.: Collodii 100,0
Olei Ricini 2,0
2. Rp.: Collodii 100,0
Terebinthinae 2,0
Olei Ricini 1,0
MDS. Наружное

Кольдкрем. Мазь охлаждающая —
Coldcream. Unguentum leniens

Приготовление: воск и спермацет растапливают на водяной бане, к полуостывшей массе добавляют глицерин и миндальное масло при тщательном помешивании

Rp.: Ceræ albae 3,0
Cetacei 60,0
Olei Amygdalarum 24,0
Glycerini 4,0
M. f. unguentum
DS. Наружное

Смягчающее и защитное средство для кожи.

Применяется в косметике

Кольдкрем «А» —
Goldcream «А»

Вяжущее и антисептическое средство.

Применяется для лечения различных заболеваний кожи

Rp.: Unguenti Naphthalani 40,0
Liquoris Burowi
Aquae destillatae āā 15,0
Axungiae porcinae 30,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Кольдкрем «Б» —
Coldcream «В»

По свойству и применению аналогичен кольдкрему «А»

Rp.: Unguenti Naphthalani 70,0
Aquae Plumbi 10,0
Zinci oxydi 20,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Кольдкрем вазелиновый —
Coldcream Vaselinatum

Свойства и применение — см. «Кольдкрем»

1. Rp.: Cetacei
Paraffini
Olei Cacao āā 10,0
Vaselini 100,0
Aquae Rosae 60,0
Saponis medicati 20,0
Olei Rosae gtts II
 2. Rp.: Ceræ albae
Cetacei āā 10,0
Saponis medicati 20,0
Vaselini 100,0
Aquae Rosae 60,0
M. f. unguentum
DS. Наружное
-

Кольдкрем ланолиновый —
Coldcream lanolinatum

Свойства и применение — см.
«Кольдкрем»

Rp.: Lanolini anhydrici 80,0
Olei Olivarum 40,0
Unguenti Paraffini 20,0
Glycerini 9,0
Aquae destillatae 50,0
Vanillini 0,1
Olei Bergamottae 1,0
Olei Citri 1,0
Spiritus aethylici 90% 0,6
M. f. unguentum
DS. Наружное

Кольдкрем салициловый —
Coldcream salicylatum

Препарат обладает антисептическими и смягчающими свойствами.

Применяется в косметике

Rp.: Acidi salicylici 5,0
Natrii carbonatis 2,0
Aquae Rosae 20,0
Spiritus aethylici 5,0
Cerae albae
Cetacei aa 10,0
Olei Amygdalarum 70,0
Olei Rosae gtts III
Aquae Rosae 10,0
M. f. unguentum
DS. Наружное

Колхамин — Colchaminum

N-Дезацетил - *N* - метилколхицин.
Алкалоид, выделенный из лукавиц безвременника великолепного (*Colchicum speciosum* Stev.) и безвременника осеннего (*Colchicum autumnale* L.)

Синонимы: Colcemid, Demecolcin (ЧССР), Omain

Выпускается в таблетках по 0,001 и 0,002 и в виде 0,5% мази

Срок годности таблеток —

4 года

Срок годности мази 0,5% —

3 года; после переконтроля —

2 года

Цитостатическое средство.

Применяют при раке кожи I и II степени, раке пищевода и желудка, не подлежащих оперативному вмешательству. Противопоказания и предосторожности те же, что и для других цитостатических препаратов (см., например, «Дегранол»)

Rp.: Colchamini 0,002

D. t. d. N. 12 in tabul.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

При комбинированном применении колхамина с сарколизинном назначают оба препарата внутрь одновременно 3 раза в неделю

Хранение — список А, в прохладном, защищенном от света месте

См. «Мазь колхаминовая» с. 278

Комбифенан — Combiphenan

Состав на 1 таблетку:
Chinini hydrochloridi 0,05
Phenacetini

Acidi acetylsalicylici $\bar{a}\bar{a}$ 0,2

Хранение — в обычных условиях

Жаропонижающее средство.

Применяется при тяжелой лихорадке (температура 38—39° и выше)

Rp.: Tabul. Combiphenani N. 10

DS. По одной таблетке при лихорадке

Компламин — Complamin

(НРБ, СФРЮ)

7-[2-окси-3-(N-метил-β-окси-этиламино)-пропил]-теофиллина никотинат

Синонимы: Iperfil, Landrina, Stenalgil, Vedrin, Xanthinolnicinate, Xantiniolnicotinat

Хранение — список Б

Выпускается в таблетках по 0,15 (СФРЮ) и в ампулах по 2 мл и 10 мл 15% раствора (НРБ)

Сосудорасширяющее средство.

Применяется при всех формах и стадиях атеросклероза, поражениях периферических сосудов (облитерирующем эндартериите, болезни Рейно, диабетической гангрене, мигрени, отморожениях и пр.), а также при тяжелой стенокардии для профилактики инфаркта миокарда

Rp.: Tabul. «Complamin» 0,15

D. t. d. N. 30

S. По 1 таблетке 3 раза в день, постепенно повышая дозу до 4 таблеток 4 раза в день

Rp.: Sol. «Complamin» 15% 2 ml (10 ml)

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 1—2 ампулы 1—3 раза в день в мышцы

Кондельфин — Condelphinum

Алкалоид живокости спутанной (Delphinium confusum)

Выпускается в таблетках по 0,025

Хранение — список А, в защищенном от света месте

Срок годности — 2 года

Миорелаксант.

Применяется при повышенном тонусе скелетной мускулатуры. Лечение ведется по специальной инструкции под тщательным врачебным наблюдением

Rp.: Condelpini 0,025

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. В первый день 1 таблетку 0,025 один раз, в дальнейшем 0,025—0,05 1—3 раза в день

**Консервант крови № 76 —
Haemoconservantum № 7b**

Состав:

Natrii citratis pro injectionibus
20,0

Glucosi 30,0

Laevomycetini 0,15

Aquae pro injectionibus ad 1000,0

Выпускается во флаконах по
250 и 500 мл

Срок годности — 1 год 6 мес.;
после переконтроля — 6 мес.

Антикоагулирующее и противомикробное средство.

Применяется для консервации крови при заготовке ее у доноров

Rp.: Haemoconservanti № 7b 250 (500) ml

DS. В операционную

**Контрагельмин —
Contrahelmin (ЧССР)**

Состав на 1 драже:

Phenothiazini 0,125

Hexilresorcini

Fuxini aa 0,025

Хранение — список Б

Антигельминтное средство.

Применяется для лечения нематодозов (аскаридоз, энтеробиоз)

Rp.: Dragee «Contrahelmin» N. 12

DS. По специальной схеме, приложенной к препарату

Контраспан — Contraspantum

Состав:

Tincturae Belladonnae 0,3

Paraverini hydrochloridi 0,03

Phenobarbitali 0,02

Camphorae 0,025

Tincturae Absinthii 0,05

Tincturae Valerianae aetherae 0,15

Tincturae Chamomillae 0,2

Olei aetherei gtt I—II

Spiritus aromatici ad 1,0

Выпускается во флаконах по
10 мл

Хранение — список Б

Спазмолитическое и успокаивающее средство.

Применяется при спазмах полых органов (желче- и мочевыводящих путей, кишечника и пр.)

Rp.: Contraspanti 10 ml

DS. По 10—15 капель 3 раза в день

**Контрацептин «Т» —
Contraceptin «Т»**

Противозачаточное (сперматоцидное) средство

Состав на 1 суппозиторий:

Chinosoli 0,03
Acidi borici 0,3
Tannini 0,06
Olei Casao 2,0

Срок годности — 1 год; п/п —
6 мес.

Rp.: Suppos. Contraceptini «Т» N: 10
DS. По 1 суппозиторию во влагалище за 20 мин
до сношения

**Кончаловского порошки —
Pulveres Kontschalowsky**

Сосудорасширяющее и успокаивающее средство.

Применяется при спазмах сосудов мозга, сердца, конечностей, при гипертонической болезни I стадии

Rp.: Themisali 0,5
Phenobarbitali 0,02
Papaverini hydrochloridi 0,03
M. f. pulvis
D. t. d. N. 50
S. По I порошку 2—3 раза в день

**Конькова мазь основная —
Unguentum Konkovi basicum**

Антисептическое средство, способствует заживлению ран, регенерации эпителия.

Состав:

Aethacridini 0,3
Aquaе destillatae 1,5
Olei jecoris Aselli 35,0
Mellis 65,0

Срок годности — 2 года

Применяется для лечения инфицированных ран, ожогов, трофических язв и пр.

Rp.: Ung. Konkovi 100,0
DS. Наносить на пораженные и поврежденные участки кожи

**Конькова мазь с дегтем —
Unguentum Konkovi cum Pixo**

Свойства и применение — см. «Конькова мазь основная»

Rp.: Aethacridini 0,3
Aquaе destillatae 1,5
Olei jecoris Aselli 35,0
Mellis 62,0
Picis liquidae 3,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные и поврежденные участки кожи

Конькова мазь с ихтиолом — Свойства и применение — см.
Unguentum Konkovi cum «Конькова мазь основная»
Ichthyolo

Rp.: Ichtyoli 5,0
Lanolini anhydrici 3,0
Unguenti Konkovi 100,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные и поврежденные
участки кожи

Конькова мазь с пенициллином — Свойства и применение — см.
Unguentum Konkovi cum «Конькова мазь основная»
Benzylpenicillino

Rp.: Benzylpenicillini 300 000—500 000 ED
Unguenti Konkovi 100,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные и поврежденные
участки кожи

Конькова мазь с синтомицином — Свойства и применение — см.
Unguentum Konkovi cum «Конькова мазь основная»
Synthomycino

Rp.: Synthomycini 3,0—5,0
Unguenti Konkovi 100,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные и поврежденные
участки кожи

Копиркал — Copyrkal (ГДР) Болеутоляющее, противовоспа-
лительное и успокаивающее сред-
ство. Состав на 1 таблетку: ствo. Применяется при головной
Coffeini 0,04 боли, невралгиях, миозитах и пр.
Barotali 0,08 Примечание: баротал — снотвор-
Amidopyrini 0,28 ное, близкое к этиамнолу; в дан-
Хранение — в обычных усло- ной дозе оказывает седативное
виях действие
Срок годности — 1 год; после
переконтроля — 1 год

Rp.: Tabul. «Copyrkal» N. 10
DS. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Корбелла — Corbella

Сухой таблетированный экстракт корня красавки. Содержание алкалоидов в каждой таблетке 0,001 г (в пересчете на атропин)

Хранение — список Б

Срок годности таблеток, покрытых оболочкой, — 2 года

Противоспастическое средство. Применяется при паркинсонизме и явлениях повышенного мышечного тонуса

Рр.: Tabul. Corbellae N. 50

DS. Начиная с 1 таблетки в день с постепенным повышением дозы до наиболее эффективной дозы для данного больного. Принимают перед сном

Корвалол — Corvalolum

Состав:

Aethylii bromisovalerianatis

Phenobarbitali-natrii aa 0,4

Olei Menthae piperitae 0,028

Spiritus aethylici 90% 10,0

Aquae destillatae ad 20,0

Аналогичные препараты:

Valocordin (ГДР)

Mylocordin (ПНР)

Выпускается во флаконах по 20 мл

Срок годности валокордина — 3 года

Срок годности корвалола — 2 года

Рр.: Corvaloli 20 ml

DS. По 15—20 капель 3 раза в день

Коргормон — Corhormon (ВНР)

Одна ампула содержит 1 мл экстракта сердечной мышцы эмбрионов

Содержит комплексные соединения поликарбонновых кислот и магния

Срок годности — 5 лет

Биогенный препарат, специфически действующий на сердце. Улучшает обмен в миокарде, усиливает рост и деление миофибрилл.

Применяется как вспомогательное средство при лечении сердечными гликозидами, а также при стенокардии, инфаркте миокарда, миокардиодистрофии, экстрасистолии, пароксизмальной тахикардии, частичном и полном блоке

Рр.: «Corhormon» 1,0

D. t. d. N. 10 in ampul.

(30 aut 100)

S. По 1—2 ампулы под кожу или в мышцу

**Кордиамид-кофеин —
Cordiamid-Coffeinum (ПНР)**

Состав на 1 ампулу:
Cordiamini 0,1
Coffeini-natrii salicylatis 0,1
Strychnini sulfatis 0,00025
Aquaе pro injectionibus ad 1 ml
Хранение — список А
Срок годности — 3 года

Сосудосуживающее и общетони-
зирующее средство.

Применяется при физическом и
умственном переутомлении, рас-
стройствах мозгового и перифериче-
ского кровообращения

Rp.: «Cordiamid-Coffeinum» 1 ml
D. t. d. N. 5 in ampul.
S. Под кожу по 1 ампуле 2—3 раза в день

Кордигит — Cordigitum

Препарат из сухих листьев на-
перстянки пурпуровой, содержа-
щий сумму гликозидов.

Выпускается в таблетках, со-
держащих по 0,0008 г препарата,
что соответствует по активности
0,1 г листьев наперстянки

Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте

Срок годности — контролирует-
ся ежегодно

По показаниям к применению и
свойствам близок к «Дигиток-
сину»

Rp.: Cordigiti 0,0008
D. t. d. N. 12 in tabul.
S. По $\frac{1}{2}$ —1 таблетке два раза в день

Корезид — Coresidum

Препарат, содержащий сумму
гликозидов из желтушника лев-
коного (*Erysimum cheiranthoi-*
des L.)

Выпускается в ампулах по 1 мл
0,05% раствора

Хранение — список А, в защи-
щенном от света месте

Срок годности — контролируют
ежегодно

По свойствам и показаниям ана-
логичен строфантину, несколько
менее активен

Rp.: Sol. Coresidi 0,05% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. По 0,5—1 мл в 10—20 мл 40% раствора глюкозы
внутривенно 1—2 раза в сутки (медленно!)

Корнерин — Cornerinum

Кристаллический гликозид, получаемый из листьев олеандра (*Nerium oleander* L.)

Выпускается в таблетках по 0,0001

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 1 год

По действию и применению близок к препаратам наперстянки (см. «Дигитоксин»)

Rp.: Cornerini 0,0001

D. t. d. N. 25 in tabul.

S. По 1 таблетке 3 раза в день

Коронтин — Corontin (ВНР)
N-(3'-Фенилпропил)-2'-(1,1-дифенилпропил)-3-амин лактат

Синонимы: Aminocor, Angiovigor, Angormin, Biocor, Carditin, Coropropil, Corax, Corvantin, Elecog, Falicor (ГДР), Diphrylum, Hostaginan, Incoran, Irrogin, Korodilat, Prenylamin (e), Reocorin, Rexcior, Segontin, Synadrin, Valecor, Wasangor

Выпускается в драже по 0,015

Хранение — список Б

Срок годности — 5 лет

Коронарорасширяющее средство, оказывает успокаивающее действие.

Применяется для систематического лечения стенокардии, в постинфарктном периоде

Rp.: Dragee «Corontin» 0,015

D. t. d. N. 30 (100)

S. По 2 драже 3 раза в день

Кортизона ацетат — Cortisoni acetat

11-Дегидро-17-оксикортикостерон-21-ацетат

Синонимы: Adreson, Cortadren, Cortelan, Cortilen, Cortisat(e), Cortistab, Cortogen Acetate

Выпускается в таблетках по 0,025

Срок годности — 3 года; после переконтроля — 2 года; Италия — не ограничен

Глюкокортикоид. По показаниям, противопоказаниям и свойствам аналогичен другим кортикостероидам (см. «Дексаметазон»)

Rp.: Cortisoni acetatis 0,025

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 1 таблетке 4 раза в день, с постепенным снижением дозы

**Кортикотропин для инъекций —
Corticotropinum pro
injectionibus**

Синонимы: Acethrophap, АСТН_x, Acthar, Acton, Actrope, Adrenocorticotrophin, Cibathen, Corticotrophinum, Cortrophin, Eхacthin (ВНР), Solanthyl

Выпускается в порошке во флаконах по 10, 20 или 40 ЕД

Хранение — в защищенном от света месте при температуре от 1 до 10°

Срок годности — 2 года

Гормон передней доли гипофиза. Применяется в тех же случаях, что и глюкокортикоиды (см. «Дексаметазон»)

Rp.: Corticotropini 10 ED (20 aut 40) ED

D. t. d. N. 6

S. Растворить перед употреблением в 1 мл воды для инъекций, вводить по 1 мл в мышцы 4 раза в сутки

Кортин — Cortinum

Синонимы: Cortigen, Eucortone, Supracort

Выпускается в ампулах по 1 мл с активностью 10 ЕД/мл

Хранение в защищенном от света и прохладном месте (1—10°)

Срок годности — 1 год

Вытяжка коры надпочечников, содержит гормоны коры надпочечников, в основном минералокортикоиды.

Применяется при недостаточности функции надпочечников (аддисонизме), астенических состояниях, гипотоническом синдроме с астенией и упадком питания

Rp.: Cortini 1,0 (10 ED)

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 1 мл 2 раза в день под кожу

Кортол — Cortol

Состав:

Olei Sesami aut Olei Persicorum Solutionis Ammonii caustici

aa 20,0

Olei Olivarum 40,0

Samphorae 2,0

Olei Myrrhae 1,0

Olei Pini silvestris 3,0

Olei Eucalypti 4,0

Olei Terebinthinae 10,0

Местнораздражающее средство.

Применяется для рефлекторной (отвлекающей) терапии заболеваний опорного аппарата (миозиты, радикулиты, артриты и пр.), а также заболеваний дыхательных путей (пневмония, бронхиты, ларингиты и пр.)

Rp.: Cortoli 60,0

DS. Для растирания

Корчорозид — Corchorosidum
Гликозид, содержащийся в семенах джута длинноплодного (*Corchorus olitorius*)

Синонимы: *Corchorosid A*, *Corchorozidum*, *Korchorozid*

Выпускается в ампулах по 1 мл 0,033% раствора

Хранение — список А, в прохладном, защищенном от света месте

Срок годности — контролируют ежегодно

Кардиотоническое средство, по свойствам и применению близкое к строфантину, отличается от последнего меньшей активностью и сравнительно более выраженным диастолическим действием

Rp.: Sol. Corchorosidi 0,033% 1,0

D. t. d. N. 6 in ampul.

S. По 0,5—1 мл в вену в 20 мл 20% раствора глюкозы.

Вводить медленно!

Корчагина спирт — Spiritus Kortschagini

Раздражающее и отвлекающее средство.

По применению и свойствам близок к «Капсину» и т. п. препаратам

Rp.: Tincturae Capsici

Spongillae fluviatilis āā 20,0

Olei Terebinthinae 40,0

Spiritus saponati 90,0

Spiritus aethylici 95% 85,0

Chloroformii 10,0

Solutionis Ammonii caustici 8,0

Aquae destillatae 76,0

MDS. Наружное

Кофальгин — Cofalginum
Состав на 1 таблетку:

Analгинi 0,3

Coffeini-natrii benzoatis 0,05

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 1 год

Болеутоляющее и жаропонижающее средство.

Применяется при головных болях, невралгии, лихорадочных состояниях и т. п.

Rp.: Tabul. «Cofalginum» N. 10

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Кофеидон — Coffeidon
Состав на 1 таблетку:

Amidopyrini 0,25

Coffeini-natrii benzoatis 0,05

По действию и применению аналогичен «Кофальгину»

Рр.: Tabul. Coffeidoni
D. t. d. N. 10
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Кофен-мите — Coffen-mite По свойствам и применению
Состав на 1 таблетку: аналогичен «Кофальгину»
Phenacetini 0,25
Coffeini 0,05
Хранение — список Б

Рр.: Tabul. «Coffen-mite» N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Кофен-форте — Coffen-forte Отличается от «Кофен-мите»
Состав на 1 таблетку: большим содержанием кофеина
Phenacetini 0,25
Coffeini-natrii benzoatis 0,1
Хранение — список Б

Рр.: Tabul. «Coffen-forte» N. 10
DS. По 1 таблетке при головной боли

Кофетамин — Coffetaminum Сосудосуживающее средство с
Состав на 1 таблетку: преимущественным действием на
Ergotamini tartratis 0,001 сосуды мозга.
Coffeini 0,1 Применяется при мигрени, арте-
Синонимы: Cofergot, Ergofein риальной гипотонии, а также для
(ЧССР), Ergoffin (ГДР) снижения внутричерепного давлени-
Хранение — список Б ния при сосудистых и травматиче-
Срок годности таблеток кофета- ских инфекционных поражениях
мина, покрытых оболочкой, — центральной нервной системы
2 года

Рр.: Tabul. «Coffetaminum» N. 10
DS. По 1—2 таблетки на прием во время приступа
головной боли 2 раза в день

Кофотесал — Cofothosal (ЧССР) Препарат незначительно сни-
Состав на 1 таблетку: жает артериальное давление и
Theobromini 0,3 усиливает работу сердца.
Coffeini 0,1 Применяется при гипертониче-
Хранение — список Б, в защи- ской болезни I стадии
щенном от света месте

Рр.: Tabul. «Cofothosal» N. 20
DS. По 1-таблетке 1—3 раза в день

Красногорского микстура —
Mixtura Krasnogorsky
Хранение — список Б

Успокаивающее и противоспа-
стическое средство.

Применяется при неврозах, не-
врастении, бессоннице, а также
при различных гиперкинезах (хо-
рея, паркинсонизм и т. п.)

Rp.: Phenobarbitali 0,5
Spiritus aethylici 3,0
Codeini 0,02
Tincturae Belladonnae
Natrii hydrocarbonatis
Antipyrini aa 1,0
Sirupi simplicis 30,0
Aquaе destillatae 150,0
MDS. По 1 чайной или десертной ложке 2—3 раза
в день

Краснушкина микстура —
Mixtura Krasnuschkini
Хранение — список А

Успокаивающее и противосудо-
рожное средство.

Применяется при неврастении,
неврозах, эпилепсии (большие при-
падки), судорожном синдроме раз-
личного происхождения. Пропись
№ 2 более эффективна как снотвор-
ное и противосудорожное средство

1. Rp.: Chlorali hydrati
Natrii bromidi aa 0,75
Phenobarbitali 0,25
Omnoponi 0,05
Adonisidi 5,0
Aquaе destillatae 250,0

2. Rp.: Chlorali hydrati
Natrii bromidi aa 7,0
Tincturae Valerianae 8,0
Adonisidi 3,0
Phenobarbitali 0,25
Omnoponi 0,05
Aquaе destillatae 250,0
MDS. По 1 чайной (столовой) ложке 1—3 раза в день.
При применении в качестве снотворного — 2
столовые ложки на ночь

Креде мазь — Unguentum Crede

Антисептическое средство.

Применяется в дерматологии
для лечения микробных пораже-
ний кожи

Rp.: Collargoli 3,0
Aquae destillatae 1,0
Lanolini aut Ceræ flavae 2,0
Axungiae porcinae 15,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Кризанол — Crysanolum

Представляет собой 5 или 10% суспензию смеси ауртопропанолсульфоната кальция и глюконата кальция в персиковом масле

Синонимы: Krizanol, Oleochryzine, Urizanol

Выпускается в ампулах по 2,2 мл 5 и 10% раствора и по 3,2 мл 10% раствора

Хранение — в обычных условиях

Срок годности — 1 год; после переконтроля — 6 мес.

Препарат золота, применяется при туберкулезе легочном и горланном, а также при красной волчанке, пемфигусе, проказе

Rp.: Susp. Crysanol 10% 3,2
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. Внутримышечно (в верхний наружный квадрант ягодицы). По схеме

**Кричевского жидкость —
Liquor Kritschewsky**

Антисептическое и кератолитическое средство.

Применяется для лечения грибковых поражений кожи

Rp.: Acidi salicylici 1,2
Iodi 1,0
Glycerini 10,0
Spiritus aethylici 70% 100,0
MDS. Наносить на пораженные участки кожи

Кромсан — Cromsan

Сосудосуживающее средство.

Применяется для лечения острого ринита

Rp.: Mentholi 10,0
Olei Menthae piperitae 1,5
Aetheris medicinalis 88,5
MDS. Жидкостью смачивают кусочек ваты и вкладывают в ноздрю

Ксикаин — Xycainum

2,6-Диметиланилида диэтиламиноуксусной кислоты гидрохлорид

Синонимы: Acetoxyline, Anestescain, Astracaine, Leostesin, Lidocain(e), Lidocaton, Lignostab, Maricain, Medicain, Ortosol, Solcain, Topilidon, Vasocaine, Xilina, Xylisin, Xyloton, Xylotox

Выпускается в порошке

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Местный анестетик.

Применяется для всех видов местной анестезии. Для инфильтрационной анестезии применяется 0,5% раствор (до 600 мл), для регионарной и перидуральной — 1—2% раствор (до 50 мл), для терминальной анестезии — 2% (реже 5%) раствор — не более 20 мл

Rp.: Solutionis Xycaini 0,5% (1—2%) 50 (100) ml.

Sterilisetur!

DS. Для местной анестезии

Хсилит — Xylitum

1, 2, 3, 4, 5-Пентанпентол

Синонимы: Kannit, Klinit, Xylitol

Выпускается в виде порошка

Хранение — в сухом месте

Желчегонное и слабительное средство. Обладает сладким вкусом и поэтому используется как заменитель сахара при диабете. В последнем случае послабляющее действие является побочным. Также используется при привычных запорах и нарушении выведения желчи (холециститы, дискинезия желчных путей)

Rp.: Xyliti 100,0

DS. Применять как желчегонное по 20,0 (столовая ложка) в $\frac{1}{2}$ стакана воды; как слабительное — по 2 столовые ложки (30—40 г) в стакане воды. При диабете используется вместо сахара, по $\frac{1}{2}$ —1 столовой ложке в день. Не следует применять на ночь

Кукушкина жидкость —

Liquor Kukulschkini

Хранение — в темном месте

Фунгицидное средство.

Применяется аналогично «Кастеллани жидкости»

Rp.: Solutionis Phenoli 5% 100,0

Spiritus aethylici 10,0

Acidi borici 1,0

Acetoni 5,0

Resorcini 10,0

MDS. Наружное

Приготовление: к водному раствору фенола прибавляют спирт и борную кислоту, через 2 ч добавляют ацетон, еще через 2 ч — резорцин

Куммерфельда жидкость —
Liquor Kummerfeldi

Антисептическое средство.
Применяется для лечения угрей,
себорей, псориаза и пр.

1. Rp.: Sulfuris 2,0
Glycerini 12,0
Spiritus camphorati 4,0
Spiritus Lavandulae
Oedocoloni aa 10,0
Aquaе destillatae 120,0
2. Rp.: Camphorae 1,0
Gummi arabici 2,0
Sulfuris praecipitati 12,0
Glycerini 5,0
Aquaе Rosae 40,0
Aquaе Calcis 45,0
MDS. Наружное, примочка

Купроль — Cuprol

Состав:
Cupri sulfatis 0,5
Unguenti Glycerini 15,0

Вяжущее и антисептическое
средство.
Применяется для лечения хро-
нических конъюнктивитов, блефа-
ритов и пр.

Rp.: Cuproli 15,0
DS. Намазывают на край век

Курантил — Curantyl (ГДР)
2,6-Бис[бис-(β-оксиэтил)-ами-
но]-4,8-дипиридинопиримидо-
(5,4-d)-пиримидин

Синонимы: Agacore, Apricor,
Cardioflux, Coribon, Corosan, Coro-
xin, Dilcor, Dipyridamol, Novodil,
Padicor, Permazin, Persantin
(ФРГ), Royalcor, Stenocardil, Ste-
porip, Stimolcardio, Trancocard

Выпускается в драже по 0,025
и в ампулах по 2 и 10 мл 0,5%
раствора

Хранение — список Б, в сухом
месте

Срок годности — 3 года

Препарат вызывает избиратель-
ное расширение коронарных сосу-
дов и улучшает коронарное крово-
обращение.

Применяется при острой и хро-
нической коронарной недостаточ-
ности, для профилактики и лече-
ния инфаркта миокарда

Rp.: Drag. «Curantyl» 0,025
D. t. d. N. 30
S. По 2 драже 3 раза в день с последующим пони-
жением дозы до 2—3 драже в день за 1 ч до еды

Rp.: Sol. «Curantyl» 0,5% 2 ml (10 ml)
D. t. d. N. 5 in ampul.
S. Внутривенно по 2—5 мл ежедневно

Курбин — Curbin

Противоглистное средство.
Применяется в детской практике
при инвазии ленточными глистами

Rp.: Pulveris glandulari Rottlerae
tinctoriae 10,0
Pulveris seminis Cucurbitae 30,0
MDS. По 1 столовой ложке на прием

Кутизон — Cutizonum

n-Изопропилбензальдегида тио-
семикарбазон

Выпускается в таблетках по
0,005

Хранение — в обычных усло-
виях

Препарат применяется для ле-
чения вирусного гриппа

Rp.: Cutizoni 0,005
D. t. d. N. 6 in tabul.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день в течение 2—3 дней

Кутопур — Cutopur (ЧССР)

Состав:

Acidi salicylici 0,95

Zinci oxydi 15, 56

Ichthyoli 1,6

Magnesii oxydi 11,33

Olei jecoris Aselli 3,83

Anaesthesini 0,16

Talci 16, 6

Calcii hydroxydi 2,0

Basis unguenti ad 100,0

Выпускается в тубах по 30,0

Антисептическое и противовоспа-
лительное средство.

Применяется для лечения язв,
экземы, ожогов и др.

Rp.: Ung. «Cutopur» 30,0
DS. Наносить на пораженные участки кожи

**Кутумовой линимент —
Linimentum Kutumovae**

Антимикробное средство для на-
ружного применения, содержащее
сульфаниламидный препарат.

Применяется для лечения про-
дермии, инфицированных экзем и
поверхностных ран

Rp.: Norsulfazoli solubilis 5,0
Olei Vaselini 45,0
Lanolini 5,0
Emulgentis T-1 aut T-2 15,0
Aquaе destillatae 30,0
M. f. linimentum

DS. Наносить на пораженную поверхность
Приготовление: норсульфазол растворяют в воде и жидкость эмуль-
гируют сплавом ланолина, вазелинового масла и эмульгатора

Лазикс — Lasix (ФРГ, СФРЮ)
4-Хлор-N-(2-фурилметил)-5-
сульфамойлантрилиловая кислота
Синонимы: Frusemide, Furosemidum (ПНР), Fursemide, Lasilix, Seguril

Выпускается в таблетках по 0,04 и в ампулах по 2 мл 2% раствора

Хранение — список Б
Срок годности СФРЮ — 5 лет
Фуросемид ПНР — не ограничен

Мочегонное средство.
Применяют при отеках сердечного происхождения, при заболеваниях почек, циррозах печени, сопровождающихся асцитом. Препарат отличается быстрым наступлением эффекта, в связи с чем может применяться при отеке легких и мозга, отравлениях и пр. — в тех же случаях, что и осмотические диуретики (см. «Маннитол»)

Rp.: Tabul. «Lasix» 0,04
D. t. d. N. 100
S. Дозы индивидуальны. В легких случаях — по 1 таблетке 1 раз в день, в более тяжелых — по 2—3 таблетки в день или через день
Rp.: Sol. «Lasix» 1% 2 ml.
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. Внутривенно до 2 раз в день

Лаксафел — Laxafel (ЧССР)
Состав на 1 драже:
Isapthenini 0,005
Acidi choleinici 0,025
Olei Menthae 0,001
Хранение — список Б

Слабительное средство.
Показание — см. «Изафенин»

Rp.: Dragee «Laxafel» N. 20
DS. По 1—4 драже на ночь, детям $\frac{1}{2}$ —1 драже

Ланакордал — Lanacordal (ЧССР)
Комплекс кристаллических гликозидов А, В и С из наперстянки шерстистой (Digitalis lanata)
Выпускается в драже по 0,00025
Хранение — список А
Срок годности — 6 лет

Кардиотоническое средство.
По свойствам и применению близко к «Абизину» (см.)

Rp.: Drag. «Lanacordal» 0,00025
D. t. d. N. 20
S. По 1 драже 1—2 раза в день

Ланол — Lanol
Срок годности — 2 года

Кератолитическое средство.
По применению аналогично «Адол» (см.)

Rp.: Acidi borici
Acidi salicylici āā 10,0
Lanolini 20,0
M. f. pasta
DS. Наружное

Ланолимент борный сложный —
Lanolimentum Boracis
compositum

Антисептическое и смягчающее
кожу средство.

Применяется как косметический
препарат, а также для лечения
угрей, фолликулитов и пр.

Rp.: Natrii tetraboratis 1,0
Acidi borici
Acidi benzoici āā 3,0
Balsami peruviani aut Vinylini 5,0
Tincturae Benzoës 10,0
Glycerini 5,0
Aquae Rosae 10,0
Lanolini anhydrici 40,0
MDS. Наружное

Ланолимент бороглицериновый —
Lanolimentum Boroglycerini

Антисептическое и смягчающее
кожу средство.

Применяется в тех же целях,
что и предыдущая пропись

Rp.: Acidi borici 2,0
Glycerini 8,0
Aquae destillatae
Paraffini āā 40,0
Olei Vaselini 100,0
Lanolini anhydrici 10,0
Olei Bergamottae
Olei Citri āā 1,0
MDS. Наружное

Приготовление: борную кислоту растворяют при нагревании в гли-
церине и добавляют воду. Отдельно сплавляют парафин, ланолин
и вазелиновое масло. Смешивают оба раствора и добавляют эфирные
масла.

Ланолимент дегтярный —
Lanolimentum Picis liquidae

Антисептическое и раздражаю-
щее средство.

Применяется для лечения вяло
текущих поверхностных гнойных
поражений кожи

Rp.: Picis liquidae 10,0
Lanolini anhydrici 70,0
Olei Vaselini 20,0
MDS. Наносить на пораженные участки кожи

**Ланолимент камфорно-
феноловый — Lanolimentum
Camphorae phenolatum**

Антисептическое средство. Раздражает кожу, вызывая расширение сосудов и улучшение периферического кровообращения.

Применяется для лечения отморожений I—II степени

Rp.: Olei camphorati 25,0
Lanolini anhydrici 65,0
Phenoli
Balsami peruviani aut Vinylini āā 5,0
MDS. Наносить на пораженные участки кожи

**Ланолимент
ментоло-салоловый —
Lanolimentum Mentholi cum
Phenylii salicylate.**

Местнораздражающее и противовоспалительное средство.

Применяется для отвлекающей терапии заболеваний опорного аппарата и внутренних органов (миозиты, радикулиты, пневмонии и бронхиты и т. п.)

Rp.: Phenylii salicylatis 2,0
Mentholi 1,0
Olei Olivarum 15,0
Lanolini anhydrici 45,0
MDS. Для растирания

**Ланолимент резорциновый —
Lanolimentum Resorcini**

Антисептическое средство.

Применяется в основном в косметических целях, а также при угрях и фолликулитах

Rp.: Resorcini 3,0
Aquae Rosae 30,0
Lanolini anhydrici 50,0
Axungiae porcinae benzoatae 17,0
MDS. Наружное

**Ланолимент свинцовый —
Lanolimentum Plumbi**

Вяжущее и противовоспалительное средство.

Применяется для лечения ушей и мелких ссадин

Rp.: Lanolini anhydrici 40,0
Axungiae porcinae benzoatae 10,0
Solutionis Plumbi subacetatis 50,0
MDS. Наносить на пораженные участки кожи

<p>Ланолимент серный — Lanolimentum Sulfuris</p>	<p>Препарат применяется для лечения различных кожных заболеваний (себореи, сикоза, псориаза и т. п.)</p>
<p>Rp.: Sulfuris depurati 30,0 Lanolini 70,0 MDS. Наносить на пораженные участки кожи</p>	
<p>Ланолимент серный сложный — Lanolimentum Sulfuris compositum</p>	<p>Показания к применению те же, что и для «Ланолимента серного»</p>
<p>Rp.: Sulfuris depurati Zinci sulfatis aa 10,0 Calcii carbonatis depurati 10,0 Lanolini 50,0 Saponis kalini 20,0 MDS. Наносить на пораженные участки кожи</p>	
<p>Ланолимент цинково-серный — Lanolimentum Zinci sulfuratum</p>	<p>Антисептическое и подсушивающее средство. Применяется для лечения различных кожных заболеваний, особенно сопровождающихся мокнутием</p>
<p>Rp.: Zinci oxydi 20,0 Sulfuris praecipitati 10,0 Olei Vaselini 20,0 Lanolini 50,0 MDS. Наносить на пораженные участки кожи</p>	
<p>Ланолимент цинковый — Lanolimentum Zinci</p>	<p>По свойствам и применению близок к предыдущей прописи</p>
<p>Rp.: Zinci oxydi 10,0 Axungiae porcinae benzoatae 25,0 Lanolini 65,0 MDS. Наносить на пораженные участки кожи</p>	
<p>Лародора — Larodora L-Диоксифенилаланин Синонимы: Dopa-flex α — Dopa, Levodopa Выпускается в таблетках по 0,5 Хранение — в обычных условиях Срок годности — 5 лет</p>	<p>Антипаркинсоническое средство, предшественник медиатора дофамина. Применяется для лечения паркинсонизма и других экстрапирамидных расстройств различного происхождения самостоятельно и в сочетании с холинолитиками (см. «Циклодол», «Норакин»). Противопоказан при феохромоцитоме, тиреотоксикозе, тяжелых поражениях печени и почек, острым психомоторном возбуждении</p>

Rp.: Tabul. «Larodopa» 0,5

D. t. d. N. 50

S. Начиная с суточной дозы 0,125 (1/4 таблетки 3 раза в день), довести к 7-му дню дозу до 1,0 (1/2 таблетки 4 раза в день)

Ларусан — Larusanum
Фурфуральацетона изоникотиноилгидразон

Выпускается в таблетках по 0,1; 0,3 и 0,5 г

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 5 лет

Дополнительный срок годности после переконтроля — 3 года

Противотуберкулезное средство. По действию сходен с фтивазидом

Rp.: Larusani 0,1 (0,3 seu 0,5)

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. Детям в возрасте 5—8 лет по 0,05 г 3 раза в сутки. Детям старшего возраста — по 0,1 г 3 раза в сутки, взрослым — 0,1—0,3 г 3 раза в сутки (до еды)

Ласонил — Lasonil (СФРЮ)
100,0 мази содержит 5000 ЕД синтетического гепарина и 15 000 ЕД гиалуронидазы

Выпускается в тубах по 40,0

Хранение — в обычных условиях

Средство, понижающее свертываемость крови, для наружного применения. Используется для лечения поверхностных тромбозов, а также язв голени, ушибов, геморроя с явлениями тромбоза. От «Мази гепариновой» выгодно отличается присутствием гиалуронидазы, облегчающей проникновение антикоагулянта к очагу поражения

Rp.: Ung. «Lasonil» 40,0

DS. Для нанесения на пораженную поверхность

Лассара паста — Pasta Lassari
Паста цинково-салициловая — Pasta Zinci salicylata

Срок годности — 3 года; после переконтроля — 1 1/2 года

Антисептическое, подсушивающее и вяжущее средство.

Применяется для лечения многих кожных заболеваний (дерматиты, экземы и пр.), особенно сопровождающихся мокнутием

Rp.: Acidi salicylici 2,0

Zinci oxydi

Amyli tritici aa 25,0

Vasellini flavi 48,0

M. f. pasta

DS. Наносить на пораженные участки кожи

Лашкевича микстура —
Mixtura Laschkevitschy

Общетонизирующее, антацидное
и холинолитическое средство.

Применяется для лечения ост-
рых и хронических гиперацидных
гастритов

Rp.: Tincturae Strychni
Natrii hydrocarbonatis āā 4,0
Extracti Belladonnae 0,12
Aquae Menthae piperitae ad 180,0
MDS. По 1 столовой ложке после еды

Лебедева пластырь —
Emplastrum Lebedevi

Препарат применяется для ле-
чения красной волчанки

Пластырь акрихиновый —
Emplastrum Acrichini

1. Rp.: Acrichini
Spiritus aethylici 96%
Aquae destillatae āā 10,0
Lanolini anhydrici 20,0
Emplastri Plumbi simplicis 50,0

2. Rp.: Acrichini
Spiritus aethylici 95%
Aquae destillatae
Lanolini anhydrici āā 10,0
Methylis salicylatis 15,0
Emplastri Plumbi simplicis 45,0
MDS. Наносить на пораженную поверхность кожи

Левомепромазин —
Laevomepromazinum

Лево-2-метокси-10-(2-метил-3-
диметиламинопропил)-фенотиази-
на гидрохлорид

Синонимы: Hiranamin, Levopro-
me, Levopromazin (ЧССР), Met-
hotrimепrazine, Minozinan (ФРГ),
Neozine, Neuractil, Neurocil, Nir-
van, Nozinan, Sinogan, Tisercin
(ВНР), Veractil

Выпускается в драже по 0,025 и
в ампулах по 1 мл 2,5% раствора
Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте

Срок годности — 5 лет, «Тизер-
цина» — 2 года

Нейролептическое средство. Об-
ладает также анальгетической
активностью.

По показаниям к применению
сходен с «Аминазином». В отличие
от последнего не вызывает депрес-
сии, напротив, обладает сильным
антидепрессивным действием.
Вследствие этого препарат приме-
няется также для лечения депрес-
сивного синдрома различного про-
исхождения. Анальгетические
свойства делают его препаратом
выбора из нейролептиков при пре-
медикации. Противопоказания —
общие для нейролептиков (см.
«Аминазин», «Галоперидол»)

Rp.: Laevomepromazini 0,025
D. t. d. N. 30 in dragee
S. По 1 драже 2—3 раза в день, повышая до 3—5
драже 2—3 раза в день, а затем снижая до 1—1/2,
драже в сутки

Rp.: Sol. Laevomepromazini 2,5% 1 ml

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. Внутримышечно, начиная с 1—2 мл в сутки, при необходимости доведя до 10—12 мл в сутки, после чего переходят на прием внутрь

Левомицетин — Laevomycetinum

D-(-)-трео-1-*n*-нитрофенил-дихлорацетиламинопропандиол-1,3

Синонимы: Alficetyn, Berlicetin, Biophenicol, Chlomin, Chloramphenicolum, Chlornitromycin, Chlorocid (ВНР), Chlorocol, Chlomycetina, Dextromycina, Dextromycetin, Leukomycin, Paraxin, Synthomycetin, Tifomycetin, Турмомисин, Wintefil и др.

Выпускается в таблетках и суппозиториях по 0,1; 0,25 и 0,5 и в ампулах по 0,5 (1,0) (ВНР)

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 5 лет; после переконтроля — 3 года

Антибиотик широкого спектра действия. Активен против большинства патогенных бактерий, как грамположительных, так и грамотрицательных, против риккетсий, спирохет и крупных вирусов.

Применяется для лечения кишечных инфекций — брюшного тифа и паратифов, дизентерии, сальмонеллезов — бруцеллеза, туляремии, сыпного тифа, трахомы, пситтакоза, а также для лечения заболеваний, вызванных вульгарной микрофлорой, устойчивой к бактерицидным антибиотикам (группе пенициллина, стрептомицина и пр.)

Rp.: Laevomycetini 0,1 (0,25; 0,5)

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 0,5 через 4 ч

Rp.: Sol. «Chlorocid» 0,5 (1,0)

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. По 1 ампуле в мышцы 2 раза в сутки

Лейкоген — Leucogenum

2-(α -фенил- α -карбэтоксиметил)-тиазолидин-4-карбоновая кислота

Синонимы: Leikogen, Leuk

Выпускается в таблетках по 0,02

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 4 года

Стимулятор лейкопоза.

Применяют при лейкопениях различного происхождения

Rp.: Leucogeni 0,02

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 1 таблетке 3 раза в день

Леморан — Laetogonin
(—)-3-Окси-*N*-метил-морфинана
гартрат

Синонимы: Aromagon, Dromogon, Lävorphän, Levo-Dromogon, Levorphan, Levorphanol

Выпускается в таблетках по 0,002 и в ампулах по 1 мл 0,2% раствора. Отпускается в соответствии с правилами отпуска препаратов группы морфина

Срок годности таблеток — 1 год

Наркотический анальгетик, по свойствам близкий к морфину, но несколько более сильный.

Применяют как болеутоляющее средство при травмах, при подготовке к операциям и в послеоперационном периоде, при различных заболеваниях, сопровождающихся болевыми приступами (инфаркт миокарда, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистит и др.). Главные осложнения — угнетение дыхания и пристрастие (как и при применении морфина)

Rp.: Laetogani 0,002
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1 таблетке при болях

Rp.: Sol. Laetogani 0,2% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. По 1 мл под кожу 2—3 раза в день (взрослому)

Ленбирен — Lenbiren (СРР)
Состав на 1 драже:
Phenobarbitali 0,03
Ergotali 0,0003
Radobelini 0,00025

Хранение — список Б
Срок годности — 2 года

Холинолитическое, адренолитическое и успокаивающее средство. По составу и действию близко к «Беллатаминалу».

Применяется при неврозах, климаксе, головной боли, вегетативных расстройствах. Противопоказан при беременности, тяжелом атеросклерозе, стенокардии

Rp.: Drag. «Lenbiren» N. 10
DS. По 1 драже 3 раза в день

**Лепского линимент —
Linimentum Lepsky**
Приготовление: парафин сплавляют с хлопковым маслом и добавляют при тщательном перемешивании этикридин

Антисептическое средство.
Применяется для лечения травматических повреждений кожи

- Rp.: Paraffini 75,0
Olei Gossypii (Persicorum) 24,0
Aethacridini lactatis 1,0
 - Rp.: Paraffini 75,0
Olei Jecoris Aselli 25,0
M. f. linimentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи
-

Леспенефрил — Lespenephryl
(Франц.)

Настойка из растения леспедеза голочатая (*Lespedeza capitata* Mich.)

Содержит флавоны и другие биологически активные вещества
Действующее вещество — 3,4', 5,7-тетраоксифлаво-3,7-дирамнозид.

Синонимы: Lespedin

Выпускается во флаконах по 20, 60 и 125 мл, содержащих 15% настойки *Lespedeza capitata*, и 70% спирт

Средство, снижающее уровень остаточного азота в крови.

Применяется при азотемии различного происхождения, в том числе при острых и хронических нефритах, а также при атеросклерозе

Rp.: «Lespenephryl»

20 ml (60 aut 125 ml)

DS. По 15—50 капель 4 раза в день. В первый день — до 70—100 капель на прием

Лецитин-церебро —
Lecithin-cerebro

Получают путем экстракции из мозга крупного рогатого скота
Каждое драже содержит 0,05—0,1 лецитина и органически связанного фосфора — 3,5%

Хранение в сухом, защищенном от света месте

Срок годности — 1 год

Фосфорсодержащий препарат.

Применяется при истощении нервной системы, при общем упадке сил, малокровии и рахите

Rp.: Lecithini-cerebro 0,05 (0,1)

D. t. d. N. 50 in dragee

S. По 1—2 драже 3 раза в день до еды

Либексин — Libexin (ВНР)
3-(2,2-Дифенилэтил)-5-(2-пиперидиноэтил)-1,2,4-оксадиазола гидрохлорид

Выпускается в таблетках по 0,1

Хранение — список Б

Срок годности — 5 лет

Противокашлевое средство.

Применяют при острым и хроническом бронхите, гриппе, пневмонии, бронхиальной астме, эмфиземе легких, при подготовке больных к бронхоскопическим и бронхографическим вмешательствам и т. п. Либексин не вызывает побочных явлений и пристрастия

Rp.: Tabul. «Libexin» 0,1

D. t. d. N. 20

S. По 1—2 таблетки 3—4 раза в сутки

Либриум — Librium

7-Хлор-2-метиламино-5-фенил-3Н-1,4-бензодиазепин-4-оксида гидрохлорид

Синонимы: Ansiacal, Balance, Bent, Benzodiazepin, Benzodiazepin, Binomil, Cebrium, Chlordiazepoxid(e), Clopoxidii chloridum, Contol, Decadil, Dienrax, Disarim, Dоnаrах, Elenium (ПНР), Endequil, Equibral, Huberplex, Jubilar, Kalmocaps, Labican, Labiton, Lixin, Mesural, Methaminediazepoxide, Mildmen, Napoton (ВНР), Novosed, Omnalio, Paxium, Psichial, Psicofar, Psiconor, Psicosan, Psicosedin, Psicoterina, Reliberan, Reposal «Ocefa», Serenivita, Smail, Sonia, Sonimen, Viansin, Viopsicol

Выпускается в таблетках (драже) по 0,005, 0,025 и 0,01

Хранение — список Б

Срок годности — 2 года; Эле-ниум ПНР — не ограничен

«Малый» транквилизатор.

Применяют для устранения тревоги, напряжения при различных неврозах, для лечения спастических состояний, подобно «Мепробамату». Не рекомендуется назначать совместно с другими психотропными препаратами. См. также «Валиум»

Rp.: Librii 0,005 (0,01—0,025)

D. t. d. N. 50 in tabul.

S. По 0,005—0,01 г 2—3—4 раза в день

Ливиклиман — Liviclman (ЧССР)

Состав на 1 драже:

Oestroni 0,000025 (250 ED)

Thiamini hydrochloridi 0,005

Phenobarbitali 0,02

Theobromini 0,05

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 5 лет

Комбинация женского полового гормона (эстрогена) с успокаивающими средствами.

Применяется в климактерическом периоде, при вегетативных расстройствах

Rp.: Dragee «Liviclman» N. 30

D. S. По 1—2 драже 3 раза в день

Лидокаин-адреналин — Lidocain-adrenalin (ВНР)

Состав одной ампулы (1 мл):

Xucaini 0,005 (0,01—0,02)

Adrenalini hydrochloridi 0,00001

Aquae pro injectionibus ad 1 ml

Хранение — список Б

Срок годности — 2 года

Комбинация «Ксикаина» и адреналина. Отличается от первого более длительным действием.

По применению аналогичен «Ксикаину».

Rp.: Sol. «Lidocain-adrenalin» 1 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. Для местной анестезии.

Ликватол — Liquatolum

Состав:

Trinitrotoluoli 1,5
Acetoni 25,0
Glycerini 2,0
Spiritus aethylici 75,0

Выпускается во флаконах темного стекла по 50 мл

Хранение — список Б, в темном месте

Антисептическое и фунгистатическое средство.

Применяется для лечения поверхностных дрожжевых поражений кожи, а также при себорее, дерматитах, экземе и др. При всасывании тринитротолуола возможно возникновение метгемоглобинемии (цианоз, головная боль)

Rp.: Liquatoli 50 ml

DS. Втирать в пораженные места 2—3 раза в день

Ликвиритон — Liquiritonum

Новогоаленовый препарат из корня солодки (*Glycyrrhiza glabra*)

Содержит флавоноиды (не менее 55%)

Выпускается в таблетках по 0,1

Хранение — в сухом прохладном месте

Срок годности — 2 года

Противовоспалительное, спазмолитическое и антацидное средство.

Применяется для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гиперацидного гастрита, для профилактики и лечения обострений данных заболеваний

Rp.: Liquiritoni 0,1

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 1—2 таблетки 3—4 раза в день до еды в течение месяца

Ликорина гидрохлорид — Lycorini hydrochloridum

1,2-Диокси-9,10-метилendiокси-7Н, 1, 2, 4, 5, 12, 12а-гексагидропироло (3,2,1-d, e)-фенантридина гидрохлорид

Алкалоид растений сем. амарилисовых и лилейных

Выпускается в таблетках по 0,0001 и 0,0002

Хранение — список А, в прохладном темном месте

Срок годности — 2 года

Отхаркивающее средство рефлекторного действия. В больших дозах вызывает рвоту.

Показания и противопоказания такие же, как и для других рвотных и отхаркивающих средств (см. «Настойка рвотного корня»)

Rp.: Lycorini hydrochloridi 0,0001 (0,0002)

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в сутки

Лимован — Limovan (таблетки);
Лимованил — Limovanyl
(ампулы) (ВНР)

Состав на 1 таблетку:
Aethynploestradioli 0,00001
Praegnini 0,01

Состав на 1 ампулу масляного
раствора (1 мл) или водной суспен-
зии:

Oestradioli benzoatis 0,0025
Progesteroni 0,0125

Гормональный препарат — ком-
бинация эстрогена и прогестагена.

Применяют при привычном
аборте: еженедельно в течение
20 недель по 2—3 масляных инъек-
ции или вначале еженедельно по
1—2 ампулы на протяжении 5 не-
дель, а затем еженедельно по 1 мл
суспензии. При вторичной амено-
рее: в течение 2 дней по 1 ампуле
масляного раствора или 2 ампулы
водной эмульсии одновременно
или ежедневно по 4 таблетки в те-
чение 5 дней

Rp.: Tabul. «Limovan» N. 20
DS. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Rp.: Sol. «Limovanyl» oleosae 1 ml.
D. t. d. N. 5 in ampul.
S. По 1 ампуле внутримышечно в течение 5 дней

Rp.: Suspensionis «Limovanyl» 1 ml.
D. t. d. N. 12 in ampul.
S. По 3 ампулы внутримышечно одновременно

Линетол — Linaetholum

Препарат, полученный из льня-
ного масла. Содержит смесь этило-
вых эфиров ненасыщенных жир-
ных кислот: олеиновой (15%), ли-
нолевой (15%) и линоленовой
(57%); содержание насыщенных
кислот составляет 9—11%

Выпускается во флаконах по
100,0

Хранение — в прохладном, за-
щищенном от света месте

Срок годности — 2 года; после
переконтроля — 1 год

Rp.: Linaetholi 100,0
DS. Внутрь по 1 столовой ложке утром до или
во время еды 1 раз в день

Антихолестеринемическое сред-
ство.

Применяют внутрь для профи-
лактики и лечения атеросклероза.
Лечение проводят длительно, не-
прерывно или курсами по 1—
1½ месяца с перерывами в 2—
4 месяца. Наружно применяют при
ожогах и лучевых поражениях
кожи

Линимент алоэ — Linimentum Aloës

Состав:
Succi folii Aloës 78,0
Olei Ricini
Emulgentis aa 11,0
Olei Eucalypti 0,1

Выпускается в банках по 100 мл
Срок годности — 1 год

Биогенный стимулятор.

Применяется для профилактики
поражений кожи при лучевой
терапии

Rp.: Linimenti Aloës 100,0
DS. Наносить тонким слоем на пораженную поверхность 2—3 раза в сутки

**Линимент аммиачный —
Linimentum ammoniatum** — Местнораздражающее средство.
Срок годности прописи № 2 — 6 мес. Применяется для отвлекающей терапии радикулитов, артритов, миозитов и пр.

1. Rp.: Olei Olivarum
Olei Sesami
Solutionis Ammonii caustici āā 10,0
 2. Rp.: Olei Helianthi 74,0
Solutionis Ammonii caustici 25,0
Acidi oleinici 1,0
M. f. linimentum
DS. Наружное
-

**Линимент беленного масла
сложный — Linimentum Olei
Hyoscyami compositum** — Свойства и применение — см.
предыдущую пропись

1. Rp.: Olei camphorati
Olei Hyoscyami
Chloroformii āā 30,0
 2. Rp.: Olei Hyoscyami
Solutionis Ammonii caustici
Methylii salicylatis āā 30,0
M. f. linimentum
DS. Для растирания
-

**Линимент беленного масла
хлороформный — Linimentum
Olei Hyoscyami chloroformiatum** — Раздражающее и анестезирующее средство.
Применяется для лечения заболеваний опорного аппарата — миозитов, артритов, а также для лечения радикулитов, невритов и невралгии

Rp.: Chloroformii
Olei Hyoscyami āā 40,0
M. f. linimentum
DS. Для растирания

**Линимент борно-цинковый —
Linimentum Acidi borici
et Zinci oxydi** — Антисептическое и подсушивающее средство.
Применяется для лечения различных кожных заболеваний, сопровождающихся мокнутием

1. Rp.: Zinci oxydi 10,0
Acidi borici 1,0
Olei Helianthi 40,0
Amyli 2,0
Talci 8,0

2. Rp.: Zinci oxydi 10,0
Acidi borici 1,0
Olei Helianthi 40,0
M. f. linimentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Линимент вазелиновый —
Linimentum Vaselini

Индифферентная основа для жидких мазей

Rp.: Vaselini 60,0
Emulgentis T-1 aut T-2 10,0
Aquae destillatae 30,0
M. f. linimentum
DS. Наружное

Приготовление: расплавляют твердый эмульгатор, добавляют вазелин, в расплавленную массу вливают горячую воду и тщательно перемешивают

Линимент випералгиновый —
Linimentum Viperalgini

По свойствам и применению препарат аналогичен «Випералгину». Применяется наружно

Rp.: Viperalgini 0,0004
Solutionis Natrii chloridi isotonicae 2,0
Lanolini anhydrici
Olei Ricini aa 35,0
Camphorae 5,0
Methylis salicylatis 20,0
Solutionis Ammonii caustici 3,0
M. f. linimentum
DS. Для растирания

Приготовление: к содержимому 4 ампул випералгина добавляют 2 мл изотонического раствора хлорида натрия и растирают в ступке с 4,0 ланолина. Остальной ланолин сплавляют на водяной бане с касторовым маслом и после охлаждения добавляют малыми порциями к первой смеси, тщательно перемешивая. Отдельно растворяют камфору в метилсалицилате и смешивают с основной массой. Сюда же постепенно прибавляют раствор аммиака.

Линимент известковый —
Linimentum Calcariae

Вязущее средство. Обладает слабыми антисептическими свойствами.

Применяется для лечения ожогов I—II степени

Rp.: Aquae Calcis
Olei Lini āā 50,0
M. f. linimentum
DS. Для обработки ожогов

**Линимент ихтиоловый —
Linimentum Ichthyoli**

Вязущее, противовоспалительное и антисептическое средство.
Применяется для лечения ожогов I—II степени

Rp.: Ichthyoli 2,0
Lanolini 5,0
Vaselini 10,0
Aquae Calcis 13,0
M. f. linimentum
DS. Для обработки ожогов

**Линимент йодно-камфорный —
Linimentum Iodi camphoratum**
Перед употреблением взбалтывать

Антисептическое и вязущее средство.
Применяется для лечения отморожений I—II степени

Rp.: Solutionis Iodi spirituosae 5—10% 10,0
Olei camphorati
Aquae Calcis āā 50,0
M. f. linimentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

**Линимент йодно-мыльный—
Linimentum Kalii iodidi
saponatum**

Местнораздражающее средство.
По свойствам и применению близок к «Линименту аммиачному» и т. п. препаратам

Rp.: Saponis oleosi 96,0
Spiritus aethylici 90% 300,0
Olei Rosmarini 3,0
Olei Thymi 1,5
Kalii iodidi 48,0
Aquae destillatae 36,0
M. f. linimentum
DS. Для растирания

**Линимент йодно-парафиновый —
Linimentum Iodi paraffinatum**

По свойствам и применению аналогичен «Линименту йодно-мыльному». Известен в быту как мазь «Огонек»

Rp.: Paraffini 14,0
Chloroformii 12,0
Spiritus aethylici 96%
Solutionis Iodi spirituosae āā 10,0
M. f. linimentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Линимент йодно-феноловый —
Linimentum Iodi phenolatum

Антисептическое средство.
Применяется для лечения по-
верхностных инфекционных забо-
леваний кожи (рожа, эризипеллоид
и пр.)

Rp.: Phenoli
Solutionis Iodi spirituosae
Spiritus aethylici āā 2,0
Olei Terebinthinae rectificati 4,0
Glycerini 10,0
M. f. linimentum
DS. Взбалтывать и смазывать кисточкой воспалиен-
ные части тела

Линимент камфорно-аммиачный
Linimentum Camphorae
ammoniatum

Местнораздражающее средство.
По применению аналогично «Ли-
нименту аммиачному»

Rp.: Olei camphorati 30,0
Olei Sesami aut Helianthi
Solutionis Ammonii caustici āā 10,0
M. f. linimentum
DS. Растирание

Линимент камфорно-мыльный —
Linimentum Camphorae
saponatum

Все прописи обладают местно-
раздражающим действием и ис-
пользуются для рефлекторной ст-
влекающей терапии артритов, ра-
дикулита, ишиаса, люмбаго, мио-
зитов, невритов и невралгий и т. п.

1. Rp.: Saponis medicati 40,0
Spiritus aethylici 90% 420,0
Camphorae 10,0
Olei Citri 5,0
Olei Rosmarini 2,0
Olei Thymi 1,0
Solutionis Ammonii caustici 25,0

Приготовление: мыло растворяют в спирте при нагревании на водя-
ной бане, после чего прибавляют камфору. После этого жидкость филь-
руют, добавляют эфирные масла и аммиак, разливают в склянки, заку-
поривают и ставят в холодную воду для охлаждения

2. Rp.: Natrii carbonatis
Aquae calidae āā 5,0
Spiritus aethylici 10,0
Acidi stearinici 2,5
Spiritus aethylici 90% 40,0
Camphorae 1,25

Olei Thymi 0,15
Olei Rosmarini 0,3
Solutionis Ammonii caustici 2,5

Приготовление: воду, 10 мл спирта и карбонат натрия смешивают и нагревают до полного удаления углекислоты и растворения смеси, затем добавляют остальной спирт. После охлаждения вносят остальные ингредиенты и фильтруют

3. Rp.: Spiritus camphorati 60,0
Spiritus saponati 175,0
Solutionis Ammonii caustici 12,0
Olei Thymi 1,0
Olei Rosmarini 2,0

Приготовление: растворяют эфирные масла в смеси спиртов и добавляют аммиак

4. Rp.: Spiritus saponati 10,0
Camphorae
Olei Amygdalarum āā 1,0
Spiritus aethylici 90% 8,0
M. f. linimentum
DS. Растирание

Линимент квасцовый сложный —
Linimentum Aluminis
compositum

Вяжущее, антисептическое и дезодорирующее средство

Rp.: Aluminis 4,0
Albuminis ovi N. 2
Spiritus camphorati 2,0
M. f. linimentum
DS. Наружное

Линимент ксероформный —
Linimentum Xeroformii

По свойствам препарат близок к «Линименту Вишневого».
Применяется для перевязок при лечении инфицированных ран

Rp.: Xeroformii 1,2
Olei Ricini 20,0
Vinylini 1,0
M. f. linimentum
DS. Для перевязок

Линимент левомицетиновый —
Linimentum Laevomycetini

Антимикробное средство. Спектр антимикробного действия определяется «Левомицетином» (см.).

Применяется для лечения инфицированных ран, ожогов и заболеваний кожи, вызванных преимущественно стрепто- и стафилококками (пиодермия, сикоз, фолликулит и пр.)

Rp.: Laevomycetini 2,0
Zinci oxydi 10,0
Olei Persicorum 60,0
Thymoli 0,4
Vitelli Ovi 45,0 (N. 3)
Aquaе destillatae ad 200,0
M. f. linimentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи,
Приготовление: левомецетин растирают в ступке с тремя куриными желтками. Отдельно готовят взвесь окиси цинка в масляном растворе тимола и прибавляют ее к первой смеси небольшими порциями при тщательном растирании. После полной гомогенизации при растирании добавляют небольшими порциями воду

**Линимент медово-перцовый —
Linimentum Melis capsicum**

Антисептическое средство.
Применяется для лечения язвенного (афтозного) стоматита

Rp.: Tincturae Rosae 150,0
Acidi hydrochlorici 4,0
Tincturae Capsici 5,0
Melis 20,0
M. f. linimentum

DS. Для смазывания язв во рту 2—3 раза в день

**Линимент ментоловый —
Linimentum Mentholi**

Препарат обладает раздражающим, местноанестезирующим и успокаивающим действием.

Применяется для лечения миозитов, невралгий, артритов и радикулита, а также при головной боли, мигрени и пр.

1. Rp.: Mentholi 5,0
Spiritus aethylici 140,0
Olei Caryophylli
Olei Cinnamomi aa 1,0
2. Rp.: Mentholi 5,0
Spiritus aethylici 90% 140,0
Glycerini 10,0
Olei Caryophylli
Olei Cinnamomi aa 1,0
M. f. linimentum
DS. Наружное

**Линимент метилсалицилата
сложный — Linimentum Methylii
salicylatis compositum**

Срок годности — 2 года (для прописи № 1)

Анальгезирующее и противовоспалительное средство.

Применяется для лечения воспалительных заболеваний опорного аппарата и периферических нервов — радикулита, артритов, миозитов, ишиаса, люмбаго, невритов и невралгий

1. Rp.: Methylii salicylatis
Analgini
Naphthalani āā 2,5
Emulgentis 7,5
Aquae destillatae ad 100,0
2. Rp.: Olei Hyoscyami
Chloroformii
Methylii salicylatis āā 15,0
3. Rp.: Methylii salicylatis 10,0
Chloroformii
Olei Terebinthinae āā 15,0
Olei Hyoscyami 60,0
M. f. linimentum
DS. Для растирания

**Линимент мятный —
Linimentum Menthae**

По свойствам и применению
близок к «Линименту ментоло-
вому»

Rp.: Olei Menthae 1,0
Spiritus aethylici 5,0
Glycerini 10,0
M. f. linimentum
DS. Для растирания

**Линимент нафталиновый —
Linimentum Naphthalani;
эмульсия нафталиновая —
Emulsum Naphthalani liquidum**
Состав:
Naphthalani 10,0
Aquae destillatae ad 100,0

Противовоспалительное и анти-
септическое средство.

Применяется в тех же случаях,
что и «Линимент метилсалицилата
сложный № 1», а также для лече-
ния воспалительных и аллерги-
ческих заболеваний кожи; ожогов
и язв

Rp.: Linimenti Naphthalani 50,0
DS. Наносить на пораженные участки кожи

**Линимент огуречный —
Linimentum Cucumeris**

Косметическое средство, способ-
ствующее очищению кожи и по-
вышению ее эластичности

Rp.: Seminis Cucumeris 10,0
Aquae destillatae 100,0
M. f. linimentum
DS. Для косметических масок

Приготовление: огуречные семена обливаются горячей водой, очищаются от кожицы. После этого их растирают с водой до образования эмульсии

Линимент ртутно-квасцовый —
Linimentum Hydrargyri
amidochloridi aluminatum

Антисептическое и вяжущее средство.

Применяется для лечения различных воспалительных и инфекционных заболеваний кожи, ожогов, чесотки и пр. Противопоказания — общие для препаратов ртути

Rp.: Hydrargyri amidochloridi 0,2
Aluminis 6,0
Glycerini 20,0
M. f. linimentum
DS. Смазывать пораженные участки кожи

Линимент салициловый
сложный — Linimentum
salicylatum compositum

Все прописи обладают раздражающим, анальгезирующим и противовоспалительным действием. По показаниям к применению аналогичны «Линименту метилсалицилата сложному»

1. Rp.: Acidi salicylici
Camphorae āā 10,0
Olei Juniperi
Olei Pini āā 15,0
Aetheris medicinalis 10,0
Chloroformii 40,0
Olei Rapae aut
Olei Helianthi
Lanolini āā 50,0
2. Rp.: Acidi salicylici
Tincturae Opii simplicis āā 1,0
Chloroformii 2,0
Olei Olivarum 20,0
Spiritus aethylici 90% 10,0
3. Rp.: Natrii salicylatis 15,0
Olei Cajeputi 2,0
Olei Eucalypti 1,0
Linimenti saponatoammoniatu 15,0
Spiritus aethylici 90% 200,0

Приготовление прописи № 3: салицилат натрия растворяют в спирте, добавляют линимент мыльно-аммиачный, эфирные масла и взбалтывают

4. Rp.: Acidi salicylici 1,0
Spiritus aethylici 90% 10,0
Chloroformii 1,0
Olei Ricini 20,0

Приготовление прописи № 4: салициловую кислоту растворяют в спирте и прибавляют касторовое масло и хлороформ

5. Rp.: Acidi salicylici 10,0
Spiritus aethylici 90% 50,0
Olei Ricini 10,0
M. f. linimentum
DS. Расстирание при ревматизме

Линимент серный сложный —
Linimentum Sulfuris compositum

Антисептическое, подсушивающее и смягчающее кожу средство. Применяется для лечения угрей, фолликулитов, пиодермии и пр.

Rp.: Sulfuris praecipitati
Glycerini
Spiritus aethylici 95%
Kalii carbonatis
Aetheris aa 10,0
M. f. linimentum
DS. Смазывать лицо на ночь

Линимент синтомицина 1%, 5%
и 10% — Linimentum Synthomy-
cini 1%, 5% aut 10%

Антимикробное средство. По свойствам и применению идентичен «Линименту левомецетина»

Состав: 1% 5% 10%
Synthomycini 1,0 5,0 10,0
Olei Ricini 20,0 20,0 20,0
Emulgentis 9,0 7,0 7,0
Thymoli aut 0,15 0,15 0,15
Acidi salicylici 0,125 0,125 0,125
Aquaе destillatae ad 100,0
Срок годности — 6 мес.

Rp.: Lin. Synthomycini 1% (5% aut 10%) 30,0
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Линимент синтомицина 1%
с новокаином — Linimentum
Synthomycini 1% cum Novocaino
0,5%

Благодаря наличию анестезирующих свойств рекомендуется для лечения ожогов и других кожных поражений, при которых показано применение «Линимента левомецетина», сопровождающихся болью и зудом.

Rp.: Linimenti Synthomycini 1% 99,5
Novocaini 0,5
M. f. linimentum
DS. Наружно. Смазывать пораженную поверхность

Линимент скипидарно-аммиачный — Linimentum Olei Terebinthinae ammoniatum

Местнораздражающее средство. По применению аналогично «Линименту аммиачному»

Rp.: Linimenti ammoniati 30,0
Olei Terebinthinae 10,0
M. f. linimentum
DS. Для растирания

Линимент скипидарно-хлороформный — Linimentum Olei Terebinthinae chloroformiatum
Хранение — список А

Раздражающее и анестезирующее средство для наружного применения. По показаниям к использованию близок к «Линименту метилсалицилата сложному»

Rp.: Olei Terebinthinae 250,0
Chloroformii
Tincturae Opii crocatae āā 10,0
M. f. linimentum
DS. Для растирания

Линимент скипидарный сложный — Linimentum Terebinthinae compositum
Срок годности № 1,2 — 1 год

По свойствам и применению аналогичен предыдущей прописи. Антисептическое и противовоспалительное средство. Применяется для лечения гнойных заболеваний кожи (фурункулы, пиодермия и пр.)

1. Rp.: Olei Hyoscyami
Olei Terebinthinae āā 20,0
Chloroformii 10,0
2. Rp.: Olei Terebinthinae 25,0
Vitelli ovi N. 1
Infusi florum Chamomillae 15,0—300,0
Spiritus camphorati 25,0
M. f. linimentum
DS. Для смазывания фурункулов.

Приготовление: готовится эмульсия из скипидара и яичного желтка, к ней прибавляют настой ромашки и камфорный спирт

Линимент стрептоцида 5% — Linimentum Streptocidi 5%
Состав:

Антимикробное средство. По применению аналогично «Линименту левомицетина»

Streptocidi 5,0
Olei jecoris Aselli 34,0
Emulgentis 5,0
Aquaе destillatae 56,0
Срок годности — 1 год

Rp.: Linim. Streptocidi 5% 100,0
DS. Для наружного применения

**Линимент тезана —
Linimentum Thesani**

Состав:
Thesani 0,2
Emulgentis
Olei Ricini āā 10,0
Aquae 79,8

Срок годности — 1 год

Стимулятор регенерации.

Применяется для профилактики и лечения «рентгеновских» язв при лучевой терапии, для лечения незаживающих ран, ожогов, язв и пролежней

Rp.: Linimenti Thesani 100,0

DS. Смазывать облученное место после каждого сеанса радиотерапии

**Линимент тимоловый —
Linimentum Thymoli**

Rp.: Thymoli 2,0
Glycerini
Spiritus aethylici āā 30,0
Aquae destillatae 540,0
M. f. linimentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи

Применяется при кожных заболеваниях для уменьшения зуда. Обладает антисептическими свойствами

**Линимент трагаканта —
Linimentum Tragacanthae**

Rp.: Glycerini 5,0
Aquae destillatae 100,0
Tragacanthae 2,0
Spiritus aethylici 5,0
M. f. linimentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи

Приготовление: смесь ингредиентов нагревают при постоянном помешивании до исчезновения запаха спирта

**Линимент хлоралгидрата —
Linimentum Chlorali hydrati**

1. Rp.: Chlorali hydrati 10,0
Aquae Calcis
Olei Olivarum āā 30,0

Раздражающее средство.

По показаниям к применению близок к «Линименту метилсалицилата сложному», «Линименту скипидарно-хлороформному» и т. п.

2. Rp.: Chlorali hydrati 10,0
Olei Amygdalarum 50,0
M. f. linimentum
DS. Для растирания

Линимент хлоралгидрата
сложный — Linimentum
Chlorali hydrati compositum

Антисептическое средство.
Применяется для лечения воспали-
тельных заболеваний кожи
(фолликулитов, пиодермии, угрей
и т. п.)

Rp.: Chlorali hydrati
Camphorae
Sulfuris praecipitati $\bar{a}\bar{a}$ 10,0
M. f. linimentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи.
Приготовление: хлоралгидрат и камфору растирают в ступке до полу-
чения жидкости, затем добавляют серу

Линимент хлороформный —
Linimentum Chloroformii

Препарат используется при го-
ловой боли, мигрени, невралгии

Rp.: Chloroformii 4,0
Spiritus aethylici 6,0
Aquaе communis 190,0
M. f. linimentum

DS. Для применения в виде компресса. Перед упот-
реблением взбалтывать

Линимент цинхофена —
Linimentum Cinchopheni

Противовоспалительное и под-
сушивающее средство.

Применяется при различных
кожных заболеваниях, сопровож-
дающихся воспалением, болью или
зудом.

Rp.: Cinchopheni
Zinci oxydi $\bar{a}\bar{a}$ 5,0
Naphthalani 12,0
Tincturae Valerianae
Tincturae Convallariae $\bar{a}\bar{a}$ 25,0
M. f. linimentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи

Лиоген — Lyogen (СФРЮ)
10-[3-[4-(2-Оксиэтил)-1-пипера-
зинил]-пропил]-2-трифторметил-
фенотиазина дигидрохлорид

Синонимы: Anapensol, Elinol,
Flumazine, Flumezin, Fluphena-
zindihydrochlorid, Moditen, Omca,
Pacinol, Permitil, Prolixin, Sevi-
nal, Siqualine, Tensofin, Teviral,
Trancin, Valamina, Vespazin

Выпускается в виде таблеток по
0,25 мг; 1; 5 мг, а также в ампу-
лах по 1 мл 0,25% раствора

Хранение — список Б

Нейролептик.

По свойствам и применению
близок к «Аминазину», отличаясь
более слабым гипотензивным эф-
фектом

Rp.: Sol. «Lyogen» 0,25% 1 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Внутримышечно вводят, начиная с дозы 1,25 мг
(0,5 мл 0,25% раствора), повышая ее до 10 мг
в сутки

Rp.: Tabul. «Lyogen» 0,00025 (0,001 aut 0,005)

D. t. d. N. 50

S. По 1—2 таблетки в день

Лиотиронин — Liothyronin
(ВНР)

Лиофилизированный препарат
из щитовидной железы животных

Синонимы: Vasoprocin, Супо-
mel, Cytobin, Cytomel, Ibiothy-
gon, Jodotiroxon, Jotiron, Levot-
rin, Tetroxin, Thybon, Tirogen,
Tiroton, Trionine, Triothyronine,
Tyjodin

Выпускается в таблетках по 0,02

Гормон щитовидной железы.

Применяется при различных
формах гипотиреоза, кретинизме,
микседеме, ожирении, зобе, не-
достаточной функции гипофиза,
расстройстве половых функций,
связанных с гипофункцией щито-
видной железы. Близок к отече-
ственному тиреодину

Rp.: Tabul. «Liothyronin» 0,02

D. t. d. N. 20

S. По 1—3 таблетки в день с постепенным повышением
до 5—10 таблеток в день

Липовецкого жидкость —
Liquor Lipovezky

Антисептическое и фунгицидное
средство.

Применяется для лечения по-
верхностных микозов кожи

1. Rp.: Kalii iodidi 10,0
Acidi hydrochlorici 1,2
Aqueae destillatae ad 100,0

2. Rp.: Chloramini 6,0

Aquae destillatae ad 100,0

MDS. Смазывают пораженный участок кожи раствором № 1 и через несколько минут раствором № 2

Липолизин — Lipolisin (Англ.)
α-Диэтиламинопропиофенона гидрохлорид

Синонимы: Abulemin, Adiposon, Alipid, Amfepramonum, Anorex, Diaethylpropionum, Dierpron, Dobesin, Keramin, Lipomin, Liposlim, Menutil, Modulor, Obesitex, Parabolin, Parvin, Phepranonum, Sinapet, Teranil, Tylnal

Анорексигенный препарат, повышающий окислительные процессы в организме. Аналогичен «Фепранону».

Применяется при нарушении жирового обмена (ожирении и пр.). Малые дозы препарата предохраняют от накопления жира, большие дозы ведут к потере веса тела

Rp.: Drag. «Lipolisin» N. 100

DS. По 1—3 драже 3 раза в день

Липоцеребрин — Lipocerebrinum

Экстракт фосфолипидов из мозговой ткани убойного скота

Выпускается в таблетках по 0,5

Хранение — в прохладном, сухом месте, в хорошо закрытых склянках

Срок годности таблеток, покрытых оболочкой, — 3 года

Общеукрепляющее средство.

Применяется при нервном истощении, неврозах, сосудистой гипотонии, переутомлении и т. п.

Rp.: Lipocerebrini 0,5

D. t. d. N. 50 in tabul.

S. По 1—2 таблетки 3 раза в день

Листера мазь борная — Unguentum Acidi borici Listeri

Антисептическое средство.

Применяется для лечения язв, инфицированных ран, пролежней и т. п.

1. Rp.: Acidi borici
Cerae albae āā 10,0
Olei Amygdalarum
Paraffini āā 20,0

2. Rp.: Cerae albae
Paraffini
Acidi borici āā 10,0
Olei Amygdalarum 20,0
M. f. unguentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи

Листера мазь борная мягкая —
Unguentum Acidi borici
molle Listeri

Свойства и показания к применению — те же, что у предыдущей прописи

Рр.: Acidi borici
Cerae flavae āā 1,0
Paraffini 2,0
Olei Olivarum 8,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Листера паста карболовая —
Pasta carbolisata Listeri

Применение — то же, что и у «Листера мази борной»

Рр.: Phenoli 1,0
Ichthyoli 4,0
Sulfuris praecipitati 6,0
Amyli Tritici
Zinci oxydi āā 20,0
Vaselini 46,0
M. f. pasta
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Листерин — Listerin

Антисептическое, противовоспалительное и анестезирующее средство.

Применяется для обработки гнойных ран, для лечения кожных инфекций в виде промываний и примочек

Рр.: Thymoli 0,8
Acidi benzoici 2,4
Eucalyptoli 0,2
Methylis salicylatis 0,1
Mentholi 0,4
Natrii tetraboratis
Acidi borici āā 3,0
Spiritus aethylici 90% 60,0
Aquaе destillatae ad 300,0
MDS. Для перевязок

Лобелина гидрохлорид —
Lobelini hydrochloridum
Алкалоид, содержащийся в растении *Lobelia inflata*

Рефлекторный дыхательный аналептик.

Применяется при остановке дыхания или ослаблении его (при

2-(β-Окси-фенетил)-1-метил-6-фенацилпиперидина гидрохлорид
Синонимы: Antisol, Bantron, Inflatine, Lobatox, Lobeton, Lobidan, Lobishan, Nikoban, Nokotin, Unilobin

Выпускается в ампулах по 1 мл 1% раствора

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 5 лет; после переконтроля — 2 года

отсутствии значительных нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы), при асфиксии и т. д.

Rp.: Sol. Lobelini hydrochloridi 1% 1,0

D. t. d. N. 6 in ampul.

S. В вену медленно по 0,5—1 мл

Локакортен — Locacorten
(СФРЮ)

6α, 9α-Дифтор-11β, 17α, 21-триокси-16α-метил-1,4-прегнадиен-3,20-дион-21-триметилацетат

Синонимы: Flumetasonum pivalicum, Flumethazone pivalate, Flumethasondimethylpropionat, Fluorodexamethasonpivalat, Locorten, Lorinden (ПНР)

Выпускается в тубах по 15 г 0,02% мази

Хранение — в обычных условиях

Срок годности — 3 года

Синтетическое производное глюкокортикоидов, близкое к «Декса-метазону».

Применяется по тем же показаниям, что и «Оксикорт», «Мазь преднизолоновая» и т. п. Отличается большей эффективностью. Предпочтительно применять «Локакортен-Н», содержащий дополнительно 0,5% неомидина сульфата, так как при этом снижается опасность инфицирования кожи (ср. «Синалар» и «Синалар-Н»)

Rp.: Ung. «Locacorten» 0,02% 15,0

DS. Наносить на пораженную поверхность

Лофенал — Lophenalum

Пара-бис (β-хлорэтил)-аминофенацетин-D,L-фенилаланин

Выпускается в таблетках по 0,3

Хранение — список А, в банках оранжевого стекла, при температуре не выше +10°

Срок годности — 1 год; после переконтроля — 1 год

Цитостатическое средство, производное трихлортриэтиламина.

Применяется при первичном раке яичников, в том числе при рецидивах и метастазах. Менее эффективен при лимфолейкозе, лимфогранулематозе и других болезнях крови. Противопоказан при лейкопении, тромбоцитопении. Лечение следует проводить под контролем состояния белой крови. Осложнение: диспепсические явления, анорексия, лейкопения

Rp.: Lophenali 0,3
D. t. d. N. 100 in tabul.
S. По 1 таблетке 2—4 раза в день после еды

Лукомского паста —
Pasta Lucomsky

Препарат содержит фтористый натрий, снижающий чувствительность тканей зуба.

Применяется для обезболивания дентина в стоматологии

Rp.: Natrii fluoridi
Boli albae aa 1,0
Glycerini 1,2
M. f. pasta
DS. В зубоврачебный кабинет

Лукьянова мазь —
Unguentum Lukianovi

Анестезирующее и подсушивающее средство.

Применяется для уменьшения боли, зуда и экссудации при ожогах I и II степени и при кожных заболеваниях, сопровождающихся указанными явлениями

Rp.: Anaesthesini
Calcii carbonatis aa 10,0
Magnesii oxydi 20,0
Carbonis activati 50,0
Lanolini anhydrici 350,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Лумпан — Lumpan
Скробанского жидкость —
Liquor Skrobansky
Хранение — список А

Седативное и обезболивающее средство.

Применяется для обезболивания родов, не сопровождающихся слабостью родовой деятельности

Rp.: Phenobarbitali 0,1
Spiritus aethylici 5,0
Omnoponi 0,01
Antipyryni 0,4
Aquae destillatae 20,0
Sirupi simplicis ad 30,0.
MDS. На один прием внутрь

Лунина мазь —
Unguentum Lunini

Антисептическое и подсушивающее средство.

Применяется для лечения экзем и других кожных заболеваний, сопровождающихся экссудацией

Rp.: Acidi borici 10,0
Zinci oxydi
Talcī āā 20,0
Mentholi 1,5
Vaselini 150,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Луронит — Luronitum

Вытяжка из стекловидного тела глаза крупного рогатого скота, содержащая гиалуроновую кислоту

Выпускается во флаконах по 0,01 сухого препарата

Хранение — при температуре не выше 10°

Срок годности — 2 года

Биогенный препарат, обладает противовоспалительными свойствами, стимулирует регенерацию.

Применяется для лечения длительно существующих ран и язв, а также для подготовки раневой поверхности к кожной трансплантации. Противопоказан при избыточных грануляциях, острых воспалительных осложнениях и некрозе в области ран и язв

Rp.: Luroniti 0,01
D. t. d. N. 10
S. Содержимое флакона развести в 2,5 мл 0,25—0,5% раствора новокаина. Получившимся раствором пропитывать повязки

Любазол — Lubazolium

Состав на 1 таблетку:

Dibazoli

Phenobarbitali āā 0,025

Хранение — список Б

Срок годности — 3 года

Сосудорасширяющее и успокаивающее средство.

Применяется при гипертонической болезни I стадии, для лечения стенокардии, спазмов мозговых сосудов, спазмов полых органов

Rp.: Tabul. Lubazoli N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

**Любневая мазь —
Unguentum Lubnevi**

Подсушивающее, вяжущее и ледодорирующее средство.

Применяется для уменьшения потливости

Rp.: Solutionis Formaldehydi 6,0
Zinci oxydi 5,0
Glycerini
Talcī āā 10,0
M. f. unguentum
DS. Для смазывания ступней ног

Люголя раствор для внутреннего применения — Solutio Lugoli ad usum internum

Препарат йода. Обладает тиреотропным (в малых дозах) или тиреостатическим (в больших дозах) действием, способствует нормализации обмена холестерина при атеросклерозе, оказывает отхаркивающий эффект при сухом кашле, а также лечебное действие при третичном сифилисе и нейросифилисе

1. Rp.: Iodi 2,0
Kalii iodidi 10,0
Aquae destillatae 250,0
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Пропись № 1 используется при осложнениях атеросклероза (последствия кровоизлияния в мозг, паралич). Пропись № 2 используется при гипертиреозе, особенно в сочетании с мерказолилом и метилтиоурацилом для предупреждения увеличения зоба под влиянием последних препаратов.

2. Rp.: Iodi 1,0
Kalii iodidi 2,0
Aquae destillatae ad 20,0
MDS. По 5—10 капель 2 раза в день

Люголя раствор на глицерине — Solutio Lugoli glycerinosa

Антисептическое средство. Применяется местно для лечения острых и хронических ларингитов и фарингитов

Rp.: Iodi 1,0
Kalii iodidi 2,0
Aquae destillatae 3,0
Glycerini 94,0
MDS. Для смазывания слизистой глотки

Люголя раствор для наружного применения — Solutio Lugoli ad usum externum

Хранение — список Б, в склянке темного стекла со стеклянной пробкой

Антисептическое средство. Применяется для смягчения явлений раздражения и профилактики инфекции при укусах кровососущих насекомых (пропись № 1), а также по тем же показаниям, что и «Люголя раствор на глицерине» (пропись № 2)

1. Rp.: Iodi 2,0
Kalii iodidi 5,0
Aquae destillatae 100,0
MDS. Для нанесения на кожу

2. Rp.: Iodi 1,0
Kalii iodidi 2,0
Aquae destillatae ad 100,0

3. Rp.: Iodi
Kalii iodidi āā 2,0
Aquae destillatae 3,0
Glycerini 94,0
MDS. Для смазывания слизистой оболочки глотки
и гортани

Люмисалин — Lumisalinum
Состав на 1 таблетку:
Salsolini hydrochloridi 0,03
Phenobarbitali 0,05
Хранение — список Б

Используется при спазмах сосудов мозга и гипертонической болезни

Rp.: Tabul. Lumisalini N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Люпаверин — Lupaverinum
Состав на 1 таблетку:
Papaverini hydrochloridi 0,02
Phenobarbitali 0,05
Хранение — список Б
Срок годности — 10 лет

По свойствам и применению аналогичен «Любазолу»

Rp.: Tabul. Lupaverini N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Мажептил — Majeptil
(Франция)
3-Диметил-сульфонамидо-10-[3-(4-метил-1-пиперазинил)-пропил]-фенотиазина бисметансульфонат
Синонимы: Cephalin, Thiopergazine, Thioproperezinumbismethansulfonat, Vontil
Выпускается в таблетках по 0,001
Хранение — список Б
Срок годности таблеток и ампул — 4 года

Препарат является производным фенотиазина, близким по свойствам и применению к «Аминазину». От последнего отличается более слабым седативным и более выраженным противорвотным действием

Rp.: Tabul. «Majeptil» 0,001
D. t. d. N. 20
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

**Мазь автоловая —
Unguentum Autoli**

1. Состав:
Autoli 85,0
Acidi stearinici 12,0
Zinci oxydi 3,0

2. Состав:
Autoli 85,0
Acidi stearinici 7,0
Paraffini 3,0

Axungiae porcinae 5,0
Выпускается в банках по 100 г
Срок годности — 1 год

Rp.: Ung. Autoli 100,0
DS. Наружное

Приготовление: окись цинка растирают с небольшим количеством автола (принцип Дерягина), после чего к массе добавляют при тщательном растирании слав стеарина с автолом

Антисептическое средство, обладает умеренным раздражающим свойством, способствует заживлению ран.

Применяется для лечения ожогов, язв, инфицированных ран. Входит в состав многих мазей как основа

**Мазь алсоловая —
Unguentum Alsoli**

Rp.: Alsoli 1,0
Lanolini 15,0
Vaselini 30,0
Aquaе destillatae 54,0
M. f. unguentum

DS. Наносить на пораженную поверхность

Вяжущее и антисептическое средство.

Применение — см. «Алсол»

**Мазь алюминиево-борная —
Unguentum Aluminium boratum**

Rp.: Vaselini borici 3% 25,0
Liquoris Burowi 5,0
M. f. unguentum
DS. Наружное

По свойствам и применению аналогична «Бурова жидкости», «Алсолу» и т. п.

**Мазь анестезирующая —
Unguentum anaestheticum**

1. Rp.: Anaesthesini
Mentholi aa 0,5
Lanolini anhydrici ad 5,0

Анестезирующее и антисептическое средство.

Применяется при повреждениях и заболеваниях кожи, сопровождающихся болью и зудом (ожоги, обморожения, экзема и пр.)

2. Rp.: Anaesthesini
Dermatoli āā 5,0
Vaselini ad 50,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь белая — Unguentum album Антисептическое и подсушивающее средство.

Применяется для лечения кожных заболеваний (экземы, пиодермии, дерматиты и пр.)

Rp.: Lanolini 15,0
Glycerini
Olei Olivarum āā 4,0
Acidi borici
Zinci oxydi āā 1,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь белильная — Unguentum Cerussae Косметическое средство.
Применяется для бытовой гримировки

Rp.: Vaselini 20,0
Plumbi carbonatis 10,0
M. f. unguentum
DS. Наружное

Приготовление: в нагретой фарфоровой ступке растирают белила с небольшим количеством расплавленного вазелина до получения совершенно гомогенной массы, к которой примешивают остальной вазелин

Мазь бензилпенициллиновая — Unguentum Benzylpenicillini-Kalii

Состав:
Benzylpenicillini-Kalii 0,651
Lanolini anhydrici 20,0
Vaselini 79,35

Выпускается в тубах по 20 г
Срок годности — 6 мес.; после переконтроля — 3 мес.

Препарат антибиотика пенициллина для наружного применения.

Используется для лечения воспалительных заболеваний кожи, вызванных микробами, особенно стрептококками (рожистое воспаление, стрептодермия и пр.). Менее эффективна при стафилококковой инфекции (фолликулиты, фурункулез и пр.). Применяется также для лечения инфицированных экзем, ожогов, отморожений и поверхностных ранений

Rp.: Unguenti Benzylpenicillini-Kalii 20,0
DS. Наносить на пораженные участки кожи

**Мазь бодяги — Unguentum
Spongillae fluviatilis**

Местнораздражающее средство.
По силе раздражающего действия и применению аналогична «Линименту йодно-парафиновому»

Rp.: Pulveris Spongillae fluviatilis 1,0
Axungiae porcinae 9,0
M. f. unguentum
DS. Для растирания

**Мазь борная —
Unguentum Acidi borici**
Срок годности — 1 год

Антисептическое средство.
Применяется для лечения и профилактики гнойничковых заболеваний кожи, для обработки мелких ранений кожи. Пропись № 1 содержит $\frac{1}{6}$ (17%) борной кислоты, пропись № 2 — 5%, № 3 и 4 — по 10%, пропись № 5 — 25% борной кислоты

1. Rp.: Acidi borici
Cerae albae aa 5,0
Olei Helianthi
Paraffini aa 10,0

Приготовление прописи № 1: воск, парафин и подсолнечное масло сплавляют в фарфоровой чашке на слабом огне, после остывания тщательно растирают в ступке до получения однородной массы и смешивают с борной кислотой

2. Rp.: Acidi borici 5,0
Basis unguenti 95,0
3. Rp.: Acidi borici 10,0
Vasellini albi 90,0
4. Rp.: Acidi borici 10,0
Basis unguenti 90,0
5. Rp.: Cerae albae 1,0
Olei Amygdalarum 10,0
Lanolini 20,0
Acidi borici 10,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи
-

**Мазь борно-висмутовая —
Unguentum Acidi borici
et Bismuthi subnitratris**

Антисептическое, фунгицидное и противовоспалительное средство.
Применяется при гнойничковых и грибковых поражениях кожи

1. Rp.: Acidi borici 1,0
Bismuthi subnitratis 2,0
Amyli Tritici 7,0
Vaselini albi 90,0

2. Rp.: Acidi borici 1,0
Bismuthi subnitratis 3,0
Vaselini 30,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь борно-салициловая —
Unguentum Acidi borici
salicylatum

Антисептическое и кератолитическое средство.

Применяется так же, как и предыдущая пропись

Rp.: Acidi salicylici 1,5
Unguenti Acidi borici 5% 50,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь бромистая —
Unguentum Kalii bromidi

Фунгистатическое средство.
Применяют для лечения некоторых микозов (парша)

Rp.: Kalii bromidi 2,0
Basis unguenti 8,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь висмутовая — Unguentum
Bismuthi subnitratis
Срок годности — 3 года

Противовоспалительное, вяжущее и антисептическое средство.
Применение — см. «Мазь борно-висмутовая»

1. Rp.: Bismuthi subnitratis 10,0
Vaselini albi 90,0
2. Rp.: Bismuthi subnitratis 10,0
Unguenti lenientis 40,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь висмутово-цинковая —
Unguentum Bismuthi subnitratis
zincatum

Свойства и применение — см. «Мазь борно-висмутовая»

Rp.: Zinci oxydi
Bismuthi subnitratis aa 10,0
Basis unguenti
Unguenti lenientis aa 40,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

**Мазь глицериновая —
Unguentum Glycerini**

Индифферентная мазевая основа

Rp.: Glycerini 93,0
Aquae destillatae
Amyli Triticii aa 7,0
M. f. unguentum
DS. Для приготовления мазей.

Приготовление: крахмал смешивают с равным количеством воды, прибавляют глицерин и осторожно нагревают до получения однородной просвечивающей массы

**Мазь гелиомициновая —
Unguentum Heliomycini**

Препарат антибиотика гелиомицина для наружного применения. Обладает бактерицидной активностью по отношению к грамположительным микробам.

Состав:
Heliomycini 1,0 (3,0—5,0)
Basis unguenti ad 100,0
Выпускается в тубах по 20 г
Срок годности — 1 год

Применяется для лечения гнойничковых заболеваний кожи, пиодермии, инфицированных язв и пр.

Rp.: Ung. Heliomycini 1% (3% aut 5%) 20,0
DS. Наносить на пораженные участки кожи

**Мазь гепариновая —
Unguentum Heparini (ВНР)**

В состав мази входит антикоагулянт гепарин, что определяет ее использование при тромбофлебитах и варикозных язвах. Эффективность вызывает сомнения, так как через неповрежденную кожу гепарин не всасывается

Состав:
Heparini 2500 ED
Conservanti 0,0625
Basis unguenti 25,0
Выпускается в тубах по 25 г
Срок годности — 2 года

Rp.: Ung. Heparini 25,0
DS. Наружное

**Мазь гидрокортизоновая —
Unguentum Hydrocortisoni
(ВНР, ПНР)**

Свойства мази определяются «Гидрокортизоном».

Состав:
Hydrocortisoni acetatis 0,5
(1,0—2,5)
Basis unguenti ad 100,0
Выпускается в тубах по 2,5
0,5% мази (глазная мазь) и в тубах по 5,0 1% и 2,5% мази
Срок годности — 2 года

Применяется при аллергических заболеваниях кожи (экзема, дерматозы и пр.), в офтальмологии — при яридах и кератитах

Rp.: Ung. Hydrocortisoni acetatis 0,5%
(1%, 2,5%) — 2,5 (5,0)
DS. Наносить на пораженную поверхность

**Мазь (листья) грецкого ореха —
Unguentum Juglandis**

Антисептическое средство, способствует заживлению ран. Содержит каротин, витамин В₁, дубильные вещества, антисептик юглон.

Применяется для лечения мелких повреждений кожи

Rp.: Folii Juglandis 15,0
Olei Helianthi 100,0
Cerae flavae 15,0
M. f. unguentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи.

Приготовление: листья ореха экстрагируют подсолнечным маслом в течение 3 ч на водяной бане. К теплому процеженному экстракту прибавляют воск

**Мазь дегтярная —
Unguentum Picis liquidae**

Антисептическое, инсектицидное и местнораздражающее средство.

Применяется для лечения различных кожных заболеваний, вызывает улучшение кровообращения и стимулирует регенерацию эпителия при экземе, псориазе и т. п. Применяется также для лечения чесотки. Входит в состав других мазей

Rp.: Picis liquidae 1,5
Unguenti Paraffini 15,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

**Мазь дегтярная сложная —
Unguentum Picis liquidae
compositum**

Показания к применению и свойства те же, что и у предыдущей прописи

1. Rp.: Sulfuris praecipitati 4,0
Picis liquidae 5,7
Natrii tetraboratis 1,6
Saponis viridis 4,0
Zinci oxydi 9,8
Ceresini aut
Cerae flavae 16,0
Olei Lini 26,0
Paraffini 23,0
Naphthalani 24,0
Vaselini 187,0

Приготовление прописи № 1: смесь растертых серы, буры и окиси цинка просеивают через сито и растирают в ступке с зеленым мылом и льняным маслом. Затем добавляют расплавленную смесь парафина, перезина, нафталана и вазелина. К полуостывшей массе добавляют деготь и тщательно смешивают

2. Rp.: Sulfuris
Picis liquidae $\bar{a}\bar{a}$ 3,0
Calcii carbonatis
Saponis viridis
Axungiae porcinae $\bar{a}\bar{a}$ 6,0
3. Rp.: Picis liquidae
Sulfuris praecipitati $\bar{a}\bar{a}$ 15,0
Saponis viridis 30,0
Naphthalani 40,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь дегтярно-мыльная —
Unguentum Picis liquidae
saponatum

По свойствам и применению
аналогична предыдущим прописям

Rp.: Picis liquidae
Saponis viridis
Spiritus aethylici 95% $\bar{a}\bar{a}$ 15,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь дегтярно-серная —
Unguentum Picis liquidae
sulfuratum

Свойства и применение — см.
«Мазь дегтярная»

Rp.: Picis liquidae
Sulfuris praecipitati $\bar{a}\bar{a}$ 5,0
Vasellini 50,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь дегтярно-цинковая —
Unguentum Picis liquidae
zincatum

Свойства и применение — см.
«Мазь дегтярная»

Rp.: Picis Betulae 3,0
Pastae Zinci 30,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь дерматоловая —
Unguentum Dermatoli
Срок годности — 5 лет

Антисептическое, противовоспалительное (вяжущее) и подсушивающее средство.

Применяется при заболеваниях кожи, сопровождающихся экссудацией (экзема), при гнойничковых заболеваниях и т. п.

Rp.: Dermatoli 10,0
Vaselini 90,0
M. f. unguentum
DS. Для нанесения на пораженную поверхность

**Мазь диахильная —
Unguentum Diachylon**

Состав:
Emplastrum Plumbi simplicis
Vaselini $\bar{a}\bar{a}$ 100,0
Выпускается в банках
Срок годности — 1 год

Антисептическое средство.
Применяется для лечения гнойно-воспалительных заболеваний кожи, а также фурункулов и карбункулов

Rp.: Ung. Diachylon 100,0
DS. Наносить на пораженные участки кожи

**Мазь дибимициновая глазная —
Unguentum Dibiomycini
ophthalmicum**

Состав:
Dibiomycini 10 000 ED
Lanolini anhydrici 0,4
Vaselini «ophthalmici» 0,6
Выпускается в тубах по 5 г
Срок годности — 1 год

Антимикробное средство.
Применяется для лечения инфекционных заболеваний глаз, в том числе трахомы, острого конъюнктивита и язв роговицы

Rp.: Ung. Dibiomycini ophthalmici 5,0
DS. Глазная мазь

**Мазь домашняя —
Unguentum domesticum**

Rp.: Cerae flavae
Naphthalani $\bar{a}\bar{a}$ 30,0
Cetacei 40,0
Axungiae porcinae benzoatae
Terebinthinae
Emplastrum camphorati
Balsami peruviani (aut Vinylini) $\bar{a}\bar{a}$ 10,0
Vitelli ovi recentis 60,0
Chrysarobini 1,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Антисептическое и противовоспалительное средство, стимулирует регенерацию эпидермиса.

Применяется для лечения гнойничковых заболеваний кожи, для профилактики и лечения раневой инфекции при мелких повреждениях кожи

Мазь защитная —
Unguentum defensens

Мазь предназначена для защиты
кожи рук от агрессивных жидко-
стей

Rp.: Unguenti lenientis
Unguenti Cerei āā 50,0
M. f. unguentum
DS. Наносить тонким слоем на руки

Мазь инсулиновая —
Unguentum Insulini

Препарат используется при ней-
ропаралитических и герпетиче-
ских кератитах

Rp.: Insulini 40 ED
Vaselini 5,0
M. f. unguentum
DS. Глазная мазь

Мазь ихтиоловая —
Unguentum Ichthyoli

Состав:
Ichthyoli 10,0 (20,0)
Vaselini ad 100,0
Выпускается в банках
Срок годности — 2 года

Противовоспалительное и анти-
септическое средство. Обладает
слабыми анестезирующими свойст-
вами.

Применяется для лечения вос-
палительных заболеваний кожи
(экзема, ожоги, пиодермия, рож-
истое воспаление, обморожения и
пр.)

Rp.: Ung. Ichthyoli 100,0
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь ихтиоловая сложная —
Unguentum Ichthyoli
compositum

По свойствам и применению ана-
логична предыдущей прописи

1. Rp.: Olei camphorati
Picis liquidae āā 12,5
Lanolini 70,0
Ichthyoli 17,5
Phenoli 2,5
2. Rp.: Ichthyoli 0,5
Sulfuris praecipitati 2,5
Pastae Zinci 27,0
3. Rp.: Acidi salicylici 3,0
Ichthyoli 2,0
Bismuthi subnitratris 5,0
Vaselini 90,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь ихтиолово-бензойная — Свойства и применение — см.
Unguentum Ichthyoli benzoatum «Мазь ихтиоловая»

Rp.: Ichthyoli 3,0
Aquae destillatae 12,0
Axungiae porcinae benzoatae 10,0
Lanolini anhydrici 5,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь ихтиолово-нафталанная — Свойства и применение — см.
Unguentum Ichthyoli «Мазь ихтиоловая»
naphthalanatum

Rp.: Ichthyoli 10,0
Naphthalani 90,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь йодная — Антисептическое средство.
Unguentum Iodi Применяется для лечения инфицированных ран, для обработки мелких повреждений кожи

1. Rp.: Iodi 1,0
Kalii iodidi 2,0
Aquae destillatae 2,5
Axungiae porcinae 44,0

Приготовление прописи № 1: растворяют в воде сначала йодид калия, затем йод, после чего раствор эмульгируют со свиным жиром

2. Rp.: Paraffini solidi 8,0
Olei Vaselini 12,0
Iodi 1,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь йодная сложная — Антисептическое и подсушивающее средство.
Unguentum Iodi compositum Применяется в основном для борьбы с грибковыми поражениями кожи, а также по тем же показаниям, что и мазь по предыдущим прописям

Rp.: Iodi
Kalii iodidi $\bar{a}\bar{a}$ 0,8
Hexamethylenetetramini 4,0
Unguenti Zinci 20,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь йодоформная
Unguentum Iodoformii

Антисептическое средство.
Применяется для профилактики
и лечения раневой инфекции, для
лечения язв, ожогов и т. п.

Рр.: Iodoformii 10,0
Axungiae porcinae 90,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь йодоформная сложная —
Unguentum Iodoformii compositum

Свойства и применение — те же,
что и у мази по предыдущей про-
писи

Рр.: Iodoformii 2,0
Phenylis salicylatis 4,0
Acidi borici
Antipyrini aa 5,0
Vaselini 80,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь каломельно-висмутовая —
Unguentum Hydrargyri chloridi
cum Bismuthi subnitrate

Противовоспалительное и анти-
септическое средство.

Применяется для лечения воспа-
лительных и аллергических забо-
леваний кожи (экзема, дерматит
и пр.). Противопоказания и меры
предосторожности — общие для
препаратов ртути

Рр.: Hydrargyri monochloridi 0,5
Bismuthi subnitratis 1,0
Basis unguenti 12,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь камфорная —
Unguentum camphoratum

Раздражающее и слабое анти-
септическое средство.

Состав:
Camphorae 10,0
Vaselini 60,0
Lanolini anhydrici 30,0
Выпускается в банках
Срок годности — 3 года

Применяется для рефлекторной
терапии, невралгии, миозитов,
артритов и т. п.

Рр.: Ung. camphorati 100,0
DS. Для растирания

Мазь камфорно-скипидарная — Свойства и применение — см.
Unguentum Camphorae cum oleo «Мазь камфорная»
Terebinthinae

Rp.: Ceræ flavæ 50,0
Cetacei 10,0
Olei Olivarum 60,0
Olei Terebinthinae 4,0
Camphoræ 3,0
M. f. unguentum
DS. Наружное

Мазь камфорно-терпентинная — Свойства и применение — см.
Unguentum Camphorae cum Tere- «Мазь камфорная»
binthino

Rp.: Ceræ flavæ 26,0
Terebinthinae 15,0
Olei Olivarum aut Olei Persicorum 90,0
Camphoræ 10,0
M. f. unguentum
DS. Для растирания

Мазь каолиновая — Свойства и применение — см.
Unguentum Kaolini «Мазь защитная»

Rp.: Lanolini anhydrici
Saponis domestici 40% āā 10,0
Kaolini 30,0
Aquæ destillatæ 50,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на кожу тонким слоем

Мазь колларговая — Антисептическое средство.
Unguentum Collargoli Применяется для лечения ро-
жистого воспаления, пиодермии,
мягкого шанкра

Rp.: Collargoli 3,0
Aquæ destillatæ 1,0
Lanolini aut Ceræ flavæ 2,0
Axungiae porcinae 15,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Приготовление: коллоидное серебро (колларгол) растворяют в ступке в воде, после чего прибавляют ланолин (или воск в расплавленном виде) и свиное сало и тщательно растирают до образования эмульсии

Мазь колхаминовая 0,5% —
Unguentum Colchamini 0,5%
Состав:
Colchamini 0,5
Synthomycini 0,05
Thymoli 0,15
Emulgentis 26,0
Spiritus aethylici 6,0
Aquaе destillatae 67,3
Выпускается в банках по 25
и 100 г
Хранение — список А, в банках
темного стекла с притертой проб-
кой
Срок годности — 3 года; после
переконтроля — 2 года

Цитостатическое (антимитоти-
ческое) средство.

Применяется для лечения рака
кожи I—II стадий. Не применя-
ется при раке кожи III — IV ста-
дии, нельзя наносить на слизис-
тые. Лечение проводится под кон-
тролем числа лейкоцитов. Курс
лечения — 18—25 дней, не более
35 дней

Rp.: Ung. Colchamini 0,5% 25,0 (100,0)
DS. Для нанесения на кожу по 1—1,5 г

Мазь косметическая —
Unguentum romadium

Смягчающее кожу средство.
Применяется как косметическое
средство для обработки лица и рук

1. Rp.: Olei Olivarum 80,0
Cetacei 10,0
Olei Bergamottae 2,5
Olei Melissaе 0,5
Olei Citri 1,0

2. Rp.: Paraffini 200,0
Olei Ricini 120,0
Olei odorati 5,0
M. f. unguentum
DS. Наружное (обрабатывать лицо, руки)

Мазь красавки —
Unguentum Belladonnae
Готовится ex tempore

По свойствам и применению
аналогична «Мази беленной»

Rp.: Extracti Belladonnae spissi
Glycerini aa 10,0
Axungiae porcinae 80,0
M. f. unguentum
DS. Для растирания

Мазь красавки с опиумом —
Unguentum Belladonnae cum Opio
Хранение — список А

То же

Rp.: Extracti Belladonnae 2,0
Extracti Opii 1,0
Glycerini 3,0
Basis unguenti 20,0
M. f. unguentum
DS. Для растирания

Приготовление: экстракт красавки и экстракт опия смешивают в ступке и тщательно растирают с глицерином, затем частями добавляют мазевую основу и смешивают

Мазь ксероформная глазная —
Unguentum Xeroformii ophthalmicum.

Антисептическое и вяжущее средство.

Применяется при острых воспалительных заболеваниях глаз

Rp.: Xeroformii 0,3
Vaselini «ophthalmici» 9,7
M. f. unguentum
DS. Глазная мазь

Мазь ксероформно-цинковая
Unguentum Xeroformii zincatum

Антисептическое и подсушивающее средство.

По показаниям аналогична «Мазь дерматоловой»

Rp.: Xeroformii 1,0
Zinci oxydi 5,0
Lanolini
Vaselini āā 10,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь ланолиновая —
Unguentum Lanolini

Смягчающее кожу средство.

Применяется в косметике, но в основном — в составе других мазей как индифферентная основа

1. Rp.: Lanolini anhydrici 13,0
Olei Vaselini 6,0
Paraffini 1,0
Aquaе destillatae 6,0

Приготовление прописи 1: ланолин, парафин и вазелиновое масло (жидкий парафин) растапливают и при помешивании добавляют воду

2. Rp.: Lanolini anhydrici 30,0
Vaselini 40,0

3. Rp.: Lanolini anhydrici
Vaselini
Axungiae porcinae āā 10,0

4. Rp.: Unguenti Glycerini
Lanolini anhydrici āā 15,0
Vaselini 4,0

M. f. unguentum
DS. Наружное

Мазь масла какао —
Unguentum Olei Casao

Смягчающее кожу средство.
Применяется в косметических
целях самостоятельно и в составе
многих прописей мазей.

Rp.: Olei Casao 10,0
Olei Amygdalarum 20,0
M. f. unguentum
DS. Наружное

Мазь ментоловая —
Unguentum Mentholi

Антисептическое, раздражаю-
щее и обезболивающее средство.
Пропись № 1 (1%) применяется
для лечения острого ринита (на-
сморка); № 2 (10%) — при неврал-
гиях, миозитах, артритах, кожном
зуде

1. Rp.: Mentholi 1,0
Lanolini
Vaselini $\bar{a}\bar{a}$ 49,5
2. Rp.: Mentholi 2,0
Olei Vaselini 1,0
Lanolini 17,0
M. f. unguentum
DS. Для растирания

Приготовление прописи 2: смесь вазелинового масла и ланолина
растопливают и прибавляют ментол при температуре не выше 40°

Мазь ментоловая сложная —
Unguentum Mentholi compositum

Прописи № 1, 4—6 по свойствам
и применению аналогичны «Мази
ментоловой № 1»; прописи № 2, 3
аналогичны «Мази ментоловой
№ 2»

1. Rp.: Mentholi 0,15
Acidi borici
Zinci oxydi $\bar{a}\bar{a}$ 0,75
Vaselini flavi 15,0
2. Rp.: Mentholi
Methylii salicylatis
Aquae destillatae $\bar{a}\bar{a}$ 3,0
Cerae flavae 2,0
Lanolini anhydrici 9,0
3. Rp.: Resorcini
Natrii salicylatis $\bar{a}\bar{a}$ 4,0
Mentholi 1,0
Vaselini
Lanolini $\bar{a}\bar{a}$ 33,0

4. Rp.: Anaesthesini 0,5
 Solutionis Adrenalini hydrochloridi 0,1 % 1,0
 Mentholi 0,3
 Olei Eucalypti gtts V
 Acidi borici 1,0
 Lanolini
 Vaselini aa 10,0
5. Rp.: Protargoli 0,5
 Aquae destillatae q. s.
 Saccharini 0,1
 Mentholi 0,2
 Lanolini
 Vaselini aa 5,0
6. Rp.: Acidi borici 2,0
 Mentholi
 Camphorae aa 0,3
 Resorcini 1,0
 Vaselini ad 100,0
 Olei Eucalypti gtts XX
 M. f. unguentum
 DS. Смазывать слизистую носа

Мазь ментоловая
 с метилсалицилатом — Unguentum
 Mentholi cum Methylii salicylate

Применяется так же, как и
 «Мазь ментоловая № 2»

Rp.: Methylii salicylatis
 Mentholi aa 3,0
 Lanolini 40,0
 D. f. unguentum
 MS. Для растирания

Мазь ментоло-висмутовая —
 Unguentum Mentholi cum Bismuthi
 subnitrate

Применяется так же, как и
 «Мазь ментоловая № 1»

Rp.: Mentholi 0,05
 Bismuthi subnitratis 1,0
 Vaselini flavi 10,0
 M. f. unguentum
 DS. Закладывать в нос

Мазь ментоло-протарголовая —
 Unguentum Mentholi protargol-
 icum

Применяется так же, как и
 предыдущая пропись.

Rp.: Mentholi 0,1
Protargoli 0,2
Lanolini 1,0
Vaselini ad 10,0
M. f. unguentum
DS. Закладывать в нос

Мазь ментоло-эфедриновая То же
Unguentum Mentholi ephedrinicum

Rp.: Ephedrini hydrochloridi 0,05—0,1
Mentholi 0,1
Olei Pini gttss V
Vaselini 10,0
M. f. unguentum
DS. Закладывать в нос

Мазь метилсалициловая — Болеутоляющее и противовос-
Unguentum Methylii salicylatis палительное средство.
Применяется при невритах, нев-
ралгии, миозитах, артритях и т. п.

Rp.: Methylii salicylatis 10,0
Vaselini 90,0
M. f. unguentum
DS. Для растирания

Мазь метилсалициловая Применяется так же, как мазь
сложная — Unguentum Methylii по предыдущей прописи
salicylatis compositum

Rp.: Acidi salicylici 2,0
Methylii salicylatis 5,0
Guajacoli 4,0
Vaselini 30,0
M. f. unguentum
DS. Для растирания

Мазь можжевельная — Дезинфицирующее и инсекти-
Unguentum obei Juniperi цидное (акарицидное) средство.
Применяется для лечения чес-
отки

1. Rp.: Olei Juniperi empyreumatici 2,0
Axungiae porcinae 48,0

2. Rp.: Olei Juniperi empyreumatici
Saponis viridis aa 25,0
Spiritus aethylici 50,0
M. f. unguentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь можжевельная сложная —
**Unguentum obei Juniperi composi-
situm**

Свойства и применение — см.
«Мазь дегтярная»

Rp.: Olei Juniperi empyreumatici
Natrii carbonatis
Picis liquidae āā 2,5
Axungiae porcinae 20,0
M. f. unguentum
DS. Наружное

Мазь молочной кислоты сали-
циловая — **Unguentum Acidi lactici
salicylatum**

Кератолитическое средство.
Применяется для лечения микозов, поражающих ногти, волосы, роговой слой эпителия

Rp.: Acidi salicylici 4,0
Acidi lactici 2,0
Vaselini 24,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь мягкая —
Unguentum molle

Индифферентная мазевая основа, может применяться самостоятельно для смягчения кожи лица и рук

Rp.: Vaselini flavi
Lanolini āā 15,0
M. f. unguentum
DS. Наружное

Мазь нафталиновая —
Unguentum Naphthalani
Состав: Naphthalani liquidi raf-
finati 70,0
Paraffini 18,0
Petrolati 12,0

Выпускается в банках
Срок годности 8 лет; после пере-
контроля — 4 года

Противовоспалительное, анти-
септическое, рассасывающее и бо-
леутоляющее средство.

Применяется при заболеваниях
кожи (экземы, нейродермиты, фу-
рункулез, рожистое воспаление
и др.), при ожогах, язвах, пролеж-
нях, при невралгиях, радикули-
тах, плекситах и др.

Rp.: Ung. Naphthalani 100,0
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь нафталиновая сложная —
**Unguentum Naphthalani composi-
situm**

Прописи № 1 и 2 применяются
для лечения чесотки, пропись
№ 3 по тем же показаниям, что и
«Мазь метилсалицилата»

1. Rp.: Saponis viridis 30,0
Unguenti Naphthalani 40,0
Picis Betulae
Sulfuris depurati āā 15,0
2. Rp.: Picis liquidae
Sulfuris praecipitati āā 10,0
Naphthalani 40,0
Saponis viridis 30,0
3. Rp.: Novocaini
Amidopyrini āā 1,0
Lanolini
Naphthalani liquidi raffinati āā 50,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь нафталанно-салициловая — Применяется так же, как и
Unguentum Naphthalani salicyla- «Мазь нафталанная»
tum

Rp.: Acidi salicylici 2,0
Unguenti Naphthalani 98,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь нафталанно-серная — Применяется так же, как и
Unguentum Naphthalani sulfura- «Мазь нафталанная сложная № 1
tum и 2»

Rp.: Unguenti Naphthalani 20,0
Sulfuris depurati 10,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь нафталанно-стеариновая — Свойства и применение — см.
Unguentum Naphthalani cum Natrii «Мазь нафталанная»
stearate

1. Rp.: Natrii stearatis 20,0
Naphthalani liquidi raffinati 80,0
2. Rp.: Naphthalani liquidi raffinati 94,0
Acidi stearinici 6,5
Solutionis Natrii caustici concentratae 1,2
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

**Мазь нафтоловая сложная —
Unguentum Betanaphtholi
compositum**

Антисептическое средство, раздражает и обезжиривает кожу. Применяется при гнойничковых заболеваниях кожи, угрях, жирной себорее

1. Rp.: Betanaphtholi
Camphorae
Resorcini aa 5,0
Sulfuris praecipitati 15,0
Saponis medicati 7,5
Calcii carbonatis praecipitati 2,5
Vaselini 20,0

2. Rp.: Betanaphtholi 1,5
Sulfuris praecipitati
Saponis viridis
Axungiae porcinae aa 10,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на лицо на ночь

**Мазь нистатиновая —
Unguentum Nystatini**

Состав:

Nystatini 4,0 (16 000 000 ЕД)
Lanolini anhydrici 40,0
Vaselini ad 100,0

Выпускается в тубах по 15 г
Срок годности — 1 год 6 мес.

Противогрибковое средство. Применяется для лечения кандидамикозов кожи и слизистых, а также для профилактики кандидамикозов после лечения антибиотиками широкого спектра действия

Rp.: Ung. Nystatini 15,0
DS. Наносить на пораженные участки кожи

**Мазь окситетрациклиновая —
глазная — Unguentum Oxytetracyclini ophthalmicum**

Состав:

Oxytetracyclini hydrochloridi 0,1
Basis unguenti ophthalmici ad 10,0

Выпускается в тубах по 10 г
Срок годности — 2 года

Показания к применению — см. «Мазь дибимициновая глазная»

Rp.: Ung. Oxytetracyclini ophthalmici 10,0
DS. Глазная мазь

**Мазь оксолиновая —
Unguentum Oxolini**

Состав на 100 г мази:

Oxolini 0,25 (0,5, 1,0, 2,0 aut 3,0)
Basis unguenti ad 100,0

Выпускается в тубах по 5 и 10 г

Антисептическое (противовирусное) средство.

Применяется для лечения вирусных заболеваний слизистых оболочек (пузырьковый и опоясывающий лишай, вирусные кера-

Хранение — список Б, в обычных условиях
Срок годности — 1 год

титы, аденовирусная инфекция, а также для лечения и профилактики гриппа (при этом мазь закладывают в нос) и для выведения бородавок

Rp.: Ung. Oxolini 0,25%
(0,5%, 1%, 2% aut 3%) 10,0 (5,0)

DS. Наносить на пораженную поверхность; в глазной практике применяется только 0,25% мазь, которую закладывают за веки до 3 раз в день

Мазь оливомыциновая —
Unguentum Olivomycini
Срок годности — 1 год

Цитостатическое средство.
Применяется для лечения рака кожи, особенно плоскоклеточного. В зависимости от площади поражения применяют 0,05% или 0,3% мазь

Rp.: Olivomycini 0,05 aut 0,3
Vasellini ad 100,0
M. f. unguentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь парафиновая —
Unguentum Paraffini

Индифферентная мазевая основа
Примечание: летом готовят мазь 1 : 3

Rp.: Paraffini 10,0
Olei Vasellini 40,0
M. f. unguentum
DS. Наружное

Мазь перцовая сложная —
Unguentum Capsici compositum

Мазь обладает раздражающими и антисептическими свойствами. Применяется по тем же показаниям, что и «Капсин», а также для лечения обморожений I — II степени

Rp.: Tincturae Capsici 7,7
Acidi formicici 0,32
Solutionis Ammonii caustici 25% 1,4
Saponis liquidi kalini 2,0
Olei camphorati 6,4
Olei Ricini 1,0
Lanolini 1,3
Axungiae porcinae 9,75
Vasellini 73,52
M. f. unguentum
DS. Для растирания

**Мазь полимиксиновая —
Unguentum Polymyxini**

Состав:
Polymyxini M sulfatis 20 000 ED
Basis unguenti ad 1,0
Выпускается в тубах по 5, 10,
25 и 50 г
Срок годности — 1 год

Антисептическое (бактерицид-
ное) средство, содержащее анти-
биотик для наружного приме-
нения — полимиксин.

Применяется для лечения гной-
ных процессов (ран, язв, пиодер-
мии), вызванных грамотрицатель-
ной флорой и синегнойной палоч-
кой

Rp.: Ung. Polymyxini 5,0 (10,0, 25,0 aut 50,0)
DS. Наносить на пораженную поверхность

**Мазь преднизолоновая (ВНР) —
Unguentum Prednisoloni**

Состав:
Prednisoloni 0,025
Basis unguenti ad 5,0
Выпускается в тубах по 5 г
Срок годности ВНР — 2 года

Свойства и показания к приме-
нению — см. «Мазь гидрокорти-
зоновая». Несколько более эффек-
тивна

Rp.: Ung. Prednisoloni 5,0
DS. Наносить на пораженные участки кожи

**Мазь репеллентная —
Unguentum repellens**

Мазь отпугивает летучих крово-
сосущих насекомых (комаров, мос-
китов и т. д.)

1. Rp.: Olei Caryophylli 5,0
Lanolini 15,0
Unguenti Glycerini 30,0

2. Rp.: Phenoli
Olei Bergamottae
Olei Citri aa 3,0
Hydrargyri amidochloridi 5,0
Vaselini 100,0
Cerae 7,5
M. f. unguentum
DS. Намазать оголенные участки тела для предо-
хранения от укуса насекомых

**Мазь ртутная белая —
Unguentum Hydrargyri amido-
chloridi**

Хранение — список Б
Срок годности официальной про-
писи № 3 — 1 год; после пере-
контроля — 6 мес.

Свойства, показания к приме-
нению и меры предосторожно-
сти — см. «Мазь коллоидно-вис-
мутовая»

1. Rp.: Hydrargyri amidochloridi 10,0
Vaselini 88,0
Olei Coriandri 2,0
2. Rp.: Hydrargyri amidochloridi 5,0 (10,0)
Vaselini ad 100,0
3. Rp.: Hydrargyri amidochloridi 10,0
Vaselini 60,0
Lanolini 30,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

**Мазь ртутная белая для губ —
Unguentum Hydrargyri amidochlo-
ridi labiale**

Отличается от мазей по предыдущим прописям карминно-красной окраской, что позволяет применить ее для нанесения на губы. Применяется обычно для лечения вторичного и третичного сифилиса

Rp.: Hydrargyri amidochloridi 0,5
Carmini 0,1
Spiritus aethylici gtts III
Unguenti lenientis 10,0
M. f. unguentum
DS. Для смазывания губ

**Мазь ртутная белая с висмутом —
Unguentum Hydrargyri amidochlo-
ridi cum Bismuthi subnitrate**

Мазь обладает кератолическим и отбеливающим свойствами. Применяется для выведения веснушек. Состав намазывают на ночь, утром смывают с мылом

1. Rp.: Hydrargyri amidochloridi
Bismuthi subnitratis aa 10,0
Unguenti Glycerini 20,0
2. Rp.: Hydrargyri amidochloridi
Bismuthi subnitratis aa 5,0
Unguenti Glycerini 20,0
M. f. unguentum
DS. Наружное, применять не дольше 2—3 дней

**Мазь ртутная белая с камфорой —
Unguentum Hydrargyri amidochlo-
ridi camphoratum**

Противовоспалительное и антисептическое средство. Используется при заболеваниях кожи и как косметическое средство

Rp.: Hydrargyri amidochloridi 2,0
Camphorae 0,5
Basis unguenti 25,0
M. f. unguentum
DS. Наружное

Мазь ртутная белая сложная — Свойства и применение — см.
Unguentum Hydrargyri amidochlo- «Мазь ртутная белая с висмутом»
ridi compositum

1. Rp.: Hydrargyri amidochloridi
Bismuthi subnitrat̄is āā 3,0
Acidi salicylici 1,0
Vaselini
Lanolini āā 15,0

2. Rp.: Hydrargyri amidochloridi 1,5
Ammonii carbonatis 1,0
Barii sulfatis
Talci
Glycerini
Unguenti Glycerini āā 3,0
Olei Rosae gtts III
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь ртутная желтая —
Unguentum Hydrargyri
oxydi flavi
Готовят ex tempore

Антисептическое и противовос-
палительное (вяжущее) средство.
Применяется в глазной прак-
тике при блефаритах, конъюнкти-
витах и пр., в кожной практике —
при сикозе, пиодермии и пр. При
использовании в глазной практике
нельзя сочетать с этилморфином,
а также с приемом внутрь бромидов
и йодидов. Противопоказан-
ия — обычные для соединений
ртути

1. Rp.: Hydrargyri oxydi flavi 1,0
Unguenti mollis 99,0
2. Rp.: Hydrargyri oxydi flavi 1,0
Vaselini ophthalmici ad 100,0
3. Rp.: Hydrargyri oxydi flavi 1,0
Aquae destillatae 8,0
Vaselini 75,0
Lanolini anhydrici 17,0
M. f. unguentum
DS. Наружное

Мазь ртутная желтая с дегтем —
Unguentum Hydrargyri oxydi flavi
picisatum

По свойствам аналогична мази по предыдущей прописи. Применяется для лечения экземы, чешуйчатого лишая и др.

Rp.: Hydrargyri oxydi flavi 0,3
Picis liquidae 3,0
Vaselini 30,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь ртутная желтая сложная —
Unguentum Hydrargyri oxydi flavi
compositum

По свойствам аналогична «Мази ртутной желтой». Используется при заболеваниях кожи

1. Rp.: Hydrargyri oxydi flavi 1,0
Resorcini
Acidi salicylici aa 0,3
Lanolini
Vaselini aa 15,0
 2. Rp.: Hydrargyri oxydi flavi 0,6
Ichthyoli 0,8
Unguenti Zinci 20,0
M. f. unguentum
DS. Смазывать пораженные участки кожи
-

Мазь ртутная серая —
Unguentum Hydrargyri cinereum

Состав:
Unguenti Hydrargyri cinerei concentrati 35,7
Lanolini anhydrici 4,3
Axungiae porcinae depurati 40,0
Sebi bovini depurati 20,0

Назначается в разделенном виде по 1,0—2,0

Срок годности — 1 год; после переконтроля — 6 мес.

Антисептическое средство. Применяется для лечения кожных паразитарных заболеваний (чесотки, кожного лейшманиоза и пр.), для профилактики (после подозрительного сношения) и лечения сифилиса. Ввиду токсичности не следует втирать сразу более 3—5 г мази. Противопоказания и осложнения — общие для препаратов ртути

Rp.: Ung. Hydrargyri cinerei 3,0
D. t. d. N. 30 in charta cerata
S. Втирать в кожу по 1 пакету

Мазь ртутная серая концентрированная —
Unguentum Hydrargyri
cinereum concentratum

Мазь используется для изготовления «Мази ртутной серой»

Rp.: Hydrargyri 85,0
Lanolini anhydrici 15,0
M. f. unguentum
DS. Для приготовления серой ртутной мази

Мазь рыбьего жира —
Unguentum Olei jecoris Aselli

Препарат содержит витамины А и D. Способствует заживлению ран и эпителизации.

Применяется для лечения вяло текущих гнойно-воспалительных процессов на коже (раны, ожоги и пр.)

Rp.: Olei jecoris Aselli
Solutionis Ergocalciferoli oleosae 0,125%
Vaselini āā 10,0
M. f. unguentum
DS. Для перевязок

Мазь салициловая —
Unguentum salicylatum
Срок годности — 2 года

Антисептическое, раздражающее и кератолитическое средство. По показаниям практически аналогична «Адолю» и т. п. прописям. Кроме того, применяется для лечения грибковых поражений кожи

1. Rp.: Acidi salicylici 2,0
Unguenti Paraffini 98,0

2. Rp.: Acidi salicylici 21,0
Lanolini 120,0
Vaselini
Cerae āā 48,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь салицилово-ментоловая —
Unguentum Acidi salicylici
mentholatum

Кератолитическое средство.
Применение — см. «Адоль»

1. Rp.: Mentholi 1,0
Acidi salicylici 5,0
Cerae
Olei Persicorum āā 40,0

2. Rp.: Olei Olivarum 18,0
Cerae 6,0
Acidi salicylici 4,0
Mentholi 0,1
M. f. unguentum
DS. Для лечения мозолей

Мазь салицилово-молочнокислая — *Unguentum Acidi salicylici cum Acido lactico*

По свойствам и применению аналогична предыдущей прописи

Rp.: *Acidi salicylici*
Acidi lactici āā 1,0
Basis unguenti 8,0
M. f. unguentum
DS. Наружное

Мазь салицилово-нафталанная — *Unguentum Acidi salicylici naphthalanatum*

Применяется в основном для тех же целей, что и «Мазь нафталанная»

Rp.: *Acidi salicylici* 2,0
Unguenti Naphthalani 98,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь салицилово-скипидарная — *Unguentum Acidi salicylici terebinthinatum*

Раздражающее, антисептическое и противовоспалительное средство.

Применяется для отвлекающей терапии заболеваний органов движения (миозиты, артриты), периферических нервов (невриты, радикулиты, невралгии) и внутренних органов

1. Rp.: *Acidi salicylici* 12,5
Olei Terebinthinae depurati 8,0
Axungiae porcinae 42,0

2. Rp.: *Acidi salicylici*
Olei Terebinthinae depurati āā 1,0
Lanolini 8,0
M. f. unguentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь свинцовая — *Unguentum Plumbi*

Приготовление прописей 1 и 2: смесь ингредиентов кипятят на огне до полного омыления.

Препарат обладает антисептическим, вяжущим и противовоспалительным свойствами.

Применяется для лечения гнойничковых заболеваний кожи, ссадин, ушибов и пр.

1. Rp.: *Emplastri Plumbi*
Olei Olivarum āā 100,0

2. Rp.: *Plumbi oxydi* 25,0
Olei Olivarum
Axungiae porcinae āā 50,0

3. Rp.: Paraffini 7,0
Olei Vaselini 23,0
Cetacei 2,0
Lanolini anhydrici 10,0
Glycerini 3,0
Sol. Plumbi subacetatis 5,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь свинцовая с настойкой
опия — **Unguentum Plumbi cum
tinctura Opii**

По свойствам мазь близка к предыдущей прописи, обладает, кроме того, некоторым обезболивающим эффектом.

Применяется для лечения ожогов I—II степени

Rp.: Olei Lini 60,0
Albumini Ovi 30,0
Solutionis Plumbi acetatis 7,5
Tincturae Opii simplicis 4,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь свинцовая сложная —
Unguentum Plumbi compositum

Свойства и применение — см.
«Мазь свинцовая»

Rp.: Unguenti Zinci 20,0
Lanolini anhydrici 10,0
Aquaе Plumbi 40,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь свинцовая с экстрактом
красавки — **Unguentum Plumbi
cum extracto Belladonnae**

По сравнению с «Мазью свинцовой» обладает спазмолитическим (холинолитическим) действием, благодаря чему может применяться для лечения обострений геморроя, трещин заднего прохода

Rp.: Sol. Plumbi subacetatis 2,0
Extracti Belladonnae 1,0
Basis unguenti 12,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь свинцово-бензойная —
Unguentum Plumbi benzoatum

Свойства и применение — см.
«Мазь свинцовая»

Rp.: Sol. Plumbi subacetatis 30,0
Vasellini 20,0
Lanolini anhydrici 10,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь свинцово-таниновая — Свойства и применение — см.
Unguentum Plumbi tannicum «Мазь свинцовая» и «Мазь свинцовая с настойкой опия» и т. п.

1. Rp.: Tannini 1,0
Sol. Plumbi subacetatis 2,0
Lanolini anhydrici 5,0
Vasellini 12,0
 2. Rp.: Sol. Plumbi subacetatis 25,0
Corticis Quercus 50,0 aut Tannini 15,0
Glycerini 15,7
Aquaе destillatae 250,0
 3. Rp.: Tannini 1,0
Glycerini 3,0
Sol. Plumbi subacetatis 6,0
Basis unguenti 24,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи
-

Мазь свинцово-феноловая — Свойства и применение — см.
Unguentum Plumbi phenolatum «Мазь свинцовая»

1. Rp.: Phenoli 1,0
Lanolini
Unguenti Plumbi subacetatis aa 40,0
Olei Olivarum 20,0
Olei Lavandulae 1,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи
-

Мазь свинцово-цинковая То же
Unguentum Plumbi zincatum

- Rp.: Zinci sulfatis 2,5
Sol. Plumbi subacetatis 5,0
Tincturae Myrrhae aut Tincturae Hyperici 1,0
Vasellini 41,5
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Приготовление: сульфат цинка и раствора ацетата свинца растирают с настойкой мирры (или зверобоя) и добавляют вазелин, растирая до получения однородной массы

Мазь серебра нитрата — **Unguentum Argenti nitratis**

Обладает теми же свойствами, что и «Мазь свинцовая», но антисептическое действие более выражено, а противовоспалительное — слабее.

Применяется в основном для лечения инфицированных ран, ожогов и т. п.

Rp.: Argenti nitratis 1,0
Unguenti mollis 100,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь серная — **Unguentum sulfuratum**

Мазь обладает антисептическим, инсектицидным (акарицидным) действием, способствует нормализации функций кожи.

Применяется для лечения паразитарных заболеваний кожи (чесотка), себореи, псориаза, экземы и т. п.

1. Rp.: Sulfuris praecipitati 125,0
Amyli Triticici
Saponis medicati aa 50,0
Aquaе destillatae 350,0

2. Rp.: Sulfuris praecipitati 125,0
Saponis medicati 100,0
Aquaе destillatae 700,0
M. f. unguentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи

Приготовление прописи 1: мыло кипятят с водой до образования однородной массы. К полуостывшей массе при растирании добавляют смесь серы и крахмала

Мазь серная сложная — **Unguentum sulfuratum compositum**

Противомикробное средство. Применяется для лечения себорей, грибковых заболеваний, чесотки (№ 2) и др.

1. Rp.: Sulfuris depurati 3,0
Resorcini 1,0
Ichthyoli 2,0
Vasellini
Lanolini aa 15,0

2. Rp.: Sulfuris praecipitati 20,0
Kalii carbonatis
Aquaе destillatae āā 8,0
Calcii carbonatis 10,0
Naphthalani 54,0

3. Rp.: Betanaphtholi
Balsami Peruviani aut Vinylini āā 1,0
Saponis viridis
Gerae āā 2,0
Vasolimenti sulfurati 3% 4,0
Sulfuris 2,0
Kalii carbonatis 1,0
Lanolini 12,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь серно-таниновая —
Unguentum sulfurato-tannatum

Вяжущее средство, способствующее отторжению ороговевшего эпидермиса.

Применяется для выведения веснушек

Rp.: Paraffini 18,0
Olei Amygdalarum 5,0
Lactis sulfuris 1,8
Glycerini 4,0
Tannini 1,0
Tincturae Colocynthis 20,0
Olei Rosmarini gttis X
M. f. unguentum

DS. Наружное. Ежедневно лицо натирается этой мазью перед сном

Приготовление: сплавляют парафин и миндальное масло и добавляют остальные ингредиенты

Мазь с калия йодидом —
Unguentum Kalii iodidi

Антисептическое средство.
Применяется при поверхностных микозах кожи

Rp.: Kalii iodidi 2,0
Aquaе destillatae 1,0
Axungiae porcinae 5,0
Lanolini 12,0
M. f. unguentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь с калия йодидом
желтая — Unguentum Kalii
iodidi flavum

Применяется по тем же показаниям, что и «Мазь йодная»

Rp.: Kalii iodidi 4,0
Aquaе destillatae 3,0

Cerae flavae 4,0
Axungiae porcinae 30,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь с калия йодидом и тиосульфатом натрия — Unguentum Kalii iodidi cum Natrii thiosulfate

Антисептическое средство.
Применяется для лечения инфицированных ран, пролежней, а также для борьбы с поверхностными микозами кожи

Примечание: пропись № 1 рекомендуется ГФ IX под названием «Мазь с йодидом калия»

1. Rp.: Kalii iodidi 50,0
Natrii thiosulfatis 1,0
Aquaе destillatae 44,0
Lanolini anhydrici 135,0
Axungiae porcinae 270,0

2. Rp.: Kalii iodidi 2,0
Aquaе destillatae 1,0
Natrii thiosulfatis 0,4
Axungiae porcinae 17,0
M. f. unguentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь скипидарная — Unguentum olei Terebinthinae

Срок годности — 1 год

Раздражающее кожу средство.
Применяется для рефлекторной отвлекающей терапии заболеваний внутренних органов (бронхиты и т. п.). Пропись № 1 (50%) предназначена для взрослых, пропись № 2 (20%) — для детей, а также при ревматизме, миозитах, невралгиях и др.

1. Rp.: Olei Terebinthinae
Axungiae porcinae aa 15,0

2. Rp.: Olei Terebinthinae 20,0
Axungiae porcinae 80,0
M. f. unguentum
DS. Для растирания

Мазь скипидарная сложная — Unguentum olei Terebinthinae compositum

Препарат применяется по тем же показаниям, что и предыдущая пропись

Rp.: Olei Terebinthinae
Chloroformii aa 10,0
Linimenti ammoniati 40,0
M. f. unguentum
DS. Для растирания

Мазь спермацетовая —
Unguentum Cetacei

Средство, смягчающее кожу.
Используется в косметике как
основа для других мазей

1. Rp.: Cerae albae 10,0
Cetacei 20,0
Olei Persicorum 70,0
2. Rp.: Cerae albae
Cetacei āā 15,0
Olei Amygdalarum 70,0
3. Rp.: Cetacei 10,0
Cerae albae 4,0
Olei Amygdalarum 37,0
4. Rp.: Cerae
Cetacei āā 3,0
Olei Olivarum 14,0
Aquae Rosae 2,0
M. f. unguentum
DS. Для смазывания лица и рук

Мазь спермацетовая сложная —
Unguentum Cetacei compositum

Смягчает кожу, обладает сла-
быми антисептическими свойст-
вами.

По применению аналогична мази
по предыдущей прописи

- Rp.: Cetacei 15,0
Cerae albae 11,0
Olei Amygdalarum 60,0
Lanolini anhydrici 20,0
Balsami Peruviani auf vinylini 1,0
Spiritus aethylici 95% 6,0
Gelatinae medicinalis 2,0
Aquae destillatae 30,0
M. f. unguentum
DS. Наружное (используется в косметике)

Мазь стрептоцидная —
Unguentum Streptocidi

По свойствам и применению
аналогична «Линименту стреп-
тоцида»

- Rp.: Streptocidi 10,0
Vaselini 90,0
M. f. unguentum
DS. Наружное

Мазь сульфациловая —
Unguentum Sulfacyli
Срок годности — 6 мес.

Противомикробное средство
эффективно против большинства
патогенных бактерий.

Применяется для лечения ин-
фекционных заболеваний глаз

Rp.: Sulfacyli-natrii 30,0
Aquaе pro injectionibus
Lanolini anhydrici āā 20,0
Olei Vaselini
Vaselini āā 15,0
M. f. unguentum
DS. Глазная мазь

Мазь с хлоридом железа —
Unguentum Ferri chloridi

Вяжущее средство.
Применяется для остановки кро-
вотечений при повреждении кожи

Rp.: Solutionis Ferri chloridi 10,0
Axungiae porcinae 40,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на поврежденный участок кожи

Мазь таниновая —
Unguentum Tannini

Вяжущее и противовоспалительное средство.
Применяется для лечения ожогов и обморожений I—II ст.

Rp.: Tannini
Lycopodii āā 10,0
Axungiae porcinae 20,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь таниновая сложная —
Unguentum Tannini compositum

По свойствам и применению аналогична «Мази свинцово-таниновой»

Rp.: Gallarum turcicae 10,0
(pulveris subtilissimi) aut
Tannini 5,0
Camphorae 2,0
Tincturae Opii simplicis 5,0
Basis unguenti 40,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь танино-серная —
Unguentum Tannini sulfuratum

По свойствам и применению близка к «Мази серной»

Rp.: Tannini 5,0
Aquaе Amygdalarum amararum 6,0
Sulfuris praecipitati 5,0
Axungiae porcinae 60,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь терпентинная —
Unguentum Terebinthinae
Срок годности — 2 года

Свойства и применение — см.
«Мазь скипидарная»

Rp.: Terebinthinae
Cerae flavae
Olei Terebinthinae āā 10,0
M. f. unguentum
DS. Втирать в больные места

Мазь терпентинная сложная —
Unguentum Terebinthinae
compositum

Антисептическое и раздражаю-
щее средство, способствует росту
грануляций и эпителизации.

Применяется для лечения инфи-
цированных ран, ожогов, гной-
ничковых заболеваний кожи и пр.

1. Rp.: Terebinthinae 32,0
Vitelli Ovi 4,0
Pulveris Myrrhae
Pulveris Aloës āā 1,0
Olei Sesami aut
Olei Persicorum 8,0
2. Rp.: Mentholi 0,1
Extracti Opii
Extracti Hyoscyami āā 0,15
Terebinthinae 2,0
Acidi hydrochlorici gttс XXX
Lanolini 10,0
Vaselini 30,0
M. f. unguentum
DS. Для перевязок

Приготовление прописи 1: терпентин и яичный желток смешивают до образования эмульсии и прибавляют остальные ингредиенты

Мазь тимоловая —
Unguentum Thymoli

Антисептическое средство.
Применяется для лечения инфи-
цированных ран

1. Rp.: Thymoli 2,0
Olei Lini 40,0
Saponis depurati 60,0
 2. Rp.: Thymoli 1,0
Basis unguenti ad 25,0
M. f. unguentum
DS. Для перевязок
-

Мазь тимоловая сложная —
Unguentum Thymoli compositum

То же

Rp.: Resorcini 5,0
Sulfuris 6,0
Thymoli 5,0
Lanolini anhydrici 8,0
Axungiae porcinae 20,0
M. f. unguentum
DS. Для перевязок

Мазь тополевая —
Unguentum Populi

Антисептическое и дезодорирующее средство, способствует регенерации тканей.

Применяется в составе сложных мазей

Rp.: Extracti Populi
Spiritus aethylici 90% āā 10,0
Axungiae porcinae 80,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженную поверхность

Мазь уксусно-бензойная —
Unguentum Acidi acetici benzoatum

Противомикробное и фунгицидное средство.

Применяется для лечения грибковых заболеваний кожи.

Rp.: Solutionis Acidi acetici 30%
Lanolini
Vaselini āā 10,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь уксусно-серная —
Unguentum Acidi acetici
sulfuratum

Антисептическое и кератолитическое прижигающее средство.

Применяется для выведения бородавок. Возможно образование грубых рубцов

Rp.: Acidi acetici concentrati 1,0
Sulfuris praecipitati 2,0
Glycerini 5,0
M. f. unguentum
DS. 1 раз в день осторожно смазывать бородавки этой мазью при помощи кисточки

Мазь ундециленовая —
Unguentum undecylenicum

Фунгицидное средство.

Применяется для лечения поверхностных микозов кожи (эпидермофитии, кандидамикозов и пр.)

Rp.: Acidi undecylenici 5,0
Zinci undecylenatis 20,0
Basis unguenti 75,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи 2 раза
в день

Мазь формалиновая —
Unguentum Formalini

Состав:
Acidi borici 5,0
Acidi salicylici 2,0
Solutionis Formaldehydi 15,0
Glycerini 14,0
Polyaethylenoxydi aut
Lanolini 62,5
Olei odorati 1,5
Выпускается в тубах по 50 и
100 г
Срок годности — 2 года

Антисептическое, подсушивающее и дезодорирующее средство. Применяется для лечения избыточной потливости. Не следует наносить на лицо

Rp.: Ung. Formalini 50,0 (100,0)
DS. Применять при потливости ног

Мазь фурацилиновая —
Unguentum Furacilini

Rp.: Furacilini 1,0
Vaselini 50,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Антисептическое средство. Применяется для лечения инфицированных ран, гнойно-воспалительных процессов кожи

Мазь фурацилино-касторовая —
Unguentum Furacilini cum oleo Ricini

Rp.: Furacilini 0,2
Olei Ricini 4,0
Lanolini anhydrici 5,0
Vaselini 90,8
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

По свойствам и применению аналогична предыдущей прописи

Мазь феноловая —
Unguentum Phenoli
Срок годности — 6 мес.

Антисептическое средство, обладает раздражающими и прижигающими свойствами.

Применяется для лечения кожных заболеваний (парша, сикоз)

1. Rp.: Phenoli 5,0
Olei Olivarum aut
Olei Persicorum 60,0
Amyli 85,0

2. Rp.: Phenoli puri 5,0
Axungiae porcinae 95,0
M. f. unguentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи
Приготовление прописи 2: фенол растворяют в растопленном свином
сале и помешивают до охлаждения

Мазь хлороформная —
Unguentum Chloroformii

Местнораздражающее и боле-
утоляющее средство.

Применяется для лечения забо-
леваний опорного аппарата (арт-
риты, миозиты), периферических
нервов (радикулиты, невралгии и
пр.), кожного зуда

1. Rp.: Chloroformii 5,0
Basis unguenti 20,0

2. Rp.: Cerae 5,0
Axungiae porcinae 85,0
Chloroformii 10,0

3. Rp.: Cerae 10,0
Axungiae porcinae 90,0
Chloroformii 20,0
M. f. unguentum
DS. Для растирания

Приготовление прописи 2 и 3: воск и свиное сало растапливают
на водяной бане, к полуостывшей массе при взбалтывании добавляют
хлороформ. Готовится ex tempore

Мазь хлортетрациклиновая глаз-
ная — Unguentum Chlortetracy-
clini ophthalmicum

Свойства и применение — см.
«Мазь дибимициновая глазная»

Состав:
Chlortetracyclini hydrochloridi
0,556 aut 1,112
Lanolini anhydrici 40,0
Vasellini ophthalmici ad 100,0
Выпускается в тубах по 5—50 г
Срок годности — 2 года

Rp.: Ung. Chlortetracyclini ophthalmici 5,0 (10,0; 25,0;
50,0)
DS. Глазная мазь

Мазь цинковая
Unguentum Zinci
Срок годности прописи 2—8 лет;
после переконтроля — 4 года

Антисептическое, вяжущее (противовоспалительное) и подсушивающее средство.

Применяется для лечения различных кожных заболеваний — экземы, дерматитов и пр. Пропись № 2 выпускается промышленностью

1. Rp.: Cerae 1,0
Vaselini 8,0
Zinci oxydi 1,0

2. Rp.: Zinci oxydi 5,0
Vaselini 45,0

3. Rp.: Zinci oxydi
Olei Persicorum
Vaselini aa 10,0
Lanolini anhydrici 7,0

4. Rp.: Zinci oxydi 10,0
Glycerini
Lanolini aa 30,0
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь цинково-серная —
Unguentum Zinci sulfuratum
Состав:

Unguenti sulfurati
Unguenti Zinci aa 50,0
Выпускается в банках

Применяется так же, как и мази по предыдущим прописям и, кроме того, для лечения чесотки

Rp.: Ung. Zinci sulfurati 100,0
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь цинковая с меди
сульфатом — Unguentum
Zinci cum Cupri sulfate

По свойствам аналогична «Мази цинковой».

Применяется для лечения инфицированных ран

Rp.: Cupri sulfatis 1,0
Unguenti Zinci 60,0
Olei jecoris Aselli 40,0
M. f. unguentum
DS. Для перевязок

Мазь цинхофеновая сложная —
Unguentum Cinchopheni
compositum

Противовоспалительное и антисептическое средство.

По показаниям аналогична «Мази нафталанной»

Rp.: Cinchopheni
Zinci oxydi āā 5,0
Naphthalani 12,0
Tincturae Valerianae
Tincturae Convallariae āā 2,5
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь цитральная — Unguentum
Citralli

Противовоспалительное средство, способствующее эпителизации.

Применяется при различных кожных заболеваниях, сопровождающихся десквамацией эпителия (экземы, дерматиты и пр.), а также при язвах, ожогах

Rp.: Solutionis Citralli 1% 0,25—1,0
Paraffini 40,0
Lanolini 10,0
Olei Vaselini 50,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь щелочная — Unguentum
alcalinum

Препарат размягчает и расплавляет некротические ткани.

Применяется для облегчения удаления струпуев и корок на коже

Rp.: Kalii carbonatis depurati 3,0
Axungiae porcinae 25,0
Aquae destillatae 2,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мазь щелочная глазная —
Unguentum alcalinum ophthalmicum

Антисептическое средство.

Применяется для лечения инфекционных и воспалительных заболеваний глаз (конъюнктивитов, иридоциклитов и пр.)

Rp.: Natrii tetraboratis 1,0
Natrii hydrocarbonatis 2,0
Aquae pro injectionibus
Lanolini anhydrici āā 10,0
Vaselini ad 100,0
M. f. unguentum
DS. Глазная мазь

Приготовление: при экстенпоральном приготовлении небольших количеств этой мази обе соли обязательно растворяют в воде и раствор эмульгируют ланолином, после чего в несколько приемов при растирании добавляют вазелин. При заготовке мази в запас, несмотря на наличие в прописи воды, ее приготавливают из мельчайших порошков безводных солей. Воду примешивают перед отпуском мази. В противном случае при хранении, вследствие испарения растворителя, соли могут выкристаллизовываться в виде острых кристаллов, делающих мазь негодной для применения

**Мазь эритромициновая —
Unguentum Erythromycini**

Состав:

Erythromycini 1,0

Lanolini anhydrici 40,0

Vaselini ad 100,0

Выпускается в тубах по 5, 10
и 50 г

Срок годности — 1 год

Антисептическое средство, эффективное в основном против грамположительной (кокковой) флоры и вируса трахомы.

Применяется для лечения гнойно-воспалительных заболеваний кожи, инфицированных ран и ожогов, в глазной практике для лечения трахомы

Rp.: Ung. Erythromycini 5,0 (10,0; 50,0)

DS. Наносить на пораженные участки кожи

**Мазь эстроновая —
Unguentum Oestroni**

Препарат женского полового гормона (эстрогена).

Применяется для лечения юношеских и обыкновенных угрей у женщин и девушек

Rp.: Oestroni 0,01 (100 000 ED)

Cerae albae

Cetacei

Glycerini aa 10,0

Olei Persicorum 70,0

Olei Lavandulae gtts X

M. f. unguentum

DS. Наносить на кожу лица

**Мазь этакридиновая —
Unguentum Aethacridini (Rivanoli)**

Антисептическое средство.

Применяется в тех же случаях, что и «Мазь фурацилиновая» (см.)

Rp.: Aethacridini lactatis 0,1

Vaselini 10,0

M. f. unguentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи

Макроциклин — Macrocyclin
(ПНР)

Состав на 1 таблетку:
Erythromycini 0,05
Tetracyclini 0,2
Хранение — список Б
Срок годности — 1 год

Комбинированный препарат
антибиотиков.

Применяется преимущественно при инфекциях, вызванных устойчивыми к другим антибиотикам штаммами стафилококков (пневмонии, тонзиллиты, отиты и пр.), а также при бруцеллезе, риккетсиозах, туляремии. По действию близок к «Олететрину»

Rp.: Tabul. «Macrocyclin» N. 50
DS. По 1 таблетке 4—6 раз в сутки

Малинная жидкость —
Liquor Malinini

Инсектицидное и бактерицидное средство.

Применяется для борьбы со всеми видами насекомых-паразитов. Отличается от фосфорорганических инсектицидов тем, что совершенно безвредно для человека, отсутствием привыкания насекомых к яду и бактерицидными свойствами. Жидкость испаряется в закрытых помещениях 2—3 дня

Rp.: Florum Pyretri 20,0
Olei Terebinthinae
Petrolei aa 100,0
Olei Cinnamomi 3,0
Phenoli 10,0
DS. Для дезинсекции

Приготовление: персидский (или далматский) порошок извлекается скипидаром, жидкость сливают, а остаток вновь извлекается керосином, после чего остаток отжимают, жидкости сливают и к их смеси добавляют фенол и коричное масло

Малинина порошок —
Pulvis Malinini

По свойствам и применению аналогичен «Малинная жидкости»

Rp.: Liquoris Malinini 10,0
Talcii 90,0
MDS. Для дезинсекции

Малиновского суппозитории —
Suppositoria Malinovsky

Антисептическое и бактерицидное средство.

Применяется в качестве противозачаточного средства

Rp.: Chinini hydrochloridi 2,0

Acidi borici 3,0

Acidi salicylici 1,5

Olei Cacao 15,0

M. f. suppositoria
vaginalia N. 10

DS. По 1 суппозиторию во влагалище за 15—20 мин
до сношения

Маммофизин — Mammophysinum

Комбинированный препарат, содержащий экстракты гипофиза и молочной железы лактирующих коров.

Действующим веществом является окситоцин

Выпускается в ампулах по 1 мл

Хранение — список Б, в прохладном, защищенном от света месте

Средство, стимулирующее сокращение матки и секрецию молока.

Применяют при первичной родовой слабости, а также при атонических послеродовых кровотечениях для ускорения и послеродовой субинволюции матки. Препарат может применяться для остановки маточных кровотечений, связанных с хроническим воспалительным процессом или фибромиомой матки. Во время родов вводят по 0,3—0,4 мл через каждые 30 мин до наступления эффекта, при маточных кровотечениях — по 1 мл 1—2 раза в день. При консервативном лечении фибромиом вводят ежедневно по 1 мл. На курс лечения — 12—15 мл

Rp.: Mammophysini 1 ml

D. t. d. N. 6 in ampul.

S. Вводят внутримышечно или под кожу

Маннитол — Mannitol

D(-)-Маннит

Синонимы: Maniton-S, Mannazucker, Mannigen, Mannit, Osmitol, Osmosal

Выпускается в порошке по 20,0 во флаконах емкостью 500 мл

Хранение — в обычных условиях

Срок годности — 2 года

Осмотическое мочегонное средство.

Применяется при заболеваниях, сопровождающихся задержкой жидкости в организме; при увеличении количества циркулирующей жидкости в случае экстракорпорального кровообращения. Применяют также при местной внеклеточной гипергидратации, в частности отеке мозга. Маннитол эффективен при острой почечной и печеночной недостаточности с сохранением фильтрации, посттрансфузионных осложнениях (вследствие вливания несовместимой крови), при острых отравлениях ядами, легко выделяющимися через почки

Rp.: Mannitoli 20,0

DS. Внутривенно. Перед употреблением препарат растворяют в воде для инъекций или в изотоническом растворе натрия хлорида или в 5% растворе глюкозы. Концентрация раствора — 5—40% в зависимости от показаний

Манус — Manus

Антисептическое и смягчающее кожу средство.

Применяется для обработки рук

Rp.: Glycerini

Aetheris acetici

Spiritus aethylici 70% āā 100,0

MDS. Наносить на кожу

Марплан — Marplan (Швейц.)

Антидепрессант (ингибитор МАО).

5-Метилизоксазол-3-карбонил-N-бензилгидразид

Синонимы: Eperzer, Isocarboxamid, Marplan

По свойствам, применению и противопоказаниям аналогичен «Ипразиду»

Выпускается в таблетках по 0,01

Хранение — список Б

Rp.: Tabul. «Marplan» 0,01

D. t. d. N. 50

S. По 1 таблетке 3 раза в день

Масло беленное —

Oleum Hyoscyami

Раздражающее средство.

Применяется в составе различных линиментов

Срок годности — 5 лет; после переконтроля — 3 года

1. Rp.: Folii Hyoscyami 100,0

Spiritus aethylici 95%

aut 70% q. s.

Solutionis Ammonii caustici q. s.

Olei Heliantii 1000,0

2. Rp.: Folii Hyoscyami 4,0

Spiritus aethylici 90% 3,0

Olei Sesami aut Olei Helianthi 24,0

MDS. Наружное

Масло камфорное для наружного применения — *Oleum camphoratum ad usum externum*

Срок годности — не ограничен

Раздражающее и антисептическое средство.

Применяется самостоятельно и в составе смесей и линиментов для растирания при заболеваниях опорного аппарата и внутренних органов

Rp.: Camphorae 10,0
Olei Helianthi ad 100,0
MDS. Для растирания

Масло карболовое —
Oleum carbolisatum

Антисептическое средство.
Применяется для обработки мелких повреждений кожи

Rp.: Phenoli puri 2,0
Olei Olivarum aut
Olei Persicorum 98,0
MDS. Наносить на пораженные участки кожи

Масло льняное серное —
Oleum Lini sulfuratum

Раздражающее и антисептическое средство. Применяется для изготовления некоторых сложных прописей

Rp.: Olei Lini 60,0
Sulfuris exsiccati 10,0
MDS. Наружное

Приготовление: льняное масло нагревают в керамической посуде до 120° (не выше 160°!) и растворяют в нем хорошо высушенную серу

Масло ментоловое —
Oleum Mentholi

Антисептическое и отхаркивающее средство.

Применяется для лечения острых заболеваний верхних дыхательных путей (фарингитов, ларингитов, бронхитов) в виде ингаляций, а также в виде капель при остром насморке (рините)

1. Rp.: Mentholi 0,05 (0,1)
Olei Vaselini 10,0

2. Rp.: Mentholi 0,1
Olei Persicorum 10,0

MDS. Для паровых ингаляций по 15—20 капель на стакан кипятку. При остром рините по 2 капли в нос

Масло ментоловое сложное —
Oleum Mentholi compositum

По свойствам аналогична предыдущей прописи.

Применяется местно для лечения острого ринита

Rp.: Thymoli 0,05
Mentholi
Camphorae aa 0,2
Olei Eucalypti 0,05
Olei Vaselini 100,0
MDS. По 2—3 капли в нос

Приготовление: ментол, камфору и тимол растворяют в подогретом вазелиновом масле и добавляют масло эвкалипта

Масло миндальное бензойное —
Oleum Amygdalarum benzoatum

Антисептическое средство. Входит в состав некоторых сложных прописей

Rp.: Acidi benzoici 1,0
Olei Amygdalarum 99,0
MDS. Наносить по пораженные участки кожи

Масло облепиховое —
Oleum Hipporrhoeae

Состоит из смеси каротина и каротиноидов, токоферолов и глицеридов олеиновой, линолевой, пальмитиновой и стеариновой кислот

Выпускается во флаконах по 100 и 200 мл

Хранение в прохладном, защищенном от света месте

Срок годности — 1 год

Витаминный препарат.

Применяется наружно для лечения ожогов, пролежней, лучевых повреждений кожи. Внутрь применяется при лучевой терапии рака пищевода по $\frac{1}{2}$ столовой ложки 2—3 раза в день, при лечении язвенной болезни желудка — внутрь по 1 чайной ложке 2—3 раза в день. При лечении кольпитов и эндоцервицитов стенки влагалища и шейку матки смазывают облепиховым маслом при помощи ватных тампонов. При лечении эрозий шейки матки тампоны, смоченные облепиховым маслом, прижимают к эрозированной поверхности

Rp.: Ol. Hipporrhoeae 100,0
DS. По 1 чайной ложке 2—3 раза в день

Масло тимоловое —
Oleum Thymoli

Антисептическое и слабое анестезирующее средство.

Применяется для смягчения зуда при различных кожных заболеваниях

Rp.: Thymoli 1,0
Olei Olivarum 99,0

MDS. Наносить на пораженные участки кожи

Приготовление: тимол растворяют в масле при слабом нагревании

Масло цинковое —
Oleum Zinci

Препарат применяется для защиты кожи рук при работе с агрессивными веществами

Rp.: Zinci oxydi
Olei Olivarum aut
Olei Helianthi aa 50,0
MDS. Для смазывания рук

**Маслова жидкость —
Liquor Maslovi**

Коллоидно-солевой плазмозамещающий раствор.

Применяется в нетяжелых случаях шока и кровопотери, но в основном — для терапии дегидратации организма — при дизентерии, токсиконфекциях, холере, гипохлоремическом алкалозе. Близко по составу и применению к «Банайтиса жидкости»

Rp.: Solutionis Ringeri
Solutionis Glucosi 5% aa 200,0
Plasmatis 100,0
M. Sterilisetur!
DS. Внутривенно капельно

Мебедрол — Mebedrolum

2-Диметиламиноэтилового эфира-*o*-метилбензгидрола гидрохлорид

Синонимы: Disipal, Mephedamin, Orphenadrin hydrochlorid

Выпускается в ампулах по 1 мл 2,5—5% раствора и таблетках по 0,025 и 0,05

Хранение — список Б

Центральный холинолитик.

Применяется при лечении паркинсонизма, болезни Паркинсона, спастических парезов и других заболеваний, связанных с поражением экстрапирамидной системы и др. Может применяться также при спазмах гладкой мускулатуры внутренних органов

Rp.: Mebedroli 0,025 (0,05)
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1 табл. 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Mebedroli 2,5% (5%) 1 ml
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. Под кожу по 1 ампуле 1—2 раза в день

**Медротестрона пропионат —
Medrotestroni propionas**

2- α -Метиландростан-17 β -ол-3-он-17-пропионат

Синоним: Masteron

Выпускается в ампулах по 1 мл 5 и 10% масляного раствора

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 2 года

Аналог мужского полового гормона.

Применяют при первичном раке молочной железы с метастазами

Rp.: Sol. Medrotestroni propionatis oleosae 5% (10%) 1 ml
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. По 1 мл внутримышечно ежедневно

Мезалгин — Mesalgin (ЧССР)

Состав на 1 ампулу:
Trimesicaini 0,01
Coffeini-natrii benzoatis 0,15
Natrii salicylatis 1,0
Aquaе pro injectionibus ad 10,0
Выпускается в ампулах по 10 мл
Хранение: список Б, в защищенном от света месте

Анальгетическое и противовоспалительное средство.

Применяется при невралгии, невритах, полиневритах, шейно-плечевом синдроме, ревматических болях

—Rp.: «Mesalgin» 10 ml
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. По 1 ампуле в вену (медленно) 1—2 раза в день

**Мейсаховича паста —
Pasta Meisachovitschi**

Депиляторий.

Применяется при подготовке больного к фунгицидной терапии при грибковых поражениях

Rp.: Strontii chloridi 3,0
Glycerini 1,0
M. f. pasta
DS. Наносить на волосистую поверхность кожи

Мексаза — Mexase (СФРЮ)

Состав на 1 драже:
Bromelini 0,05
Pancreatini 0,15
Acidi dehydrocholici 0,025
Enteroseptoli 0,1
Phanquinoni 0,01
Хранение — список Б, в защищенном от света месте
Срок годности — 3 года

Антисептическое и способствующее пищеварению средство. Во внешнем слое драже содержатся пищеварительные ферменты — бромелин (сумма протеолитических ферментов ананаса) и панкреатин, а также дегидрохолевая кислота, во внутреннем слое — антисептики, производные 8-оксихинолина (энтеросептол и фанхинон).

Применяется для лечения заболеваний, проявляющихся снижением пищеварительной функции желудка, печени и поджелудочной железы и появлением гнилостных и бродильных процессов в желудке (гипоацидный гастрит, гастроэнтериты, холециститы и гепатиты, диспепсия и пр.). При появлении изжоги и тошноты следует комбинировать с антацидами, при пониженной кислотности желудочного сока — с соляной кислотой. Противопоказан при гипертиреозе, идиосинкразии к йоду.

Рр.: Dragee «Mehase» N. 20

DS. По 1—2 драже 3 раза в день во время еды, запивая водой

Мексамин — Mexaminum

5-Метокситриптамина гидрохлорид

Синонимы: Mexaminum, Mexamin

Выпускается в таблетках по 0,05

Хранение — список Б, в склянках темного стекла в сухом, защищенном от света месте

Радиозащитное средство.

Применяют для профилактики общей лучевой реакции при лучевой терапии. Противопоказан при выраженном склерозе сосудов сердца и мозга, сердечно-сосудистой недостаточности, бронхиальной астме, заболеваниях почек, при беременности

Рр.: Mexamini 0,05

D. t. d. N. 6 in tabul.

S. За 30—40 мин перед каждым сеансом лучевой терапии

Мексаформ — Mexaform (СФРЮ)

Состав на 1 драже:

Enteroseptoli 0,2

Phanquinoni 0,02

Oxurphenonii bromidi 0,002

Хранение — список Б

Срок годности — 10 лет

Антисептическое средство, обладает спазмолитическим действием.

Применяют для регуляции кишечной флоры при бродильной диспепсии и гнилостной диспепсии, послеоперационном дисбактериозе, при нарушении микрофлоры кишечника после перорального применения антибиотиков, при хронических запорах и т. п.

Рр.: Dragee «Mehaform» N. 20

DS. По 2 драже 3 раза в день

Мелливенон — Mellivenon (НРБ)

Препарат пчелиного яда с добавлением тиамин хлорида (мазь) и метилсалицилата (линимент).

Выпускается в виде мази в тубах по 15—20,0 и в виде линимента во флаконах по 20,0

Хранение — в прохладном, защищенном от света месте

Местнораздражающее средство.

Применяется для лечения артритов и артрозов различного происхождения, подагры, тендовагинитов, невритов и невралгий, некоторых аллергических заболеваний (бронхиальная астма, крапивница, сенная лихорадка и пр.), облитерирующего эндартериита, атеросклероза сосудов конечностей, а также для ускорения заживления вяло текущих ран и язв. Противопоказан при острых воспалительных процессах, туберкулезе печени и почек, диабете, злокачественных новообразованиях

Rp.: Ung. «Mellivenon» 20,0
DS. Для растирания
Rp.: Lin. «Mellivenon» 20,0
DS Для растирания

Меллерил — Melleril (СФРЮ)
2-Метилтио-10-[2-(1-метил-2-пи-
перидил)-этил]-фенотиазина гид-
рохлорид

Синонимы: Mallorol, Malloryl,
Mellaril, Mellerets, Mellerette(n),
Thioridazin

Выпускается в драже по 0,25—
0,05

Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте

Срок годности СФРЮ — 5 лет

Нейролептик, производное фе-
нотиазина. Применяют при пси-
хомоторных нарушениях с беспок-
койством, состоянием напряжен-
ности, бессоннице, климактери-
ческих невробах и т. п. Близок к
«Мажептилу» (см.)

Rp.: Drag. «Melleril» 0,025—0,05
D. t. d. N. 50
S. По 1—4 драже в день

Мензилан — Menzylan (ПНР)
Состав на 1 таблетку:
Acidi parasulfoaminobenzoici 0,35
Amidopyrurini 0,1
Barbitali 0,05

Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте

Анальгезирующее и седативное
средство.

Применяют при дисменорее, го-
ловной боли и т. п.

Rp.: Tabul. «Menzylan» N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Менталин — Menthalin

Кератолитическое средство. По
свойствам и применению анало-
гично «Адолло»

Rp.: Acidi salicylici
Acidi lactici aa 1,0
Collodii 10,0
Mentholi 0,1
MDS. Наносить на пораженные участки кожи

Ментогом — Menthogom

Отхаркивающее средство.
Применяется для смягчения су-
хого кашля при бронхитах, пнев-
монии и пр.

Rp.: Gummi arabici
Sacchari aa 0,5
Aquaе destillatae q. s.
Mentholi
Natrii hydrocarbonatis aa 0,05
M. f. pastil.
D. t. d. N. 20
S. По 1 лепешке под язык

Ментолин — Mentholin

Раздражающее средство. Применяется как средство рефлекторной терапии при радикулитах, артритах, миозитах, люмбаго, бронхитах, пневмонии и пр.

Rp.: Mentholi 10,0
Spiritus aethylici 78,0
Solutionis Ammonii caustici 12,0
MDS. Для растирания

Ментол-фенол — Mentholum-Phenolum

Препарат применяется в стоматологии

Rp.: Phenoli puri 10,0
Mentholi 30,0
MDS. В зубо-врачебный кабинет

Мепазин — Mepazinum
10-(1-Метил-3-пиперидил)-метилфенотиазина ацетат
Синонимы: Lacumin, Nothiazine, Pacatal, Pecazin и др.
Выпускается в таблетках (драже) по 0,025 и в ампулах по 1 и 2 мл 2,5% раствора
Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Нейролептик («большой» транквилизатор). По свойствам и применению аналогичен «Аминазину». Менее активен, чем последний, и поэтому не купирует острого психомоторного возбуждения. Обычно не вызывает депрессии.

Применяется для премедикации, лечения неврозов, а также для лечения психозов, не сопровождающихся выраженной ажитацией

Rp.: Mepazini 0,025
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день после еды

Rp.: Sol. Mepazini 2,5% 1,0
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. По 1 мл внутривенно медленно, предварительно развести в 10 мл 40% раствора глюкозы. Можно вводить в мышцы

Мепанит — Mepanitum

2-Диэтиламиноэтилового эфира фенилциклопентакарбоновой кислоты метилсульфометилат

Синоним: Merpanit

Выпускается в ампулах по 2 мл 2% раствора

Хранение — список А, в защищенном от света месте

Холинолитическое средство.

Применяют при спазмах гладкой мускулатуры внутренних органов (почечные, печеночные, кишечные колики), при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при бронхиальной астме и т. п.

Rp.: Sol. Mepaniti 2% 2,0
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. По 1—2 мл под кожу

Мепротан — Meprostanum

2-Метил-2-пропилпропандиола -1,3-дикарбамат

Синонимы: Anepromat, Andaxin (ВНР), Aneurial, Ansil, Apacil, Artolon, Biobamat, Calmadin, Dabromat, Diurnal, Ecuamil, Edeanal, Equamil, Harmonin, Ipsotran, Larten, Mepantin, Meproban, Meprobamat (ЧССР), Meprozin, Morbam, Nervonus, Pankalma, Paren-sedal, Paxidil, Paxin, Pimal, Placidon, Probamyl, Procalmidol, Restenil, Sedazil, Sedral, Tranquilate

Выпускается в таблетках по 0,2 и 0,4 г

Хранение — список Б, в хорошо укупоренной таре

Срок годности — 5 лет; после переконтроля — 2 года

Мепробамат ЧССР — 8 лет; мепробамат ГДР — 5 лет

Седативное и анксиолитическое средство.

Применяется при лечении нервно-психических заболеваний. Действует успокаивающе при состояниях тревоги, страха, внутренней напряженности, повышенной возбудимости, неврозах, психопатиях, бессоннице. Мепротан можно применять в сочетании с другими успокаивающими препаратами

Rp.: Meprotani 0,4 (0,2)
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1/2—1 таблетке 2—3 раза в день.

Меридил — Meridilum

Метилового эфира фенил-(2)-пиперидилуксусной кислоты гидрохлорид

Синонимы: Aktilin, Centedrin (ВНР), Methylphenidathydrochlorid, Methylphenidylat, Phenydylate, Rilatin, Ritalin

Выпускается в таблетках по 0,01 и 0,02

Хранение — список А

Срок годности — 5 лет

Психостимулирующее средство.

Применяется в психиатрии для лечения депрессий различного происхождения, при астеническом синдроме, переутомлении, для повышения работоспособности, для лечения «нейроплегического синдрома», комы, вызванной отравлением снотворными и транквилизаторами. Практически не дает вегетативных реакций. Может вызвать бессонницу, пристрастие

Rp.: Meridili 0,01
D. t. d. N. 50 in tabul
S. По 1—2 таблетке 2 раза в день

Мерказолил — Mercazolylum
1-Метил-2-меркаптоимидазол
Синонимы: Antiroid, Basolan,
Danantizol, Favistan, Flaba, Fren-
tirox, Mercaptizol, Mercazolyl, Me-
tazolo, Methimazol, Methirit, Me-
thothylin (ВНР), Strumazol, Tap-
azol, Thiamazol, Thycazol, Tirazolo

Выпускается в таблетках по 0,005

Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте

Срок годности таблеток, покры-
тых оболочкой, — 5 лет

Антитиреодное средство, бло-
кирующее йодирование тиреогло-
булина.

Применяют при базедовой бо-
лезни и тиреотоксикозе различной
степени, для подготовки больных
к струмэктомии. Может вызвать
лейкопению, аллергию, разрас-
тание ткани щитовидной железы
(зоб)

Rp.: Mercazolyl 0,005
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Меркамина аскорбинат —
Mercamini ascorbinas
β-Меркаптоэтиламина аскорби-
нат

Выпускается в ампулах по 2 мл
10% раствора

Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте

Срок годности — 1 год

Радиозащитное средство.

Применяется для профилактики
радиационных поражений, вызы-
ваемых рентгенорадиотерапией

Rp.: Sol. Mercamini ascorbinatis 10% 2 ml.
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. Внутривенно. По 1 ампуле за 10-20 мин до облучения

Меркамина гидротартрат с пири-
доксином — Mercamini hydrotar-
tras cum Pyridoxino

Выпускается в таблетках по 0,2
Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте

Срок годности — 2 года

Свойства и применение — те же,
что и у предыдущего препарата.
Несколько менее токсичен

Rp.: Mercamini hydrotartratis cum
Pyridoxino 0,2
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 3—5 таблеток за 1—2 ч до облучения

**Меркамина гидрохлорид —
Mercamini hydrochloridum**

β-Меркаптоэтиламина гидрохлорид

Синонимы: Becaptan, Cysteamine, Lambratene, Mercaptaminum

Выпускается в ампулах по 2 мл 10% раствора

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности ампул — 1 год

Свойства и применение — см. «Меркамина аскорбинат». По сравнению с последним несколько более токсичен

Rp.: Sol. Mercamini hydrochloridi 10% 2 ml.

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Внутривенно. С профилактической целью вводят 0,1—0,2 г (1—2 мл 10% раствора) за 10—30 мин до первого облучения. Общее количество инъекций — 4—5—7 на курс лучевой терапии

**Меркаптопурин —
Mercaptopurinum**

6-Меркаптопурин

Синонимы: Istimpur, Leukerin, Leupurin, Mercapleukin, Mercapurine, Mercapurin, Mern, Mucaptine, 6 MP, Purinethol

Выпускается в таблетках по 0,05

Хранение — список А

Срок годности СССР — 4 года;

ПНР — 3 года

Антибластомное средство (анти-метаболит).

Применяют для лечения острого и подострого лейкоза, а также при резко выраженных обострениях хронического миелолейкоза

Rp.: Mercaptopurini 0,05

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. В первые 3—4 недели назначают ежедневно из расчета 0,002—0,0025 на 1 кг веса больного. При отсутствии эффекта через 4 недели после начала лечения дозу постепенно увеличивают до 5 мг на 1 кг веса в сутки (но не более)

Меркузал — Mercusalum

Раствор (10%) моноватриевой соли соединения карбоксиметилового эфира 2-метокси-3-ртутьпропиламида салициловой кислоты с 5,5-диэтилбарбитуровой кислотой (барбиталом)

Выпускается в ампулах по 1 мл

Хранение — список Б

Срок годности — 1 год; после переконтроля — 1 год

Ртутное мочегонное средство.

Применяется при отеках вследствие хронической сердечной недостаточности, цирроза печени или нефроза. Не рекомендуется применение при гломерулонефритах. Следует сочетать с кислотообразующими диуретиками (ацетат калия) или с ингибиторами карбоангидразы (диакарб), а при лечении сердечными гликозидами — с хлоридом калия, так как препарат вызывает усиленную потерю калия и гипохлоремический алкалоз

Rp.: Mercusali 1,0
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. Внутримышечно (по 0,5—1 мл) один раз в 5 дней

Местрол — Mestrol (ПНР)
Выпускается в таблетках
Состав таблеток:
Methyltestosteroni 0,0025
Oestradioli benzoatis 0,0005
Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Комбинированный препарат мужского и женского гормона. Применяется при болезненных менструациях, гипертрофии предстательной железы, климактерических расстройствах, сосудистых нарушениях. Близок к венгерскому препарату «Амбосекс», а также к зарубежным препаратам фемандрену и фемовлару

Rp.: Tabul. «Mestrol» N. 20
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день (сублингвально)

Мессалин — Messalin

Свойства и применение — см. «Линимент метилсалицилата», «Линимент ментоловый» и пр.

Rp.: Mentholi 1,0
Saliti (Borneoli salicylatis) 8,0
Lanolini 12,0
MDS. Для растирания

Месфенал — Mesphenalum
3-диэтиламинопропилового эфира 1,1-дифенилуксусной кислоты метилсульфометилат

Выпускается в ампулах по 1 мл 1% раствора

Хранение — список Б

Холинолитик, по свойствам близкий к «Мепаниту».

Применяют при спазмах гладкомышечных органов — при бронхиальной астме, хронических колитах, почечной и кишечной коликах, при спазмах пищевода, а также язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническом холецистите

Rp.: Sol. Mesphenali 1% 1 ml.
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. Под кожу 1—2 раза в день

Метамизил — Metamizylum
2-Диэтиламинопропилового эфира бензиловой кислоты гидроклорид

Синонимы: Methamicil, Methyl-diazyl

«Малый» транквилизатор. По свойствам и применению аналогичен «Амизилу». Несколько более активен

Выпускается в таблетках по 0,001 и ампулах по 1 мл 0,25% раствора

Хранение — список А, в прохладном, защищенном от света месте

Срок годности таблеток — 2 года

Rp.: Metamizyli 0,001

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 1 таблетке 2 раза в день

Rp.: Sol. Metamizyli 0,25% 1,0

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 1 мл под кожу

**Метандростенолон —
Methandrostenolonum**

17- α -Метил- Δ -дегидротестостерон

Синонимы: Anabolin, Anaboral, Danabol, Dehydromethyltestosteron, Dianabol (BHP), Distranorm, Metabolina, Methandienone, Nerobol, Novabol, Stenolon, Vanabol

Выпускается в таблетках по 0,001 и 0,005

Хранение — список Б, в прохладном, защищенном от света месте

Срок годности — 2 года

Анаболический стероидный препарат.

Применяют при нарушении белкового обмена: при астении, кахексии различного происхождения, после тяжелых травм, операций, при остеопорозах, переломах, состоянии реконвалесценции и т. п. Противопоказан при беременности и кормлении, девочкам препубертатного возраста, при раке простаты, при поражении печени и почек

Rp.: Methandrostenoloni 0,005

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 1 таблетке 1—2 раза в день (взрослому)

**Метиландростендиол —
Methylandrosterndiolium (ЧССР)**

17- α -метил-5-андростен-3 β -17 β -диол

Синонимы: Androdiol, Androgonyl, Androteston «M», Anormon, Crestabolic, Diandrin, Diolandrone, Diolostene, Gynediolo, Madiol, Masdiol, Megabion, Mestenediol, Metandiolo, Methanabol, Neostene, Neosteron, Neviron, Protendiolo, Sinesex, Stenediol, Stenosterone,

Анаболический стероидный препарат.

Применяется так же, как и «Метандростенолон», однако отличается от последнего относительно более выраженной андрогенной активностью, что с одной стороны, ограничивает его применение как анаболизатора у женщин, а с другой стороны, позволяет применять его по тем же показаниям, что и андрогены, — при раке мо-

Testodiol, Tonormon, Troformone и др.

Выпускается в таблетках по 0,01 и 0,025

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 3 года; СССР — 5 лет

лочной железы, в климактерическом периоде, при дисменорее, не связанной с гипогонадизмом и т. п.

Rp.: Methylandrosterendioli 0,01 (0,025)

D. t. d. N. 30 in tabul.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день под язык

Метилapoгалантамина гидрохлорид — Methylapogalanthamini hydrochloridum

Выпускается в таблетках по 0,002 и 0,005 и в ампулах по 1 мл 0,2% раствора

Хранение — список Б

Срок годности — 2 года

Симпатолитик.

Применяется для лечения гипертонической болезни I—II стадии, в том числе для лечения криза. Может использоваться для лечения болезни Рейно, облитерирующего эндартерита и т. п. Может вызвать ортостатический коллапс

Rp.: Methylapogalanthamini hydrochloridi 0,002 (0,005)

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день перед едой.

Rp.: Sol. Methylapogalanthamini hydrochloridi 0,2% 1 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 1—2 мл в мышцы или в вену

Метилтестостерон — Methyltestosteronum

17- α -Метилтестостерон

Синонимы: Andrormone, Andrometh, Androral, Androsten, Noman, Normale, Malogen, Mesteron, Metandren, Metextergona, Nadosteron, Oraviron, Sublings, Testhormona, Testoral и др.

Выпускается в таблетках по 0,005

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 8 лет; дополнительный срок годности после переконтроля — 4 года

Аналог мужского полового гормона (андроген).

Применяется у мужчин при первичном евнухоидизме, кастрации, климаксе, протекающем с сосудистыми расстройствами, функциональной импотенции. Женщинам назначают при климактерических неврозах (в случае наличия противопоказаний к лечению эстрогенами), маточных кровотечениях пожилого возраста, при раке молочной железы и яичников, для прекращения лактации. Противопоказан при первичном раке предстательной железы

Rp.: Methyltestosteroni 0,005

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 2 таблетки 3 раза в день под язык

Метилэргометрин —

Methylergometrin (ЧССР)

Метилэргометрина гидротартрат

Синонимы: Methylergobasin,
Methylergobrevin, Methylergonovin

Выпускается в ампулах по 1 мл
0,02% раствора

Хранение — список Б

Срок годности — 4 года

Стимулятор сокращений матки, близкий к «Дигидроэргометрину».

Применяется при гипотонии и атонии матки после родов, при кесаревом сечении, при неполной инволюции матки в послеродовом периоде, кровотечениях при начинающемся и неполном аборте

Rp.: Sol. «Methylergometrin» 0,02% 1 ml

D. t. d. N. 6 in ampul.

S. Под кожу, внутримышечно по 0,5—1 мл; внутривенно 0,25—0,5 мл

Метивит — Methiovit (ПНР)

Состав на 1 драже:

Cholini citratis

L-Methionini aa 0,1

Thiamini chloridi

Pyridoxini hydrochloridi

Riboflavini aa 0,002

Tocopheroli acetatis

Calcii pantothenatis aa 0,003

Cyanocobalamini 0,000007

Biotini 0,0001

Nicotinamidi 0,006

Acidi folici 0,0004

Хранение — в обычных условиях

Срок годности — 1 год

Гепатотропное средство, содержащее витамины группы В, а также холин, метионин и витамин Е.

Применяется для лечения паренхиматозных гепатитов различного происхождения (инфекционных, токсических и т. п.), при циррозе печени, являющемся следствием гепатита, для профилактики осложнений со стороны печени при лечении туберкулеза производными гидразида изоникотиновой кислоты, а также при операциях на желчевыводящих путях и печени

Rp.: Drag. «Methiovit» N. 60

DS. По 1—2 драже 2—3 раза в день

Метотрексат — Methotrexate
(СФРЮ)

4-Дезокси-4-амино-*N*¹⁰-метил-фолиевая кислота

Синонимы: A-methopterin, Methopterin, Methylaminopterinum

Выпускается в таблетках по 0,0025 и в ампулах по 0,005 сухого препарата

Хранение — список Б

Срок годности — 3 года

Цитостатическое средство (анти-метаболит, антагонист фолиевой кислоты).

Применяется для лечения острого и подострого лейкоза, особенно у детей, для лечения хорионэпителиомы. Осложнения — гипоплазия костного мозга, язвенные стоматиты, поносы. Лечение проводится до наступления ремиссии (обычно 20—30 дней). При повторном применении развивается привыкание

Rp.: Tabul. «Methotrexate» 0,0025

D. t. d. N. 100

S. По 1—3 таблетки в день (в зависимости от возраста)

Rp.: «Methotrexate» 0,005

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Содержимое ампулы развести в 2 мл воды для инъекций и вводить внутримышечно или внутривенно

Метронидазол — Metronidazolium
1-(2-Оксиэтил)-2-метил-5-нитроимидазол

Синонимы: Atrivyl, Clont, Eflorgan (СФРЮ), Flagesol, Flagil, Flagyl (Фр.), Flegyl, Gineflavir, Klion (ВНР), Metronil, Orvagil, Trichazol, Trichex, Trichopol (ПНР), Tricocet, Tricom, Tricowaß, Trivazol

Выпускается в таблетках по 0,25 для приема внутрь и в таблетках по 0,5 для введения во влагалище

Хранение — список Б

Срок годности — не ограничен;
ПНР — 2 года

Противопротозойное (трихомонадное) средство.

Применяется внутрь (мужчины и женщины) и местно (женщины). Для успеха лечения необходимо применять у обоих партнеров. Может вызвать кандидамикоз влагалища. Нельзя одновременно принимать алкоголь

Rp.: Metronidazoli 0,25 (0,5)

D. t. d. N. 25 in tabul.

S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день или по 1 таблетке (0,5) 1 раз в день во влагалище

Мигренал — Migrenal (ЧССР)

Состав на 1 таблетку:

Phenacetini 0,4

Antipyrini 0,15

Coffeini 0,01

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Анальгетическое и жаропонижающее средство.

Применяют при головной боли, невралгии и т. п.

Rp.: Tabul. «Migrenal» N. 10

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Мигрозин — Migrosin

Местнораздражающее и слабоанестезирующее средство.

Применяется для отвлекающей терапии мигрени и головной боли

Rp.: Mentholi 10,0

Aetheris acetici 40,0

MDS. Для натирания лба и висков

Мидокалм — Mydocalm (ВНР)

1-Пиперидино-2-метил-пара-толил-пропано-3-гидрохлорид

Синонимы: Midefon, Mydeton

Выпускается в таблетках по 0,05 и в ампулах по 1 мл 10% раствора

Хранение — список Б

Срок годности — 2 года; ампул — 2 года

Средство, снижающее тонус скелетных мышц.

Применяется для лечения всевозможных спастических состояний, в том числе паркинсонизма, спастических параличей различной этиологии, эпилепсии, для релаксации при проведении электросудорожной терапии, а также для лечения рассеянного склероза и энцефалопатии

Rp.: Tabul. «Mydocalm» 0,05

D. t. d. N. 20

S. Вначале по 1 таблетке 3 раза в день, а затем по 2 таблетки 3 раза в день

Rp.: Sol. «Mydocalm» 10% 1 ml

D. t. d. N. 20 in ampul.

S. По 1—2 мл в сутки в вену или в мышцу

Миелобромол — Myelobromol (ВНР)

1,6-Дибром-1,6-дидезоксиманнит

Выпускается в таблетках по 0,25

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 5 лет

Цитостатическое средство, близкое к «Дегранолу».

Применяют при хронической миелоидной лейкемии. Дозы назначают после тщательной проверки картины крови и клинического состояния больного. Рекомендуемая дозировка ежедневно — 5 мг/1 кг веса тела больного. Следует систематически проверять картину крови и число тромбоцитов: в начале курса лечения — три раза в неделю, а в дальнейшем — ежедневно! Применяют исключительно под контролем врача

Rp.: Tabul. «Myelobromol» 0,25

D. t. d. N. 10

S. Дозировка индивидуальна

Миелосан — Myelosanum

Бис-метилсульфононовый эфир бутандиона-1,4

Синонимы: Busulfan, Busulphan (ПНР), Citosulfan, Mablin, Mielucin, Misulban, Mitostan, Myeleukon, Myelucin, Myerlan, Mylecy-

Цитостатическое средство. В малых дозах тормозит образования гранулоцитов и тромбоцитов, в больших дозах снижает образование лимфоцитов и эритроцитов.

Применяется при хронических миелолейкозах. Исследование кро-

tan, Myleran, Mysulban, Sulfabutip

Выпускается в виде таблеток по 0,002 г

Хранение: список А, в защищенном от света месте

ви — обязательно каждые 5 дней, а при уменьшении количества лейкоцитов до 50 000 — 40 000 в 1 мм — каждые 2 дня, в период клинической и гематологической ремиссии — не реже 2 раз в месяц. При лечении могут наблюдаться гранулоцитопения, тромбоцитопения, кровотечения, анемия, импотенция, сосудистые расстройства. Препарат противопоказан при острых лейкозах, тромбоцитопении, алейкемических формах хронического лейкоза

Rp.: Myelosani 0,002

D. t. d. N. 30 in tabul.

S. Индивидуально (согласно врачебным показаниям). Обычно назначают 0,004—0,006 г в день. Высшая разовая доза для взрослых внутрь — 0,006 г, суточная — 0,01 г

Мизидол — Mizidolum

Состав на 1 ампулу:

Promedoli 0,02

Aminazini 0,01

Amizyli 0,0025

Aquae pro injectionibus ad 1 ml

Хранение — список А, в защищенном от света месте

Срок годности — 2 года

Анальгетическое и нейроплегическое средство.

Применяют для премедикации и в послеоперационном периоде, при всех показаниях к применению наркотических анальгетиков, изредка при остром психомоторном возбуждении и т. п. Противопоказан при коме и угнетении дыхания любого происхождения

Rp.: Mizidoli 1 ml

D. t. d. N. 3 in ampul.

S. Внутримышечно или под кожу по 0,5 мл. При операциях под местной анестезией — 1—2 мл

Миколан — Micolanum

Препарат применяется для защиты кожи при контакте с агрессивными жидкостями, органическими растворителями и минеральными маслами

Rp.: Lanolini anhydrici

Saponis domestici 40% āā 10,0

Boli albae 30,0

Aquae 50,0

M. f. unguentum

DS. Для нанесения на кожу рук

Микосептин — Mucoseptin
(ЧССР)

Состав на 100 г мази:

Acidi undecilenici 5,0

Zinci undecilenatis 20,0

Basis unguenti ad 100,0

Выпускается в тубах по 30,0

Хранение в обычных условиях

Срок годности — 3 года

Антисептическое (фунгицидное) средство, по свойствам и применению весьма близкое к отечественному «Цинкундану».

Применяется для лечения кератомикозов и дерматомикозов (кандидозы, эпидермофития, трихофития и т. п.)

Rp.: Ung. «Mucoseptin» 30,0

DS. Наносить на пораженную поверхность

Микройод — Microiodum

Состав на 1 драже:

Iodi 0,0005

Kalii iodidi 0,005

Pulv. radicis Valerianae 0,05

Хранение в защищенном от света месте

Срок годности — 6 мес.

Антитиреоидное средство. Тормозит секрецию тиреотропного гормона и гиперплазию щитовидной железы.

Применяется для лечения тиреотоксикоза, особенно с выраженными явлениями невралгии, повышенной возбудимости, раздражительности

Rp.: Dragee Microiodi N. 50

DS. По 1 драже 2—3 раза в день

Микройод с фенобарбиталом —

Microiodum cum Phenobarbitalo

Состав на 1 драже:

Iodi 0,0005

Kalii iodidi 0,005

Phenobarbitali 0,01

Pulveris radicis Valerianae 0,05

Хранение — в защищенном от света месте

Срок годности — 6 мес.

Свойства и применение — см. предыдущую пропись

Rp.: Dragee Microiodi cum Phenobarbitalo N. 50

DS. По 1 драже 2—3 раза в день

Микройод — Microiodum
Шерешевского пилюли — Pilulae Schereshevsky

То же

1. Rp.: Iodi 0,02

Kalii iodidi 0,2

Extracti et pulveris

radicis Valerianae aa 2,0

Ut f. pilulae N. 40

2. Rp.: Iodi 0,02
 Kalii iodidi 0,2
 Phenobarbitali 0,4
 Extracti et pulveris radices Valerianae āā 2,0
 Ut f. pilulae N. 40
3. Rp.: Iodi 0,02
 Kalii iodidi 0,2
 Phenobarbitali 0,4
 Methylthiouracili
 Extracti et pulveris radices Valerianae āā 2,0
 Ut f. pilulae N. 40
4. Rp.: Iodi 0,02
 Kalii iodidi 0,2
 Phenobarbitali 0,4
 Pulveris folii Digitalis 1,0
 Zinci valerianatis 2,0
 Ut f. pilulae N. 40
5. Rp.: Iodi 0,02
 Kalii iodidi 0,2
 Phenobarbitali 0,4
 Bromcamphorae 2,0
 Extracti et pulveris radices Valerianae q. s.
 Ut f. pilulae N. 40
6. Rp.: Iodi 0,02
 Kalii iodidi 0,2
 Phenobarbitali 0,4
 Pulveris folii Digitalis 1,0
 Extracti Valerianae 4,0
 Ut f. pilulae N. 40
 DS. По 1 пилюле 2—3 раза в день после еды

Микстура болгарская —
 Mixtura bulgarica,
 Decoctum radices Belladonnae

Холинотитическое средство
 (преимущественно с центральным
 действием).

Применяют при паркинсонизме

Rp.: Radices Belladonnae 5,0
 Vini albi 100,0
 Carbonis activati 0,1
 MDS. От 1 чайной до 2 столовых ложек в день (по
 предписанию врача)

Приготовление: смесь ингредиентов кипятят 10 мин после начала
 кипения. После охлаждения и процеживания доводят объем до 100 мл
 белым вином

Микстура бромидная —
Mixture bromidorum

Успокаивающее средство.
Применяется для лечения нев-
растении и неврозов с преобла-
дающим процессов возбуждения
над тормозными процессами

1. Rp.: Natrii bromidi
Kalii bromidi
Ammonii bromidi $\bar{a}\bar{a}$ 3,0
Aquaе destillatae 150,0
2. Rp.: Kalii bromidi 8,0
Natrii bromidi
Ammonii bromidi $\bar{a}\bar{a}$ 4,0
Aquaе destillatae 200,0
3. Rp.: Natrii bromidi
Ammonii bromidi $\bar{a}\bar{a}$ 10,0
Aquaе Menthae piperitae 400,0
4. Rp.: Natrii bromidi
Ammonii bromidi $\bar{a}\bar{a}$ 5,0
Kalii bromidi 10,0
Aquaе destillatae 230,0
MDS. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день после
еды

Микстура валериановая
сложная — Mixture Valerianae
composita

Успокаивающее средство.
Применяется при неврозах и
неврастении

- Rp.: Tincturae Valerianae
Tincturae Convallariae $\bar{a}\bar{a}$ 5,0
Spiritus aetherei gttis XV
Aquaе Foeniculi 100,0
MDS. По 1 столовой ложке через 3—4 ч

Микстура горькая —
Mixture amara

Сокогонное средство рефлектор-
ного действия.

Применяется для повышения
аппетита, для усиления секреции
пищеварительных желез

- Rp.: Extracti folii Menyanthidis 2,0
Elaeosacchari Menthae 20,0
Aquaе destillatae 100,0
MDS. По 1 чайной ложке перед едой

Микстура желчегонная —
Mixture cholekinetica

Желчегонное средство, усили-
вающее выделение желчи (холе-
кинетик).

Применяется при холециститах
и желчекаменной болезни

Rp.: Natrii sulfatis 25,0
Natrii hydrocarbonatis 5,0
Sacchari 25,0
Aquaе destillatae 200,0
MDS. По 1 столовой ложке через 2 ч

**Микстура кислая —
Mixture acida**

Средство, усиливающее желу-
дочное пищеварение.

Применяется при гипоацидных
и анацидных гастритах

Rp.: Acidi hydrochlorici 1,0
Aquaе destillatae 89,0
Sirupi Rubi idaei 10,0
MDS. По 5—10 капель на $\frac{1}{2}$ стакана воды перед
едой

**Микстура кровоостанавливаю-
щая — Mixture haemostatica**

Микстура усиливает сокраще-
ние и повышает тонус матки. При-
меняется для остановки атониче-
ских маточных кровотечений
после родов, при метроррагии и
т. п.

1. Rp.: Infusi rhizomatis Tormentillae 15,0—200,0
Tincturae Cinnamomi 8,0
Sirupi corticis Aurantii 30,0
 2. Rp.: Extracti Secalis cornuti fluidi 1,0
Tannini 2,0
Aquaе destillatae 200,0
Sirupi simplicis 30,0
MDS. По столовой ложке через час
-

**Микстура отхаркивающая —
Mixture contra tussim**

Отхаркивающее средство.
Применяется при сухом кашле
различного происхождения.

Примечание: корень ипе-
какуаны можно заменить равным
количеством травы термопсиса

1. Rp.: Infusi herbae Thermopsisidis 0,6—200,0
Liquoris Ammonii anisati
Natrii hydrocarbonatis aa 4,0
2. Rp.: Infusi radice Polygalae 10,0—180,0
Liquoris Ammonii anisati 3,0
3. Rp.: Infusi radice Polygalae 10,0—180,0
Aethylmorphini hydrochloridi 0,1
Liquoris Ammonii anisati 2,5

4. Rp.: Infusi radices Althaeae 6,0—180,0
Ammonii chloridi 4,0
5. Rp.: Infusi radices Ipecacuanhae 0,5—180,0
Aethylmorphini hydrochloridi 0,1
Liquoris Ammonii anisati 2,0
6. Rp.: Infusi radices Ipecacuanhae 0,6—180,0
Codeini 0,1
Liquoris Ammonii anisati 2,5
7. Rp.: Infusi radices Ipecacuanhae 0,5—200,0
Codeini 0,15
Liquoris Ammonii anisati
Natrii benzoatis āā 4,0
8. Rp.: Extracti radices Inulae 10,0
Extracti radices Glycyrrhizae 5,0
Aquaе Foeniculi 150,0
Liquoris Ammonii anisati 10,0
9. Rp.: Kalii iodidi 5,0
Aquaе destillatae 200,0
Aquaе Amygdalarum amararum 10,0
Tincturae Opii benzoicae 5,0
10. Rp.: Acidi hydrochlorici 1,0
Infusi radices Althaeae 180,0
Sirupi simplicis 20,0
11. Rp.: Infusi radices Polygalae 10,0—140,0
Kalii iodidi 8,0
Tincturae Lobeliae
Tincturae Opii benzoicae āā 5,0
12. Rp.: Ammonii chloridi
Extracti Glycyrrhizae āā 5,0
Aquaе destillatae 190,0
MDS. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день.

Микстура потогонная —
Mistura diaphoretica

Потогонное средство.
Применяется для профилактики
и лечения лихорадки как вспомо-
гательное средство

Rp.: Kalii acetatis 1,0
Aquaе Petroselini 25,0
Oxymellis Scillae
Sacchari āā 3,0
MDS. По 1 чайной ложке 3 раза в день

Микстура противорвотная —
Mixtura antiemetica

Противорвотное (противокинезное) средство.

Применяется для профилактики и лечения морской и воздушной болезни

1. Rp.: Chloroformii 5,0
Tincturae aromaticae 10,0
Tincturae amarae 30,0
MDS. По 20—40 капель на прием
2. Rp.: Antipyriini 3,0
Coffeini 0,5
Chlorali hydrati 0,2
Strychnini nitratis 0,004 (seu tincturae Strychni 4.0)
Spiritus aethylici 90% 20,0
Aquaе destillatae 100,0
MDS. По 1 столовой ложке перед путешествием, не более 3 ложек в день
-

Микстура салицилатная —
Mixtura Natrii salicylatis

Анальгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее средство.

Применяется для лечения лихорадки, ревматизма, радикулита, артритов и т. п.

- Rp.: Natrii salicylatis 10,0
Aquaе destillatae 185,0
Tincturae corticis Aurantii 5,0
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день после еды
-

Микстура слабительная —
Mixtura laxativa

Слабительное средство.

Применяется для лечения хронических (привычных) запоров, для подготовки к операции и т. п.

- Rp.: Decocti corticis Frangulae 10,0—120,0
Natrii sulfatis 10,0
Aquaе Amygdalarum 1,0
Sirupi simplicis 5,0
MDS. По 1 столовой ложке утром и на ночь
-

Микстура с пепсином сложная —
Mixtura Pepsini composita

Средство, способствующее пищеварению. Заменяет натуральный желудочный сок.

Применяется при анацидных гастритах и ахилии

1. Rp.: Pepsini 20,0
Acidi hydrochlorici 12,0
Olei Cinnamomi gtts V
Olei Caryophylli gtts X
Spiritus aethylici 90% 50,0
Glycerini 300,0
Talcı 20,0
Aquaе destillatae 1400,0

2. Rp.: Pepsini 40,0
Acidi hydrochlorici 12,0
Aquaе destillatae 650,0
Glycerini 325,0
MDS. По 1 столовой ложке перед едой

Приготовление прописи 1: растворяют пепсин в смеси 500 мл воды и соляной кислоты; отдельно в спирте растворяют эфирные масла. Затем оба раствора смешивают, фильтруют и добавляют тальк, глицерин и остальную воду.

Приготовление прописи 2: растворяют пепсин в смеси воды, соляной кислоты и глицерина

Микстура щелочная —
Mixtura alkalina

Антацидное средство.
Применяется при гиперацидных гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в сочетании со спазмолитиками и холинолитиками

1. Rp.: Natrii hydrocarbonatis 4,0
Aquaе destillatae 70,0
Tincturae corticis Aurantii
Glycerini āā 4,0

2. Rp.: Magnesii oxydi
Aquaе Menthae piperitae āā 20,0
Aquaе destillatae 160,0

3. Rp.: Magnesii subcarbonatis 5,0
Aquaе Menthae piperitae 100,0
Sirupi corticis Aurantii 20,0

4. Rp.: Magnesii oxydi 12,0
Olei Amygdalarum
Gummi arabici āā 15,0
Aquaе destillatae 60,0
MDS. По 1 столовой ложке за 10—15 мин до еды.
Перед употреблением взбалтывать

Приготовление прописи 2: растирают в ступке окись магния, постепенно прибавляя дистиллированную, а затем мятную воду

**Микулича спирт —
Spiritus Miculitschi**

Антисептическое средство.
Применяется для лечения гнойно-воспалительных заболеваний кожи

Rp.: Olei Olivarum 12,0
Solutionis Kalii caustici q.s.
Spiritus aethylici 96% 60,0
Aquaе destillatae 34,0
MDS. Наносить на пораженные участки кожи

Приготовление: оливковое масло омыляют гидратом окиси калия в присутствии 15 мл спирта путем взбалтывания при комнатной температуре, добавляют остальной спирт и воду, взбалтывают

**Микулича мазь —
Unguentum Miculitschi**

Антисептическое средство, способствует регенерации эпителия. Применяется для лечения вялотекущих ран и язв

Rp.: Argenti nitratis 1,0
Balsami peruviani (aut Balsami Schostakovsky) 10,0
Lanolini anhydrici 10,0
Vasellini ad 100,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Минтезол — Mintezol (СФРЮ)
2-(4-Тиазолл)-бензимидазол
Синонимы: Bendazol, Bovizole, Equizole, Thiaben, Thibenzole, Tiabendazol

Выпускается в таблетках по 0,5
Хранение — в обычных условиях

Противоглистное средство.
Применяется для лечения инвазии аскаридами, власоглавом и сосальщиками (аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидоз). Препарат не требует соблюдения диеты и применения слабительного. Не следует применять у беременных и кормящих женщин. При появлении побочных явлений (повышенная чувствительность, анорексия, тошнота, рвота, головокружение) препарат следует отменить

Rp.: «Mintezol» 0,5
D. t. d. N. 24 in tabul.
S. По 2—3 таблетки 2—3 раза в день (до 3 г в день)

Миодил — Myodil (СФРЮ)

Масляный раствор, смесь изомеров этилового эфира 10-параидофенилудекаановой кислоты, содержащий 30% связанного йода

Синонимы: Ethiodan, Jofendylatum, Myelodil, Neurotrast, Pantoraque

Выпускается в ампулах по 3 мл

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — не установлен

Рентгеноконтрастное вещество.

Применяется для миелографии и контрастной рентгенографии желудочков мозга

Rp.: «Myodil» 3 ml

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. Для субарахноидального введения

Миоксил — Myoxyl (ЧССР)

α-Ортоглицероэфир глицирина

Синонимы: Anxine, Artroplegipa, Atensin, Avosyl, Cresodiol, Curaril, Curarythan, Daserd, Dioloxol, Findolor, Lissephen, Mephensin, Mianesin, Miolisina, Myastenin, Myodetensin, Myolysin, Nocytynol, Oranixon, Ortol, Prolax, Relaxar, Sinan, Spasmolyn, Stilalgin, Tolansin, Tolseron, Tolulox, Tolydgin и др.

Выпускается в таблетках по 0,25

Хранение — список Б

Центральный миорелаксант.

Применяют для лечения спастических состояний различного происхождения (болезнь Литтля, травматические повреждения экстрапирамидной системы, рассеянный склероз), для лечения паркинсонизма совместно с холинолитиками. См. также «Гваякуран», «Мидокалм»

Rp.: Tabul. «Myoxyl» 0,25

D. t. d. N. 50

S. По 1—2 таблетки 3—5 раз в день

Мион — Myon (ЧССР)

Состав одной ампулы:

Natrii nucleinatis 0,02

Cholini chloridi 0,015

Aquae pro injectionibus ad 1 ml

Хранение — список А

Средство, способствующее нормализации кровообращения и обмена в органах при сосудистых спазмах.

Применяется для лечения атеросклероза, ангиоспазмов, эндартерита, сосудистых нарушений в климактерическом периоде

Rp.: «Myon» 1 ml.

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. Внутривенно по 1 ампуле ежедневно или через день

Миострофозан — Myostrofosan
(ЧССР)

Состав одной ампулы:
Strophanthini g 0,0005
Novocaini 0,07
Aquae pro injectionibus ad 2 ml
Хранение — список А, в защи-
щенном от света месте

Кардиотоническое и противо-
аритмическое средство.

Применяется при сердечной не-
достаточности, инфаркте миокар-
да, приступе пароксизмальной та-
хикардии. Противопоказания —
общие для сердечных гликозидов
(см. «Дигоксин», «Коввалютксин»
и т. п.)

Рр.: «Myostrofosan» 2 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. По $\frac{1}{2}$ —1 ампуле в день внутримышечно. По
достижении терапевтического эффекта инъекции
проводят через день или 2 раза в неделю

Мирапронт — Mirapront (СФРЮ)
 α , α -Диметилфенэтиламина ре-
зинат

Синонимы: Duromine, Ionamin,
Linyl, Omnibex, Phenterminumre-
sinat

Выпускается в капсулах по
0,015

Хранение — список Б

Анорексигенное средство.

Применяют для лечения ожире-
ния, адипозо-генитальной дистро-
фии. При лечении этим препаратом
нельзя принимать алкоголь; дру-
гие побочные эффекты — см. «Феп-
ранон»

Рр.: «Mirapront» 0,015
D. t. d. N. 20 in caps. gelat.
S. По 1 капсуле после завтрака. Капсулу следует
проглотить целиком

Миртиллин — Myrtillinum

Вяжущее и сокогонное средство,
способствует нормализации пище-
варения в желудке. Применяется
главным образом в детской прак-
тике при диспепсии и поносах,
в случае инфекционных заболе-
ваний пищеварительного тракта —
как вспомогательное средство в со-
четании с антимикробной тера-
пией

Рр.: Fructus Myrtilli sicci 20,0
Aquae fervidae 80,0
Spiritus aethylici 95% 12,0
Pepsini 0,7
Acidi hydrochlorici 0,2
Glycerini 2,0
Sacchari 100,0

MDS. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день перед
едой

Мисклерон — Miscleron (ВНР)
Этил α -(пара-хлорфенокси)-изо-
бутират

Выпускается в капсулах по 0,25
Хранение — список Б
Срок годности — 5 лет

Гипохолестеринемическое сред-
ство.

Применяют при атеросклерозе,
гиперхолестеринемии, склерози-
рующих заболеваниях коронар-
ных, мозговых и периферических
сосудов, а также при диабетичес-
кой артериопатии

Рр.: «Miscleron» 0,25
D. t. d. N. 50 in caps. gelat.
S. По 2—6 капсул 3 раза в день перед едой

Мистол — Mistolum

Антисептическое и сосудосу-
живающее средство.

Применяется для лечения остро-
го ринита (насморка). Если для
изготовления берется вазелиновое
масло, то получают капли, если
вазелин — мазь.

П р и м е ч а н и е: целесооб-
разно для лучшего распределения
по влажной слизистой оболочке
внести 5—10% ланолина, умень-
шив соответственно количество
вазелина и вазелинового масла

Рр.: Camphorae 0,05
Olei Menthae
Olei Eucalypti $\bar{a}\bar{a}$ 0,06
Olei Vaselini aut
Vaselini 10,0
MDS. В нос 2—3 раза в день

Митекс — Mitex (ЧССР)

Выпускается в тубах по 30,0

Состав:

Acidi salicylici 0,36

Mentholi 0,73

Tannini 0,5

Butylis aminobenzoatis 3,0

Acidi oleinici 2,93

Sol. Ammonii caustici 0,73

Zinci oxydi

Talci $\bar{a}\bar{a}$ 20,0

Basis unguenti ad 100,0

Хранение — в обычных усло-
виях

Анестезирующее, вяжущее и
подсушивающее средство.

Применяется при зуде кожи,
экземе, дерматитах и других кож-
ных заболеваниях

П р и м е ч а н и е: бутилами-
нобензоат (бенкаин, бутилкаин) —
местный анестетик, близкий по
свойствам к анестезину

Рр.: Unguenti «Mitex» 30,0
DS. Намазать зудящие места несколько раз в день

Митрошина жидкость —
Liquor Mitroschini
Продукт термической обработки зерен злаков (пшеницы, ржи и овса), по свойствам и применению аналогичен дегтю
Срок годности — 2 года 6 мес.

Антисептическое, фунгицидное и кератопластическое средство.
Применяется для лечения различных кожных заболеваний (экзема, нейродермиты и др.) самостоятельно и в составе различных прописей

Rp.: Liquoris Mitroschini 100,0
DS. Наружное

Михайлова капли желудочные —
Guttae stomachicae Michailovi
Хранение — список А

Успокаивающее и сокогонное средство, подавляет моторику желудка и кишечника.
Применяется для лечения вегетоневрозов желудочно-кишечного тракта и гастритов

Rp.: Tincturae Valerianae aetherae
Tincturae Menthae piperitae
Tincturae Opii simplicis
Spiritus aetherei aa 20,0
Tincturae Strychni 10,0
MDS. По 20—25 капель несколько раз в день после еды

Можжевельного мазь —
Unguentum Mozschevelni

Антисептическое, фунгицидное, acaricidное и кератолитическое средство.
Применяется для лечения экземы, чесотки и других заболеваний кожи. См. также мази аналогичного состава (содержащие деготь и серу)

Rp.: Picis liquidae 2,5
Sulfuris depurati 5,0
Acidi salicylici 1,25
Olei Ricini 5,0
Vaselini 50,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Мозолин — Mosolinum

Кератолитическое средство.
Применяется для лечения мозолей. Способ употребления — см. «Адоль»

Rp.: Acidi salicylici
Solutionis Acidi lactici 68% aa 1,5
Collodii 8,0
MDS. Наносить на пораженные участки кожи

Моллизин — Mollisinum

Индифферентная мазевая основа

Rp.: Olei Vaselini 40,0

Cerae flavae 10,0

M. f. unguentum

DS. Наружное. В летнее время готовят 1:3

**Монкевича мазь —
Unguentum Monkevitschi**

Антисептическое средство. Способствует заживлению ран.

Применяется для лечения трещин сосков

Rp.: Axungiae porcinae 100,0

Mellis

Folii Cactusi āā 50,0

Olei Olivarum

Spiritus aethylici āā 30,0

Acidi nitrici concentrati 3,0

M. f. unguentum

DS. Наружное. Смазывать соски после кормления

Приготовление: смесь ингредиентов кипятят в сосуде с крышкой 3,5 ч, охлаждают 20—30 мин, затем фильтруют и разливают в банки

**Монтье палочки мазевые —
Styli unguentes Monties**Смягчающее кожу средство.
Применяется в косметических целях

Rp.: Paraffini 1,0

Olei Cacao 15,0

Olei Olivarum 20,0

M. f. styli

DS. Наружное

Приготовление: смесь ингредиентов растапливают и разливают в формы

Моргалин — Morgalin (ВНР)

Состав на 1 драже:

Bimolini 0,1

Acidi ascorbinici 0,01

Хранение — список Б

Химиотерапевтическое (противовирусное) средство.

Применяют при опоясывающем лишае и герпетическом кератите. Есть сведения об эффективности при профилактике гриппа

Rp.: Dragee «Morgalin» N. 24

DS. По 2 драже 3 раза в день (взрослому); по 1 драже 3 раза в день (детям). Курс лечения — 6—8 дней

**Морфолеп — Morpholep (ВНР)
α-Метил-α-фенил-N-морфолин-ил-метилен-еукцинимид**

Противоэпилептическое средство.

Применяют при малых припад-

Выпускается в таблетках по 0,5 как эпилепсии и смешанных формах, не поддающихся лечению другими противосудорожными средствами

Рр.: Tabul. «Morpholer» 0,5

D. t. d. N. 20

S. По $\frac{1}{2}$ таблетки 2—3 раза в сутки с постепенным повышением до 1 таблетки 3—4 раза в день

**Москаленко линимент —
Linimentum Moskalenko**

Раздражающее и слабое местно-анестезирующее средство.

Применяется для лечения заболеваний двигательного аппарата (артритов, миозитов и пр.), периферических нервов (невритов, радикулитов и т. п.). См. также «Капсин», «Линимент метилсалицилата сложный» и т. п.

Рр.: Olei Hyoscyami

Olei Terebinthinae āā 25,0

Spiritus camphorati

Tincturae Capsici āā 20,0

Chloroformii

Methylii salicylatis āā 15,0

Acidi salicylici

Solutionis Ammonii caustici

Ichthyoli āā 8,0

MDS. Наносить на пораженные участки кожи

Мотолон — Motolon (ВНР)

2-Метил-3-орто-толил-4-(3Н)-хи-назолона гидрохлорид

Синонимы: Aqualon, Bendor, Citexal, Dormigoa, Dormiplex, Dormised, Dormutil, Fadormir, Holodorm, Hypcol, Ipnolan, Medorbon, Melsedin, Methaqualonhydrochlorid, Mezulon, Nobadorm, Noctilene, Noxal, Optinoxan, Parminal, Somberol, Somnidon, Somnomed, Somnotropon, Sonal, Tolinon, Torinal и др.

Выпускается в таблетках по 0,2

Хранение — список Б

Снотворное и успокаивающее средство.

Применяют для лечения бессонницы и неврозов

Рр.: Tabul. «Motolon» 0,2

D. t. d. N. 10

S. По 1 таблетке перед сном, $\frac{1}{2}$ таблетки в случае раннего пробуждения

Мультосаликс — Multosalix
(ЧССР)

Состав на 1 драже:
Calcii salicylatis 0,04
Kalii salicylatis 0,0703
Natrii salicylatis 0,3966

Хранение — в сухом месте

Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгетическое и противоревматическое средство.

Применяют для лечения ревматизма, полиартритов, невралгии, радикулитов, лихорадки и т. п.

Рр.: Dragee «Multosalix» N. 50
DS. По 3—4 драже 5 и более раз в день

Мыло дегтярное жидкое —
Sapo piceus liquidus

Антисептическое, фунгицидное и кератопластическое средство.

По применению аналогично другим препаратам дегтя (см. «Линимент дегтярно-мыльный и др.)

Рр.: Saponis domestici 60,0
Natrii carbonatis 5,0
Natrii tetraboratis 2,5
Picis liquidae 20,0
Aquae destillatae q. s.
MDS. Для умывания

Мыло сульсеновое —
Sapo Sulseni

Состав:
Sulseni (Seleni disulfidi) 2,5
Saponis medicati 97,5
Выпускается в кусках по 100 г

Препарат применяется для лечения себореи волосистой части головы. После обычного мытья мыло втирают в кожу головы, а через 5—10 мин смывают. Курс лечения — 1—1,5 мес. по 1 процедуре в неделю. Избегать попадания в глаза

Рр.: Saponis Sulseni 100,0
DS. Для местного применения

Мыло хлорное —
Sapo chloratus

Хранение — в банках с пробками

Антисептическое средство.

Применяется для обработки рук после работы с инфицированным материалом, после аутопсии и т. п.

Рр.: Saponis domestici 100,0
Natrii carbonatis siccati 10,0
Calcariae chloratae 12,5
MDS. Для мытья рук

Навитон — Naviton (ЧССР)

Хранение — список Б
Состав на 1 таблетку:
Chlorobutanoli 0,15
Coffeini 0,05
Phenobarbitali 0,025

Противорвотное (противокин-
етозное) средство.

Применяется для профилактики
и лечения морской и воздушной
болезни

Рр.: Tabul. «Naviton» N. 10

DS. По 1—2 таблетки перед путешествием

Назаль — Nasal

Антисептическое, противовос-
палительное и рефлекторное сосу-
досуживающее средство.

Применяется для лечения ост-
рых респираторных заболеваний

Рр.: Natrii tetraboratis
Natrii hydrocarbonatis āā 0,518
Natrii benzoatis
Natrii salicylatis āā 0,022
Olei Eucalypti
Thymoli āā 0,011
Mentholi
Methylii salicylatis āā 0,0054
M. f. pastillae
D. t. d. N. 10

S. По 1 пастилке под язык 3—4 раза в день

Приготовление: гидрокарбонат, тетраборат и бензоат натрия смеши-
вают, смачивают раствором гуммиарабика, высушивают и просеивают.
После этого прибавляют остальные ингредиенты и прессуют пастилки

Налорфина гидрохлорид —
Nalorphini hydrochloridum

N-Аллилнорморфина гидрохло-
рид

Синонимы: Acetorphin, Anarcon,
Antorphin, Lethidrone, Nallin(e),
Nalorfin, Norfin

Выпускается в ампулах по 1 мл
0,5% раствора и по 0,5 мл 0,05%
раствора

Хранение — список А, в защи-
щенном от света месте

Конкурентный антагонист мор-
фина и морфиноподобных аналь-
гетиков.

Применяют налорфин в качест-
во антидота при резком угнетении
дыхания вследствие передозиров-
ки морфина, промедола и других
анальгезирующих средств, а так-
же для предупреждения и лечения
асфиксии новорожденных в слу-
чаях, когда обезболивание родов
производится анальгезирующими
веществами

Рр.: Sol. Nalorphini hydrochloridi 0,5% 1 ml (0,05% 0,5 ml)
D. t. d. N. 5 in ampul.

S. Взрослому вводят внутривенно, внутримышечно
или под кожу по 1—2 ампулы 0,5% раствора;
новорожденным вводят в пупочную вену 0,2—
0,5 мл 0,05% раствора

Нандролон деканоат —
Nandroloni decanoas
17β-Окси-19-нор-4-андростен-
3-он-17β-деcanoат
Синонимы: Deca-Durabol, Deca-
Durabolin, Eubolin, Hormo-retard,
Nandrolondecanoat, Retabolil
(ВНР)
Выпускается в ампулах по 1 мл
5% масляного раствора
Хранение — список Б
Срок годности — 2 года

Анаболический стероидный пре-
парат.

Показания и противопоказания
к применению — те же, что и для
«Метандростенолона» (см.). Отли-
чается от последнего более силь-
ным анаболическим и менее выра-
женным андрогенным действием,
что позволяет применять его у
женщин

Rp.: Sol. Nandroloni decanoatis oleosae 5% 1 ml
D. t. d. N. 20 in ampul.
S. Внутримышечно по 1 ампуле 1 раз в неделю

Нандролон фенилпропионат —
Nandroloni phenylpropionas
17 β-Окси-19-нор-4-андростен-3-
он-17 β-фенилпропионат
Синонимы: Anticatabolin, Dura-
bol, Durabolin (Голл.), Nerobolil
(ВНР) Norstenol, Nortestosteron-
phenylpropionat, Superanabolon.
Выпускается в ампулах по 1 мл
2,5% масляного раствора
Хранение — список Б, в прох-
ладном и защищенном от света
месте
Срок годности нероболила (ам-
пулы) ВНР — 2 года

Отличается от предыдущего пре-
парата более сильным и менее
продолжительным действием

Rp.: Sol. Nandroloni phenylpropionatis oleosae 2,5% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. По 1 мл в неделю внутримышечно (взрослому)

Нанофин — Nanorfinum
2,6-Диметил-пиперидина гид-
рохлорид
Синонимы: Naniorinum, Napof-
inum, Nanorfin, Nanorfinum
Выпускается в ампулах по 1 мл
2% и 5% раствора и в таблетках
по 0,1
Хранение — список Б
Срок годности — 1 год; допол-
нительный срок годности после
переконтроля — 6 мес.

Ганглиолитик. По показаниям и
свойствам сходен с «Димеколином»
и подобными препаратами.

Применяется в основном при
гипертонической болезни I и II
степени

Rp.: Nanophyni 0,1
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Rp.: Sol. Nanophyni 2% (5%) 1,0
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. По 1 мл подкожно или внутримышечно 2 раза в день

**Настой алтея сложный —
Infusum radices Althaeae
compositum**

Отхаркивающее и противовоспалительное средство. Готовится из корня алтея лекарственного (*Althaea officinalis*), содержащего слизь и крахмал.

Применяется для лечения сухого кашля, особенно в детской практике

1. Rp.: Infusi radices Althaeae 6,0—180,0
Natrii benzoatis
Natrii hydrocarbonatis
Liquoris Ammonii anisati āā 4,0
2. Rp.: Infusi radices Althaeae 6,0—200,0
Natrii benzoatis
Natrii hydrocarbonatis
Liquoris Ammonii anisati āā 4,0
Codeini 0,1
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день
3. Rp.: Infusi radices Althaeae 3,0—100,0
Sirupi simplicis 20,0
MDS. По 1 чайной ложке 4—5 раз в день (ребенку 2 лет) и по 1 столовой ложке 4—5 раз в день старшим детям

**Настой валерианы сложный —
Infusum Valerianae compositum**

Успокаивающее средство. Готовится из корня и корневища валерианы лекарственной (*Valeriana officinalis*).

Применяется по тем же показаниям, что и «Бехтерева микстура». Можно готовить настой валерианы 1 : 10 с более сильным седативным действием

Rp.: Infusi rhizomatis cum radicibus
Valerianae 10,0—180,0
Codeini phosphatis 0,2
Sirupi simplicis 20,0
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

**Настой горичвета сложный —
Infusum herbae Adonidis vernalis
compositum**

Кардиотоническое, мочегонное и успокаивающее средство. Готовят из травы горичвета весеннего (черногорки) — *Adonis vernalis*. Действующие вещества — гликозиды цимарин и адонитоксигенин, по действию близкие к гликозидам наперстянки (см. «Дигитоксин»), но практически лишенные кумулятивных свойств.

Показания — те же, что и для препаратов наперстянки (см. «Дигитоксин», «Абицин» и др.)

1. Rp.: Infusi herbae Adonidis vernalis 6,0—180,0
Themisali 6,0
2. Rp.: Infusi herbae Adonidis vernalis 6,0—180,0
Theophyllini 2,0
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

**Настой листьев грецкого ореха
сложный —
Infusum Juglandis compositum**

Средство, способствующее заживлению ран, повышающее иммунитет и обладающее антисептическими свойствами. Листья грецкого ореха (*Juglans regia*) содержат витамины А, С, В₁, юглон, дубильные вещества.

Используется препарат для ускорения заживления ран, в периоде реконвалесценции, для лечения рахита у детей (главным образом в народной медицине)

- Rp.: Folii Juglandis et radicis Juglandis concisi aa 10,0
Aquaе destillatae q. s.
ad collaturae 500,0
Calcii chloridi 8,0
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

**Настой подорожника —
Infusum folii Plantaginis**

Отхаркивающее средство. Листья подорожника большого (*Plantago major* L.) содержат глюкозид ринантин, слизь, горечи, каротин.

Применяется в тех же случаях, что и «Настой алтея»

- Rp.: Infusi folii Plantaginis 10,0—200,0
DS. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день

Настой рвотного корня сложный —
Infusum radicis Ipecacuanhae
compositum

Отхаркивающее средство. Получают из корня ипекакуаны (*Cephaelis ipecacuanha*), содержащего алкалоид эметин.

Применяют для усиления секреции бронхиальных желез при сухом кашле. Содержащийся в прописи № 1 фосфат коденна одновременно подавляет кашель, действуя на кашлевой центр

1 Rp.: Infusi radicis Ipecacuanhae 1,0 (1,5)—180,0
Ammonii chloridi 4,0
Codeini phosphatis 0,12

2. Rp.: Infusi radicis Ipecacuanhae 0,25
cum folio Sennae 5,0 et
herbae Ledi palustris 30,0—120,0
Sirupi simplicis 50,0
Liquoris Ammonii anisati gtts V
MDS. По 1— $\frac{1}{2}$ столовой или по 1 чайной ложке
2—3 раза в день

Настой ревеня сложный —
Infusum radicis Rhei compositum

Слабительное средство. Корень ревеня (*Rheum palmatum* L. var *tanguticum* Maxim.) содержит антрагликозиды.

Применяется при запорах

Rp.: Infusi radicis Rhei 5,0—150,0
Natrii sulfatis 30,0
Sirupi simplicis ad 200,0
MDS. По 1—2 столовой ложке 1 раз в день

Настой сенны сложный —
Infusum folii Sennae compositum

Слабительное средство. Листья кассии узколистной (*Cassia angustifolia*) и кассии остролистной (*Cassia acutifolia*), известные под названиями «листья сенны» или «александрийский лист», содержат антрагликозиды.

Применяется при запорах, действует медленно (через 4—6 ч). Пропись № 2 известна под названием «Венское питье»

1. Rp.: Infusi folii Sennae
15,0—155,0
Magnesii sulfatis 45,0

2. Rp.: Infusi folii Sennae 10,0—75,0
Natrii-Kalii tartratis
Mellis depurati
Spiritus aethylici 95% āā 10,0
MDS. По 1—3 столовые ложки на прием. Детям —
от 1 чайной до 1 столовой ложки

**Настой эвкалипта —
Infusum folii Eucalypti**

Антисептическое средство. Листья эвкалипта шарикового (*Eucalyptus globulus* Labill.) содержат эфирные масла, главной составной частью которых является цинеол (эвкалиптол).

Применяется для лечения ларингитов, фарингитов, для обработки инфицированных ран

Rp.: Infusi folii Eucalypti 10,0—200,0
MDS. Для паровых ингаляций по 15—20 капель на стакан воды. Для полоскания горла — по 1 столовой ложке на стакан кипяченой воды

**Настойка аралии —
Tinctura Araliae**
Изготавливается на 70% спирте
в соотношении 1 : 5

Общетонизирующее средство. Применяется при гипотонии, депрессии, астении. Противопоказана при бессоннице и гипертонии

Rp.: T-гае Araliae 50,0
DS. По 30—40 капель 2—3 раза в день

**Настойка арники —
Tinctura Arnicae**
Изготавливается на 70% спирте
в соотношении 1 : 10
Срок годности — 3 года; после
переконтроля — 1 год

Кровоостанавливающее и желчегонное средство.

Применяется при замедленной послеродовой инволюции матки, при эндометритах, холециститах. При наружном применении оказывает также антисептическое действие

Rp.: T-гае Arnicae 100,0
DS. Для смазывания ссадин, пролежней и т. п.

**Настойка ароматная —
Tinctura aromatica**
Состав:
Corticis Cinnamomi 5,0
Fructus Cardamomi
Caryophyllorum
Rhizomatis Galangae āā 1,0
Rhizomatis Zingiberis 2,0
Spiritus aethylici 70% 50,0

Настойка обладает горьким вкусом, приятным запахом и слабыми антисептическими и сокогонными свойствами.

Применяется главным образом в различных сложных прописях

Рр.: T-rae aromaticae 50,0
DS. По 10—30 капель перед едой

Настойка барбариса —
Tinctura Berberis
Изготавливается на 40% спирте
в соотношении 1 : 5
Срок годности — 1 год

Кровоостанавливающее и жел-
чегонное средство. Действующие
вещества — алкалоиды берберин,
оксиакантин, леонтидин и др.
Показана при маточных кро-
вотечениях различной этиологии
и др.

Рр.: T-rae Berberis 20,0
DS. По 30—40 капель 3 раза в день

Настойка
вазилитника воночного —
Tinctura Thalictri foetidi
Изготавливается на 70% спирте
в соотношении 1 : 10
Срок годности — 1 год

Гипотензивное средство.
Применяется при климактери-
ческих и других вегетативных
неврозах, связанных с гипертен-
зией, гипертонической болезни I ст.

Рр.: T-rae Thalictri 30,0
DS. По 15—20 капель 2—3 раза в день

Настойка горькая —
Tinctura amara
Срок годности — 10 лет; после
переконтроля — 5 лет
Состав:
Corticis Aurantii 15,0
Herbae Centaurii
Folii Menyanthidis āā 60,0
Rhizomatis Calami
Herbae Absinthii āā 30,0
Spiritus aethylici 40% q. s. ad
tincturam 1000,0
Fructus Aurantii
Herbae Centaurii
Radiciis Gentianae āā 2,0
Rhizomatis Zedoariae 1,0
Spiritus aethylici 70% 35,0

Сокогонное средство.
Применяется для повышения
аппетита при истощении в периоде
реконвалесценции, для лечения
гипоацидных гастритов. Входит
в состав многих сложных про-
писей

Рр.: T-rae amarae 50,0
DS. По 10—20 капель перед едой

**Настойка
железа яблочно-кислого —
Tinctura Ferri pomati**

Состав:

Extracti Ferri pomati 100,0
Aquaе Coriandri spirituosaе ad 1000,0

Выпускается во флаконах по
500,0

Срок годности — 1 год; после
переконтроля — 1 год

Препарат железа.
Применяется для лечения гипо-
хромных анемий (см. «Железа
аскорбинат»)

Rp.: T-rae Ferri pomati 500,0

DS. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день после еды

**Настойка женьшеня —
Tinctura Ginsengi**

Изготавливается на 70% спирте
в соотношении 1 : 10

Срок годности — 3 года; после
переконтроля — 3 года

Общетонизирующее средство.
Применяется в тех же случаях,
что и «Настойка аралии»

Rp.: T-rae Ginsengi 50,0

DS. По 15—25 капель 3 раза в день

**Настойка зайцегуба —
Tinctura Lagochili**

Изготавливается на 65% спирте
в соотношении 1 : 10

Срок годности — 1 год

Кровоостанавливающее сред-
ство.

Применяется для лечения уме-
ренных паренхиматозных крово-
течений из носа, матки, геморро-
идальных узлов, при геморраги-
ческих диатезах и т. п., а также
для предупреждения повышенной
кровооточивости при хирургичес-
ких операциях. Оказывает также
слабое седативное, иногда — по-
слабляющее действие

Rp.: T-rae Lagochili 50,0

DS. По 1 чайной ложке в $\frac{1}{4}$ стакана воды в день

**Настойка заманихи —
Tinctura Echinopacis elati**

Изготавливается на 70% спирте
в соотношении 1 : 5

Срок годности — 3 года

Общетонизирующее средство.
Свойства и показания к приме-
нению — см. «Настойка аралии»,
«Настойка женьшеня»

Rp.: T-rae Echinopacis 50,0

DS. По 30—40 капель 2—3 раза в день

Настойка зверобоя —
Tinctura Hyperici
Изготавливается на 40% спирте
в соотношении 1 : 5
Срок годности — 3 года

Вяжущее и антисептическое средство, способствует заживлению ран.

Применяется для лечения энтероколитов (внутри по 20—40 капель), стоматитов, гингивитов, инфицированных ран и т. п. (наружно)

Рр.: T-rae Hyperici 50,0
DS. По 50 капель на стакан для полоскания рта

Настойка золототысячника —
Tinctura Centaurii
Изготавливается на 70% спирте
в соотношении 1 : 5

Сокогонное средство (горечь).
Показания к применению — см.
«Настойка горькая»

Рр.: T-rae Centaurii 50,0
DS. По 15—20 капель перед едой

Настойка клопогона даурского
(цимицифуги) —
Tinctura Cimicifugae dahuricae
Изготавливается на 70% спирте
в соотношении 1 : 5
Срок годности — 1 год

Успокаивающее и гипотензивное средство.

Используется при ранних стадиях гипертонической болезни

Рр.: T-rae Cimicifugae 50,0
DS. По 50—60 капель 2—3 раза в день

Настойка лапчатки (калгана,
завязника стоячего) —
Tinctura Tormentillae
Изготавливается на 40% спирте
в соотношении 1 : 5
Срок годности — 3 года; после
переконтроля — 2,5 года

Вяжущее и антисептическое (противопоносное) средство.

По применению аналогично «Настойке зверобоя»

Рр.: T-rae Tormentillae 100,0
DS. Внутрь по 20—30 капель 2—3 раза в день.
Для полоскания — по 40—60 капель на $\frac{1}{2}$ стакана воды

Настойка лимонника китайского —
Tinctura Schizandrae chinensis
Изготавливается на 95% спирте
в соотношении 1 : 5
Срок годности — 2 года

Общетонизирующее средство.
По показаниям аналогично «Настойке аралии», «Настойке женьшеня»

Rp.: T-rae Schizandrae 100,0
DS. По 20—30 капель натошак

Настойка маральего корня (левзеи) — Общетоизирующее средство.
Tinctura Leuzeae carthamoidis Применение — см. «Настойка
Изготавливается на 70% спирте аралии»
в соотношении 1 : 10

Rp.: T-rae Leuzeae 20,0
DS. По 20—30 капель 2 раза в день

Настойка ноготков (календулы) — Антисептическое средство.
Tinctura Calendulae Применяется при стоматитах,
Изготавливается на 70% спирте ожогах, воспалительных процес-
в соотношении 1 : 10 сах на слизистой рта, глотки,
влагалища, шейки матки наружно
в виде полосканий, примочек,
спринцеваний

Rp.: T-rae Calendulae 25,0
DS. По 1 чайной ложке на стакан воды для полосканий

Настойка опия шафранная — Легкое анальгетическое, про-
Tinctura Opii crocata тивокашлевое и противопонное
Состав: средство.
Opii 5,0 Применяется для лечения по-
Croci носа (в сочетании с химиотерапев-
Acidi benzoici aa 9,0 тическими средствами), при опе-
Olei Foeniculi 3,0 рациях на нижних отделах ки-
Solutionis Ammonii caustici 96,0 шечника, для подавления кашля
Spiritus aethylicus 90% 384,0
Хранение — список Б

Rp.: T-rae Opii crocatae 50,0
DS. По 15—20 капель 2 раза в день

Настойка перца стручкового — Средство, раздражающее кожу
Tinctura Capsici и слизистые.
Изготавливается на 90% спирте Внутрь применяется как горечь
в соотношении 1 : 10 для сокогонного эффекта, наруж-
но — при заболеваниях суставов,
мышц, периферических нервов.
Входит в состав многих сложных
прописей (см. «Капсин», «Лини-
мент сложноперцовый» и т. д.)

Rp.: T-rae Capsici 50,0
DS. По 10—20 капель внутрь перед едой

Настойка померанцевых корок —
Tinctura corticis Aurantii
Изготавливается на 70% спирте
в соотношении 1 : 5

Сокогонное средство (горечь).
Применяется для повышения ап-
петита при истощении, при гипо-
ацидном гастрите и т. п. Обладает
приятным запахом, благодаря че-
му входит в состав многих слож-
ных прописей как corrigens

Rp.: T-rae corticis Aurantii 50,0
DS. По 15—30 капель внутрь перед едой

Настойка померанцевых плодов —
Tinctura fructus Aurantii
Изготавливается на 70% спирте
в соотношении 1 : 5

То же

Rp.: T-rae fructus Aurantii 50,0
DS. По 10—20 капель перед едой

Настойка померанцевых цветов —
Tinctura florum Aurantii
Состав:
Florum Aurantii 10,0
Spiritus aethylici 70% q. s.
ut. f. tinctura 50,0

То же

Rp.: T-rae florum Aurantii 50,0
DS. По 10—20 капель перед едой

Настойка ревеня —
Tinctura Rhei
Состав:
Pulveris radicis Rhei 10,0
Natrii tetraboratis
Kalii carbonatis aa 1,0
Aquae destillatae ebullientis 85,0
Spiritus aethylici 90% 10,0
Aquae Cinnamomi 15,0
Хранение — в прохладном
месте

Слабительное средство с преи-
мущественным действием на тол-
стый кишечник.

Применяется для лечения хро-
нических запоров

Rp.: T-rae Rhei 100,0
DS. По $\frac{1}{2}$ —1 чайной ложке 2 раза в день перед едой.

Приготовление: ремень, буру и соду кипятят в воде в закрытом сосуде
в течение получаса, приливают спирт и настаивают еще полчаса. Жид-
кость процеживают, остаток отжимают и к 85 частям коллатуры при-
бавляют 15 частей коричной воды. Смесь фильтруют

Настойка ревеня горькая — То же
Tinctura Rhei amara

Состав:

Radices Rhei grosso modo pulveratae 80,0

Radices Gentianae 20,0

Rhizomatis Calami 10,0

Spiritus aethylici 70% q. s.

ad tincturam 1000, 0

Срок годности 5 лет, после переконтроля — 2,5 года

Rp.: T-rae Rhei amarae 50,0

DS. По 1 чайной ложке перед едой

Настойка рвотного корня — Отхаркивающее средство.
Tinctura Ipecacuanhae Применяется при сухом кашле

Изготавливается в 70% спирте различного происхождения
в соотношении 1 : 10

Rp.: T-rae Ipecacuanhae 50,0

DS. По 5—10 капель на прием

Настойка росного ладана —
Tinctura Benzoës

Состав:

Resinae Benzoës concisi 10,0

Spiritus aethylici 90% ad 50,0

Антисептическое и противовоспалительное средство.

Применяется для промывания слизистых при воспалительных заболеваниях, для обработки ран, в косметических целях

Rp.: T-rae Benzoës 50,0

DS. По 1 чайной ложке на стакан воды для полоскания горла

Настойка росного ладана То же
сложная —

Tinctura Benzoës composita

1. Resinae Benzoës 20,0

Aloës 4,0

Balsami Peruviani aut Vinylini 5,0

Spiritus aethylici 90% 160,0

2. Resorcini 2,5

Glycerini 10,0

Tincturae Benzoës compositae 40,0

Rp.: T-rae Benzoës compositae 100,0

DS. Для обработки гнойных ран развести водой
1 : 2

**Настойка сабура (алое) —
Tinctura Aloës**

Слабительное средство, по свойствам и применению близкое к «Настойке ревеня»

Состав:
Extracti Aloës sicci 160,0
Spiritus aethylici 40% ad 1000,0
Срок годности — 5 лет; после
переконтроля — 2,5 года

Rp.: T-rae Aloës 100,0
DS. По 10—20 капель 2 раза в день

**Настойка сабура сложная —
Tinctura Aloës composita**

То же

Состав:
Aloës concisi 9,0
Radiciс Gentianae concisi
Radiciс Rhei
Crocii
Rhizomatis Zedoariae $\bar{a}\bar{a}$ 1,0
Spiritus aethylici 70% 200,0

Rp.: T-rae Aloës compositae 100,0
DS. По 10—30 капель на прием

**Настойка сабура шафранная —
Tinctura Aloës crocata**

То же

Состав:
Tincturae Aloës
Tincturae Myrrhae $\bar{a}\bar{a}$ 20,0
Tincturae Croci 10,0

Rp.: T-rae Aloës crocatae 50,0
DS. По 40—60 капель 2 раза в день

**Настойка сенны сложная —
Tinctura Sennae composita**

Слабительное средство.
По свойствам и применению
аналогично предыдущим прописям

Состав:
Folii Sennae concisi 24,0
Passulae majores 32,0
Fructus Carvi concisi 3,0
Fructus Cardamomi 1,0
Spiritus aethylici 70% 192,0

Rp.: T-rae Sennae compositae 200,0
DS. По 1 столовой ложке 2 раза в день

Настойка сосновых шишек —
Tinctura gemmae Pini
Изготавливается на 90% спирте
в соотношении 1 : 5

Антисептическое и отхаркиваю-
щее средство.

Применяется внутрь при инфек-
циях мочевыводящих путей (цис-
титы и пиелиты); наружно — для
ингаляций при ларингитах, тра-
хеитах, фарингитах, бронхитах

Рр.: T-rae gemmae Pini 100,0

DS. Для ингаляций — по 1 чайной ложке на стакан
кипятку; внутрь — по 10—30 капель 2—3 раза
в день

Настойка софоры японской —
Tinctura Sophorae japonicae
Изготавливается на 48% спирте
в соотношении 1 : 12
Срок годности — 1 год

Антисептическое и противвос-
палительное средство

Применяется для лечения гной-
ных ран и ожогов в виде промыва-
ний и примочек

Рр.: T-rae Sophorae 100,0

DS Развести водой 1 : 3 или 1 : 5. Для примочек

Настойка стальника пашенного —
Tinctura Onopidis arvensis
Изготавливается на 70% спирте
в соотношении 1 : 5
Срок годности — 2 года

Кровоостанавливающее средст-
во. Оказывает некоторое мочегон-
ное действие

Применяется в основном при
обострениях геморроя для пре-
кращения кровотечения и норма-
лизации стула

Рр.: T-rae Onopidis 100,0

DS. По 40—60 капель 2—3 раза в день

Настойка стеркулии —
Tinctura Sterculiae
Изготавливается на 70% спирте
в соотношении 1 : 5
Срок годности — 2 года

Общетонизирующее средство.

Применяется так же, как и
«Настойка араллии»

Рр.: T-rae Sterculiae 50,0

DS. Внутрь по 10—40 капель 2—3 раза в день не
позже, чем за 5—6 ч до отхода ко сну

Настойка хины —
Tinctura Chinae
Изготавливается на 70% спирте
в соотношении 1 : 10
Срок годности — 5 лет; после
переконтроля — 5 лет

Сокогонное средство (горечь).

Применяется аналогично «На-
стойке горькой»

Рр.: T-rae Chinae 100,0
DS. По 20—30 капель 2—3 раза в день за полчаса до еды

Настойка чемерицы —
Tinctura Veratri
Изготавливается на 70% спирте в соотношении 1 : 10
Срок годности — 3 года; после переконтроля — 1,5 года

Противопаразитарное средство. Применяется только наружно для борьбы с вшами и другими кожными паразитами, а также для лечения артритов, миозитов, подагры (растирания). Входит в состав сабадилловой воды

Рр.: T-rae Veratri 50,0
DS. Для растирания

Настойка черники —
Tinctura Myrtilli

Вязущее (противопоносное) средство.
Применяется главным образом в детской практике при диспепсии и колитах как дополнение к антибактериальной терапии

Состав:

1. Fructus Myrtilli 200,0
Spiritus aethylici 70% q. s.
Ut f. tinctura 1000,0
2. Fructus Myrtilli
Spiritus aethylici 90% āā 100,0

Рр.: T-rae Myrtilli 100,0
DS. По 20—30 капель 2—3 раза в день

Настойка чеснока —
Tinctura Allii sativi
Изготавливается на 90% спирте в соотношении 1 : 5

Антисептическое средство. Применяется при колитах, а также для уменьшения процессов брожения и гниения в кишечнике. Имеются указания на эффективность при атеросклерозе и гипертонии

Рр.: T-rae Allii sativi 40,0
DS. По 10—20 капель 2—3 раза в день

Настойка
шлемника байкальского —
Tinctura Scutellariae
Изготавливается на 70% спирте в соотношении 1 : 5

Успокаивающее и гипотензивное средство.
Применение — см. «Настойка василистника вонючего»

Rp.: T-rae Scutellariae 100,0
DS. По 20—30 капель 2—3 раза в день

Настойка эвкалипта — Антисептическое средство.
Tinctura Eucalypti Применяется так же, как и
Изготавливается на 70% спирте «Настой эвкалипта»
в соотношении 1 : 5
Срок годности — 5 лет; после
переконтроля — 2 года 6 мес.

Rp.: T-rae Eucalypti 25,0
DS. По 10—20 капель на стакан воды для ингаляций

Настойка эвкоммии (эйкоммии) — Успокаивающее и гипотензив-
Tinctura Eucommiae ное средство
Изготавливается на 70% спир-
те в соотношении 1 : 5
Срок годности — 1 год

Rp.: T-rae Eucommiae 20,0
DS. По 15—30 капель 2—3 раза в день

Натрия нуклеинат — Стимулятор лейкопоза.
Natrii nucleinas Применяется при лейкопениях
Натриевая соль нуклеиновой вследствие применения антиблас-
кислот томных средств и радиотерапии,
Выпускается в порошке и в ам- при агранулоцитозе различного
пулах по 5 мл 1% раствора (для происхождения, а также при нару-
детей) шении фосфорного обмена (фос-
Хранение — в обычных усло- фатурия, рахит)
виях
Срок годности порошка — 3 го- П р и м е ч а н и е: место инъ-
да; после переконтроля — 2 года екции желательно предварительно
анестезировать 0,5% раствором
новокаина

Rp.: Sol. Natrii nucleinatis 1% 5,0
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. По 1—2 мл в день в мышцу (ребенку 5—8 лет)

Rp.: Sol. Natrii nucleinatis 2% — 20,0
Sterilisetur!
DS. По 5 мл 1—2 раза в день в мышцу (взрослому)

Rp.: Natrii nucleinatis 0,1
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 3 раза в день

**Натрия оксibuтират —
Natrii oxybutyras**

γ-Оксимасляной кислоты натриевая соль

Выпускается в ампулах по 10 мл 20% раствора

Хранение — список Б, в обычных условиях

Срок годности — 3 года

Неингаляционный общий анестетик.

Применяется для вводного или базисного наркоза из расчета 70—120 мг/кг веса тела больного. Для самостоятельного наркоза применяется редко, так как этот препарат является слабым анальгетиком. Также применяется для профилактики и лечения гипоксического отека мозга, в акушерской практике, при гиперкалиемии различного происхождения. Может быть применен в качестве снотворного (внутри по 2—4 г) и успокаивающего средства. Отличается от других неингаляционных средств для наркоза («Тиопентал», «Сомбревин» и т. д.), большей безопасностью в применении, почти полным отсутствием токсических свойств и медленным наступлением эффекта (через 30—40 мин). Длительность наркоза — 2—4 ч. Противопоказан при гипокалиемии, миастении, язве и раке желудка, гипертензии

Rp.: Sol. Natrii oxybutyratis 20% 10,0

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Вводить внутривенно 0,3—0,5 мл на 1 кг веса тела больного

**Натрия пара-аминосалицилат —
Natrii para-aminosalicylas**

Синонимы: Асипар, Аминораг, Аминосалил(ум), Аминох, Арасил, Апас, Natri-Pas, Paramin, Paramisan, Pasalon, Pask, Sta-Pas, Teebasin, Tuboras, Wofapas (ГДР)

Выпускается в таблетках по 1,0 и в драже по 0,4 (ГДР)

Хранение — в сухом защищенном от света месте

Срок годности — 3 года; после переконтроля — 2 года; таблетки СРР — неограничен; пара-аминосалицилат натрия 3% раствор — 8 мес., ПАС, таблетки ЧССР — 4 года

Противотуберкулезное средство.

Применяется при туберкулезе различной локализации, обязательно в сочетании с препаратами ГИНК и стрептомицина

Rp.: Natrii para-aminosalicylatis 1,0

D. t. d. N. 200 in tabul.

S. По 10—20 г в день, продолжительность лечения — 3—6 мес. При явлениях непереносимости лечение прерывают на 3—4 дня

Натулан — Natulan (Швейц.)

N-изопропил-*n*-(2-метилгидрази-
нометил)-бензамида гидрохло-
рид

Синонимы: Procarbazinehydro-
chlorid

Выпускается в капсулах по 0,05

Хранение — список Б

Срок годности — 3 года

Цитостатическое средство.

Применяется для лечения лей-
козов, иноперабельного рака.
Начиная с суточной дозы 50 мг
и прибавляя по 50 мг каждый
день, доводят ее до 250—300 мг.
На курс лечения — 6 г препарата

Rp.: «Natulan» 0,05

D. t. d. N. 100 in capsul. gelat.

S. По 1—6 капсул ежедневно

Наурастал — Naugastal

Противовоспалительное средст-
во, способствует выведению моче-
вой кислоты из организма, облада-
ет умеренным желчегонным свой-
ством.

Применяется для лечения по-
дагры, артритов, артрозов, по-
чечнокаменной болезни (при урат-
ных камнях)

Rp.: Lithii carbonatis 1,0

Acidi acetylsalicylici

Sacchari āā 10,0

Magnesii carbonatis 0,5

Sacchari lactis 65,0

Natrii sulfatis 2,0

Olei Citri 0,3

Cardamomi 0,05

M. f. pulvis

DS. По 1/2 чайной ложки на 1/2 стакана воды

Нафталгин — Naphthalginum

Состав:

Methylii salicylatis

Analgini

Naphthalani liquidi āā 2,5

Emulgentis T₂ 13,0

Aquae destillatae ad 100,0

Выпускается во флаконах по
100 мл

Срок годности — 2 года

Противовоспалительное, анти-
септическое, болеутоляющее и рас-
сасывающее средство.

Применяется для лечения арт-
ритов, ревматизма, ишиаса, ра-
дикулита, невритов, миозитов и
т. п.

Rp.: Naphthalgini 100,0
DS. Для растираний

Нафтизин — Naphthyzinum

2-(α -Нафтилметил)-имидазолина нитрат (или гидрохлорид)

Синонимы: Antan, Araff, Benil, Biogan, Cefasan, Clasol, Col-dan, Fluitting, Imidazolina, ImidazyI, Imidin, Imizol, Iprasan, Medicoryn, Momentol, Myralon, Nafazol, Nafazolin, Naftazolina, Naphazolin (BHP), Naphol, Naph-tazolin, Naphthizine, Nastizol, Nia-zol, Pentakos, Pertiran, Privin, Prizole, Rhinal, Rhinantin, Rhinaz-in, Rhinex, Rhinon, Rhino-perd, Rimidol, Rinazina, Rinitol, Rinofug, Sanorin (ЧССР), Stana-zoline, Strictylon, Vasocon-Regu-lar

Выпускается в виде 0,025%, 0,05% и 0,1% раствора, а также в виде 0,1% эмульсии (санорин) и 0,1% раствора с добавлением 2,5% борной кислоты (нафазолин)

Хранение — список Б, в прохладном, защищенном от света месте

Адреномиметик, сосудосуживающее средство.

Применяется местно для лечения острого ринита (насморка), а также конъюнктивита. К препарату наблюдается быстрое (через 3—5 дней) привыкание

Rp.: Sol. Naphthyzini 0,025%
(0,05 aut 0,1%) 10,0

DS. По 3—5 капель 2—3 раза в день в нос

Невиграмон — Nevigramon (BHP)

1-Этил-7-метил-1, 8-нафтиридин-4-он-3-карбоновая кислота

Синонимы: Acidum nalidixicum, Nalidixanum, Nalidixic acid, Nalidixin, NegGram, NeGram, Nogram, Wintomylon

Выпускается в таблетках и в капсулах по 0,5

Хранение — в обычных условиях

Срок годности: капсулы — 5 лет, таблетки — не ограничен

Химиотерапевтическое средство, активное по отношению к грамотрицательным микробам — бактериям кишечной группы, палочке Фридендера, протеею и др.

Применяется при заболеваниях, вызванных грамотрицательными микробами, особенно при инфекциях мочевыводящих путей (цистит, пиелит, пиелонефрит)

Rp.: Tabul. «Nevigramon» 0,5
D. t. d. N. 20

S. По 1—2 таблетки 4 раза в день

Невралгин — Neuralgin (ПНР)

Состав на 1 таблетку:
Codeini phosphatis 0,01
Phenacetini
Acidi acetylsalicylici \bar{a} 0,25

Хранение — список Б

Срок годности — 4 года; дополнительный срок годности после переконтроля — 2 года

Анальгезирующее и противовоспалительное средство.

Применяется при ревматизме, невралгии, ишиасе, полиартритах и пр.

Rp.: Tabul. «Neuralgin» N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Невротамин — Neurotamin (ПНР)

Состав на 1 таблетку:
Phenobarbitali 0,125
Strychnini nitratis 0,0005
Thiamini chloridi 0,001
Acidi ascorbinici 0,0075

Хранение — список А, в защищенном от света месте

Срок годности — 1 год

Препарат способствует улучшению проведения возбуждения по периферическим нервам и в центральной нервной системе. Обладает некоторым успокаивающим действием.

Применяется для лечения органических и функциональных заболеваний нервной системы, особенно в периоде реконвалесценции

Rp.: Tabul. «Neurotamin» N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Нега — Nega

Вяжущее, подсушивающее, антисептическое и дезодорирующее средство.

Применяется для борьбы с гипергидрозом (избыточной потливостью)

Rp.: Mentholi 2,0
Thymoli 3,0
Bismuthi subnitratis 35,0
Aluminis usti 60,0
Acidi borici 300,0
Talci 1000,0
M. f. aspersio
DS. Присыпать потеющие места 1—2 раза в день

Незол — Nesol

Сосудосуживающее и антисептическое средство.

Применяется для лечения острого ринита (насморка)

Rp.: Acidi borici 10,0
Mentholi 0,2
Vasellini 189,7
Olei Geranii 0,1
M. f. unguentum
DS. Мазь от насморка

Нейтрацид — Neutracid (ЧССР)

Состав на 1 таблетку:

Magnesii trisilicatis 0,35
Bismuthi subnitratis 0,1
Aluminii hydrooxydi colloidalis 0,15

Extracti Belladonnae 0,005

Хранение — список Б

Антацидное и противовоспалительное средство.

Применяется для снижения кислотности содержимого желудка при язве желудка и двенадцатиперстной кишки и при гиперацидных гастритах

Rp.: Tabul. «Neutracid» N. 20

DS. По 1 таблетке 2—4 раза в день между приемами пищи. Таблетки следует размочить в воде

Неоанузол — Neoanusolum

Состав:

Bismuthi subnitratis 0,075

Tannini 0,05

Resorcini 0,005

Zinci oxydi 0,02

Iodi 0,005

Methyleni coerulei 0,003

Olei Casao 2,0

Срок годности — 1 год; после переконтроля — 6 мес.

Вяжущее, антисептическое и противовоспалительное средство.

Применяется для лечения геморроя и трещин заднего прохода

Rp.: Suppos. Neoanusoli N. 10

DS. По 1 суппозиторию в прямую кишку утром и вечером, после теплой сидячей ванны

Необензиол — Neobenzinolum

Смесь алифатических углеводов с прованским или персиковым маслом. Содержит 16% нормального гексана, 16% нормального гептана, 68% масла

Выпускается в ампулах по 0,4 мл

Хранение — в прохладном, защищенном от света и огня месте

Неспецифическое десенсибилизирующее средство.

Применяют при аллергических заболеваниях, при бронхиальной астме, скрофулодерме и др.

Rp.: Neobenzinoli 0,4 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. В мышцы по 0,6—0,8 мл при бронхиальной астме,
по 0,2—0,3 мл — при скрофулодерме 1 раз в 2—3
недели

Неогинофорт — Neogynofort
(ВНР)

Состав на 1 ампулу:
Ergotamini tartratis 0,00025
Ergometrini maleatis 0,000125
Aquaе pro injectionibus ad 1 ml
Хранение — список А, в за-
щищенном от света месте при тем-
пературе не выше 10°
Срок годности — 1 год

Средство, стимулирующее со-
кращение матки.

Применяется для лечения ато-
нических кровотечений в после-
родовом периоде, для ускорения
инволюции матки, при метрорра-
гиях и т. п. Противопоказан во
время схваток и в периоде изгна-
ния плода, во время беременности

Rp.: «Neogynofort» 1 ml
D. t. d. N. 5 in ampul
S. По 0,5—1 мл внутримышечно.

Неодентикаин — Neodenticain
(ЧССР)

Состав 1 ампулы:
Novocaini 0,04 (0,08)
Isoadrenalini 0,0003
Aquaе pro injectionibus ad 2 ml
Хранение — список Б, в за-
щищенном от света месте

Местноанестезирующее средст-
во в комбинации с сосудосуживаю-
щим.

Применяют в стоматологии для
проводниковой и инфильтраци-
онной анестезии

Rp.: «Neodenticain» 2 ml.
D. t. d. N. 100 in ampul.
S. По 1—3 мл 2% или 1—2 мл 4% (по новокаину)
раствора

Неодикумарин — Neodicumarinum

Этиловый эфир ди-(4-оксикума-
ринил-3)-уксусной кислоты

Синонимы: Aethylis biscoumate-
setas, Dicumacyl, Dicumaryl, Dip-
harsan, Pelentan (ЧССР), Tromba-
rin, Trombex, Trombolyan, Тро-
механ

Выпускают в таблетках по 0,1;
0,2 и 0,3

Хранение — список А, в защи-
щенном от света месте

Срок годности — 6 лет (пелен-
тан); 3 года (неодикумарин); после
переконтроля — 2 года

Антикоагулянт непрямого дей-
ствия, сходный с «Дикумарином»,
но менее токсичный и менее ак-
тивный.

Показания и противопоказа-
ния — см. «Дикумарин»

Rp.: Neodicumarini 0,1 (0,2; 0,3)

D. t. d. N. 50 in tabul.

S. Дозировка строго индивидуальна

Неокарболокс — Neocarbolax
(ВНР)

Слабительное средство.
Применяется при хронических запорах

Состав на 1 таблетку:

Rhei sicci 0,02

Sulfuris praecipitati 0,05

Pulveris folii Sennae 0,1

Carbonis activati 0,19

Хранение — в сухом месте

Rp.: Tabul. «Neocarbolax» N. 40

DS. По 1—3 таблетки 3 раза в день после еды или 1—4 таблетки на ночь. От 8 до 12 лет — $\frac{1}{2}$ дозы взрослого

Неопепульсан — Neoperulsan
(ВНР)

Холинолитическое (спазмолитическое) средство.

N, N-Дизопропил- N-метил-2-(ксиантен-9-карбонилокси)-этил-аммонийгидроксида бромид

Применяют при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при остром и хроническом гиперацидном гастрите, пилороспазме, неукротимой рвоте беременных, остром и хроническом панкреатите, колите, желчнокаменной болезни и др.

Синонимы: Bantynyl-duplex, Ergocil, Ergotina, Lenigastriil, Mephatelin, Neodexabine, Neo-Gastro-sedan, Neo-Metantyl, Neo-Ulkophob, Neo-ventrisan, Pervagal, Pro-Bantin(e), Pro-Gastron, Prodixamon, Propanthel, Propanthelin-bromid, Sedalcer, Suprantil

Выпускается в драже по 0,04 и в таблетках по 0,015.

Хранение — список Б, в сухом, защищенном от света месте

Rp.: Dragee «Neoperulsan» 0,04 (0,015)

D. t. d. N. 10

S. По 1 драже 2—3 раза в день, с постепенным снижением дозы до 1 драже 1—2 раза в день

Неорегулин — Neoregulin

Слабительное средство.
Применяется при привычных запорах, геморрое и т. п.

Rp.: Extracti Frangulae sicci 3,5

Agar-agar 96,5

M. f. pulvis

DS. От 1 до 3 столовых ложек в день

Неофедан — Neophedan (BHP)
Фенилацетилмочевина
Синонимы: Cetylureum, Eferon,
Epheron, Epiclase, Felurea, Fena-
cemid, Fenised, Fenostenyl, Fe-
nural, Fenurone, Fenytan, Neop-
henal, Phacetur, Phenacalum,
Phenacemid, Phenacereum, Phen-
uron, Phenutal, Phenyrit, Phetyl-
igeum

Выпускается в таблетках по
0,25

Хранение — в сухом месте

Противоэпилептическое сред-
ство.

Применяют при психомоторных
эквивалентах, а также при боль-
ших и малых припадках в тех
случаях, когда другие антиэпи-
лептические средства не помогают

Rp.: Tabul. «Neophedan» 0,25

D. t. d. N. 25

S. По 2—3 таблетки в день во время еды или после
еды, запивая обильным количеством жидкости

Непотин — Nepotin

Антисептическое и подсушиваю-
щее средство.

Применяется для борьбы с пот-
ливостью ног

Rp.: Acidi borici 9,0

Zinci oxydi 1,0

M. f. aspersio

DS. Присыпать потливые места

Нервалин — Nervalin

Анальгетическое и жаропонижа-
ющее средство.

Применяется при головной бо-
ли, мигрени, лихорадке

Rp.: Kalii bromidi

Acidi acetylsalicylici aa 0,25

Euchinini 0,18

Extracti Kolae sicci 0,02

Pulveris Coffeae 0,12

M. f. pulvis

D. t. d. N. 20

S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Неулептил — Neuleptil (Франц.)
2-Циано-3-(гидрокси-4-пиперидино-3-пропил)-10-фенотиазин
Синонимы: Aolept, Neulactil, Periciazinum, Propericiazine
Выпускается в капсулах по 0,001

Хранение — список А, в защищенном от света месте
Срок годности — 3 года

Нейролептик («большой» транквилизатор).

По применению и противопоказаниям близок к «Аминазину» (см.) Отличается большей активностью

Rp.: «Neuleptil» 0,001
D. t. d. N. 50 in capsul. gelat.
S. По 1—2 капсулы 2—4 раза в день

Ниаламид — Nialamidum
1-[2-(бензилкарбамоил)-этил]-2-изоникотиноилгидразин
Синонимы: Delmoneurina, Esp-ril, Isalizina, Mygal, Nialamina, Nialamide, Niamid(e), Nuredal (ВНР), Psicodisten, Surgex

Выпускается в таблетках по 0,025

Хранение — список Б
Срок годности — 5 лет

Антидепрессант (ингибитор МАО).

По действию, применению и противопоказаниям весьма сходен с «Ипразидом», «Индопаном»

Rp.: Nialamidi 0,025
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Нибуфин — Nibuphinum
пара-Нитрофениловый эфир дин-бутилфосфиновой кислоты
Синоним: Nibufin

Выпускается в виде 0,033% раствора в ампулах по 5 мл и во флаконах по 10 мл

Хранение — список А, в защищенном от света месте.

Срок годности — 1 год; дополнительный срок годности после переконтроля — 6 мес.

Антихолинэстеразное средство.

Применяют при атонии мускулатуры кишечника любого происхождения, для стимуляции родовой деятельности (на фоне эстрогенов). В глазной практике используется при глаукоме. Противопоказан при беременности, гиперкинезах, бронхиальной астме, острых воспалительных (гнояных) процессах в брюшной полости

Rp.: Sol. Nibuphini 0,033% 5 ml.
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. По 3—5 мл под кожу взрослому
Rp.: Sol. Nibuphini 0,033% 10 ml
DS. Глазные капли

Нигексин — Nihexinum

Состав на 1 таблетку:

Hexyltheobromini 0,2

Acidi nicotiniци 0,05

Синоним: Cosaldon

Хранение — список Б

Срок годности — 3 года

Сосудорасширяющее средство.

Применяют главным образом при спазмах сосудов головного мозга (при церебросклерозе), спазмах сосудов верхней половины туловища

Rp.: Tabul. Nihexini N. 20

DS. В первые 2—3 недели принимают по 1 таблетке 3—4 раза в день, затем по 2 таблетки в день

Никверин — Nicoverinum

Состав на 1 таблетку:

Papaverini hydrochloridi 0,02

Acidi nicotiniци 0,05

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 3 года

Спазмолитическое и сосудорасширяющее средство.

По применению аналогично предыдущей прописи

Rp.: Tabul. Nicoverini N. 10

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Никодин — Nicodinum

Никотиновой кислоты гидроксиметиламид

Синонимы: Bilamid, Bilizorin, Bilocid, Cholamid, Choligen, Coloton, Felosan, Isochol, Nicoform, Savatin, Vimabil

Выпускается в таблетках по 0,5

Хранение — в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 20°

Срок годности — 3 года; после переконтроля — 1 год

Желчегонное и антимикробное средство.

Применяют при воспалительных заболеваниях желчных и мочевыводящих путей (холециститы, пиелиты и пр.), а также при гастроэнтеритах

Rp.: Nicodini 0,5

D t. d. № 30 in tabul.

S. По 1 таблетке 3 раза в день до еды

**Николаева мазь —
Unguentum Nikolaevi**

Отбеливающее и смягчающее кожу средство.

Применяется для выведения веснушек и простых угрей

I. Rp.: Perhydroli 0,5

Olei Bergamottae 1,0

Aquae Amygdalarum amargarum 5,0

Succi Citri

Lanolini aa 20,0

2. Rp.: Perhydroli 0,5
Olei Amygdalarum
Cerae albae āā 10,0
Cetacei 15,0
Aquaе Rosae ad 50,0

3. Rp : Perhydroli
Camphorae
Acidi salicylici āā 0,5
Lanolini
Vaselini āā 10,0
M. f. unguentum
DS. Для нанесения на кожу лица на ночь

Никофер — Nicofer (ЧССР)

Состав на 1 драже:

Ferrosi sulfatis 0,23

Ferrosi nicotinatіs 0,2

Acidi ascorbinici 0,025

Chlorophylli 0,005

Хранение — в хорошо закупоренной таре, предохраняющей от действия света

Желесодержащий препарат, противоанемическое средство.

Применяют при анемии, обусловленной недостатком железа, постгеморрагической анемии, при ахилии желудка, в период беременности, при поносах и др.

Rp.: Dragee «Nicofer» N. 50

DS. По 1—2 драже 2—3 раза в день после еды.
Драже раскусывать

Никофлавин — Nicoflavin (ЧССР)

Состав одной ампулы:

Acidi nicotinici 0,25

Riboflavini 0,0005

Aquaе pro injectionibus ad 5 ml

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 1 год

Комплекс витаминов, обладающий сосудорасширяющими и спазмолитическими свойствами.

Применяется при функциональных расстройствах периферических сосудов (болезнь Рейно), при органических и функциональных поражениях мозговых сосудов, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при авитаминозе РР

Rp.: «Nicoflavin» 5 ml

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. Внутримышечно по 1 ампуле в день. При расстройствах периферических сосудов — 5—20 мл в день

Никошпан — Nicospan (ВНР)
Состав на 1 таблетку:
Nospani 0,078
Acidi nicotini 0,022
Хранение — список Б
Срок годности — 5 лет

Сосудорасширяющее и спазмолитическое средство.

Применяют при мозговых и периферических ангиоспазмах, головных болях сосудистого происхождения, стенокардии и т. п.

Рр.: Tabul. «Nicospan» N. 20
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Нитазол — Nitazolium
2-Ацетиламино-5-нитрогизазол
Синонимы: Acinitrazol, Aminitrazol, Cytosteon, Torion, Trichocid, Trichoral, Tricosteril, Trigamma, Trinex
Выпускается в таблетках по 0,1, шариках по 0,12 и в виде 2,5% суспензии для наружного применения

Противопротозойное (трихомонацидное) средство.

Применяется для лечения трихомониаза. Мужчинам назначается внутрь, женщинам так же и местно, в виде pessaries и обработки 2,5% суспензией. Лечение партнеров проводится одновременно

Хранение — список Б
Срок годности таблеток — 2 года

Рр.: Nitazoli 0,1
D. i. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке 3 раза в день. Курс лечения — 3 цикла по 15 дней с перерывами по 1—2 недели между циклами

Рр.: Susp. Nitazoli 2,5% 100,0
DS. Для наружного применения

Нитразепам — Nitrazepamum
7-Нитро-2,3-дигидро-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин-2-он
Синонимы: Eunoclin (ВНР), Mogadan, Mogadon, Neozepam, Radedorm (ГДР)
Выпускается в таблетках по 0,005 и 0,01
Хранение — список Б
Срок годности таблеток «Радедорм» (ГДР) — 5 лет

Успокаивающее и снотворное средство. В больших дозах оказывает противосудорожное и противоэпилептическое действие.

Применяют главным образом как снотворное средство при нарушении сна различного происхождения, особенно при функционально-эмоциональных расстройствах. Сон наступает через 20—45 мин, длится 6—8 ч. Чувства тяжести, разбитости после сна не отмечается. Может применяться до и после операций, как успокаивающее средство

Rp.: Nitrazepami 0,005 (0,01)
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке за полчаса до сна

Нитранол — Nitranolum
Тринитрата триэтанолamina
дифосфат

Синонимы: Aminotrate phosphate, Angitrit, Bentonyl, Bitri, Duronitrin, Metamin(e), Metanitrate, Nitralettae, Nitretamin, Nitrin, Nitroduran, Nitronium, Nitro-Tabletten, Ortin, Praenitrona (ФРГ), Thibetine, Tricoryl, Vasomed

Выпускается в таблетках по 0,002

Хранение — список Б
Срок годности — 6 мес.

Сосудорасширяющее средство, действующее преимущественно на коронарные сосуды.

Применяется для предупреждения приступов стенокардии для лечения спазмов периферических сосудов. Для купирования острых спазмов сосудов непригодно, так как действует медленно, но длительно

Rp.: Nitranoli 0,002
D. t. d. N. 30 in tabul.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день после еды

Нитросорбид — Nitrosorbidum
1,4: 3,6-Диангидро-*D*-сорбита-
2,5-динитрат

Синонимы: Carvasin, Harrical, Isorbid, Isordil, Isosorbiddinitrat, Niglon, Risordan, Sorbangil

Выпускается в таблетках по 0,005 и 0,01

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 2 года

Сосудорасширяющее средство, по эффекту и применению близкое к «Нитранолу»

Rp.: Nitrosorbidi 0,005 (0,01)
D. t. d. N. 50 in tabul.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Нитротесал — Nitrothesal

Состав на 1 таблетку:

Theobromini 0,3

Nitranoli 0,002

Phenobarbitali 0,015

Хранение — список Б

Сосудорасширяющее и успокаивающее средство.

Применяется при лечении стенокардии, а также гипертонической болезни I стадии (сердечная форма)

Rp.: Tabul. Nitrothesali N. 20
DS. По 1 таблетке 1—3 раза в день

Нитрофунгин — Nitrofungin
(ЧССР)

Состав:
Chlornitrophenoli 1,0
Triethylenglycoli 10,0
Spiritus aethylici 50% ad 100,0
Выпускается во флаконах по
25 мл
Срок годности — 4 года

Фунгицидное средство.
Применяется для лечения эпи-
дермофитии, трихофитии, канди-
дамикоза и других дерматомико-
зов

Rp.: «Nitrofungin» 25 ml.
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Нитрофурилен — Nitrofurilenum
5-Нитро-2-фурил-β-нитроэтилен
Выпускается в виде порошка
Хранение — в темном месте

Антисептическое (фунгицидное)
средство.
Применяется для лечения эпи-
дермофитии и кандидамикоза ко-
жи

Rp.: Nitrofurileni 0,1
Spiritus aethylici 70% 200,0
MDS. Смазывать пораженную поверхность

Rp.: Nitrofurileni 0,025
Basis unguenti 50,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженную поверхность

Новика жидкость зубная —
Liquor Novici odontalgicum

Препарат фтора.
Применяется при санации зубов

Rp.: Natrii fluoridi 0,2
Aquaе destillatae 18,0
MDS. В стоматологический кабинет

Новикова жидкость —
Liquor Novicovi

Антисептическое средство.
Применяется для смазывания
мелких повреждений кожи (вместо
повязки)

Состав:
Tannini 1,0
Viridis nitentis 0,2
Spiritus aethylici 96% 0,2
Olei Ricini 0,5
Collodii 20,0
Выпускается во флаконах по
20 и 30 мл
Срок годности — 1 год

Rp.: Liquoris Novicovi 20 ml (30 ml)
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Новокаинамид — Novocainamidum

Диэтиламиноэтиламида пара-аминобензойной кислоты гидрохлорид

Синонимы: Amidoprocain, Amisalin, Bio-coril, Cardiorytmin, Procainamid, Procardyl, Pronestyl, Supicain Amide

Выпускается в таблетках по 0,25 и в ампулах по 1, 2 и 5 мл 10% раствора

Хранение — список Б

Срок годности таблеток — 1,5 года; ампул 10% — 3 года

Противоаритмическое средство.

Применяется при пароксизмальной тахикардии, экстрасистолии и других нарушениях ритма сердца, при операциях на сердце и крупных сосудах и т. д.

Rp.: Novocainamidi 0,25

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Rp.: Sol. Novocainamidi 10% 1 ml

(2 ml, 5 ml)

D. t. d. N. 20 in ampul.

S. От 1 до 5 мл в мышцы или в вену, в последнем случае развести 40% раствором глюкозы, вводить медленно

Новоинол — Novopinol

Раздражающее средство.

Применяется как заменитель хвойного экстракта для ванн при лечении заболеваний дыхательных путей. (см. «Ванна скипидарная»)

Rp.: Fluoresceini 2,0

Natrii tetraboratis 100,0

Olei Pini aetherei 10,5

Olei Juniperi 1,5

Olei Lavandulae

Olei Citri aa 0,5

MDS. На одну ванну.

Новурит — Novurit (ВНР)
2-Метокси-3-меркурпропиламида-2,2,3-триметил-1,3-циклопентандикарбоновой кислоты натриевая соль

Синонимы: Diumerin, Hydran AB, Mercupurin, Mercurin, Mercurophyllin, Mercuzan, Mercuzanthin, Merthylline

Состав на 1 ампулу:
Novuriti 0,1 (0,2)
Theophyllini 0,045—0,09
Aquaе pro injectionibus ad 1 ml (2 ml)

Состав на 1 суппозиторий:
Novuriti 0,5
Anaesthesini 0,2
Basis suppositorii g. s.

Срок годности суппозитория и ампул — 5 лет

Ртутное мочегонное средство.

Применяется для лечения отеков, связанных с хронической сердечной недостаточностью, циррозом печени, нефрозами. Противопоказан при поражениях клубочкового аппарата почек (гломерулонефриты). При длительном применении может вызвать гипохлоремический алкалоз, причем эффект препарата снижается. Чтобы избежать этого, рекомендуется сочетать с диакрббом или хлоридом калия. При совместном применении с сердечными гликозидами необходимо назначать одновременно препараты калия (новурит вызывает потерю калия организмом)

Rp.: Sol. «Novurit» 1 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. По 1—2 мл внутримышечно 1 раз в 5—7 дней

Rp.: Suppos. «Novurit» N. 10
DS. По 1 свече в прямую кишку 1 раз в 5 дней

Новэмбитол — Novembitolum
Орто-ксилил-ди (2-хлорэтил)-амин гидрохлорид

Выпускается в ампулах в виде порошка по 0,045

Хранение — список А
Срок годности — 3 года

Применяется при лечении лимфогранулематоза и других злокачественных новообразований лимфатической системы. Лечение проводится курсами — по 15—20 инъекций. При лечении необходимо следить за картиной крови

Rp.: Novembitoli 0,045
D. t. d. N. 10 in ampul
S. В локтевую вену через день. Содержимое ампулы растворяют перед употреблением в 20 мл стерильного изотонического раствора натрия хлорида

5-НОК — 5-НОК (СФРЮ)
5-Нитро-8-оксихинолин
Синонимы: Nibiol, 5-Nitro-oxin, Nitroxolin, Noxibiol, Uro-Coli
Выпускается в драже по 0,05
Хранение — список Б
Срок годности — 3 года

Химиотерапевтическое средство.
Применяется при острых и хронических инфекциях мочеполового тракта (пиелонефрит, цистит, уретрит, простатит и т. д.)

Rp.: Drag. «5-НОК» 0,05
D. t. d. N. 50
S. По 2 драже 4 раза в день

Ноксирон — Noxugon (ВНР)
2,6-Диоксо-3-этил-3-фенил-пиперидин
Синонимы: Alfimid, Doriden, Elrodorm, Glimid, Glutethimid, Sarodormin
Выпускается в таблетках по 0,25
Хранение — список Б
Срок годности — 5 лет

Успокаивающее и снотворное средство короткого действия.
Применяют при всех видах бессонницы

Rp.: Tabul. «Noxugon» 0,25
D. t. d. N. 10
S. По 1—2 таблетки на ночь как снотворное, таблетки — как успокаивающее

Норакин — Norakin (ГДР)
1-(Бицикло-2,2,1-гепт-2-ен-5-ил)-1-фенил-3-пиперидинопропан-1-ола гидрохлорид
Синонимы: Akineton, Akinophyl, Viperiden
Выпускается в таблетках по 0,001 и 0,002
Хранение — список А
Срок годности — 5 лет.

Центральный холинолитик.
Применяется для лечения паркинсонизма, «нейролептического синдрома» и других состояний, связанных с нарушением экстрапирамидной системы. По свойствам и строению близок к «Циклодолу». Побочные эффекты — типичные для холинолитиков (тахикардия, паралич аккомодации, сухость во рту, запоры, тошнота). Для усиления эффекта рекомендуется сочетать с «Лародопа».

Rp.: «Norakin» 0,001 (0,002)
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1—2 таблетки 3—4 раза в день (в зависимости от эффекта и переносимости препарата)

НТ — NT; Нифонтова и Троицкого жидкость —
Liquor Nifontovi et Troicky

Солевой плазмозамещающий раствор. Применяется при умеренной кровопотере, шоке, но в основном — при дегидратации, связанной с профузной рвотой или поносом (гипохлоремический алкалоз, сальмонеллезы и др.)

Rp.: Natrii chloridi 40,0
Calcii chloridi 1,0
Kalii chloridi 2,6
Acidi glutaminici 5,0
Acidi ascorbinici 10,0
Aquae pro injectionibus 1000,0
M. Sterilisetur!
DS. Внутривенно по 200 мл

Но-шпа — Nospanum (ВНР)
6,7,3,4-Тетразоксид-1-бензил-ден-1,2,3,4-тетрагидроизохинолина гидрохлорид

Синонимы: No-spa, Nospan
Выпускается в драже по 0,04 и в ампулах по 2 мл 2% раствора
Хранение — список Б
Срок годности — 5 лет

Спазмолитическое и сосудорасширяющее средство.

Применяют при спазмах желудка и кишечника, при желчнокаменной болезни, холецистите, почечнокаменной болезни и спастическом запоре, спазмах венечных и периферических сосудов

Rp.: Nospani 0,04
D. t. d. N. 10 in dragee
S. По 1—2 драже 2—3 раза в сутки

Rp.: Sol. Nospani 2% 2 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. По 2—4 мл внутривенно медленно (при остром ангиоспазме)

Облифон — Oblivon

3-Метил-1-пентинол-3

Синонимы: Allotropal, Apridol, Atemopin, Atempol, Dalgol, Dorison, Dormosan, Formison, Hexofen, Imnudorm, Melpintol, Mepentil, Methylpentynol, Olosot, Olvadon, Pavorex, Pentadorm, Pentinol, Perlopal, Profundol, Quietal, Riposon, Sedapercut, Seral, Somnesin, Sonnormon, Util

Выпускается в драже по 0,1

Седативное средство («малый» транквилизатор).

Препарат применяется при неврозах, неврастении, психастении, стенокардии, вегетативных неврозах. При лечении облифоном рекомендуется воздерживаться от возбуждающих средств, спиртных напитков

Rp.: Drag. «Oblivon» 0,1
D. t. d. N. 30
S. Через каждые 3—4 ч по 1 драже

**Образцова микстура —
Mixture Obraszovi**

Спазмолитическое и противовоспалительное средство. Обладает умеренным желчегонным эффектом.

Применяется при холециститах, желчнокаменной болезни

Rp.: Natrii salicylatis 6,0
Hexamethylentetramini 4,0
Extracti Belladonnae 0,15
Glycerini 30,0
Aquae destillatae 120,0
Aquae Menthae 60,0
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Оксазепам — Oxazepamum

7-Хлор-2,3-дигидро-3-окси-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин-2-он
Синонимы: Adumbran, Bonage, Прахитен, Psicorax, Rondar, Segan, Serenal, Serenid-D, Tazepam (ПНР)

Выпускается в таблетках по 0,01 и 0,015

Хранение — список Б

Срок годности «Тазепама» (ПНР) — 3 года

«Малый» транквилизатор. Близок по строению и действию к «Валиуму».

Применяется для лечения неврозов различного происхождения, а также при бессоннице

Rp.: Oxazepamii 0,01 (0,015)
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

**Окинчица глобули —
Globuli Okintschici**

Противозачаточное (сперматоцидное) средство

Rp.: Chinini hydrochloridi
Acidi borici aa 0,3
Thymoli 0,06
Olei Cacao 1,5
Ut. f. suppositorium vaginale
D. t. d. N. 20
S. По 1 суппозиторию во влагалище за 15—20 мин перед сношением

Оксазил — Oxazylum

N, N'-бис (2-диэтиламиноэтил)
оксамид бис - (2-хлорбензил-ок-
сида)-дихлорид

Синонимы: Ambenoniumchlorid,
Ambestigminumchloride, Misuran,
Mysuran chloride, Mytelase
chloride.

Выпускают в таблетках по 0,005

Хранение — список А, в защи-
щенном от света месте

Срок годности — 5 лет

Антихолинэстеразное средство.

Применяют при миастении, дви-
гательных нарушениях после трав-
мы центральной нервной системы,
периферических параличах нерв-
ной системы, парезе кишечника.
Близок по свойствам и примене-
нию к «Галантамину» и «Прозе-
рину»

Рр.: Oxazyli 0,005

D. t. d. N. 50 in tabul.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день (взрослому)

Оксафенамид — Oxaphenamidum

пара-Оксифенилсалициламид
Синонимы: Auxobil, Bilene,
Drenamide, Driol, Enidran, Neo-
col, Oksafenamid, Osalmidum, Sal-
midochol, Yoshichol

Выпускается в таблетках по 0,25

Хранение — в хорошо укупо-
ренной таре, в защищенном от
света месте

Желчегонное средство (холе-
кинетик).

Применяется при хронических
холециститах, холангитах, холе-
цистогепатитах, желчнокаменной
болезни и т. п. При острых воспа-
лительных процессах в желче-
выводящих путях и желчном пу-
зыре рекомендуется сочетать окса-
фенамид с антибактериальными
препаратами. При спазмах одно-
временно с оксафенамидом при-
меняются холинолитики (спаз-
молитики) и анальгетики (атро-
пин, папаверин, промедол и др.)

Рр.: Oxaphenamidi 0,25

D. t. d. N. 50 in tabul.

S. По 1—2 таблетки 3 раза в день перед едой

Оксикорт — Oxycort (ПНР)

Состав мази:

Oxytetracyclini 0,3

Hydrocortisoni acetatis 0,1

Basis unguenti ad 10,0

Синонимы: Tetran-hydrocorti-
son (ВНР), Geocorton (СФРЮ)

Выпускается в тубах по 10 г

Срок годности ПНР — 2 года

Комбинированный препарат
глюкокортикоида и антибиотика
широкого спектра действия. Об-
ладает антимикробным, противо-
воспалительным и противоаллер-
гическим действием.

Применяется аналогично «Мази
гидрокортизоновой»

Рр.: Ung. «Oxycort» 10,0

DS. Для наружного применения

Оксипрогестерона капронат —
Oxyprogesteroni capronas
17- α -Оксипрогестерона-17-капронат

Синонимы: Capron, Delalutin, Hormofort (ВНР), Hydroxuprogesteroncaproate, Luteocrin depot, Neolutin «Spofa», Oxyprogesteronium capronicum, Primolut-Depot, Progesterona-Serral, Progesteron-retard Pharlon, Proluton-Depot, Teralutil

Выпускается в ампулах по 1 мл 6,5%, 12,5% и 25% масляного раствора

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 3 года

Синтетический аналог женского полового гормона желтого тела прогестерона.

Применяется при первичной и вторичной аменорее, функциональных маточных кровотечениях (в сочетании с эстрогенами), при привычном и угрожающем аборте и т. д. Отличается от прогестерона пролонгированным действием

Rp.: Sol. Oxyprogesteroni capronatis

oleosae 12,5% 1 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По $\frac{1}{2}$ —1 ампуле внутримышечно 1 раз в месяц

Окситоцин — Oxytocinum (ВНР),
(ЧССР)

Пептид (октапептид)

Синонимы: Ocytocin, Orasthin, Partocin, Pitocin, Pituilobine, Pitupartin, Synpitan, Syntocinon, Utedrin, Uterason

Выпускается в ампулах по 1 мл, содержащих по 5 ЕД препарата

Хранение — список Б, в прохладном, защищенном от света месте

Срок годности — 3 года (ЧССР);
ВНР — 2 года

Синтетический гормон задней доли гипофиза. Стимулирует сокращения матки, преимущественно тела и дна.

Применяют при слабой родовой деятельности, связанной с атонией матки, при затяжных родах (кесаревом сечении), а также при гипотонических маточных кровотечениях и в послеродовом периоде

Rp.: «Oxytocin» 1 ml (5 ED)

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. Внутривенно (1 мл окситоцина разводят 500 мл 5% раствора глюкозы) капельно со скоростью 10 капель в минуту

Оксифиллин — Oxyphyllin (ЧССР)

7-(2-Оксиэтил) теофиллин

Синонимы: Aethophyllinum, Ascophylline, Cordalin, Corophyllin-N, Etofyllinum, Mediphyllin, Nihicor, Oxyäthyltheophyllin, Oxytheonyl, Phyllocormin «N», Theoxylline

Выпускается в таблетках по 0,1 и 0,35 и в ампулах по 2 мл 10% раствора

Хранение — список Б

Спазмолитическое и сосудорасширяющее средство, обладает умеренным мочегонным и кардиотоническим действием.

Применяется при острых ангиоспазмах (гипертонический криз, приступ стенокардии), бронхиальной астме, сердечной астме. Противопоказан при инфаркте миокарда, сопровождающемся коллапсом, коронаросклерозе, тахикардии и экстрасистолии

Rp.: Tabul. «Oxyphyllin» 0,1 (0,35)

D. t. d. N. 20

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Sol. «Oxyphyllin» 10% 2 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 1—2 ампулы в вену или в мышцы

Октадин — Octadinum

1-(N-Азациклооктил)-этил-2-гуанидина сульфат

Синонимы: Azetidin, Dopom, Eutensol, Guanethidine, Ipoctal, Iroguanin, Iporal, Ismelin, Izobarin (СФРЮ), Normorif, Octatenzine, Pressedin, Sanotensin, Visutensil

Выпускается в таблетках по 0,01 и 0,025

Хранение — список Б

Срок годности — 1 год

Симпатолитик.

Применяется при гипертонической болезни II—III стадии, является одним из наиболее эффективных препаратов такого рода. Может применяться местно (10% раствор) для лечения глаукомы. Обычные побочные эффекты — ортостатический коллапс, поносы, ослабление работы сердца. Желательно сочетать с «Дихлотиазидом». Лечение начинают с 0,01 в день, доводя дозы до 0,05—0,1 в сутки, затем переходят на поддерживающие дозы (0,01—0,02 в день). После отмены препарата эффект сохраняется в течение 4—14 дней. В начале лечения часто наблюдается гипертензия

Rp.: Octadini 0,025

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 1—2 таблетки в день

Октэстрол — Octoestrolum
2,4-Ди-(пара-гидрооксифенил)-
3-этилгексан
Синонимы: Benzestrol, Benzö-
strol, Chemestrogen, Octöstrol, Oc-
tofollin

Выпускается в таблетках по
0,001

Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте

Срок годности — 3 года

Синтетический нестероидный
эстроген.

По свойствам и применению
аналогичен «Диэтилстильбэст-
ролу»

Rp.: Octoestrolum 0,001
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке 1—2 раза в день

Оливомицин — Olivomycinum
Является веществом, продуци-
руемым лучистым грибом *Actino-
myces olivoreticuli*

Выпускается в ампулах в виде
порошка (натриевая соль) по 0,005
и 0,01

Хранение — список А, в защи-
щенном от света месте, при тем-
пературе не выше 6°

Срок годности — 1 год

Противоопухолевый антибио-
тик.

Применяется для лечения мела-
ном с метастазами, ретикулосар-
ком, лимфогранулематоза, рака
легких с метастазами. Замедляет
рост метастазов (иногда подвер-
гает их обратному развитию),
улучшает состояние больных

Rp.: Olivomycinum 0,005 (0,01)
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. Внутривенно один раз в 24 или 48 ч (начинают
с дозы 2—3 мг, постепенно увеличивая до 10 мг).
Содержимое флакона непосредственно перед инъек-
цией разводят в 8—10 мл стерильного изотони-
ческого раствора натрия хлорида. Курс лечения —
10—20 инъекций

Олиметин — Olimetinum
Состав на 1 капсулу:
Olei Menthae piperitae 0,0085
Olei Terebinthinae rectific. 0,01705
Olei Calami 0,0125
Olei Olivarum 0,46025
Sulfuris depurati 0,0017

Хранение в сухом, прохладном,
защищенном от света месте

Срок годности капсул — 3 года

Средство, способствующее выде-
лению мочевых конкрементов.

Применяется для профилактики
и лечения мочекаменной и желчно-
каменной болезни. По составу
и механизму действия олиметин
сходен с зарубежными препара-
тами «Ровахол» и «Роватинекс»

Rp.: Caps. Olimetini N. 20

DS. По 2 капсулы 3—5 раз в день до еды (в случае изжоги — после еды). С профилактической целью принимают по капсуле в день

Олиторизид — Olitorisidum

Гликозид, выделенный из семян джута длинноплодного (*Cochorus olitorius*)

Выпускается в ампулах по 1 мл 0,04% раствора

Хранение — список А, в защищенном от света месте

Срок годности — контролируется ежегодно; олиторизид — 3 года

Кардиотоническое средство (сердечный гликозид), по действию близкий к «Конваллятоксину» и «Строфантину».

Применяется в тех же случаях

Rp.: Sol. Olitorisidi 0,04% 1,0

D. t. d. N. 6 in ampul.

S. По 0,5 мл 1 раз в день в вену

Омефин — Omephin

2-Оксиметил-2-фенилиндан-1,3-дион

Синоним: Omefin

Выпускается в таблетках по 0,05

Хранение — список А, в сухом прохладном месте

Срок годности — 2 года

Антикоагулянт непрямого действия.

По применению и свойствам близок к «Дикумарину», «Нафарину» и др.

Rp.: Omephini 0,05

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. В первый день по 0,05 г 2—3—4 раза в день, на 2-е сутки — по 0,05 г 2 раза в день

Онихолизин — Onycholysin

Состав:

Barii sulfidi 15,0

Talci 85,0

Кератолитическое средство.

Применяется для удаления ногтевой пластинки при грибковых поражениях ногтей. Так как препарат фунгицидными свойствами не обладает, после его применения необходимо проводить соответствующее специфическое лечение. Во время лечения необходимо защищать кожу от попадания препарата

Rp.: Onycholysini 100,0

DS. Порошок онихолизина размешивают, прибавляя холодную воду, до получения кашицеобразной массы, которую наносят на ногтевую пластинку слоем толщиной до 0,5 см на 30—40 мин, после чего соскабливают размягченный ноготь

Орензим — Orenzym (ЧССР)

Препарат такадиастазы
Выпускается в драже по 0,1 г
Хранение — в прохладном, защищенном от света месте

Ферментный препарат.
Применяется при недостаточности экскреторной функции поджелудочной железы

Rp.: Dragee «Orenzym» 0,1

D. t. d. N. 20

S. По 1—3 драже за 5—10 мин до еды

Орферон — Orferon (СФРЮ)

Железа глицерофосфат
Выпускается в драже по 0,05 и в виде 2% раствора по 20 мл во флаконе
Хранение — в обычных условиях

Препарат железа.
Применяется при железодефицитных, преимущественно постгеморрагических анемиях, в периоде реконвалесценции, при беременности и лактации и т. п.

Срок годности — 1 год

Rp.: «Orferon» 0,05

D. t. d. N. 50 (100) in dragee

S. По 1 драже 2—3 раза в день (взрослым)

Rp.: Sol. «Orferon» 2% 20,0

DS. Детям до 7 лет по 10 капель на год жизни 2—3 раза в день

Осан — Osan (СФРЮ)

Состав на 1 драже:
Reserpini 0,0002
Phenobarbitali 0,015
Paraverini hydrochloridi 0,04
Theobromini 0,2

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 5 лет

Гипотензивное и успокаивающее средство.

Применяется для лечения гипертонической болезни I ст., церебрального атеросклероза с гипертонией и т. п.

Rp.: Dragee «Osan» N. 40

DS. Вначале назначают по 1 драже 2 раза в день, через каждые 6—7 дней дозу увеличивают до 3—5 драже в день. Поддерживающая доза — 2—4 драже в день.

Осарбон — Osarbonum	Трихомонацидное средство.
Состав:	Применяется для лечения вагинального трихомоноза
Osarsoli 0,25	
Glucosi	
Acidi borici $\bar{a}\bar{a}$ 0,3	
Olei Cacao 2,9	
Срок годности — 2 года	
Rp.: Supp. Osarboni N. 10	
DS. По 1 суппозиторию во влагалище утром и вечером	

Осарцид — Osarcidum	Свойства и применение — См. «Осарбон»
Состав:	
Glucosi	
Osarsoli	
Acidi borici	
Streptocidi $\bar{a}\bar{a}$ 0,3	
Olei Cacao 2,9	
Срок годности — 1 год	
Rp.: Supp. Osarcidi N. 10	
DS. По 1 суппозиторию во влагалище утром и вечером	

Основа мазевая — Basis unguenti	Индифферентная мазевая основа
Rp.: Gelatinae medicinalis 3,0	
Glycerini 2,0	
Aquae destillatae	
Lanolini anhydrici $\bar{a}\bar{a}$ 5,0	
Zinci oxydi 2,0	
M. f. unguentum	
S. Для приготовления мазей	
Приготовление: ланолин смешивают с водным раствором желатина на водяной бане, прибавляют окись цинка и тщательно перемешивают	

Оссокальцинол — Ossocalcinolum	Препарат кальция.
15% стерильная суспензия в персиковом масле особым образом приготовленного костного порошка	Применяют при заболеваниях, сопровождающихся гипокальциемией (тетания, спазмофилия и т. п.). Противопоказан при активном туберкулезе, гиперпаратиреодизме
Выпускается в ампулах по 2,5 и 5 мл	
Хранение — в обычных условиях	
Срок годности — 1 год	

Rp.: Susp. Ossocalcinoli 15% 2,5 ml (5 ml)
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. Внутримышечно 1 раз в 2—3 дня

Остакол — Ostacol (ЧССР) Активированный уголь Выпускается в таблетках по 0,5 Хранение — в сухом месте Срок годности — не ограничен	Адсорбент. Применяют при метеоризме, при отравлениях органическими и неорганическими ядами. По свойствам и применению аналогичен отечественному «Карболену»
---	--

Rp.: Tabul. «Ostacol» 0,5
D. t. d. N. 20
S. По 2—4 таблетки несколько раз в день

Отвар баранца — Decoctum herbae Selaginis	Применяется для лечения хронического алкоголизма с целью выработки рвотного условного рефлекса на алкоголь. Лечение проводится в стационаре при отсутствии соматических заболеваний
--	---

Rp.: Decocti herbae Selaginis ex 10,0—200,0
DS. По 1/2 стакана на прием

Отвар дубовой коры квасцовый — Decoctum corticis Quercus aluminatum	Вяжущее и противовоспалительное средство. Применяется для лечения стоматитов, гингивитов, глосситов
--	--

Rp.: Decocti corticis Quercus ex 10,0—200,0
Aluminis 2,0
Glycerini 15,0
MDS. Для полоскания рта

Отвар истода сложный — Decoctum radicis Polygalae compositum	Отхаркивающее средство. Применяется при сухом кашле различного происхождения
---	---

Rp.: Decocti radicis Polygalae ex 20,0—200,0
Natrii hydrocarbonatis 4,0
Liquoris Ammonii anisati 2,0
Sirupi simplicis 20,0
MDS. По 1 столовой ложке 4—5 раз в день

Отвар кровохлебки —
Decoctum Sanguisorbae

Вяжущее и кровоостанавливающее средство.

Применяется при маточных кровотечениях, кишечных кровотечениях на почве колита, кровохаркании

Rp.: Decocti rhizomatis et radiceis Sanguisorbae ex 15,0—
200,0
DS. По 1 столовой ложке 5—6 раз в день

Офтальмол — Ophthalmolum
Состав:
Cupri citratis 5,0
Lanolini anhydrici 6,0
Vasellini ophthalmici 89,0
Срок годности — 1 год

Антимикробное и вяжущее (противовоспалительное) средство.

Применяется для лечения острых и хронических конъюнктивитов, трахомы и т. п.

Rp.: Ophthalmoli 10,0
DS. Глазная мазь

Пабиалгин — Pabialgin (ПНП)
Состав на 1 таблетку:
Diali 0,03
Amidopyrini 0,22
Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Анальгезирующее и успокаивающее средство.

Применяют при головной, зубной боли, невралгии и т. д.

Rp.: Tabul. «Pabialgin» 0,25
D. t. d. N. 10
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Павестезин — Pavesthesinum
Состав на 1 таблетку:
Anaesthesini 0,3
Papaverini hydrochloridi 0,05
Хранение — список Б, в защищенном от света месте
Срок годности — 1 год

Местноанестезирующее и спазмолитическое средство.

Применяют при болях в желудке и спазмах кишечника

Rp.: Tabul. Pavesthesini N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

**Павлова микстура —
Mixture Pavlovi**

Седативное средство.
Применяется для лечения неврозов и неврастении, связанных со слабостью тормозного и возбуждательного процессов. Не следует применять на ночь и при бессоннице

Рр.: Natrii bromidi 1,0
Coffeini-natrii benzoatis 0,5
Aquae destillatae 200,0
MDS. По $\frac{1}{2}$ —1 столовой ложке 2—3 раза в день

**Павлова таблетки —
Tabulettae Pavlovi**

То же

Состав:
Natrii bromidi 0,1
Coffeini-natrii benzoatis 0,05

Рр.: Tabul. Pavlovi N. 50
DS. По 1 таблетке 3 раза в день за 30 мин до еды

**Падутин-депо — Padutin-Depot
(Англ.)**

**Калликреин-депо — Kallikrein-
Depot**

Препарат из тканей поджелудочной железы, освобожденной от инсулина. Близок по составу и действию к отечественному препарату ангиотрофину. Выпускается в ампулах в порошке по 20—40 ЕД с приложенным растворителем

Синоним: Dilminal-D (ГДР)
Срок годности — 5 лет

Сосудорасширяющее средство.
Применяется при нарушении периферического кровообращения — облитерирующем эндартериите, болезни Рейно, а также при стенокардии, мигрени, болезни Меньера и при плохо заживающих ранах и язвах

Рр.: Kallikreini-Depot 40 ED
D. t. d. N. 25 in ampul.
S. Внутримышечно по 20—40 ЕД, разведя приложенным растворителем

Паксил — Paxyl (ПНР)

Состав на 1 драже:
Noxugoni 0,075
Reserpinі 0,00005

Хранение — список Б

Успокаивающее средство.
Применяется при неврозах различного происхождения для снижения напряженности, при тахикардии, при гипертонической болезни I стадии, как легкое снотворное и т. д.

Рр.: Dragee «Рахул» N. 50

DS. По 1 драже 1—3 раза в день. При бессоннице —
вечером перед сном 2—3 драже

Палюфин — Palufinum

Состав:

Platyphyllini hydrotartratis 0,005

Phenobarbitali

Paraverini hydrochloridi $\bar{a}\bar{a}$ 0,02

Хранение — список А

Спазмолитическое, холинолитическое и успокаивающее средство.

Применяют при спазмах гладкомышечных органов (почечнокаменной и желчнокаменной болезни, язвенной болезни желудка)

Рр.: Tabul. Palufini N. 10

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Панангин — Panangin (BHP)

Состав на 1 драже:

Magnesii asparaginatidis

Kalii asparaginatidis $\bar{a}\bar{a}$ 0,175

Состав на 1 ампулу:

Magnesii asparaginatidis

Kalii asparaginatidis $\bar{a}\bar{a}$ 0,5

Aquae pro injectionibus 10,0

Хранение — в обычных условиях

Срок годности ампул — 2 года;
таблеток — 3 года

Препарат калия. Ионы магния и аспарагината усиливают терапевтическое действие калия и облегчают его проникновение внутрь клетки.

Применяется так же, как и калия хлорид, т. е. для лечения заболеваний сердца, связанных с гипокалиемией (стенокардия, инфаркт миокарда, экстрасистолия, передозировка сердечных гликозидов и т. п.). Противопоказан при гиперкалиемии и почечной недостаточности

Рр.: Drag. «Panangin» N. 20

DS. По 1—2 драже 3 раза в день

Рр.: Sol. «Panangin» 10,0

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. По 1—2 ампулы в 50—500 мл 5% глюкозы или изотонического раствора хлорида натрия внутривенно медленно или капельно

Пангексавит — Panhexavitum

Состав на 1 таблетку:

Retinoli palmitatis (acetatis)

16500 ED

Thiamini bromidi 0,00645

Riboflavini 0,005

Pyridoxini hydrochloridi 0,005

Nicotinamidi 0,05

Calcii pantothenatis 0,01

Хранение в защищенном от света месте

Срок годности таблеток, покрытых оболочкой, — 1 год

Полвивитаминный препарат.

Применяется при заболеваниях кожи, инфекциях, заболеваниях сетчатки, поражениях периферических нервов, гипо- и авитаминозах А, В₁, В₂, В₆, РР и в периоде реконвалесценции и т. д.

Рр.: Tabul. Panhexaviti N. 50
DS. По 1 таблетке 3 раза в день

Паниверин — Paniverin (ВНР)
Состав на 1 ампулу:
Nospani 0,0642
Acidi nicotiniци 0,0176
Aquaе pro injectionibus ad 2 ml
Хранение — список Б

Сосудорасширяющее и спазмолитическое средство.

Применяется при склеротических заболеваниях мозговых сосудов, ангиоспазмах, головных болях сосудистого происхождения, при климактерических спазмах сосудов, облитерирующем тромбоангите и т. д.
(см. «Никошпан», с. 369)

Рр.: «Paniverin» 2 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. Под кожу или внутримышечно 1—2 раза в день.
В срочных случаях — 1 мл внутривенно медленно

Пантокрин — Pantocrinum
Жидкий экстракт из пантов марала, изюбра и пятнистого оленя. Выпускается во флаконах по 30 и 50 мл, таблетках и ампулах по 1 мл
Хранение — в прохладном, защищенном от света месте
Срок годности — 2 года (таблетки и ампулы), 1 год 6 месяцев (флаконы)

Общетонизирующее средство. Применяют при переутомлении, неврастении, неврозах, астенических состояниях, после инфекционных заболеваний, при слабости сердечной мышцы, гипотонии.

Начат выпуск аналогичного экстракта из пантов северного оленя под названием «Рантарин»

Рр.: Pantocrini 1,0
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. По 1 мл под кожу 1 раз в день. Вводят также внутримышечно

Рр.: Tabul. Pantocrini N. 100
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Рр.: Pantocrini 30 ml (50 ml)
S. По 10—20 капель 2—3 раза в день

Пантрипин — Pantrypinum
Особым образом приготовленный экстракт поджелудочной железы крупного рогатого скота
Выпускается в сухом виде во флаконах по 6, 12, 15 и 30 ИЕ

Ингибитор панкреатических протеолитических ферментов.

Применяется для лечения острого и хронического панкреатита, при высоких дуоденальных свищах, а также в случае использо-

Хранение — в сухом, темном, прохладном месте

вания хемотрипсина — для прекращения его действия (операции по поводу катаракты и т. п.). См. также «Трасилол». В зависимости от тяжести заболевания вводят от 50—80 до 300 ИЕ в сутки внутривенно капельно

Rp.: Pantropylini 6 ИЕ
(12, 15 aut 30 ИЕ)
D. t d. N. 20

S. Развести 30—120 ИЕ препарата в 500—1000 *мл* стерильного изотонического раствора хлорида натрия или 5% раствора глюкозы с добавлением 1 ЕД инсулина на каждые 3,0 глюкозы и вводить внутривенно капельно по 25—30 ИЕ за один раз (в тяжелых случаях — до 120 ИЕ в первый раз). Скорость вливания — 40—60 капель в минуту.

**Папаверинтезал —
Papaverinthesal (ЧССР)**

Состав на 1 таблетку:
Theobromini 0,3
Papaverini hydrochloridi 0,02
Хранение — список Б
Срок годности — 5 лет

Сосудорасширяющее и спазмолитическое средство.

Применяют при ангиоспазмах (см. «Паниверин»)

Rp.: Tabul. «Papaverinthesal» N. 20
DS. По 1 таблетке 3 раза в день

Папазол — Papazolium

Состав на 1 таблетку:
Dibazoli
Papaverini hydrochloridi aa 0,03
Хранение — список Б
Срок годности — 1 год

Свойства и применение аналогичны предыдущей прописи

Rp.: Tabul. Papazoli N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Паратиреоидин — Parathyreoidinum

Препарат, получаемый из оклощитовидных желез убойного скота Содержит парат-гормон
Синонимы: Parathyreocrinum, Parathormon

Выпускается в ампулах по 1 *мл* и во флаконах по 5 и 10 *мл* с активностью по 20 ЕД в 1 *мл*

Хранение — список Б, в прохладном защищенном от света месте

Срок годности — 1 год

Гормональный препарат.

Применяют при различных заболеваниях, связанных с гипокальциемией, тетанией, спазмофилией, а также при хронических аллергических заболеваниях (бронхиальная астма, крапивница, вазомоторный ринит и др.)

Рр.: Parathyreoidini 1,0 (5,0—10,0)

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 1 мл в мышцы 2 раза в день

Парацетамол — Paracetamolium

пара-Ацетиламинофенол

Синонимы: Acamol, Acenol, Acetaminophen, Acetophenon, Algotropyl, Alvedon, Amadil, Aminophen, Aramide, APAP, Aracet, Atasol, Cenapin, Dolamin, Dumadon, Eneril, Febrilix, Febrolin, Fendon, Metalid, Napatyl, Napional, Nobedon, Pacemol, Panadil, Paralgin, Parmol, Phenacin, Remodin, Tabalgin, Tachipirina, Tralgon, Tylenol

Выпускается в порошке и в таблетках по 0,2

Хранение — список Б, в хорошо укупореженной таре, предохраняющей от действия света; таблетки — в защищенном от света месте

Анальгезирующее и противовоспалительное средство. По действию близок к фенацетину, но менее токсичен.

Применяют самостоятельно или в сочетании с другими средствами при невралгиях, головной боли, воспалительных заболеваниях и др.

Рр.: Paracetamoli 0,2

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 1 таблетке 3 раза в день. Высшие дозы для взрослых: разовая — 0,5; суточная — 1,5

**Парфенова раствор —
Solutio Parfenovi**

Местноанестезирующее средство.

Может применяться для терминальной анестезии, а также при лечении ринитов, синуситов и др.

Рр.: Cocaini hydrochloridi

Dicaini

Sovcaini aa 0,1

Solutionis Adrenalini hydrochloridi 0,1% 0,6

Aquae pro injectionibus 30,0

MDS. Для местной анестезии

**Паста абразивная —
Pasta abrasiva**

Срок годности — 1 год

Препарат применяется для механического удаления с кожи различных загрязнений

Rp.: Saponis domestici 25,0
Kaolini 37,0
Natrii carbonatis 3,0
Olei Vaselini 10,0
Aquaе destillatae 24,0
Olei odorati 1,0
M. f. pasta
DS. Для удаления производственной грязи с кожи

**Паста антисептическая
биологическая — Pasta
antiseptica biologica**

Состав:

Plasmatis sicci 7,0
Synthomycini 2,0
Furacilini 0,02
Novocaini 0,5
Olei Ricini 30,0
Выпускается в банках
Срок годности — 1 год

Антисептическое средство.
Применяется в стоматологии
для лечения различных гнойно-
воспалительных заболеваний по-
лости рта

Rp.: Pastae antisepticae biologicae 50,0
DS. В стоматологический кабинет

**Паста бетанафтоловая сложная —
Pasta Betanaphtholi composita**

Антисептическое и кератолити-
ческое средство.
Применяется для лечения раз-
личных кожных заболеваний

1. Rp.: Betanaphtholi 1,0
Sulfuris praecipitati 5,0
Vaselini
Saponis viridis āā 2,0

Приготовление: растапливают вазелин и мыло, к полуостывшей массе при помешивании добавляют бетанафтол и серу

2. Rp.: Betanaphtholi
Vaselini
Saponis viridis āā 2,0
Sulfuris praecipitati 5,0

3. Rp.: Betanaphtholi
Vaselini
Camphorae āā 2,0
Calcii carbonatis 1,0
Saponis viridis 3,0
Sulfuris praecipitati 10,0
M. f. pasta

DS. Наружное. Кожу намазывают более или менее тонким слоем пасты, оставляют на 15—60 мин., затем тщательно стирают и посыпают места, на которых лежала паста, пудрой

Паста борно-цинковая —
Pasta Acidi borici zincata

Антисептическое и подсушивающее средство.

Применяется для лечения кожных заболеваний, сопровождающихся экссудацией

Rp.: Acidi borici 10,0
Zinci oxydi
Amyli Triticici āā 50,0
Vasellini 90,0
M. f. pasta
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Паста борная сложная —
Pasta Acidi borici composita
Срок годности — 1 год 6 мес.

То же

Rp.: Acidi borici 5,0
Zinci oxydi 25,0
Unguenti Naphthalani 45,0
Amyli Triticici 25,0
M. f. pasta
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Паста висмутовая —
Pasta Bismuthi subnitratris

Антисептическое и вяжущее противовоспалительное средство.

Применяется для лечения воспалительных и аллергических заболеваний кожи

Rp.: Bismuthi subnitratris
Lanolini
Paraffini āā 10,0
Vasellini 20,0
M. f. pasta
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Паста грамицидиновая —
Pasta Gramicidini C

Антисептическое и сперматоцидное средство.

Состав:
Sol. Gramicidini spirituosae
2% — 9,89
Sol. Acidi lactici 40% 0,51
Emulgentis 15,0
Aquaе destillatae 74,6

Применяется в качестве противозачаточного средства, а также для лечения эрозий шейки матки и кольпитов. Может применяться наочно для лечения ожогов и гнойных ран

Выпускается в тубах по 30,0
Срок годности — 1 год

Rp.: Pastae Gramicidini 30,0
DS. По 5—6 г в задний свод влагалища перед сношением (с помощью специального шприца)

**Паста дегтярная сложная —
Pasta Picis composita**

По свойствам и применению аналогична «Мази дегтярной»

Rp.: Zinci oxydi 10,0
Talcii 10,0
Naphthalani 20,0
Picis liquidae 5,0
M. f. pasta
DS. Наносить на пораженные участки кожи

**Паста димедроло-цинковая —
Pasta Dimedroli zincata**

Антигистаминное, антисептическое и подсушивающее средство. Применяется для лечения аллергических заболеваний кожи (экземы, дерматиты, диатез)

Rp.: Solutionis Dimedroli spirituosae 10% 10,0
Pastae Zinci 100,0
M. f. pasta
DS. Наносить на пораженные участки кожи

**Паста известковая сложная —
Pasta Calcis composita**

Адсорбирующее, подсушивающее и антисептическое средство. Применяется при свежих ожогах II степени и при других поражениях кожи, сопровождающихся экссудацией

1. Rp.: Olei Lini
Aquae Calcis $\bar{a}\bar{a}$ 2,0
Zinci oxydi 40,0
Calcii carbonatis praecipitati 30,0

2. Rp.: Olei Lini
Aquae Calcis $\bar{a}\bar{a}$ 20,0
Zinci oxydi 40,0
Calcii carbonatis praecipitati 20,0
M. f. pasta
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Паста ихтиоловая —
Pasta Ichthyoli

Свойства и применение — см.
«Мазь ихтиоловая»

1. Rp.: Ichthyoli 1,0
Aquaе destillatae
Glycerini
Dextrini āā 3,0
2. Rp.: Ichthyoli 1,0
Zinci oxydi
Amyli Triticici āā 5,0
Vaselini 10,0
3. Rp.: Ichthyoli 1,0
Zinci oxydi
Amyli Triticici āā 5,0
Unguenti Glycerini 15,0
4. Rp.: Ichthyoli 5,0
Vaselini
Lanolini āā 25,0
M. f. pasta
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Паста ихтиоловая сложная —
Pasta Ichthyoli composita

Свойства и применение — см.
«Мазь ихтиоловая сложная»

1. Rp.: Acidi salicylici 1,0
Ichthyoli 4,0
Sulfuris praecipitati 6,0
Amyli Triticici
Zinci oxydi āā 20,0
Vaselini 46,0
 2. Rp.: Sulfuris praecipitati 3,0
Ichthyoli 3,0
Plumbi oxydi 0,01
Zinci oxydi 1,0
Amyli Triticici 10,0
Vaselini 22,0
 3. Rp.: Ichthyoli 4,0
Zinci oxydi 10,0
Unguenti Naphthalani 16,0
Amyli 10,0
 4. Rp.: Ichthyoli 10,0
Acidi salicylici 5,0
Olei Terebinthinae 10,0
Lanolini ad 100,0
M. f. pasta
DS. Наносить на пораженные участки кожи
-

Паста казеиновая —
Pasta Caseini

Защитное средство для кожи рук.

Применяется при работе с органическими растворителями и лиофильными веществами, способными проникать сквозь неповрежденную кожу

Rp.: Caseini 58,7
Spiritus aethylici 58,7
Glycerini 19,7
Solutionis Ammonii caustici 25% 1,9
M. f. pasta

DS. Наносить тонким слоем на кожу рук. После работы смыть водой

Паста каолиновая —
Pasta Kaolini

Адсорбирующее и подсушивающее средство.

Может применяться для защиты кожи рук при работе с агрессивными жидкостями, а также по тем же показаниям, что и «Паста известковая»

Rp.: Kaolini
Glycerini aa 100,0

Rp.: Kaolini 30,0
Olei Lini 20,0
M. f. pasta
DS. Наружное

Паста магнезиальная —
Pasta Magnesiae

См. «Паста известковая»

Rp.: Magnesii subcarbonatis 10,0
Aquaе destillatae 20,0
Vasellini 20,0
M. f. pasta
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Приготовление: карбонат магния смешивают с водой до получения однородной кашицы, затем добавляют вазелин

Паста медовая —
Pasta Mellis

Защитное средство для кожи рук, применяемое при работе с агрессивными жидкостями

Rp.: Farinae 100,0
Aquae destillatae 50,0
Mellis depurati 150,0
M. f. pasta

DS. Наносить на кожу рук тонким слоем

Приготовление: ингредиенты смешивают при нагревании

Паста ментоловая сложная —
Pasta Mentholi composita

Раздражающее, слабое обезбо-
ливающее и антисептическое сред-
ство.

Применяется для отвлекающей
терапии

Rp.: Mentholi
Chlorali hydrati $\bar{a}\bar{a}$ 1,0
Olei Cacao 2,0
Cetacei 4,0
M. f. pasta
DS. Наружное

Приготовление: спермацет и масло какао сплавляют и к полуостыв-
шей массе прибавляют ментол и хлоралгидрат

Паста мышьяковистая —
Pasta arsenicosa
Хранение — список А

Общеядовитое средство.
Применяется для умерщвления
нерва перед пломбированием зуба.
Накладывается на несколько ча-
сов

Rp.: Acidi arsenicosi anhydrici 2,0
Cocaini hydrochloridi 1,0
Olei Caryophylli q. s.
M. f. pasta
DS. В руки врача

Паста натрия тиосульфата —
Pasta Natrii thiosulfatis

Противопаразитарное (акари-
цидное) средство.

Применяют для лечения чесотки

Rp.: Saponis viridis 10,0
Natrii thiosulfatis 30,0
Aquae destillatae 10,0
M. f. pasta
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Паста нафталанно-цинковая —
Pasta Naphthalani zincata

Свойства и применение — см.
«Мазь нафталанная»

1. Rp.: Pastae Zinci 75,0
Unguenti Naphthalani 25,0

2. Rp.: Zinci oxydi
Amyli āā 10,0
Naphthalani 20,0
M. f. pasta
DS. Наносить на пораженные участки кожи

**Паста резорцино-цинковая —
Pasta Resorzini zincata**

Кератолитическое, антисептическое и подсушивающее средство.

Применяется при поверхностных микозах кожи, экземе, дерматитах и пр.

1. Rp.: Resorzini
Zinci oxydi
Amyli
Olei Vaselini āā 10,0

2. Rp.: Resorcini 1,0
Zinci oxydi
Amyli āā 2,5
Olei Vaselini 4,0
M. f. pasta
DS. Наносить на пораженные участки кожи

**Паста салицилово-серная —
Pasta Acidi salicylici sulfurata**

Противопаразитарное (акарицидное) средство.

Применяется для лечения чесотки

- Rp.: Amyli Tritici 16,0
Acidi salicylici 1,0
Sulfuris 6,0
Aquaе destillatae q. s.
M. f. pasta

DS. Смазывают раз в день поверхность кожи в продолжение 5 дней, причем больной не должен менять белья и брать ванны в течение этого времени

**Паста салицилово-цинковая —
Pasta Acidi salicylici zincata**
Срок годности — 2 года

Свойства и применение — см.
«Лассара паста»

- Rp.: Acidi salicylici 2,0
Zinci oxydi
Amyli Tritici āā 25,0
Basis unguenti 50,0
M. f. pasta
DS. Наносить на пораженные участки кожи
-

Паста свинцовая сложная —
Pasta Plumbi oxydi composita

Вяжущее (противовоспалительное) слабое антисептическое и подсушивающее средство.

Применяется при воспалительных и аллергических заболеваниях кожи

Rp.: Plumbi oxydi 6,0
Aceti 18,0
Amyli 5,0
Aquaе destillatae 15,0
Glycerini 20,0
M. f. pasta

DS. Наносить на пораженные участки кожи

Приготовление: смесь свинцового глета и уксуса выпаривают до образования тестообразной массы; по охлаждении прибавляют смесь крахмала и воды и кипятят, затем добавляют глицерин

Паста серная сложная —
Pasta Sulfuris composita

Противопаразитарное средство. Используется для лечения чесотки

Rp.: Sulfuris praecipitati
Kalii carbonatis
Glycerini
Spiritus aethylici 70%
Aquaе Amygdalarum amararum āā 10,0
M. f. pasta

DS. Применяется так же, как паста салицилово-серная

Паста серно-цинковая —
Pasta Sulfuris zincata

См. «Паста салицилово-серная». Предпочтительно для применения при наличии расчесов и мокнущих

Rp.: Unguenti Zinci
Unguenti sulfurati āā 50,0
M. f. pasta

DS. Наносить на пораженные участки кожи

Паста содовая
(натрия гидрокарбоната) —
Pasta Natrii hydrocarbonatis

Препарат применяют для обработки свежих ожогов I—II степени

1. Rp.: Talci 50,0
Natrii hydrocarbonatis
Glycerini āā 10,0
Aquaе q. s.
2. Rp.: Talci
Natrii hydrocarbonatis āā 30,0
Glycerini 10,0—20,0
M. f. pasta
DS. Наружное

Паста стрептоцидная сложная — Свойства и применение — см.
Pasta Streptocidi composita «Линимент стрептоцида»

Rp.: Pastae Zinci salicylatis 25,0
Unguenti Naphthalani 5,0
Streptocidi 1,5
M. f. pasta
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Паста сульсеновая — Свойства и применение — см.
Pasta Sulseni «Мыло сульсеновое»

Состав:
Sulseni 2,5
Pastae spumantis 97,5 *
Выпускается в тубах по 50 г
Срок годности — 3 мес.

Rp.: Pastae Sulseni 50,0
DS. По 1 чайной ложке на процедуру

Паста трикрезол-формалиновая — Антисептическое средство.
Pasta Tricresoli formalinata Применяют в стоматологии для
обработки кариозных полостей
зуба

Rp.: Zinci oxydi 60,0
Tricresoli 30,0
Solutionis Formaldehydi 8,0
Glycerini 2,0
M. f. pasta
DS. В зубо врачебный кабинет

Паста уксусная сложная — Антисептическое и противо-
Pasta Acidi acetici composita воспалительное средство.
Применяется в основном для
лечения угрей

*Пенообразующая основа.

1. Rp.: Acidi acetici 30% 3,0
Glycerini 4,0
Sulfuris praecipitati 2,0
Kaolini 4,0

2. Rp.: Lanolini 6,0
Acidi acetici 30% 7,0
Axungiae porcinae benzoatae 2,0
Kaolini 6,0
M. f. pasta
DS. Намазывать лицо тонким слоем на ночь

**Паста феноловая —
Pasta phenolata**

Антисептическое средство.
Применяется для уменьшения
зуда кожи и для обработки ожо-
гов I степени

Rp.: Gelatinae medicinalis 30,0
Aquaе destillatae 64,0
Glycerini 5,0
Phenoli 1,0
M. f. pasta
DS. Наносить на пораженные участки кожи

**Паста хлорофилло-каротиновая —
Pasta Chlorophyllo-carotini**

Хранение — в хорошо укупо-
ренной таре
Срок годности — 2 года; после
переконтроля — 1 год

Витаминный препарат, содер-
жит каротиноиды, хлорофилл, ви-
тамин Е, фитостерины, терпены
и другие вещества.

Применяется для лечения ожо-
гов, вяло заживающих ран и язв,
а также для лечения кольпитов,
вульвовагинитов, эрозии шейки
матки. Можно применять в виде
спринцеваний (2 столовые ложки
пасты разводят в 1 л воды)

Rp.: Pastae Chlorophylli-carotini
50,0 (100,0)

DS. Наносить на пораженную поверхность, приме-
няется также в виде тампонов во влагалище

Паста цинковая —
Pasta Zinci
Срок годности — 10 лет; после
переконтроля — 5 лет (№ 1)

Антисептическое, подсушивающее и противовоспалительное средство.

Применяется для лечения различных кожных заболеваний и для приготовления различных мазей и паст

1. Rp.: Zinci oxydi
Amyli Tritici āā 25,0
Vaselini 50,0
2. Rp.: Kaolini
Olei Lini
Zinci oxydi āā 30,0
Solutionis Plumbi subacetatis 20,0
3. Rp.: Zinci oxydi
Amyli
Glycerini
Mucilaginis Gummi arabici āā 10,0
4. Rp.: Lanolini 30,0
Olei Lini 10,0
Zinci oxydi 20,0
5. Rp.: Calcii carbonatis praecipitati
Zinci oxydi
Olei Lini
Aquaе Calcis āā 10,0
M. f. pasta
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Паста цинковая антисептиче-
ская — Pasta Zinci antiseptica

То же

Rp.: Zinci oxydi
Zinci sulfatis āā 1,0
Glycerini 2,0
Aquaе destillatae 8,0
M. f. pasta
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Пастинацин — Pastinacinum
Фурокумарин, выделенный из
семян пастернака посевного (*Pas-*
tinaca sativa L.)

Выпускается в таблетках по
0,2 г

Хранение — список Б, в сухом
защищенном от света месте

Срок годности таблеток —
2 года

Сосудорасширяющее и спазмо-
литическое средство.

Применяют для предупрежде-
ния приступов стенокардии при
коронарной недостаточности (см.
«Даукарин»)

Rp.: Pastinacini 0,02
D. t. d. N. 50 in tabul.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Пафиллин — Paphyllinum
Состав на 1 таблетку:
Papaverini hydrochloridi 0,02
Platyphyllini hydrotartratis 0,005
Хранение — список А

Спазмолитическое и гипотензивное средство.

Применяется при спазмах сосудов, гипертонических кризах, спазмах полых органов (почечная, печеночная, кишечная колики), язвенной болезни желудка и других спастических состояниях

Rp.: Tabul. Paphyllini N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Педолин — Pedolin

Свойства и способ применения — см. «Адолъ»

Rp.: Acidi salicylici 30,0
Acidi lactici 10,0
Collodii 70,0
Terebinthinae 10,0
Methyl-orange 0,1
MDS. Для наружного применения

Пектол — Pectol
Состав на 1 таблетку:
Extracti Theroposidis
Opii aa 0,01
Natrii hydrocarbonatis
Pulveris radices Liquiritiae cum
Oleo Anisi 0,2
Хранение — список А
Срок годности — 2 года

Отхаркивающее и противокашлевое средство.

Применяется при кашле различного происхождения

Rp.: Tabul. Pectoli N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Пектусин — Pectussinum
Состав на 1 таблетку:
Mentholi 0,004
Olei Eucalypti 0,0005
Sacchari 0,75
Talcii 0,03
Хранение — в сухом месте
Срок годности — 1 год

Антисептическое и отхаркивающее средство.

Применяют при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей

Rp.: Tabul. Pectussini N. 10

DS. По 1 таблетке (сублингвально) 2—4 раза в день

Пеллоидин — Peloidinum
Экстракт из иловой лечебной
грязи

Выпускается во флаконах по
500 *мл*

Хранение — в прохладном, за-
щищенном от света месте. По-
мутневший препарат к примене-
нию непригоден

Срок годности — 2 года

Биогенный препарат.

Применяется внутрь при яз-
венной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки, гастри-
тах, колитах. Назначают также
в виде клизм по 100 *мл* 2 раза
в день, вводят в прямую кишку
при помощи катетера на глубину
14—16 *см*. Наружно применяют
для лечения гнойных ран, для
промывания и для смачивания
повязок

Rp.: Peloidini 500 *ml*

DS. По 40—50 *мл* 2 раза в день (утром и вечером)
в подогретом виде за 1 ч до еды или через 1 ч
после еды. Выпить небольшими глотками в тече-
ние нескольких минут

Пентабисмол — Pentabismolum
Препарат висмута, раствори-
мый в воде. Содержит 1% ме-
таллического висмута

Выпускается в ампулах по 2 *мл*

Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте

Срок годности — 1 год

Химиотерапевтическое (про-
тивопаразитарное) висмутсодер-
жащее средство.

Применяется при лечении всех
форм сифилиса. Аналогичен по
свойствам «Бийохинулу»

Rp.: Pentabismoli 2 *ml*

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Внутримышечно (в разные группы мышц) по 1 *мл*
в сутки. Для уменьшения болезненности можно
ввести одновременно (в одном шприце) 0,5 *мл*
2% раствора новокаина

Пенталгин — Pentalgin

Состав на 1 таблетку:

Amidopyrini

Analгинi aa 0,3

Coffeini-natrii benzoatis 0,05

Codeini 0,015

Phenobarbitali 0,01

Хранение — список Б, в за-
щищенном от света месте

Срок годности — 5 лет

Анальгезирующее, жаропони-
жающее и успокаивающее сред-
ство.

Применяют при головной боли,
мигрени, невралгии, миозите, ра-
дикулите и лихорадочных со-
стояниях

Rp.: Tabul. Pentalgini N. 10

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Пентаметон — Pentamethon
(СССР)

Пентаметилен-бис-триметиламония гидроксид

Синонимы: Anticurasyn, Antilusis, Lytensium, Pentamethonium, Penthonium

Выпускается в драже по 0,25

Хранение — в сухом прохладном месте

Ганглиоблокатор.

Применяют при гипертонической болезни II—III ст. По свойствам, применению, побочным эффектам близок к «Диколину»

Rp.: Drag. «Pentamethon» 0 25
D. t. d. N. 20
S. По 1 драже 2 раза в день

Пентамин — Pentaminum

3-Метил-1,5-бис-(*N, N*-диметил-*N*-этиламмоний)-3-азапентана дибромид

Синонимы: Azamethoniumbromid, Azameton, Ganlion, Hypotensin, Pendiomid, Pentamethazene

Выпускается в ампулах по 1—2 мл 5% раствора

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 5 лет

Ганглиоблокирующее средство.

Применяется при гипертонической болезни I и II стадии, гипертонических кризах, спазмах периферических сосудов, спазмах кишечника и желчных путей, почечной колике, бронхиальной астме и т. п. Является преимущественно средством скорой помощи. При гипертонической болезни начинают с дозы 0,4 мл 5% раствора с постепенным увеличением до 2—3 мл 5% раствора. При спазмах сосудов начинают с 1 мл 5%, доводят до 1,5 мл 5% раствора. При гипертонических кризах, отеке легких, отеке мозга вводят в вену 0,2—0,5 мл 5% раствора, разведенных в 20 мл изотонического раствора хлорида натрия или 5% раствора глюкозы. Вводят медленно. Для управляемой гипотонии вводят в вену перед операцией 0,8—1,2 мл 5% раствора, при необходимости вводят дополнительно до 2,4—3,6 мл 5% раствора

Rp.: Sol. Pentamini 5% 1,0 (2,0)
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. По 0,4—1 мл в мышцы

Пентацин — Pentacinum

Кальций-нагреваемая соль динатриотриаминпентауксусной кислоты

Синонимы: *Calcii, trinatritii pentetas, Calcium Trisodium pentate, Pentacin, Penthamil*

Выпускается в ампулах по 5 мл 5% раствора

Хранение — в прохладном, защищенном от света месте

Срок годности — 5 лет

Комплексообразователь.

Применяют для диагностики и лечения отравлений радиоактивными изотопами тяжелых и редкоземельных элементов (плутоний, церий, иттрий, цирконий). Непригоден при отравлении ураном, стронцием, радием, полонием; константа устойчивости соединений этих элементов ниже таковой для кальция. Противопоказан при поражениях почек, протекающих с нарушением их функции, лихорадке, гипертонической болезни и стенокардии

Rp.: Sol. Pentacini 5% 5 ml

D. t. d. N. 3 in ampul

S. Внутривенно по 1 ампуле через 1—2 дня. В острых случаях разовая доза может быть повышена до 30 мл 5% раствора

Пентовит — Pentovitum

Состав на 1 таблетку:

Thiamini chloridi 0,01 aut

Thiamini bromidi 0,0129

Pyridoxini hydrochloridi 0,005

Nicotinamidi 0,02

Acidi folici 0,003

Cyanocobalaminum 0,00005

Хранение — в сухом, защищенном от света месте

Срок годности — 1 год 6 мес.

Для таблеток, покрытых оболочкой, срок годности — 1 год

Комплексный препарат витаминов, обладающих преимущественно нейротропным действием.

Применяют при комплексной терапии заболеваний периферической (радикулиты, невралгии, невриты) и центральной нервной системы, при астенических состояниях разного генеза.

Rp.: Tabul. Pentoviti N. 50

DS По 2—4 таблетки 3 раза в день в течение 3—4 недель

Пентоксил — Pentoxylum

4-Метил-5-оксиметилурацил

Синоним: *Pentoksil*

Выпускается в таблетках по 0,2

Хранение — список Б

Срок годности таблеток, покрытых оболочкой, — 1 год

Стимулятор лейкопоза.

Применяют при агранулоцитарной ангине, при лейкопениях различного происхождения (см. «Натрия нуклеинат»)

Rp.: Pentoxyli 0,2
D. t. d. N. 12 in tabul.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Пен-экспеллер — Pain-Expeller
(ЧССР)
Линимент перцовый сложный —
Linimentum Capsici compositum

Местнораздражающее и анестезирующее средство.

Применяется как средство рефлекторной терапии заболеваний двигательного аппарата (артриты, миозиты и т. п.) и периферических нервов (радикулиты, невралгии и невриты). См. также «Линимент перцовый сложный»

1. Rp.: Tincturae Capsici (1 : 3) 525,0
Saponis medicati 3,0
Camphorae tritae 30,0
Olei Rosmarini 10,0
Olei Lavandulae
Olei Thymi
Olei Caryophyllorum āā 10,0
Olei Cinnamomi 2,0
Solutionis Ammonii caustici 100,0
 2. Rp.: Tincturae Capsici 60,0
Tincturae Cinnamomi 6,0
Tincturae Gallarum 2,0
Camphorae 3,0
Olei Rosmarini 1,0
Saponis medicati 2,5
Solutionis Ammonii caustici 30,0
Aquae destillatae 10,0
M. f. linimentum
DS. Для растирания
-

Пен-экспеллер якорный —
Pain-Expeller-Anker (ЧССР)

То же

Rp.: Fructus Capsici 100,0
Spiritus aethylici 90% 400,0
Camphorae 15,0
Olei florum Aurantii 3,0
Olei Lavandulae
Olei Rosmarini
Olei Zingiberis
Olei Thymi
Olei Macidis
Olei Cinnamomi āā 5,0
Saponis medicati 10,0
Aquae Melissaе

Aquae Menthae piperitae āā 150,0
Aquae Chamomillae 100,0
Solutionis Ammonii caustici 80,0
M. f. linimentum
DS. Для растирания

Приготовление: стручки перца настаивают несколько дней на спирте, затем процеживают и добавляют остальные ингредиенты

Первитин — Pervitinum

(+)-1-Фенил-2-метиламинопропана гидрохлорид

Синонимы: Amphedroxyn, Amamine, Corvitin, Daropervamin, Desamine, Desephrine, Desoxin, Destim, Detrex, Dexstim, Dopidrin, Doxephin, Egherit, Hiropon, Isophen, Methamine, Methedrine, Methylamphetamin, Neodrine, Normadrine, Philorop, Propamin, Psisoran и др.

Выпускается в таблетках по 0,003

Хранение — список А

Срок годности — 5 лет

Психостимулятор.

Применяется при физическом и умственном утомлении, для повышения работоспособности при умственной и физической работе, для лечения ожирения, в психиатрии как антидепрессивное средство. Нельзя применять при психическом возбуждении, бессоннице, гипертонии, а также совместно с ингибиторами MAO («Трансамин», «Ипразид»)

Rp.: Pervitini 0,003

D. t. d. N. 6 in tabul.

DS. По 1 таблетке 1—2 раза в день

Пергален — Pergalen (СФРЮ)

Полимера этансульфоновой кислоты натриевая соль

Синонимы: Natrii apolas, Pergalen-Wirkstoff, Peson, Sodium apolate, Sodium lyapolate

Выпускается в виде мази в тубах по 20,0

Прямой антикоагулянт (синтетический гепариноид).

Применяется для лечения и профилактики тромбоза поверхностных вен конечностей, а также для профилактики образования грубых рубцов (см. «Мазь гепариновая»)

Rp.: Ung. «Pergalen» 20,0

DS. Для нанесения на пораженную поверхность 2 раза в день. Мазь не следует втирать в кожу

Перновин — Pernovin (ВНР)
2-Метил-9-фенил-2,3,4,9-тетрагидропиридиндена гидротар-
трат

Синонимы: Phenidamine, Phenidamin tartrat, Theophorin, Therphorin

Выпускается в драже по 0,004 и 0,025

Хранение — список Б

Антигистаминное средство, по свойствам близкое к «Дипразину» и «Димедролу».

Применяется при всех анафилактических и аллергических заболеваниях (крапивница, ангионевротический отек, нейродермит, аллергический ринит, сенная лихорадка, бронхиальная астма, перепончатый колит). Отличается от упомянутых препаратов отсутствием успокаивающего действия, а также более длительным эффектом

Rp.: Drag. «Pernovin» 0,025 (0,004)

D. t. d. N. 20

S. По 1 драже 2—3 раза в день до 4—5 драже

Перопаназа — Peropanasа (ЧССР)

Состав на 1 драже:

Pancreatini

Natrii cholatis aa 0,1

Хранение — в сухом прохладном месте

Комбинированный ферментный препарат.

Применяется при ахилии, панкреатите, расстройствах пищеварения, связанных с заболеваниями печени и поджелудочной железы, при хроническом энтероколите, анацидном и гипоацидном гастрите

Rp.: Drag. «Peropanasа» N. 50

DS. По 2—4 драже через 1—1,5 ч после еды Глотать целиком!

Перпарин — Perparin (ВНР)
6,7-Дизтокси-1-(3,4-дизтоксибензил)-изохинолина гидрохлорид

Синонимы: Aethaverin, Aethylparaverin, Barbonin, Diquinol, Etaverina, Ethaverin, Ethquinol, Hexaverine, Neopavrin, Papethegine, Preparein

Выпускается в таблетках по 0,04

Хранение — список Б

Спазмолитическое и гипотензивное средство.

Применяют при язве желудка и двенадцатиперстной кишки (с болями и рвотой), при кардиальном пилороспазмах, спастическом запоре, коликах, спазмах пищевода, желчнокаменной болезни, холецистите, при гипертонических кризах, спазмах коронарных сосудов и т. п. Применяют в гинекологии при дисменорее, послеродовых болях и т. п., в хирургии при послеоперационных коликах вследствие неотхождения газов,

в урологии при почечнокаменной болезни, пиелите, цистите, спазме сфинктера мочевого пузыря, спазме, вызванном инструментальным вмешательством. По строению и свойствам близок к «Но-шпа» и папаверину.

Rp.: Tabul. «Perparin» 0,04
D: t. d. N. 20
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Пертуссин — Pertussinum

Состав:

1. Infusi herbae Thymi 15,0—130,0
Glycerini 30,0
Natrii bromidi 3,0
Olei Thymi gtts II
Sirupi simplicis ad 250,0
2. Extracti Thymi fluidi compositi 60,0
Spiritus aethylici 90% 30,0
Aquaе destillatae 30,0
Kalii bromidi 25,0
Sirupi simplicis 450,0
3. Extracti Serpylli aut
Extracti Thymi 12,0
Kalii bromidi 1,0
Sirupi simplicis 82,0
Spiritus aethylici 80% 5,0

Пропись № 3 выпускается во флаконах по 100 мл

Срок годности — 2 года

Отхаркивающее, антисептическое и успокаивающее средство. Применяется преимущественно в детской практике при сухом кашле различного происхождения (бронхит, коклюш и т. д.)

Rp.: Pertussini 100 ml
DS. От 1/2 чайной до 1 десертной ложки 3 раза в день

Петерса микстура — Mixtura Petersi

Хранится непродолжительное время

Анальгезирующее, жаропонижающее, противовоспалительное и противоревматическое средство. Применяется в тех же случаях, что и салицилат натрия (ревматизм, полиартриты, лихорадка и т. д.). Отличается меньшим раздражающим действием на желудок

Rp.: Natrii salicylatis 3,0
Natrii hydrocarbonatis 6,0
Aquae Menthae piperitae 30,0
Aquae destillatae ad 100,0
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

**Петрова—Белякова жидкость —
Liquor Petrovi—Beljacovi**

Коллоидно-солевой плазмозамещающий раствор с добавлением морфина и кофеина.

Применяется для предупреждения и лечения шока

Rp.: Natrii bromidi 1,0
Coffeini 0,2
Morphini hydrochloridi 0,01
Plasmatis 40,0
Sincoli aut Polyglucini 400,0
M. Sterilisetur!
DS. Для внутривенного капельного введения

**Петрова жидкость —
Liquor Petrovi**

Коллоидно-солевой плазмозамещающий раствор.

Применяется для лечения умеренной кровопотери, дегидратации организма (ожоги, понос, длительная рвота), шока, сепсиса, перитонита

Rp.: Natrii chloridi 15,0
Kalii chloridi 0,2
Calcii chloridi 0,1
Plasmatis 100,0
Aquae pro injectionibus ad 1000,0
M. Sterilisetur!
DS. Внутривенно капельно

**Петрова таблетки —
Tabulettae Petrovi**

См. «Петрова жидкость»

Состав:
Natrii chloridi 1,5
Kalii chloridi 0,02
Calcii chloridi 0,01
Срок годности — 1 год 6 мес.

Rp.: Tabul. Petrovi N. 10
DS. По 1 таблетке для приготовления 100 мл жидкости Петрова

Петролиммент жидкий —
Petrolimentum liquidum

Индифферентная мазевая основа

Rp.: Olei Vaselini 6,0
Acidi oleinici 1,0
Solutionis Ammonii caustici spirituoso-aquosae 1,0
MDS. Мазевая основа

Пикнолепсин —
Puknolepsin (ВНР, ФРГ)

α -Метил- α -этил-сукцинимид
Синонимы: Aethosuximid, Eme-
side, Ethosuximidum, Ethymal,
Mesentol, Pemal, Pemalin, Petini-
mid, Petnidan, Simaten, Succimal,
Suxilep (ГДР), Suxin, Suxinutin,
Zarondan, Zarontin, Zartalin

Выпускается в капсулах по 0,25
Срок годности — 5 лет; ФРГ —
не ограничен

Противоэпилептическое сред-
ство.

Применяется в основном при
малых припадках

Rp.: «Puknolepsin» 0,25
D. t. d. N. 40 in capsul. gelat.
S. По 1 капсуле 4—6 раз в день во время еды. Через
каждые 6—7 дней дневная доза увеличивается
на 1 капсулу. Окончательная доза устанавливается
индивидуально

Пиксал — Pixal

Кератолитическое средство.
Свойства и применение — см.
«Адоль»

Rp.: Adici salicylici 10,0
Emplastri citrini 40,0
M. f. emplastrum
DS. Мозольный пластырь

Пиксол — Pixol

Противопаразитарное (акари-
цидное) средство.
Применяется для лечения че-
сотки

Rp.: Saponis medicati 10,0
Resinae Pini 30,0
Solutionis Kalii caustici 30,0
MDS. Наружное

**Пилулы азиатские —
Pilulae asiaticae**

Показания — см.
«Пилулы азиатские»

«Таблетки

1. Rp.: Acidi arsenicosi anhydrici 1,0
Pulveris Piperis nigri 20,0
Pulveris radices Liquiritiae 50,0
Mucilaginis Gummi arabici q. s.
ut fiant pilulae N. 500
2. Rp.: Acidi arsenicosi anhydrici 0,5
Pulveris Piperis nigri 5,0
Mucilaginis Gummi arabici q. s.
ut fiant pilulae N. 500
3. Rp.: Acidi arsenicosi anhydrici 0,5
Glycerini 3,0
Pulveris Piperis nigri q. s.
Pulveris radices Gentianae q. s.
ut fiant pilulae N. 500
DS. По 1 пилуле 2—3 раза в день

**Пилулы бромидные —
Pilulae Kalii bromidi**

Свойства и применение — см.
«Микстура бромидная»

Rp.: Kalii bromidi 10,0
Extracti radices Glycyrrhizae spissi 3,0
Pulveris Glycyrrhizae q. s.
ut fiant pilulae N. 100
DS. По 1 пилуле 2—4 раза в день

**Пилулы желчегонные —
Pilulae cholereticae**

Желчегонное средство (холеретик).

Применяется при холециститах и холангитах, хроническом гепатите, холелитиазе. Не рекомендуется при подострой дистрофии печени и механической желтухе

Rp.: Fellis Tauri 10,0
Gummi arabici 1,0
Pulveris radices Althaeae 5,0
Aquaе destillatae q. s.
ut fiant pilulae N. 100
DS. По 5 пилуль 2—3 раза в день

Пилюли ихтиоловые —
Pilulae Ichthyoli

Антисептическое и противовоспалительное средство.

Применяется при колитах, энтеритах и гастритах, сопровождающихся бродильными процессами

Rp.: Ichthyoli 8,0
Magnesii oxydi 1,0
Aquaе destillatae 8,0
ut fiant pilulae N. 40

DS. По 1—2 пилюли 2—3 раза в день

Приготовление: смесь ингредиентов выпаривают на водяной бане до порошкообразного состояния. Пилюли готовят, добавив несколько капель воды

Пилюли калия йодида —
Pilulae Kalii iodidi

Йодсодержащее средство.

Применение: при гипертиреозе, эндемическом зобе, при бронхитах и бронхиальной астме и др.

Rp.: Kalii iodidi 20,0
Amyli Triticici 5,0
Sirupi simplicis q. s.
ut fiant pilulae N. 100

DS. По 1 пилюле 3 раза в день

Пилюли колларголовые —
Pilulae Collargoli

Вяжущее и антисептическое средство.

Применяется для лечения хронического гастрита и язвенной болезни желудка

1. Rp.: Collargoli 1,0
Sacchari lactis 10,0
Glycerini
Aquaе destillatae $\bar{a}\bar{a}$ q. s
ut fiant pilulae N. 100

2. Rp.: Collargoli 1,0
Sacchari lactis 5,0
Glycerini
Aquaе destillatae $\bar{a}\bar{a}$ q. s
ut fiant pilulae N. 100

DS. По 1 пилюле 3 раза в день после еды

Пилюли кровоостанавливающие —
Pilulae haemostaticae

Вяжущее средство, также повышает тонус матки.

Применяется при умеренных желудочных, кишечных и маточных кровотечениях

Rp.: Aluminis
Extracti Secalis cornuti 2,5
Resinae Benzoëis 1,0
Gummi Tragacanthae q. s.
ut fiant pilulae N. 50
DS По 1—2 пилюли 2—3 раза в день

Пилюли марганцовые — Антисептическое средство.
Pilulae Kalii permanganatis Применяется для подавления
гнилостных и бродильных про-
цессов в желудке и кишечнике

Rp.: Kalii permanganatis 5,0
Boli albae 4,0
Lanolini anhydrici q. s.
ut fiant pilulae N. 100
DS. По 1 пилюле 3 раза в день после еды

Пилюли ментоловые — Местнораздражающее и отхар-
кивающее средство.
Pilulae Mentholi Применяется при болях в же-
лудке, сопутствующих гипоацид-
ному гастриту, при острых респи-
раторных заболеваниях и т. д.

Rp.: Mentholi 2,0
Cerae flavae 1,5
Olei Amygdalarum 1,0
Pulv. rhizomatis Iridis q. s.
ut fiant pilulae N. 40
DS. По 1 пилюле 3 раза в день

Пилюли мочегонные — Кардиотоническое и мочегон-
ное средство, антисептик моче-
выводящих путей.
Pilulae diureticae Применяется для лечения оте-
ков, возникших на почве хрони-
ческой сердечной недостаточ-
ности

Rp.: Pulv. folii Digitalis
Pulv. bulbi Scillae $\bar{a}\bar{a}$ 2,0
Extracti Gentianae spissi 1,0
Olei baccarum Juniperi 0,4
Mucilaginis Gummi arabici q. s.
ut fiant pilulae N. 30
DS. По 1 пилюле 2—3 раза в день

Пилулы опийные сложные —
Pilulae Opii compositum

Препарат оказывает умеренное обезболивающее и спазмолитическое действие.

Применяется для снятия болей в тех же случаях, что и морфин

1. Rp.: Plumbi acetatis 0,3
Extracti Opii 0,1
Pulveris folii Hyoscyami 0,6
Mucilaginis Gummi arabici q. s.
ut fiant pilulae N. 15
2. Rp.: Zinci valerianatis 0,5
Extracti Hyoscyami 0,25
Extracti Opii 0,13
Massae pilularum q. s.
ut fiant pilulae N. 20
DS. По 1—2 пилулы 2 раза в день

Пилулы пепсиновые —
Pilulae Pepsini

Средство заместительной терапии при пониженной секреции желудка.

Применяется при гипо- и анацидных гастритах, колитах, энтеритах и пр.

- Rp.: Pepsini 10,0
Sacchari lactis 2,0
Gummi Tragacanthae 1,0
Acidi hydrochlorici 2,5
Pulv. radices Glycyrrhizae 2,5
Glycerini q. s.
ut fiant pilulae N. 100
DS. По 1—2 пилулы за 30—50 мин до еды

Пилулы подофиллиновые —
Pilulae Podophyllini

Слабительное и желчегонное средство.

Применяется при хронических запорах

- Rp.: Podophyllini 3,0
Saponis medicati 5,0
Pulv. radices Glycyrrhizae 3,0
Olei Foeniculi 1,0
ut fiant pilulae N. 100
DS. По 2—3 пилулы на ночь

Пилулы ртутные —
Pilulae Hydrargyri diodidi

Химиотерапевтическое средство.

Применяется для лечения третичного висцерального сифилиса

Rp.: Hydrargyri diiodidi 0,2
Kalii iodidi 1,0
Extracti et pulveris Glycyrrhizae q. s.
ut fiant pilulae N. 100
DS. По 1 пилюле 2—3 раза в день

Пилюли слабительные —
Pilulae purgativae

Слабительное средство.
Применяется для лечения хро-
нических запоров

1. Rp.: Aloës 10,0
Saponis Jalapae 6,0
Spiritus aethylici 70% q. s.
ut fiant pilulae N. 100
2. Rp.: Aloës 10,0
Pulveris radices Gentianae 5,0
Olei Thymi 1,0
Pulveris radices Althaeae q. s.
ut fiant pilulae N. 100
3. Rp.: Extracti Frangulae
Extracti Rhei āā 3,0
Extracti Belladonnae
Podophyllini āā 0,5
Pulv. corticis Frangulae q. s.
ut fiant pilulae N. 50
4. Rp.: Extracti Fucis vesiculosi * 20,0
Extracti Frangulae 5,0
Kalii sulfatis 10,0
Pulv. radices Althaeae 2,0
Pulveris Fucis vesiculosi q. s.
ut fiant pilulae N. 200
5. Rp.: Extracti Aloës 8,0
Pulveris Jalapae 4,0
Mucilaginis Gummi arabici q. s.
ut fiant pilulae N. 100
6. Rp.: Extracti Aloës 4,0
Extracti Rhei compositi 2,0
Ferri reducti 3,0
Aquaе destillatae 50,0
ut fiant pilulae N. 100
DS. По 1—2 пилюли 2—3 раза в день

Приготовление прописи 6: смесь ингредиентов нагревают на водя-
ной бане до прекращения выделения водорода. Из сухой массы готовят
пилюли с помощью мыльного спирта

* Водоросль — фукус пузырчатый

Пилулы с экстрактом красавки
сложные — *Pilulae extracti
Belladonnae compositae*

Успокаивающее средство.
Применяется для лечения невро-
зов и неврастении, сопровожда-
ющихся ваготонией

Rp.: Zinci Valerianatis 1,0
Extracti Belladonnae 0,25
Extracti Gentianae q. s.
ut fiant pilulae N. 20
DS. По 1 пилуле 3 раза в сутки

Пилулы ферролецитиновые —
Pilulae Ferrolecithini

Общеукрепляющее средство.
Применяется при переутомле-
нии, неврастении, в периоде ре-
конвалесценции

Rp.: Ferri carbonatis
Calcii phosphatis aa 10,0
Lecithini 5,0
Extracti et pulveris Glycyrrhizae q. s.
ut fiant pilulae N. 100
DS. По 1—2 пилулы 2—3 раза в день

Пилулы хининовые —
Pilulae Chinini

Средство, стимулирующее со-
кращения матки.
Применяется для лечения пер-
вичной родовой слабости

1. Rp.: Chinini hydrochloridi 3,0
Acidi hydrochlorici gtts III—IV
Massae pilularum q. s.
ut fiant pilulae N. 30
 2. Rp.: Chinini sulfatis 3,0
Acidi tartarici 0,1
Gummi Tragacantae q. s.
Glycerini 0,4
ut fiant pilulae N. 30
 3. Rp.: Chinini sulfatis 1,5
Ferri reducti 5,0
Pulveris radices Gentianae 0,5
Extracti Gentianae 2,5
ut fiant pilulae N. 50
DS. По 1 пилуле 2—3 раза в день после еды
-

Пилулы щелочные —
Pilulae alcalinae

Пилулы применяются для профилактики и лечения заболеваний, сопровождающихся отложением солей (подагры, желчнокаменной и мочекаменной болезни и т. п.)

Rp.: Natrii carbonatis
Lithii benzoatis
Natrii tetraboratis $\bar{a}\bar{a}$ 10,0
Saponis medicati
Extracti Gentianae $\bar{a}\bar{a}$ 5,0
Pulveris aromatici q. s.
ut fiant pilulae N. 100
DS. По 5—10 пилуль три раза в день

Пимсин — Pimeinum

Состав на 1 таблетку:
Amidopyrini 0,1
Barbitali-natrii 0,3
Codeini 0,001
Хранение — список Б

Снотворное, успокаивающее и анальгетическое средство. Обладает противокашлевым действием. Применяется для лечения бессонницы, связанной с болями. При длительном применении может вызвать пристрастие

Rp.: Tabul. Pimeini N. 10
DS. По 1 таблетке на ночь

Пинабин — Pinabinum

50% раствор в масле тяжелой фракции эфирного масла сосновой или еловой хвои
Выпускается во флаконах по 25 мл
Хранение — в прохладном месте
Срок годности — 1 год

Препарат применяется для лечения почечнокаменной болезни, фосфатурии, в том числе при воспалительных осложнениях этих заболеваний, после оперативного удаления камней. Рекомендуется сочетать с растительными мочегонными. Противопоказан при нефрозах и нефритах

Rp.: Pinabini 25 ml
DS. По 5 капель на кусочке сахара 3 раза в день перед едой. Курс лечения — 6 недель

Пинат — Pinat

Обезболивающее и спазмолитическое средство.
Применяется для лечения болевого синдрома, связанного со спазмом полых органов (колики), радикулита, люмбаго и пр.

Rp.: Solutionis Amidopyrini 3% 15,0
Kalii iodidi 0,3
Novocaini 0,2
Thiaini bromidi 0,1
Atropini sulfatis 0,01
M. Sterilisetur!
DS. По 1 мл внутримышечно в подогретом виде

Приготовление: ингредиенты, входящие в состав прописи, химически несовместимы. Данную лекарственную форму для инъекции можно отпустить только в том случае, если отдельно в 5 мл воды для инъекций растворить 0,01 атропина сульфата, 0,2 новокаина и 0,1 тиамин-бромид, добавив в качестве стабилизатора 1—1,5 капли 0,1 н. раствора соляной кислоты. В другой части воды для инъекции (10 мл) растворяют 0,3 йодида калия и 0,45 амидопирина. Оба раствора фильтруют и стерилизуют текучим паром при температуре 100° в течение 30 мин. Сливают в асептических условиях после охлаждения, непосредственно перед употреблением

Пиоцид — Pyocidum
Лукомского жидкость — Liquor
Lusomsky
Хранение — список Б
Срок годности — 2 года

Антисептическое средство.
Применяется для лечения гнойно-воспалительных заболеваний десен, амфодонтоза и т. д. Жидкость наносят только на поврежденную, предварительно осушенную ткань и после прекращения выделения пузырьков немедленно удаляют. Применять те же меры предосторожности, что и при работе с серной кислотой

Rp.: Aetheris medicinalis
Acidi sulfurici puri aa 2,0
MDS. В стоматологический кабинет

Пиперазина адипинат —
Piperazini Adipinas
Пиперазина (диэтилендиамина)
адипинат
Синонимы: Adipalit, Adiprazina, Adiver, Adivermal, Antielmintico, Antivermin (ПНР), Coopane, Curox, Dietelmin, Entacyl, Helminthex, Helmirazin (ЧССР), Heltolan, Ismiverm, Jetsan, Mapiprin, Nemacyl, Nometan, Optoverm, Oxiural, Oxurasin, Oxyzin, Paraminthin, Pipadox, Piperascat (ВНР), Piperaver, Piperoxine, Pipertol, Toxivers, Uridoxyl, Vermi-

Противоглистное средство, эффективное при инвазиях нематодами (аскаридоз и энтеробиоз).

Лечение проводят обычно в течение 2—3 дней в дозе по 0,03—0,05 на 1 кг веса тела в день в 2—3 приема. При запоре на 3-й день дают солевое слабительное. При энтеробиозе проводят 2—3 цикла с перерывами в неделю

compreu, Vermilass, Vermitox, Vermofrik, Verzina, Wurmex, Zidatin

Выпускается в таблетках по 0,2, 0,25, 0,3 и 0,5

Срок годности — 4 года; дополнительный срок годности после переконтроля — 2 года

Срок годности пипераската (ВНР) — не ограничен

Rp.: Piperazini adipinatis 0,5

D. t. d. N. 30 in tabul.

S. На курс лечения

Пирабутол — Pyrabutol (ЧССР)

Состав на 1 таблетку:

Butadioni

Amidopyrini $\bar{a}\bar{a}$ 0,125

Состав на 1 ампулу:

Butadioni

Amidopyrini $\bar{a}\bar{a}$ 0,75

Aquae pro injectionibus ad 5 ml

Синонимы: Alindor, Butapyrin, Irgapyrin, Реорурин (ВНР), Wofapyrin

Хранение — список Б

Срок годности драже — 5 лет (реопирин), ампул пирабутола — 4 года, ампул реопирина — 2 года

Rp.: Tabul. «Pyrabutol» 0,25

D. t. d. N. 20

S. По 1—2 таблетки (драже) 2—3 раза в день

Rp.: Sol. «Pyrabutol» 5 ml

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. По 5 мл внутримышечно

Пиразинамид — Pyrazinamid (СФРЮ)

Пиразинкарбоновой кислоты амид

Синонимы: Aldinamid, Eprazin, Farmizina, Isopyratsin, Novamid, Piraldina, Pirazinamid, Tebrazid, Tisamid, Tubersan, Zinamide

Выпускается в таблетках по 0,5

Хранение — список Б

Срок годности — 3 года

Противотуберкулезное средство, по свойствам и применению аналогичное «Изониазиду». Более токсичен и менее активен, вследствие чего является препаратом 2-го ряда

Рр.: Tabul. «Pyrazinamid» 0,5
D. t. d. N. 30
S. По 1 таблетке 3—5 раз в день (после еды)

Пирамеин — Pyrameinum
Состав на 1 таблетку:
Amidopyrini 0,3
Coffeini 0,03
Хранение — список Б
Срок годности — 4 года

Жаропонижающее и анальгезирующее средство.
Используют при невралгии, лихорадочных состояниях, головной боли и др.

Рр.: Tabul. Pyrameini N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Пираминал — Pyraminalum
Состав на 1 таблетку:
Amidopyrini 0,25
Phenobarbitali 0,02
Coffeini 0,03
Хранение — список Б
Срок годности — 2 года

То же

Рр.: Tabul. Pyraminali N. 10
DS. По 1 таблетке 2 раза в день

Пиранал — Pyranalum
Состав на 1 таблетку:
Amidopyrini
Aralgini aa 0,25
Хранение — список Б
Срок годности — 5 лет

То же

Рр.: Tabul. Pyranali N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Пирафен — Pyraphenum
Состав на 1 таблетку:
Amidopyrini
Phenacetini aa 0,25
Хранение — список Б
Срок годности — 8 лет

То же

Рр.: Tabul. Pyrapheni N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Пиридрол — Piridrolum
α-(2-Гиперидил)-бензгидрола
гидрохлорид.

Синонимы: Alertol, Detaril, Gadehyl, Gerodyl, Leptidrol, Luxidin, Meratonic, Meratran, Meretran, Metadin, Pipradol, Pipradolhydrochlorid, Pipral, Pipralon

Выпускается в таблетках по 0,601 и 0,0025 г

Хранение — список А, в плотно укупоренной таре

Психостимулирующее средство, близкое по свойствам к фенамину.

Применяется для стимулирования центральной нервной системы при астении, депрессивных состояниях, нарколепсии, при вялотекущей шизофрении и т. п. В случае возникновения беспокойства, двигательного возбуждения, тахикардии дозу следует уменьшить. При длительном применении пиридрола возможно привыкание и пристрастие к препарату. Противопоказан при бессоннице, склерозе сосудов, стенокардии, гиперкинезе, психическом возбуждении

Rp.: Piridroli 0,001 (0,0025)

D. t. d. N. 6 in tabul.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день (в первую половину дня). При хорошей переносимости увеличивают до 0,0025 г 3 раза в день

Пирилен — Pirilenum
1, 2, 2, 6, 6-Пентаметилпиперидина гидротартрат (или паратолуолсульфонат)

Синонимы: Huberdine, Iprometil, Normatens, Pempidil, Pempidintartrat, Pempiten, Perolysen, Rivon, Synapleg (ВНР), Tenormal, Tensiflex, Tensoral, Viotil

Хранение — список Б
Срок годности — 5 лет

Ганглиолитик, по показаниям и противопоказаниям аналогичный «Диколину», «Камфонию» и т. д. Отличается от перечисленных препаратов большей эффективностью, способностью хорошо всасываться в желудке и большей продолжительностью действия

Rp.: Pirileni 0,005

D. t. d. N. 50 in tabul.

S. По 1/2 таблетки 1—3 раза в день

Пиркофен — Pyrcophenum
Состав на 1 таблетку:
Amidopyrini
Phenacetini aa 0,3
Coffeini 0,05

Хранение — список Б
Срок годности — 5 лет

Свойства и применение — см. «Пирамени»

Rp.: Tabul. Pyrcopheni N. 10

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Пирогенал — Pyrogenalum

Пирогенал является липополисахаридом, образующимся в процессе жизнедеятельности микроорганизмов *Pseudomonas aeruginosa*

Выпускается в ампулах по 1 мл 0,001%, 0,0025%, 0,005% и 0,01% раствора

Хранение — список Б, в защищенном от света месте при температуре 2—4°.

Срок годности — не установлен

Средство лихорадочной (пирогенной) терапии.

Применяют при сифилитических поражениях центральной нервной системы, а также для ускорения рассасывания рубцов после ожогов и т. д.

Rp.: Solutionis Pyrogenali 0,001% (0,0025%; 0,005% aut 0,01%) 1 ml
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. Внутривенно или внутримышечно каждые 1—3 дня

**Пирогова капли желудочные —
Guttae gastricae Pirogovi**

Сокогонное, успокаивающее и слабое обезболивающее средство.

Применяется для лечения гипои анацидных гастритов, неврозов желудка

Rp.: Tincturae Valerianae aethereaе 12,0
Tincturae Strychni
Tincturae Opii crocatae āā 6,0
Tincturae Veratri albi 3,0
Aetheris acetici 6,0
Olei Menthae 2,0
MDS. По 20—25 капель 2—3 раза в день перед едой

**Пирогова примочка —
Fomentum Pirogovi**

Антисептическое и противовоспалительное (вяжущее) средство.

Применяется для лечения инфицированных ран и язв

Rp.: Tincturae Arnicae
Spiritus camphorati āā 10,0
Aquaе Plumbi 100,0
M. f. fomentum
DS. Примочка

Пироксофацин — Pirosofacin

Анальгезирующее и противовоспалительное средство.

Применяется для лечения радикулита, миозита, люмбаго, артрита, неврита и невралгии, спондилеза и т. п.

Rp.: Amidopyrini 2,0
Coffeini-natrii benzoatis 0,8
Novocaini 0,2
Aquae pro injectionibus 20,0
M. Sterilisetur!
DS. По 1—3 *мл* внутримышечно

Приготовление: стерилизация раствора новокаина в присутствии амидопиррина и кофеина-бензоата натрия приводит к разложению новокаина. Поэтому рекомендуется приготовить раствор без новокаина, простерилизовав его текучим паром при 100° С 30 *мин*, а новокаин добавлять асептически. В прописи превышен вдвое предел растворимости амидопиррина, который при стоянии раствора выпадает в осадок, поэтому необходимо или уменьшить наполовину количество амидопиррина, или перед введением склянку с раствором подогреть в горячей воде и затем, охладив ее до 37° С, вводить больному.

Можно готовить два стерильных раствора:

1. Амидопиррина и кофеина-бензоата натрия
2. Новокаина по ГФХ

При введении брать из каждого раствора нужное количество в один шприц

Пиррофос — Pyrophos

Тетраэтиловый эфир моноио-
пирофосфорной кислоты

Синонимы: А₂, Phosargin

Выпускается во флаконах по
10 *мл* 0,01 и 0,02% раствора
в масле

Хранение — список А, в защи-
щенном от света месте

Срок годности — 1 год

Антихолинэстеразное средство.
Применяется в качестве мио-
тического и противоглаукомного
средства. См. также «Армин»,
«Фосфакол»

Rp.: Sol. Pyrophosi oleosae 0,01% (0,02%) 10,0
DS. По 1—2 капли 2—3 раза в день в глаза

Питуитрин для инъекций — Pituitrinum pro injectionibus

Водный экстракт задней доли
гипофиза крупного рогатого скота

Синонимы: Glanduitrin, Нуро-
phen, Нурорфизин, Piton, Pitu-
glandol, Pituitan

Выпускается в ампулах по 1 *мл*
с активностью 5 и 10 ЕД

Хранение — список Б, в про-
хладном, защищенном от света
месте

Срок годности — 2 года

Маточное, сосудосуживающее и
антидиуретическое средство.

Применяют для усиления сокра-
щений матки при послеродовых
кровотечениях, менометрорагиях,
несахарном диабете. Противо-
показан при гипертонии любого
происхождения, атеросклерозе,
стенокардии

Rp.: Pituitrini 1,0 (10 ED)
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. По 1—3 мл внутримышечно

Питуитрин М — Pituitrinum M
Экстракт задней доли гипофиза, максимально освобожденный от вазопрессина; выпускается в ампулах по 1 мл (5 ЕД)
Хранение — список Б, в прохладном, защищенном от света месте

Срок годности — 2 года

Маточное средство.
Применяют для усиления сокращения матки при родах и при гипотонических послеродовых кровотечениях (см. «Окситоцин»)

Rp.: Pituitrini M 1 ml (5 ED)
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. Внутримышечно по 0,2—0,4 мл (1—2 ЕД) через каждые 30 мин до общей дозы 1 мл. Препарат можно вводить внутривенно капельным методом в 5% растворе глюкозы (5 ЕД в 1 л раствора)

Плазмол — Plasmolum
Препарат, получаемый из человеческой крови
Выпускается в ампулах по 1 мл
Хранение — в прохладном, защищенном от света месте
Срок годности — 1 год

Средство тканевой терапии.
Применяют в качестве неспецифического десенсибилизирующего и обезболивающего средства при невралгиях, невритах, радикулитах и других заболеваниях периферической нервной системы, сопровождающихся болевым синдромом, а также при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальной астме, артритах и др.

Rp.: Plasmoli 1,0
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. Под кожу по 1 мл ежедневно

Плаквенил — Plaquenil (Англ.)
4-[4-(*N*-Этил-*N*-β-оксипиперидинил)-1-метилбутиламино]-7-хлорхинолина сульфат
Синонимы: Ergoquin, Hydrochloquin, Oxychlorochin, Plaquinol, Quensyl, Reumoidin
Выпускается в таблетках по 0,2
Хранение — список Б
Срок годности — 5 лет

Противомалярийное средство, используется также для лечения коллагенозов.
Применяется при ревматоидном артрите, красной и системной волчанке, малярии

Rp.: Tabul. «Plaquenil» 0,2

D. t. d. N. 20

S. Первоначальная доза — 4 таблетки в день, с постепенным понижением до 2 таблеток в день

**Плантагина паста —
Pasta Plantagini**

Некротизирующее средство.

Применяется для лечения различных заболеваний кожи. Противопоказания и меры предосторожности — обычные для препаратов мышьяка

Rp.: Acidi arsenicosi anhydrici 1,0

Picis liquidae 0,6

Glycerini 0,8

Mellis

Farinae Triticici āā 12,0

M. f. pasta

DS. Наносить на пораженные участки кожи

Планта — Plantal

Антацидное и послабляющее средство.

Применяется для лечения гиперацидного гастрита и язвенной болезни желудка

Rp.: Acidi citrici 45,0

Natrii hydrocarbonatis 40,0

Natrii sulfatis exsiccati 14,5

Natrii chloridi 0,5

M. f. pulvis

DS. По 1 чайной ложке 3 раза в день

Плантазан — Plantosanum
Бременера паста — Pasta Bre-
meneri

Бактерицидное и некротизирующее средство.

Применяется для лечения туберкулеза кожи (туберкулезной волчанки)

Rp.: Herbae Chelidonii recentis

Lanolini

Vaselini āā 10,0

Solutionis Phenoli 0,25% gtts X

M. f. unguentum

DS. Наносить на пораженный участок кожи

Пластырь акрихиновый —			Препарат используется для лечения дискоидной красной волчанки в случаях, не поддающихся другому лечению. Перед лечением проверяют переносимость препарата нанесением его на небольшой участок. Нельзя применять одновременно с пероральным приемом акрихина и у лиц с неустойчивой или большой психикой
Emplastrum Acrichini			
Состав:	№ 1	№ 2	
Acrichini	10,0	10,0	
Methylii salicylatis	15,0	15,0	
Emplastri Plumbi	45,0	50,0	
Lanolini	10,0	20,0	
Spiritus aethylici 90%	10,0	10,0	
Aquae destillatae	10,0	10,0	

Rp.: Emplastri Acrichini 100,0

DS. Наносить на пораженную поверхность 1 раз в 2—3 дня до эффекта. При отсутствии эффекта лечение прекратить через 5—6 сеансов

Пластырь бактерицидный —
Emplastrum adhaesivum bacteri-
cidum

Состав:
Furacilini 0,02
Synthomycini 0,09
Viridis nitentis 0,01
Spiritus aethylici 40% 100,0
Этим составом пропитаны салфетки, приклеенные к лейкопластырю

Антисептическое средство.
Применяется для лечения поверхностных повреждений и гнойно-воспалительных заболеваний кожи

Rp.: Emplastri adhaesivi bactericidi N. 5

DS. Для повязок

Пластырь камфорный —
Emplastrum camphoratum

Противовоспалительное и антисептическое средство.
Применяется для лечения гнойно-воспалительных заболеваний кожи

Rp.: Emplastri Plumbi 150,0

Cerae flavae 50,0

Olei Olivarum 25,0

Camphorae 10,0

M. f. emplastrum

DS. Наносить на пораженные участки кожи

Пластырь касторовый —
Emplastrum olei Ricini

То же

Rp.: Emplastri adhaesivi 95,0
Olei Ricini 5,0
M. f. emplastrum
DS. Для наружного применения

Пластырь лимонный —
Emplastrum citrinum;
Пластырь желтый —
Emplastrum flavum

Индифферентный препарат.
Применяется для пригото-
вления других прописей

Rp.: Cerae flavae 40,0
Resinae Pini 2,0
Sebi bovini
Terebinthinae aa 1,0
M. f. emplastrum
DS. Основа для других пластырей

Пластырь медовый —
Emplastrum Mellis

Свойства и применение — см.
«Пластырь камфорный»

Rp.: Emplastri Plumbi compositi
Cerae flavae
Mellis depurati aa 20,0
M. f. emplastrum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Пластырь перцовый —
Emplastrum Capsici

Действующими веществами пла-
стыря являются густые экстракты
перца (Extr. Capsici spissum —
5,6%) и красавки (Extr. Bella-
doonae spissum — 0,3%) и на-
стойка арники (T-ra Arnicae —
0,3%)

В состав пластыря также вхо-
дят ланолин, каучук, жидкий
парафин и другие компоненты.
Масса наносится на куски хлоп-
чатобумажной ткани различных
размеров

Выпускаются пластыри разме-
ром 12×12, 10×18 и 8×18 см
по 4 штуки в пакете

Хранение — в сухом прохлад-
ном защищенном от света месте
Срок годности — 1 год

Раздражающее и отвлекающее
средство.

Применяется при подагре, арт-
ритах, радикулитах, люмбаго и
других простудных заболеваниях

Rp.: Emplastri Capsici 10 × 18 см N. 4
DS. Наружное

Способ применения: снять с пластыря защитную пленку из целлофана, наложить на больное место и слегка прижать. Пластырь можно не снимать в течение 2 суток, если не будет ощущаться сильного жжения. Лечение пластырем повторяют при необходимости несколько раз

Пластырь салициловый сложный Свойства и применение — см.
— **Emplastrum Acidi salicylici** «Адолъ»
 compositum

1. Rp.: Emplastri saponati
 Emplastri Plumbi compositi āā 5,0
 Acidi salicylici 2,0
2. Rp.: Acidi salicylici 10,0
 Emplastri Citri 40,0
3. Rp.: Colophonii 2,0
 Cerae 3,0
 Axungiae porcinae 0,9
 Terebinthinae 7,0
 Acidi salicylici 3,0
4. Rp.: Emplastri Citri 9,0
 Emplastri adhaesivi 6,0
 Acidi salicylici 2,0
 M. f. emplastrum
 DS. Наружное

Пластырь свинцовый липкий — Свойства и применение — см.
Emplastrum Plumbi adhaesivum «Пластырь камфорный»

Rp.: Emplastri Plumbi simplicis 400,0
 Colophonii 100,0
 M. f. emplastrum
 DS. Наносить на пораженные участки кожи

Пластырь свинцовый сложный — Свойства и применение — см.
Emplastrum Plumbi compositum «Пластырь камфорный»

1. Пластырь универсальный —
 Emplastrum universale
(Emplastrum gargarum)
 Срок годности — 3 года; после
 переконтроля — 1 год 6 мес.

1. Rp.: Minii 14,0
Olei Olivarum 20,0
Colophonii
Cerae flavae āā 5,0
Saponis 2,0
Camphorae 1,0

2. Rp.: Emplastri Plumbi simplicis 85,0
Colophonii 10,0
Terebinthinae 5,0
M. f. emplastrum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Приготовление прописи 1: порошок сурика смешивают с водой до образования кашицеобразной массы, затем прибавляют масло и варят при постоянном помешивании, прибавляют горячей воды до образования пластыря. Варка продолжается до окрашивания пластырной массы в бурый цвет. Затем прибавляют расплавленную смесь канифоли и воска, растирают и под конец вводят смесь порошков мыла и камфоры

**Пластырь эпилиновый —
Emplastrum Epilini**

Состав:
Epilini 4,0
Lanolini 20,0
Cerae 5,0
Emplastri Plumbi 51,0
Aeuae destillatae 20,0
Хранение — список Б
Срок годности — 1 год

Депиляторий.

Применяется для удаления волос при лечении грибковых заболеваний волосистой части головы. Пластырь накладывают на пораженную поверхность (при необходимости — на плечи или голени) из расчета 0,2 г на 1 кг веса тела больного сроком на 20 дней, после чего производят ручную эпиляцию (см. специальную инструкцию). Противопоказан при болезнях почек и нервной системы, а также детям до 1 года

Rp.: Emplastri Epilini 100,0
DS. Наружное

**Платонова жидкость —
Liquor Platonovi**

1. Rp.: Dicaini 0,2
Phenoli 3,0
Chloroformii 2,0

2. Rp.: Dicaini 0,2
Spiritus aethylici 95% 2,0
Aeuae destillatae 6,0
MDS. Втирают в твердые ткани зубов

Местноанестезирующее и антисептическое средство.

Применяется для анестезии твердых тканей зуба

Плисульфан — Plisulfan (СФРЮ)

1-Фенил-5-сульфаниламидо-
пиразол

Синонимы:

Chemidin, Depocid, Eftolon, Fenazolo, Firmazolo, Inamil, Kronosulfan, Microsulf(a) Novosulfan, Orisul, Orisulan, Paidazolo, Phenylsulfapyrazol, Raziosulfa, Sacer-sulfa, Sulfabid, Sulfaphenazol, Sulfapirazid, Sulfarest, Sulfiam, Sulfo-ral, Tardosulf, Totosulfa

Выпускается в таблетках по 0,5

Хранение — в сухом месте

Химиотерапевтическое сред-
ство — сульфаниламид пролонги-
рованного действия.

Применяется при бациллярной
дизентерии, бактериальном энте-
роколите, инфекции мочевых пу-
тей, фарингите, бронхите, пнев-
монии и др.

Rp.: Tabul. «Plisulfan» 0,5

D. t. d. N. 12

S. По 2 таблетки каждые 8 ч первые 2 дня, в даль-
нейшем по 1 таблетке каждые 8—12 ч

Полибе — Polibe (ВНР)

Состав на 1 таблетку:

Thiamini chloridi 0,005

Riboflavini 0,01

Nicotinamidi 0,05

Pyridoxini hydrochloridi 0,004

Хранение — в защищенном от
света месте

Срок годности — 2 года

Комплекс витаминов группы В.

Применяется при соответствую-
щих гипо- и авитаминозах, бере-
менности, реконвалесценции и т.п.

Rp.: Tabul. «Polibe» N. 20

DS. По 1 таблетке 3 раза в день после еды

Поливинол — Polyvinolum

2,5% раствор поливинилового
спирта

Хранение — при комнатной тем-
пературе. При охлаждении рас-
твора ниже 10° может появиться
опалесценция, которая должна
исчезнуть при подогревании фла-
кона в горячей воде

Срок годности — 5 лет

Коллоидный плазмозамещаю-
щий раствор.

Применяют при травматическом
и операционном шоке и острой
кровопотере

Rp.: Polyvinoli 250,0 (500,0)

DS. Внутривенно или внутриаптериально капельно

Поливитами́н — Polyvitamin
Состав на 1 драже:
Retinoli acetatis 1650 ED
Thiamini bromidi
Riboflavini aa 0,001
Acidi ascorbinici 0,025
Хранение — в защищенном от
света месте
Срок годности — 1 год 6 мес.

Комплекс витаминов А, В₁,
В₂, С.

Применяется при инфекцион-
ных заболеваниях, реконвалес-
ценции, при авитаминозе и гипо-
витаминозе

Rp.: Dragee Polyvitamini N. 50
DS. По 1—2 драже 3 раза в день

Полоскание борное сложное —
Gargarisma borogatum composi-
tum

Антисептическое средство.
Применяется при воспалении
слизистой рта и глотки (стоматит,
гингивит, фарингит, тонзиллит
и пр.)

Rp.: Natrii tetraboratis 1,0
Natrii hydrocarbonatis 5,0
Aquae Menthae piperitae
Aquae Menthae piperitae spirituosae aa 75,0
Tincturae Rhei aquosae 1,0
MDS. Наружное. Применять в теплом виде

Полоскание квасцовое — Garga-
risma aluminatum

Вяжущее и антисептическое
средство.
Применяется для лечения вос-
паления слизистых рта и мочепо-
ловых путей

Rp.: Aluminis 2,0
Aquae destillatae 200,0
MDS. Для полоскания (или спринцевания)

Полоскание квасцовое сложное —
Gargarisma aluminatum composi-
tum

Препарат применяется для ле-
чения воспаления слизистой рта
и глотки, при дурном запахе изо
рта

Rp.: Decocti rhizomatis Tormentillae 200,0—250,0
Aluminis 4,0
Mellis depurati 30,0
MDS. Полоскать горло по 1/2 стакана несколько
раз в день

Полоскание салициловое — *Gargarisma salicylatum*

То же

Rp.: Natrii salicylatis 5,0
Natrii hydrocarbonatis 2,5
Aquae Rosae 100,0
Tincturae Cinnamomi 20,0
Spiritus aethylici diluti 25,0
Olei Menthae gtts XV
MDS. Для полоскания рта

Полоскание тимоловое сложное —
Gargarisma thymolatum compositum

То же

Rp.: Natrii tetraboratis
Acidi salicylici
Thymoli aa 2,5
Vanillini 0,05
Aquae Rosae 250,0
Spiritus aethylici 100,0
MDS. По 1 столовой ложке на стакан воды для
полоскания рта и горла

Полоскание феноловое — *Gargarisma phenolatum*

То же

Rp.: Phenoli 3,0
Acidi benzoici 1,5
Olei Menthae 1,0
Olei Citri 0,3
Aquae destillatae 30,0
Spiritus aethylici 100,0
MDS. Для полоскания по 1 чайной ложке на $\frac{1}{2}$ стака-
кана теплой воды

Полосушина жидкость — *Liquor Polosuchini*

Солевое плазмозаменяющее сред-
ство.

Применяется при обезвожива-
нии и для детоксикации при токси-
коинфекциях, дизентерии, гипо-
хлоремическом алкалозе, неукро-
тимой рвоте беременных

Rp.: Natrii chloridi 25,0
Natrii thiosulfatis 0,5
Calcii chloridi 1,5
Aquae pro injectionibus 500,0
M. Sterilisetur!
DS. Внутривенно капельно

Попова микстура — Mixtura Popovi

Успокаивающее и снотворное средство.

Применяется главным образом для смягчения явлений абстиненции и при остром алкогольном психозе

Rp.: Phenobarbitali 0,4
Spiritus aethylici 20,0
Aquae destillatae 200,0
MDS. По 1—2 столовых ложки на ночь

Попова жидкость — Liquor Popovi

Свойства и применение — см. «Банайтиса жидкость»

Приготовление физиологических растворов, включающих соли кальция, магния, глюкозу и гидрокарбонат, натрия, требует предосторожности, так как могут образоваться осадки карбоната кальция и магния. Глюкоза в щелочной среде разлагается. С целью исключения указанных нежелательных процессов вначале в $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$ всего количества воды готовят и стерилизуют раствор солей, не дающих осадка, и глюкозу. В остальной части воды для инъекций растворяют гидрокарбонат и жидкость добавляют в асептических условиях к предварительно охлажденному раствору солей.

При наличии толстостенной, герметически закупориваемой тары раствор гидрокарбоната можно стерилизовать.

В асептических условиях добавляют к простерилизованному раствору солей спирт и сыворотку крови, если они включены в состав прописи

Rp.: Natrii chloridi 15,0
Kalii chloridi
Calcii chloridi $\bar{a}\bar{a}$ 0,2
Natrii hydrocarbonatis 4,0
Glucosi 150,0
Spiritus aethylici 100,0
Aquae pro injectionibus ad 1000,0
M. Sterilisetur!
DS. Внутривенно капельно

Порошок антиастматический —
Pulvis antiasthmaticus
Хранение — список А

Спазмолитическое, успокаивающее и обезболивающее средство.
Применяется при бронхиальной астме

Rp.: Ephedrini hydrochloridi 0,015—0,025
Euphyllini 0,02
Barbamyli 0,08
Promedoli 0,025 aut
Aethylmorphini hydrochloridi 0,015
Sacchari 0,2
M. f. pulvis
D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 2—4 раза в день

Порошок антисептический биологический — Pulvis antisepticus biologicus

Состав:
Pulveris Naemae 7,0
Synthomycini 0,15
Sulfacyli-natrii 1,0
Novocaini 0,2

Выпускается в герметически закрытых флаконах

Антисептическое средство.
Применяется для лечения вяло заживающих ран и хронических язв (варикозных, трофических и т. д.)

Rp.: Pulveris antiseptici biologici 30,0

DS. Раневую поверхность сначала обрабатывают дезинфицирующим раствором, затем покрывают слоем порошка 1—2 мм

Порошок висмутовый сложный — Pulvis Bismuthi subnitratris compositum

Вязущее и антацидное (снижающее кислотность желудочного сока) средство.

Применяется для лечения гиперацидного гастрита и язвенной болезни желудка

Rp.: Bismuthi subnitratris
Pulveris radices Rhei $\bar{a}\bar{a}$ 0,25
Natrii hydrocarbonatis 1,0
M. f. pulvis
D. t. d. N. 40
S. По 1 порошку перед едой

Порошок зубной красный — Pulvis dentifricus ruber Зубной порошок, обладающий свойством нейтрализовать вредную для зубов кислотность содержимого полости рта, а также дезодорирующим эффектом

Rp.: Talci 20,0
Natrii hydrocarbonatis 50,0
Carmini 0,05
Olei Menthae piperitae gtt V
M. f. pulvis
DS. Для чистки зубов

Порошок зубной щелочной — Pulvis dentifricus alcalinus То же

Rp.: Natrii hydrocarbonatis
Talci
Boli albae $\bar{a}\bar{a}$ 20,0
Olei Menthae piperitae gtt SX
M. f. pulvis
DS. Для чистки зубов

Порошок лимоннокислый — Pulvis Acidi citrici Освежающее питье, усиливает секрецию желудка

Rp.: Sacchari 120,0
Acidi citrici 10,0
M. f. pulvis
DS. По 1 чайной ложке на $\frac{1}{2}$ —1 стакан холодной воды

Порошок лимонный шипучий — Pulvis aërophorus citratus То же

Rp.: Natrii hydrocarbonatis 50,0
Acidi tartarici 45,0
Sacchari 95,0
Olei Citri 1,0
M. f. pulvis
DS. По 1 чайной ложке на $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ стакана воды

Порошок слабительный — Pulvis
purgativus

Слабительное средство.
Применяется для лечения при-
вычных запоров и как вспомога-
тельное средство при геморрое
и парапроктите

1. Rp.: Sulfuris depurati 0,65
Magnesii subcarbonatis 0,15
Pulv. radice Rhei 0,1
M. f. pulvis
D. t. d. N. 20
S. По 1—2 порошка на ночь
2. Rp.: Sulfuris depurati 20,0
Kalii tartratis 40,0
Sacchari 30,0
Elaeosacchari Citri 10,0
3. Rp.: Sulfuris praecipitati 10,0
Acidi tartarici 20,0
Elaeosacchari Citri 30,0
Magnesii subcarbonatis 10,0
4. Rp.: Pulveris radice Rhei
Sulfuris
Magnesii subcarbonatis $\bar{a}\bar{a}$ 4,0
Acidi tartarici
Elaeosacchari Foeniculi $\bar{a}\bar{a}$ 15,0
5. Rp.: Sulfuris depurati
Magnesii oxydi
Sacchari lactis $\bar{a}\bar{a}$ 10,0
6. Rp.: Magnesii subcarbonatis 10,0
Pulv. rhizomatis Iridis 12,5
Pulv. Croci 1,5
Fructus Anisi vulgaris 7,5
Rhizomatis cum radicibus Valerianae 7,5
7. Rp.: Magnesii subcarbonatis 30,0
Elaeosacchari Foeniculi 20,0
Pulv. radice Rhei 7,5
8. Rp.: Magnesii subcarbonatis 4,0
Pulv. radice Rhei 1,0
Elaeosacchari Foeniculi 2,0

9. Rp.: Magnesii subcarbonatis
 Pulv. fructus Foeniculi
 Pulv. radices Iridis
 Pulv. radices Jalapae āā 5,0
 Kalii sulfatis 2,5
 Sacchari 15,0
 Olei Anisi vulgaris gtts V
10. Rp.: Natrii hydrocarbonatis 40,0
 Natrii sulfatis 10,0
 Acidi tartarici 30,0
11. Rp.: Natrii hydrocarbonatis 12,0
 Natrii sulfatis sicci 30,0
 Acidi tartarici 9,0
12. Rp.: Natrii hydrocarbonatis 2,5
 Natrii-Kalii tartratis 7,5
 Acidi tartarici 2,2
 M. f. pulvis
 DS. По 1 чайной ложке на прием (прописи № 2—9),
 запивая водой; детям — по щепотке (прописи
 № 6—9), прописи № 10—12 — разводить в $\frac{1}{2}$
 стакана воды

Порошок таниновый сложный — Pulvis Tannini compositum — Вяжущее, антисептическое и дезодорирующее средство.

Применяется при носовых кровотечениях, хроническом и остром рините, полипах, озене и т. п.

1. Rp.: Tannini 5,0
 Pulveris radices Iridis
 Folii Rosae
 Natrii tetraboratis āā 2,5
 Olei Rosae gtt I
2. Rp.: Acidi salicylici 0,25
 Tannini
 Natrii tetraboratis āā 2,5
 M. f. pulvis
 DS. Для вдвухания в нос

Постовского паста — Pasta Postovsky — Антисептическое и подсушивающее средство.

Применяется для лечения ожогов II степени, кожных заболеваний, сопровождающихся экссудацией

Rp.: Streptocidi 17,5
Sulfacyli-natrii 7,5
Bentoniti (Boli albae) 25,0
Aquae destillatae 50,0
M. f. pasta
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Прегнантол — Praegnantolum
N, N-Диэтил-2-(2-аллил-6-метоксифенокси)-этиламина гидрохлорид или цитрат

Синонимы: Ergoclin, Gravitol, Gyneton, Uterol, Uterotonyl
Выпускается в ампулах по 1 мл 1% раствора (гидрохлорид) и в таблетках по 0,02 (цитрат)
Срок годности — 3 года

Маточное средство, обладает слабым адренолитическим действием.

Применяют при первичной слабости родовой деятельности для ускорения обратного развития матки в послеродовом периоде, при маточных кровотечениях

Rp.: Praegnantoli citratis 0,02
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день после еды

Rp.: Sol. Praegnantoli hydrochloridi 1% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. Под кожу или в мышцу по 1 мл 1—2 раза в день

Прегнин — Praegninum
17 α -этинилтестостерон
Синонимы: Aethinyltestosteron, Aethisteron, Colutoid, Ethinone, Ethisteron, Gestoral, Lutocylol, Lutral, Nalutorial, Oraluton, Prapnone, Pregneninolon, Pregnin, Pregnoral, Produxan, Progestab, Progestin P, Progestoral, Prolutol, Proluton C, Syngestrotabs

Выпускается в таблетках по 0,01
Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Высшие дозы для взрослых:
разовая — 0,02, суточная — 0,06

Синтетический аналог гормона желтого тела (прогестерона)

Применяется при нарушении функции яичников, связанных с недостаточностью желтого тела, при маточных кровотечениях, при аменорее, гипо-олигоменорее, альгоменорее. При бесплодии прегнин назначается после предварительного применения эстрогенных препаратов. Препарат противопоказан при привычном, угрожающем и начинающемся выкидыше

Rp.: Praegnini 0,01
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1 таблетке 3 раза в день (под язык)

**Преображенского порошки — Pul-
veres Preobraschensky**

Антимикробное и сосудосуживающее средство.

Применяется для лечения острого ринита

Rp.: Streptocidi
Sulfadimezini
Norsulfazoli āā 1,0
Benzylpenicillini 20000 ED
Ephedrini hydrochloridi 0,05
M. f. pulvis
D. t. d. N. 20
S. Для вдувания в нос

**Преображенского спирт — Spiri-
tus Preobraschensky**

Местнораздражающее средство.

Применяется для рефлекторной терапии заболеваний двигательного аппарата (миозитов, артритов и т. п.) и периферической нервной системы (невриты и невралгии)

1. Rp.: Spiritus camphorati
Spiritus saponati
Spiritus formicici
Solutionis Ammonii caustici
Tincturae Capsici
Olei Petrolei āā 50,0
2. Rp.: Spiritus camphorati
Spiritus formicici
Solutionis Ammonii caustici
Tincturae Capsici āā 50,0
3. Rp.: Spiritus camphorati
Spiritus formicici
Tincturae Capsici
Solutionis Ammonii caustici āā 50,0
Olei Petrolei 100,0
MDS. Для растирания

Пресоцил — Presocyl (ВНР)

Состав на 1 таблетку:

Chingamini 0,00004
Prednisoloni 0,00075
Acidi acetylsalicylici 0,2

Хранение — список Б

Срок годности — 2 года;
(ВНР) — 5 лет

Противовоспалительное и противоаллергическое средство.

Применяется по тем же показаниям, что и «Преднизолон»

Rp.: Tabul. «Presocyl» N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

**Префизон — Praephyson (ФРГ,
Бельгия)**

Стандартизованный комплексный экстракт передней доли гипофиза

Выпускается в таблетках и в ампулах по 1 мл (25МЕ мите, 75МЕ форте)

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности ампул ФРГ — 1 год 6 мес., Бельгии — 3 года

Гормональный препарат. Применяют при болезни Дауна, кахексии Симондса, гипофизарном истощении и ожирении, гипогени- тализме, крипторхизме, энурезе, выпадении волос после родов, мигрени, астенодинамическом синдроме и др.

Rp.: Tabul. «Praephyson» N. 20
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: «Praephyson» 1 ml (25 ME)
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. Вводят под кожу и внутримышечно по 1—2 мл ежедневно, затем по 1 мл через день. В случае крайней необходимости препарат вводят внутривенно с 5% раствором глюкозы.

**Прилишко-ванна — Valneum Pri-
liško**

Местнораздражающее средство, заменитель натуральных сероводородных ванн.

Применяется для лечения заболеваний опорного аппарата, кожи, женских половых органов, сердечно-сосудистой системы и пр.

Rp.: Natrii sulfidi 80,0
Kalii hydrosulfatis 100,0
Natrii hydrocarbonatis 20,0
MDS. На одну ванну

**Примочка глазная желтая — Col-
lygium adstringens luteum**

Вяжущее и антисептическое средство. Применяется для лечения конъюнктивитов и блефаритов

1. Rp.: Zinci sulfatis 0,5
Aquae pro injectionibus 100,0
Spiritus camphorati gtts X

2. Rp.: Zinci sulfatis 0,3
Aluminis 0,1
Aque pro injectionibus 100,0
Tincturae Opii crocatae
Spiritus camphorati aa 1,0
MDS. Наружное (используется при заболевании глаз)

Примочка глазная квасцовая — То же
Collyrium adstringens aluminatum

1. Rp.: Aluminis 1,0
Aque Rosae
Aque Foeniculi aa 30,0

2. Rp.: Aluminis 4,0
Acidi borici 6,0
Aque pro injectionibus 200,0
MDS. Наружное (используется при заболевании глаз)

Примочка глазная меди нитрата То же
или сульфата — Collyrium ad-
stringens Cupri citratis seu sul-
fatis

1. Rp.: Cupri citratis 0,2
Aque pro injectionibus 60,0
Tincturae Opii simplicis 0,8

2. Rp.: Cupri sulfatis 0,2
Solutionis Ammonii caustici 1,0
Aque pro injectionibus 100,0
MDS. Наружное (используется при заболевании глаз)

Примочка глазная серебра ни- То же
трата — Collyrium adstringens Ar-
genti nitratis

Rp.: Argenti nitratis 0,05
Aque pro injectionibus 25,0
MDS. Наружное (используется при заболевании глаз)

Примочка глазная черная — Col- То же
lyrium adstringens nigrum

Rp.: Extracti Hyoscyami 1,0
Aquae Rosae 30,0
Aquae Calcis 100,0
Hydrargyri monochloridi 0,6
MDS. Наружное (используется при заболевании глаз)

Присыпка алсоловая — *Aspersio
Alsoli*

Свойства и применение — см.
«Алсол».

Rp.: Alsoli 7,5
Talci 800,0
Amyli 192,5
M. f. *aspersio*
DS. Наружное

Присыпка бензойная — *Aspersio
Acidi benzoici*

Антисептическое и подсушива-
ющее средство.
Применяется для профилактики
и лечения опрелостей в детской
практике

Rp.: Acidi benzoici 1,0
Talci 100,0
M. f. *aspersio*
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Присыпка борная — *Aspersio Acidi
borici*

То же

Rp.: Acidi borici 20,0
Lycopodii 80,0
M. f. *aspersio*
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Присыпка борная сложная — *As-
persio Acidi borici composita*

Антисептическое и подсушива-
ющее средство.

Применяется для борьбы с избы-
точной потливостью ног (№ 1—3,
5—7) и по тем же показаниям,
что и «Присыпка бензойная» (№ 4)

1. Rp.: Pulveris radice Iridis 1,0
Acidi borici 2,0
Amyli
Talci āā 4,0
2. Rp.: Natrii tetraboratis
Aluminis āā 40,0
Phenoli
Thymoli
Mentholi
Olei Eucalypti
Methylis salicylatis āā 4,0

3. Rp.: Thymoli 0,2
Acidi borici 24,0
Aluminis usti 12,0
Zinci oxydi
Magnesii subcarbonatis $\bar{a}\bar{a}$ 24,0
Mentholi 0,3
Talci 144,0
4. Rp.: Acidi borici 2,5
Talci 45,0
Amyli Tritici 12,5
Olei Gerani 0,1
5. Rp.: Acidi salicylici 12,0
Acidi borici 48,0
Lycopodii 100,0
Talci 240,0
Amyli 100,0
Olei Bergamottae 2,0
Olei Caryophyllorum 1,0
6. Rp.: Phenoli 2,0
Acidi borici 48,0
7. Rp.: Acidi borici 20,0
Zinci oleinatis 10,0
Talci 30,0
M. f. aspersio
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Присыпка висмутовая — Aspersio Bismuthi subnitratris

Вяжущее, антисептическое и подсушивающее средство.

Применяется для лечения ожогов и заболеваний кожи, сопровождающихся экссудацией

Rp.: Bismuthi subnitratris
Pulveris radices Iridis
Talci $\bar{a}\bar{a}$ 90,0
Olei Rosae
Olei Bergamottae $\bar{a}\bar{a}$ 0,1
M. f. aspersio
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Присыпка дерматоловая — Aspersio Dermatoli

То же

Rp.: Dermatoli 20,0
Talci 70,0
Amyli Tritici 10,0
Misce fiat aspersio
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Присыпка дерматоло-цинковая — То же
Aspersio Dermatoli zincata

Rp.: Dermatoli 10,0
Zinci oxydi 20,0
Talci 30,0
M. f. aspersio
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Присыпка ртути монохлорида — Препарат применяется для ле-
Aspersio Hydrargyri monochloridi чения бородавок

Rp.: Acidi salicylici 1,0
Acidi borici 3,0
Hydrargyri monochloridi
(Calomelanos) 6,0
M. f. aspersio
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Присыпка салициловая сложная — Свойства и применение — см.
Aspersio Acidi salicylici composita «Присыпка борная сложная»

1. Rp.: Acidi salicylici 1,0
Magnesii subcarbonatis 25,0
Talci 125,0
2. Rp.: Acidi salicylici 5,0
Aluminis 10,0
Amyli 40,0
Olei Bergamottae 1,0
Spiritus aethylici 90% 10,0
Talci 140,0
3. Rp.: Acidi salicylici 1,0
Zinci oxydi
Amyli Tritici āā 50,0
4. Rp.: Acidi salicylici 3,0
Xeroformii 2,0
Zinci oxydi 10,0
Amyli Tritici 85,0
5. Rp.: Acidi salicylici
Mentholi
Bismuthi subnitratiss
Zinci oxydi āā 10,0
Amyli Tritici
Plumbi carbonatis
Aluminis usti āā 30,0
Amyli Solani 70,0

6. Rp.: Acidi salicylici 3,0
Zinci oxydi 20,0
Amyli Tritici 27,0
Talci 50,0
Methylli salicylatis 0,1
M. f. aspersio
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Присыпка феноло-цинковая — Aspersio Phenoli zincata То же

Rp.: Phenoli 10,0
Zinci oxydi
Amyli Tritici
Talci āā 70,0
M. f. aspersio
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Присыпка цинковая — Aspersio Zinci То же

1. Rp.: Zinci oxydi 5,0
Lycopodii 10,0
 2. Rp.: Zinci oxydi
Pulveris radices Iridis āā 20,0
Talci 100,0
 3. Rp.: Pulveris radices Iridis 10,0
Zinci oxydi 30,0
Talci 60,0
 4. Rp.: Zinci oxydi
Amyli Tritici āā 10,0
M. f. aspersio
DS. Наносить на пораженные участки кожи
-

Присыпка щелочная — Aspersio alcalina Препарат применяется для лечения свежих ожогов II степени

Rp.: Natrii hydrocarbonatis 20,0
Magnesii subcarbonatis 5,0
M. f. aspersio
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Проастмин — Proastmin (ПНР)

Состав на 1 таблетку:
Ephedrini hydrochloridi 0,012
Theophyllini 0,12
Phenobarbitali 0,008

Хранение — список Б
Срок годности — 1 год

Спазмолитическое (бронхолитическое) и успокаивающее средство.

Применяют при бронхиальной астме, эмфиземе легких, пневмосклерозе и т. п.

Rp.: Tabul. «Proastmin» N. 20
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Прогресс — Progress

Свойства и применение — см.
«Присыпка борная сложная»

Rp.: Acidi salicylici
Mentholi
Bismuthi subnitratiss
Zinci oxydi aa 1,0
Amyli Triticis
Plumbi carbonatis
Aluminis usti aa 3,0
Amyli Solani 7,0
M. f. aspersio
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Прозоровского порошки — Pulveres Proserovsky

Снотворное и слабое анальгезирующее средство.

Применяется при бессоннице, связанной с неврозами или болезненным синдромом

Rp.: Barbitali 0,2
Kalii bromidi 0,1 (0,05)
Codeini phosphatis 0,015
Natrii hydrocarbonatis 0,3
M. f. pulvis
D. t. d. N. 10
S. По одному порошку на ночь

Прокопчука жидкость — Liquor Procoptschuk

Антисептическое средство.

Применяется для обработки мелких кожных повреждений (см. также «Коллодий синтомициновый»)

Rp.: Chlortetracyclini aut
Synthomycini 3,0
Spiritus aethylici 2,0
Collodii 100,0
MDS. Наносить на пораженные участки кожи

Проктол — Proctol

Вяжущее, антисептическое и болеутоляющее средство.

Применяется при обострениях геморроя

Rp.: Bismuthi iodogalictis 0,5
Calcii chloridi
Anaesthesini āā 0,08
Extracti Hamamelidis fluidi 0,25
Methylis salicylatis gtt I
Olei Cacao 2,0
M. f. suppositorium rectale
D. t. d. N. 12
S. По 1 свече 2 раза в день в задний проход

Прокуран — Procuran (ЧССР)
1, 10-Бис-триметил-декаметиленаммония йодид

Синонимы: Ceeten, Curalysin, Curam, Decacuran, Decamethonium, Decametone, Decontrax, Eulysin, Synacur, Syncurin(e)

Выпускается в ампулах по 2 мл 0,2% раствора

Хранение — список А, в защищенном от света месте

Срок годности — 3 года

Миорелаксант деполяризующего действия, по свойствам и применению близкий к «Дитилину». Отличается большей эффективностью и длительностью действия

Rp.: Sol. «Procuran» 0,2% 2 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. Внутривенно

Проперистол — Properistol (ЧССР)

Состав на 1 таблетку (драже):

Extracti Belladonnae 0,01

Podophyllini 0,03

Extracti laxativae 0,3

Хранение — в сухом месте

Слабительное и спазмолитическое средство.

Применяют при хроническом запоре, спастическом колите и т. п.

Rp.: Dragee «Properistol» N. 20
DS. По 1—2 драже на ночь

Пропер-мил — Propere-myl (Итал.)

Комплекс лиофилизированных грибов-сахаромицетов, т. е. дрожжей (*Cryptococcus albicans*, *Candida tropicalis*, *Saccharomyces cerevisiae*)

Препарат типа биогенных стимуляторов.

Применяют при лечении больных рассеянным склерозом. Курс лечения начинают с 200 000 клеток на одну инъекцию, ежедневно

Выпускается во флаконах в сухом виде. В одном флаконе «Пропер-мил» содержится 10 млн. дрожжевых клеток, что соответствует 10 мг сухого протеина

Хранение — в закрытых коробках

Срок годности — не ограничен

увеличивая на 200 000 клеток. Оптимальная доза — 500 000—600 000 дрожжевых клеток (2,5—3 мл раствора)

Rp.: «Proper-myl»

D. t. d. N. 10

S. Содержимое флакона развести в 5 мл 5% раствора глюкозы. Вводить внутривенно

Протамин — Protaminum (ЧССР)
Протамин сульфат — Protamini sulfas (ВНР)

Гидрохлорид или сульфат метилового эфира клупеина

Выпускается в ампулах по 5 мл 1% раствора

Хранение — в закрытых коробках

Срок годности — 2 года

Специфический антагонист гепарина.

Применяется при передозировке гепарина. Иногда может применяться для пролонгирования эффекта инсулина

Rp.: Sol. «Protamin» 1% 5 ml

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. По 1 ампуле внутривенно

Противоядие при отравлении металлами и алкалоидами — Antidotum metallorum et alcaloidem

Антидот, переводящий алкалоиды и металлы в нерастворимые таннаты.

Применяется при отравлении неизвестными алкалоидами или солями (до всасывания основного количества яда).

Rp.: Iodi 5,0

Spiritus aethylici 20,0

Pulveris Gallarum turcicae 100,0

Kalii tartratis 10,0

Sacchari 35,0

MDS. На первый прием — 2 чайные ложки, затем еще по 1 чайной ложке каждые полчаса, не более 3 раз

Протионамид — Protionamidum
2-Пропилизоникотинтиоамид

Противотуберкулезный препарат II ряда.

Применяется при привыкании к основным препаратам (стрепто-

Синонимы: Prothionamide, Tre-
vintix
Выпускается в драже по 0,25
Хранение — список Б
Срок годности табл. НРБ —
3 года; табл. ВНР — 5 лет

мицин, изониазид, ПАСК) в со-
четании с ними. Противопоказан
при болезнях печени
По своей природе близок к этн-
онамиду

Rp.: Prothionamidi 0,25
D. t. d. N. 50 in dragee (tabul.)
S. По 1—2—3 драже в день

Псориазин — Psoriasinum
Состав:
Dichloroethaethylsulfidi 0,1 *
Vasellini 2000,0
Выпускается в банках по 100,0
Срок годности — 1 год

Средство для лечения псориаза.
Больной слегка втирает мазь
во все очаги поражения (по на-
правлению роста волос), за исклю-
чением век, один раз в день, в те-
чение 6 дней. На 7-й день делают
перерыв, больной получает ванну
с мылом, меняет белье. Такие
циклы повторяют 2—3—4 раза.
См. также «Антипсориатикум»

Rp.: Ung. Psoriasini 100,0
DS. Наносить на пораженные участки тела

Пульмохин — Pulmochin (ЧССР)
Состав на 1 ампулу:
Chinini hydrochloridi 0,07
Camphorae 0,15
Olei Olivarum ad 2 ml
Хранение — в обычных усло-
виях
Срок годности — не ограничен

Препарат применяется при ле-
гочных болезнях — при пневмо-
нии, бронхопневмонии, бронхите,
плеврите и т. п.

Rp.: «Pulmochin» 2 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. Внутримышечно по 1—2 ампулы 1—2 раза в день

Пургал — Purgal
Состав на 1 таблетку:
Phenolphthaleini 0,1
Cacao 0,05
Sacchari 0,15
Vanillini q. s.

Слабительное средство.
Применяется для лечения при-
вычных запоров

Rp.: Tabul. Purgali N. 20
DS. По 1 таблетке на ночь

* Dichloroethaethylsulfid — иприт, БОВ кожноарывного действия.

Пургосан — Purgosan То же
Состав на 1 таблетку:
Phenolphthaleini 0,12
Massae Cacao saccharatae 0,18

Rp.: Tabul. Purgosani N. 20
DS. По 1 таблетке на ночь

Равкина микстура — Mixtura Rav- Успокаивающее средство.
kini Применяется при неврозах, нев-
растении, психастении и т. п.
По свойствам и применению близ-
ка к «Бехтерева микстуре»

Rp.: Infusi herbae Leonuri 12,0—200,0
Natrii bromidi 3,0 (5,0)
Barbitali-natrii 2,0 (3,0)
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Радикал — Radical Свойства и применение — см.
«Адоль»

Rp.: Acidi salicylici 3,0
Spiritus aethylici 90% 5,0
Collodii 42,0
Chlorophylli 0,1
MDS. Мозольная жидкость

Радикал-мозолин — Radical-mo- То же
solin

Rp.: Collodii 15,0
Acidi lactici 1,0
Acidi salicylici 2,0
Chlorophylli q. s.
MDS. Мозольная жидкость

Радобелин — Radobelin (ЧССР) Холинолитическое средство.
Сумма алкалоидов корня кра- Применяют при спазмах пище-
савки (*Atropa belladonna* L.) варительного тракта, желчных и
Выпускается в таблетках по почечнокаменных коликах, пар-
0,00025 кинсонизме и т. д.

Хранение — список Б

Rp.: Tabul. «Radobelin» 0,00025
D. t. d. N. 20
S. По 1 таблетке 1—3 раза в день

Рамнил — *Rhamnium* Слабительное средство.
Сухой стандартизованный препарат коры крушины (*Rhamnus frangula* L.) Применяют при привычных запорах
Выпускается в таблетках по 0,2
Хранение — в сухом месте
Срок годности — 2 года

Rp.: Rhamnili 0,2
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 2 таблетки на ночь

Распайля (Распая) жидкость — Местнораздражающее средство.
Liquor Raspaiillii Применяется для отвлекающей
терапии мигрени

Rp.: Natrii chloridi 6,0
Aquae destillatae 90,0
Spiritus camphorati 1,0
Solutionis Ammonii caustici 20,0
MDS. Смачивать лоб и виски при головной боли

Раствор альбумината железа — Препарат железа.
Solutio Ferri albuminatis Применяется для лечения гипохромных анемий различного происхождения

Rp.: Albumini sicci 35,0
Ferri trichloridi 120,0
Natrii hydrooxydi 3,0
Spiritus aethylici 150,0
Aquae Cinnamomi 100,0
Tincturae aromatici 2,0
Aquae destillatae ad 1000,0
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Приготовление: белок растворяют в 1000,0 воды; отдельно в 100,0 воды растворяют хлорид железа, и первый раствор вливают во второй тонкой струей при помешивании. Для полного осаждения альбумината железа смесь нейтрализуют 5% раствором едкого натра. Осадок многократно отмывают от хлоридов. Показателем полноты отмывки служит отсутствие помутнения промывной воды при добавлении нитрата серебра. Отмытый осадок растворяют добавлением раствора 3,0 едкого натра в 50,0 воды, добавляют спирт, коричневую воду и ароматную настойку и доводят объем водой до 1000 мл

Раствор альбумино-плацентарный — Liquor Placentae albuminatus

Препарат, полученный из сыроворотки плацентарной крови человека

Выпускается в ампулах по 50 и 100 мл 5%, 10% и 20% раствора

Хранение — в сухом, защищенном от света месте

Срок годности — 2 года

Коллоидный плазмозамещающий раствор.

Применяют в тех же случаях, как и плазму, — при травматическом и операционном шоке, ожогах, сопровождающихся дегидратацией и концентрированием крови, при гипопротенемии и гипоальбуминемии, при циррозе печени, длительных нагноительных процессах, при поражении желудочно-кишечного тракта, острым панкреатите и т. п. (см. «Поливинол»)

Rp.: Liq. Placentae albuminatis 5% (10% aut 20%) 50,0 (100,0)

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. Вводить внутривенно капельно по 100 мл 20%, 300 мл 10% и 500 мл 5% раствора

Раствор аммиака спирто-водный — Solutio Ammonii caustici spirituos-aquosa

Входит в состав различных линиментов как раздражающее средство (например, см. «Петролимент жидкий»)

Rp.: Solutionis Ammonii caustici 50,0

Spiritus aethylici 90% 100,0

MDS. Наружное

Раствор анестезирующий для инъекций — Solutio anaesthetica pro injectionibus

Местноанестезирующее средство для инфильтрационной анестезии. Отличается от 0,25% раствора новокаина большей эффективностью и длительностью действия

Rp.: Novocaini 0,125

Sovcaini 0,01

Aquae pro injectionibus 50,0

M. Sterilisetur!

DS. В операционную

Раствор дезинфицирующий — Solutio desinfiens

Раствор тройной — Solutio triplex

Дезинфицирующее средство. Применяется для обработки инструментов (не режущих)

Rp.: Solutionis Formaldehydi 20,0
Phenoli 1,5
Natrii carbonatis 7,5
Aquae destillatae 500,0
MDS. В перевязочную

Раствор йода спиртовой 1%, 2%, 3% — Solutio Iodi spirituosus 1%, 2%, 3% Средство йодной терапии. Внутрь применяется при тиреотоксикозе (см. «Микройод»), наружно — как антисептик

Срок годности 1%, 2%, 3% — 1 мес. 10% — 1 мес.; 5% — 3 года

Rp.: Iodi 10,0 (20,0, 30,0)
Spiritus aethylici 96% ad 1000,0
MDS. Для внутреннего и наружного употребления. Готовится так же, как и 10% раствор йода (см. Гос. фармакопею, изд. X)

Раствор йода обесцвеченный — Solutio Iodi decolorata Применение — см. «Микройод»

Rp.: Jodi
Natrii thiosulfatis
Aquae destillatae aa 10,0
Solutionis Ammonii caustici 16,0
Spiritus aethylici 90% 75,0
MDS. Внутрь по 1—3 капли 2—3 раза в день в молоко

Приготовление: к раствору йода и тиосульфата натрия в воде добавляют раствор аммиака, а затем, после взбалтывания, — этиловый спирт. Жидкость оставляют стоять в прохладном месте 3 дня, после чего фильтруют

Раствор калия перманганата — Solutio Kalii permanganatis Антисептическое средство. Применяется для промывания инфицированных ран при перевязках

Rp.: Kalii permanganatis 5,0
Aquae destillatae 1000,0
MDS. В перевязочную

Раствор камфоры хлороформный — Solutio Camphorae chloroformiata Местнораздражающее и слабое анестезирующее средство.

Применяется для снятия зубной боли, для растирания как средство отвлекающей терапии при заболеваниях опорного аппарата и периферических нервов (артриты, миозиты, невриты, радикулиты и пр.)

Rp.: Camphorae 3,0
Chloroformii 17,0
MDS. Наружное

Раствор ментола спиртовой — *Solutio Mentholi spirituosa*
Срок годности — 1 год

Местнораздражающее и успокаивающее средство.
Применяется для купирования приступа стенокардии

Rp.: Mentholi 1,0
Spiritus aethylici 70% 20,0
MDS. По 1—2 капли на кусочек сахара под язык

Раствор натрия гидрокарбоната глицириновый — *Solutio Natrii hydrocarbonatis glycerinosa*

Смягчающее кожу и обезжиривающее средство.
Применяется для обработки кожи рук

Rp.: Natrii hydrocarbonatis 1,0
Glycerini
Aquae destillatae āā 10,0
MDS. Наружное, наносить на кожу рук

Раствор натрия хлорида изотонический — *Solutio Natrii chloridi isotonica*

0,9% раствор хлорида натрия
Хранение — в обычных условиях
Срок годности (в ампулах) — 10 лет; после переконтроля — 10 лет

Солевое плазмозамещающее средство.

Применяют под кожу, внутривенно и в клизмах при больших потерях организмом жидкости и интоксикациях (токсическая диспепсия, ожоги, состояние после операций и пр.)

Rp.: Solutionis Natrii chloridi isotonicae 500,0
Sterilisetur!
DS. Для введения в вену или под кожу, капельно

Раствор новокаина 0,25% для приема внутрь — *Solutio Novocaini 0,25% pro uso interno*

Местноанестезирующее средство.

Применяется при болях в желудке и при рвоте, вызванной раздражением слизистой желудка

Rp.: Novocaini 0,5
Aquae destillatae 200,0
MDS. Во внутрь по 1 столовой ложке 2—3 раза в день

Раствор серы масляный сложный — Solutio Sulfuris oleosa composita

Антисептическое и акарицидное средство.

Применяется для лечения чесотки

Rp.: Sulfuris
Calcii carbonatis āā 50,0
Olei Olivarum 150,0
Saponis viridis
Spiritus aethylici diluti āā 300,0

MDS. После теплой ванны и обмывания тела зеленым мылом пораженные места кожи смазываются указанной жидкостью. Через 2 дня процедура повторяется, а еще через 2 дня больной принимает ванну

Раствор щелочной — Solutio alcalina

Раствор применяется для лечения кожных заболеваний, сопровождающихся экссудацией, зудом и болью (экзема, экссудативный диатез и др.)

Rp.: Natrii hydrocarbonatis 4,0
Kalii hydrocarbonatis 2,0
Aquae destillatae 220,0
Glycerini 3,0
Tincturae Opii simplicis 20,0
MDS. Для примочек

Раудиазин — Raudiazin (ПНР)

Симпатолитическое средство.

Состав на 1 таблетку:

Применяют при гипертонической болезни (I и II стадии)

Apressini 0,01

Reserpinī 0,0001

Хранение — список Б

Срок годности — 3 года

Rp.: Tabul. «Raudiazin» N. 30

DS. По $\frac{1}{2}$ —1—2 таблетки 1—3 раза в день

Раунатин — Raunatinum

Симпатолитическое, седативное и антиаритмическое средство.

Препарат содержит сумму алкалоидов раувольфии змеиной (*Rauwolfia serpentina*), в том числе резерпин, аймалин, аймалицин и др. Аналогичные препараты выпускают за границей под назва-

Применяется в основном для лечения гипертонической болезни I—II стадии, а также при аритмиях (в тех же случаях, что и «Аймаллин») и для лечения невро-

ниями: Gendon, Raudixin, Rau-
ripa, Rauwiloid, Rauwasan
Выпускается в таблетках по
0,002

Хранение — список Б
Срок годности ГДР — 3 года

зов и неврастении. Противопока-
зания и осложнения — см. «Ре-
зерпин»

Rp.: Raunatini 0,002
D. t. d. N. 50 in tabul.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Рахманова паста — Pasta Rach-
manovi

Хранение — в закупоренной по-
суде

Моющее и антисептическое сред-
ство.

Применяется для очистки кожи
рук от различных загрязнений
(масла, нефтепродукты и т. д.)

Rp.: Boli albae 1500,0
Saponis domestici liquidi 500,0
Terrae silicicae
Petrolei aa 250,0
Solutionis Acidi sulfurici 65—66% 75,0
Aquae 1000,0
M. f. pasta
DS. Для обработки рук

Приготовление: каолин, мыло и песок смешивают с керосином и при
постоянном помешивании добавляют раствор серной кислоты. Все опе-
рации проводят в деревянной таре

Ревманол — Reumanol (ПНР)

Состав на 1 таблетку:

Butadioni 0,1

Isopyrini 0,2

Хранение — список Б, в обыч-
ных условиях

Противовоспалительное, про-
тиворевматическое и анальгези-
рующее средство.

Применяется при ревматизме и
других коллагенозах (красная
волчанка), полиартритах, псори-
атической артропатии, склеродер-
мии, миозитах, невралгиях и
т. п. По свойствам близок к «Рео-
пирину». Содержит «Бутадион» и
близкий по строению и свойствам
к «Амидопирину» и «Анальгину»
препарат — изоиприн

Rp.: Tabul. «Reumanol» N. 20
DS По 1 таблетке 3 раза в день

Резерпин — Reserpinum

2, α 11-Диметокси-3-(3, 4, 5-три-метоксибензоилокси)-нохимбаи-1-метилкарбонат

Синонимы: Alserin, Apoplon, Arpsical, Bioserpine, Crystoserpine, Elserpine, Gamaserpin, Hiposerpil (ПНР), Interpina, Lemiserp, Mephaserpin, Neoserfin, Quiescin, Raudixoid, Raulen, Raupasil, Rausan, Rasedan, Rasedyl (BHP), Rautrin, Rauvilid, Resedril, Resercaps, Reserpamed, Reserpil, Sandril, Serpalan, Serpasil, Serpasol, Serpium, Sertensin и др.

Выпускается в таблетках по 0,0001 и 0,00025

Хранение — список Б

Срок годности ПНР — 3 года;

ЧССР — 6 лет; СССР — 5 лет; после переконтроля — 3 года

Симпатолитик и нейролептик.

Применяется в психиатрии в тех же случаях, что и «Аминазин», но менее эффективен. В терапевтической практике используется для лечения гипертонической болезни I—II стадии. Рекомендуется сочетать с ганглиоблокаторами («Пирилен», «Камфоний» и др.) и с салуретиками («Дихлотиазид»). Противопоказан при язвенной болезни желудка, сердечной декомпенсации, брадикардии. Наиболее частые осложнения — понос, насморк, экстрапирамидный синдром (паркинсонизм), головокружение, сонливость

Rp.: Reserpini 0,0001 (0,00025)

D. t. d. N. 100 in tabul.

S. По 1 таблетке на ночь

Резурол — Resulol

Вяжущее и антисептическое средство.

Применяется для обработки слизистой влагалища при кольпитах и т. д. Обладает сперматоцидным действием

Rp.: Acidi borici 25,0

Resorcini 6,0

Aluminis 14,0

Olei Menthae piperitae gttss II

M. f. pulvis

DS. По 1 порошку на кружку воды для спринцевания

Рекорд — Record

Кератолитическое средство. Свойства и применение — см. «Адоль»

Rp.: Acidi salicylici 1,2

Collodii 7,5

Olei Ricini

Acidi lactici aa 0,2

Alcanini 0,001

Spiritus aethylici 95% 1,0

MDS. Наносить на пораженные участки кожи

Ректозан — Rectosan

Свойства и применение — см. «Проктол», «Бетиол» и др. Применение особо показано при геморроидальных кровотечениях

Rp.: Dermatoli 0,5
Anaesthesini 0,05
Extracti Hamamelidis 0,25
Olei Cacao 2,0
M. f. suppositorium rectale
D. t. d. N. 10
S. По 1 суппозиторию в прямую кишку дважды в день

Ремиолан — Remyolan (ЧССР)

1, 2, 3-трис-(β-триэтиламмоний-этоксид)-бензолтригидроксида трийодид

Синонимы: Benzcurine iodide, Benzkurin, Flaxedil, Gallamoni jodidum, Parexyl, Relaxan, Relensin, Syntubin, Tricurin

Выпускается в ампулах по 5 мл 2% раствора

Хранение — список А
Срок годности — 2 года

Антидеполяризирующий миорелаксант.

По применению и свойствам близок к «Диплацину». Отличается довольно выраженным ганглиоблокирующим действием

Rp.: Sol. «Remyolan» 2% 5 ml
D. t. d. N. 5 in ampul.

S. Вводить внутривенно по 0,001 г на 1 кг веса

Реозолон — Reosolon (ВНР)

Состав на 1 таблетку:

Prednisoloni 0,002

Butadioni 0,1

Хранение — список Б

Срок годности — 2 года

Противоревматическое и противовоспалительное средство.

Применяется в основном для лечения ревматизма и коллагенозов

Rp.: Tabul. «Reosolon» N. 20

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Ретол-рутин — Retol-Rutin

(СФРЮ)

Состав на 1 таблетку (драже):

Nitroreptoni 0,01

Phenobarbitali 0,015

Rutini 0,02

Paraverini hydrochloridi 0,03

Theobromini 0,15

Хранение — список Б

Гипотензивное и сосудорасширяющее средство.

Применяют при атеросклерозе, коронарной недостаточности, головной боли, головокружении, шуме в ушах, болях в области сердца и т. п.

Rp.: Drag. «Retol-Rutin» N. 30
DS. По 1 драже 3—4 раза в день

**Рибофлавин-мононуклеотид —
Riboflavinum mononucleotidum**

Рибофлавин-5-монофосфат натрия

Синонимы: Alloxazinmononucleotid, Arcavit B₂, Cytoflav, Flavitol forte, Lactoflavinphosphat, Riboflavinmonophosphat, Ribofosfina

Выпускается в ампулах по 1 мл 1% раствора

Хранение — в защищенном от света месте

Срок годности — 1 год

Препарат витамина B₂.
Применяют как лечебное средство при авитаминозе B₂, при зудящих дерматозах, хронических экземах, нейродермитах и других кожных заболеваниях, как общеукрепляющее средство

Rp.: Solutionis Riboflavini mononucleotidi 1% 1,0
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. По 1 мл 1 раз в день внутримышечно

Ривера питье — Potio Riveri

Сокогонное средство.
Применяется при гипоацидных гастритах

1. Rp.: Kalii hydrocarbonatis 29,0
Succi Citri
Aquae destillatae āā 240,0
2. Rp.: Acidi citrici 4,0
Natrii hydrocarbonatis 9,0
Aquae destillatae 290,0
3. Rp.: Kalii hydrocarbonatis 29,0
Aquae destillatae 480,0
Acidi citrici 20,0
MDS. По $\frac{1}{4}$ стакана 2—3 раза в день перед едой

Ридинол — Ridinolum

1-Дифенил-3-(N-пиперидино)-пропанола-1 гидрохлорид
Синонимы: Parks, Pridinolhydrochlorid

Хранение — список А

Холинолитик.
Применяют при паркинсонизме, болезни Паркинсона, спастических параличах и т. п.

Rp.: Ridinoli 0,001 (0,005)
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке (0,005) 1 раз в день, постепенно увеличивая до 0,015—0,02 в день

Ридол — Ridol (ВНР)
Состав на 1 таблетку:
Homatropini methylbromidi 0,0015
Codeini 0,02
Histantini 0,08
Analgin 0,5
Хранение — список А
Срок годности — 2 года

Холинолитическое, обезболивающее и седативное средство.

Применяется при спазмах полых органов, невритах и невралгиях и т. п.

Примечание: гистантин — антигистаминное средство, близкое к дипразину

Rp.: Tabul. «Ridol» N. 10
DS. По 1—2 таблетки 2 раза в день

Рингера раствор физиологический — Solutio physiologica Ringeri

Солевой плазмозамещающий раствор.

Применяется по тем же показаниям, что и «Раствор натрия хлорида изотонический»; отличается от последнего большей сбалансированностью по ионному составу и изогидричностию

Rp.: Natrii chloridi 9,0
Kalii chloridi
Calcii chloridi
Natrii hydrocarbonatis $\bar{a}\bar{a}$ 0,2
Aquae pro injectionibus ad 1000,0
M. Sterilisetur!
DS. Для парентерального введения

Рингер — Локка раствор физиологический — Solutio physiologica Ringer — Lökk

То же

Rp.: Natrii chloridi 9,0
Kalii chloridi
Calcii chloridi
Natrii hydrocarbonatis $\bar{a}\bar{a}$ 0,2
Glucosi 1,0
Aquae pro injectionibus ad 1000,0
M. Sterilisetur!
DS. Для парентерального введения

Рингер — Локка таблетки — Tabulettae Ringer — Lökk

То же

Состав:
Natrii chloridi 0,9
Kalii chloridi
Calcii chloridi $\bar{a}\bar{a}$ 0,02
Natrii hydrocarbonatis 0,01
Glucosi 0,1
Срок годности — 1 год

Rp.: Tabul. Ringer — Lokk N. 100
DS. Развести 1 таблетку в 100 мл стерильной воды,
вводить парентерально

Риноль — Rinol

Антисептическое, сосудосуживающее и анестезирующее средство.

Применяется для лечения острого ринита (насморка)

Rp.: Anaesthesini 0,5
Solutionis Adrenalini hydrochloridi 1 : 1000 1,0
Olei Eucalypti gttss V
Mentholi 0,3
Acidi borici
Lanolini anhydrici
Vasellini aa 10,0
M. f. unguentum
DS. Смазывать слизистую носа 2—3 раза в день

Роватинекс — Rovatinex (ФРГ)

Комбинированный препарат, состоящий из эфирных и масляных веществ: камфена, чистого терпена, цинеола и др.

Выпускается во флаконах по 10 мл

Спазмолитическое средство, антисептик мочевых путей.

Применяется при заболеваниях почек, инфекции мочевыводящих путей, почечнокаменной болезни. По действию близок к «Цистеналу»

Rp.: «Rovatinex» 10 ml
DS. По 3—4 капли на сахаре 3 раза в день за 15—20 мин до еды. При повышенной кислотности желудочного сока следует принимать после еды

Ровахол — Rovachol (ФРГ)

Комбинированный препарат, содержащий ментол, ментон, чистый терпен, борнеол, камфен, реохризин, оливковое масло

Выпускается во флаконах по 10 мл

Спазмолитическое и желчегонное средство.

Применяется при холециститах, холангитах и гепатитах хронического воспалительного или токсического характера, а также для предупреждения камнеобразования. Близок к отечественному «Олиметину»

Rp.: «Rovachol» 10 ml
DS. По 3—4 капли на сахаре 3—4 раза в день за 15—20 мин до еды

Ровенал — Rovenal (ЧССР)

Состав на 1 таблетку:

Amidopyrini 0,25

Phenacetini 0,15

Coffeini

Phenobarbitali $\bar{a}\bar{a}$ 0,05

Хранение — список Б

Болеутоляющее и успокаивающее средство.

Применяется при головной боли, мигрени, невралгиях, зубной боли

Rp.: Tabul. «Rovenal» N. 20

DS. По 1—3 таблетки в день

Рогинской жидкость — Liquor Roginskae

Красящее средство для волос. Применяется в косметических целях

Rp.: Argenti nitratis 1,0—2,0

Aquae destillatae 80,0—86,0

Sulfuris 1,0—3,0

Spiritus aethylici 15,0—20,0

MDS. Наносить щеточкой на вымытые и высушенные волосы

Родовича спирт — Spiritus Rodovitschi

Местнораздражающее средство. По применению аналогично «Капсину», «Генэкспеллеру»

Rp.: Tincturae Opii simplicis

Spongillae fluviatilis $\bar{a}\bar{a}$ 1,0

Spiritus formicici

Tincturae Capsici $\bar{a}\bar{a}$ 12,0

MDS. Для растирания

Розенталя жидкость — Liquor Rosentali

Экстракт нафталанской нефти —
Extractum Naphthalani liquidum

По свойствам и применению препарат аналогичен «Мази нафталанной»

Rp.: Naphthalani liquidi

Spiritus aethylici 96% $\bar{a}\bar{a}$ 50,0

MDS. Наружное

Приготовление: равные объемы нафталанской нефти и спирта смешивают при взбалтывании в течение 2—3 мин. Образовавшуюся эмульсию отстаивают до расслаивания (2—3 суток). Верхний слой осторожно сливают и используют по назначению. Оставшийся внизу слой нафталанской нефти можно повторно экстрагировать несколько раз

Розенталя паста — Pasta Rosentali

По свойствам и применению препарат аналогичен «Линименту йодно-парафиновому»

1. Rp.: Iodi 3,0
Spiritus aethylici 20,0
Paraffini 30,0
Chloroformii 150,0
2. Rp.: Iodi 0,3
Paraffini 15,0
Spiritus aethylici 10,0
Chloroformii 80,0
MDS. Для растирания

Розентула порошки — Pulveres Rosentuli

Комплекс витаминов В₁, В₂, РР, С.

Применяется при соответствующих гипо- и авитаминозах, при беременности и реконвалесценции, при кожных заболеваниях (себорея, угри, хейлит и т. п.)

- Rp.: Acidi ascorbinici 0,05 (0,1)
Riboflavini 0,008 (0,01)
Thiamini bromidi (chloridi) 0,05 (0,08)
Acidi nicotini 0,05 (0,1)
Sacchari 0,2
M. f. pulvis
D. t. d. N. 50
S. По 1 порошку 3 раза в день

Ромазулан — Romasulan (СРР)

Препарат, содержащий смесь галеновых препаратов из ромашки (*Matricaria chamomilla*)

Состав 1 флакона:
Extracti Chamomillae 96,0
Olei Chamomillae 0,3
Azuleni 0,018
Twin-80 4,0

Хранение — в обычных условиях

Антисептическое и противовоспалительное (вяжущее) средство.

Применяется при воспалительных заболеваниях кожи и слизистых (вагиниты, уретриты, дерматиты, варикозные язвы и пр.) наружно, а также при гастритах и колитах внутрь и в клизме

Rp.: «Romasulan» 100,0

DS. Для наружного применения. Развести 1—2 ложки препарата в 1 л воды. Для применения внутрь $\frac{1}{2}$ чайной ложки развести в стакане горячей воды, принимать по 1 ложке 3 раза в день

Рубини камфора — Rubini camphora

Стимулятор центральной нервной системы.

Применяется при гипотонии, сердечной слабости, брадикардии и т. п.

Rp.: Camphorae

Spiritus aethylici āā 1,0

MDS. По 2—3 капли на сахаре 2—3 раза в день под язык

Румалон — Rumaton (Швейц., СФРЮ)

Экстракт из хрящей и красного костного мозга

Выпускается в ампулах по 5 мл

Срок годности — 5 лет; СФРЮ — 2 года

Средство тканевой терапии.

Применяется при артрозах, артритах и других заболеваниях опорно-двигательного аппарата

Rp.: «Rumaton» 5 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Для проверки индивидуальной переносимости проводят инъекцию в 0,3 мл, через 2 дня — 0,5 мл; в последующем — по 1 мл 3 раза в неделю

Рутаскорбин — Rutascorbin (ВНР)

Состав на 1 таблетку:

Rutini 0,02

Acidi ascorbinici 0,05

Хранение — в сухом, защищенном от света месте

Срок годности — 1 год

Препарат витамина Р.

Применяют в профилактических и лечебных целях при заболеваниях, сопровождающихся нарушением проницаемости сосудов

Рутофиллин — Rutophyllin (ЦССР)

Состав на 1 драже:

Rutini 0,02

Theophyllini 0,1

Phenobarbitali 0,015

Хранение — список Б

Срок годности — 1 год

Сосудорасширяющее и успокаивающее средство.

Применяют при гипертонической болезни и атеросклерозе, при стенокардии

Rp.: Dragee «Rutophyllin» N. 20

DS. По 1—2 драже 3 раза в день

Рыбакова мазь — Unguentum Rybakovi

Свойства и применение — см. «Мазь автоловая»

Rp.: Solidoli 75,0
Vaselini 20,0
Acidi borici 5,0
Mentholi 0,5
M. f. unguentum
DS. Наружное

Салинимент — Salinimentum

Противовоспалительное и обезболивающее средство.

Состав:

Methylii salicylatis

Chloroformii aa 10,0

Olei Hyoscyami 30,0

Выпускается во флаконах по 50 г

Срок годности — 1 год

Применяют при мышечном и суставном ревматизме, экссудативном плеврите, артритях и др.

Rp.: Salinimenti 50,0
DS. Для растирания

Сальвадор — Salvador

Свойства и применение — см. «Ровенал»

Состав на 1 таблетку:

Barbitali 0,075

Coffeini 0,08

Amidopyrini

Phenacetini aa 0,15

Хранение — список Б

Rp.: Tabul. «Salvador» N. 10
DS. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Санепил — Sanepil (ЧССР)

Противозпилептическое средство.

Состав на 1 таблетку:

Diphenini 0,08

Phenobarbitali 0,0185

Хранение — список Б

По свойствам и применению аналогично «Дифенину»

Rp.: Tabul. «Sanepil» N. 50
DS. По 1 таблетке 3 раза в день

Санитас — Sanitas

Свойства и применение — см. «Бом-Бенге», «Линимент метилсалицилата сложный» и т. п.

Состав:

Methylii salicylatis 24,0

Olei Eucalypti 1,2

Olei Terebinthinae 3,2

Camphorae 5,0

Axungiae porcinae

Vaselini aa 33,3

Выпускается в банках по 100 г

Rp.: «Sanitas» 100,0
DS. Для растирания

Санковой капли — Guttae Sankovae

Бронхолитическое средство.
Применяется для купирования приступов бронхиальной астмы

Rp.: Atropini sulfatis 0,025
Dimedroli 0,1
Novocaini 0,2
Kalii sulfatis 0,02
Glycerini 1,0
Solutionis Adrenalini hydrochloridi 0,1% 10,0
Solutionis Citrali 1% 0,3
MDS. Вдыхать из ручного ингалятора по 10 капель

Сапросан — Saprozan (CPP)
5, 7-Дихлор-8-гидроксихиналин

Синонимы: Acnosan, Afungil (ВНР), Chlorquinaldol, Floralbina, Gyno-Steroxin, Intensol, Siogental, Siogenon, Sioren, Siosteran, Sterosan, Steroxin, Zoosteran

Выпускается в драже по 0,1 и в таблетках по 0,01 (сапросан) и в виде 5% мази по 20,0 в тубе (афунгил)

Хранение — список Б

Химиотерапевтическое средство.
Применяют при энтеритах, энтероколитах, лямблиозе и других кишечных инфекциях внутрь. При местном применении оказывает противогрибковое действие

Rp.: Dragee «Saprozan» 0,1 (0,01)
D. t. d. N. 30
S. По 1—2 драже (по 0,1) или 10—20 таблеток (0,01) 3 раза в день

Саррацина гидротартрат — Sarracini hydrotartras

Алкалоид, выделенный из растения широколистного — *Se-
pescio platyphyllus* (MB) D. C.

Выпускается в таблетках по 0,01

Хранение — список Б

Срок годности — 3 года

Спазмолитическое средство.
Применяют при спазмах гладкой мускулатуры внутренних органов. По свойствам близок к платифиллину

Rp.: Sarracini hydrotartratis 0,01
D. t. d. N. 30 in tabul.
S. По 1—2 таблетки 3 раза в день

Сарколизин — Sarcolysinum
D, L-1-Амино-2-[пара-ди-(2-хлор-этил) аминофенил]-пропионовой кислоты гидрохлорид

Синонимы: Merfalan, Merphalan, Racemelphalanum, Sarcoclorin

Выпускается в таблетках по 0,01 и во флаконах по 0,02 и 0,04 в порошке (для инъекций)

Хранение — список А

Срок годности — 1 год

Противоопухолевое (цитостатическое) средство.

Применяется для лечения саркомы яичка, ретикулосаркомы, саркомы Юинга и других опухолей. При лечении необходим контроль за состоянием белой крови (недопустимы лейкопения ниже 3000, тромбоцитопения ниже 100 000 клеток в мм). Противопоказан при кахексии, анемии, лейкопении, поражениях почек, печени и сердца

Rp.: Sarcolysini 0,01

D. t. d. N. 12 in tabul.

S. По 3—5 таблеток 1 раз в неделю после еды

Rp.: Sarcolysini 0,02 (0,04)

D. t. d. N. 5

S. Содержимое флакона разводят в 10 (20) мл изотонического раствора натрия хлорида; вводить в полости по 0,02—0,06 раз в неделю

Сатитурани — Satiturani

Препарат содержит сумму гликозидов наперстянки ржавой (*Digitalis ferruginea* L.)

Выпускают в таблетках с активностью по 3 ЛЕД

Хранение — список Б

Срок годности — активность контролируется ежегодно

Кардиотоническое средство.

По свойствам и применению аналогично «Дигален-нео» и препаратам наперстянки пурпуровой

Rp.: Satiturani 0,05

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Сацерно — Sacerno (BHP)

3-метил-5-фенил-5-этил-гидантонин

Синонимы: Convulsan, Epilan, Insulton, Mephentyoin, Mesantoin, Sedantoin, Triantoin

Хранение — список Б

Антиэпилептическое средство, близкое по свойствам и применению к «Дифенину»

Rp.: «Sacerno» 0,1

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 2—6 таблеток в день

Сбор аппетитный — Species amarae

Сокогонное средство.

Применяется для рефлекторного возбуждения секреции желез слизистой желудка при гипоацидном гастрите, пониженном питании, состоянии реконвалесценции. Сборы № 1, 2, 3 производятся фармацевтической промышленностью, сбор № 4 снят с производства

1. Rp.: *Herbae Absinthii*
Rhizomatis Calami
Folii Menyanthidis
Fructus Carvi āā 20,0
2. Rp.: *Herbae Absinthii*
Herbae Millefolii āā 20,0
Radicis Taraxaci 10,0
3. Rp.: *Folii Menyanthidis*
Herbae Absinthii āā 70,0
Herbae Centaurii 60,0

Заваривают столовую ложку смеси в стакане кипятку, настаивают 20 мин, процеживают через марлю и принимают по 1 столовой ложке перед едой 3—4 раза в день

4. Rp.: *Herbae Absinthii* 80,0
Herbae Millefolii 20,0
MDS. Одну чайную ложку заваривают в 2 стаканах кипятку, пьют по 1 столовой ложке 2—3 раза в день перед едой

Сбор ветрогонный — Species carminativae

Вяжущее и антисептическое средство. Прекращает бродильные процессы в кишечнике, способствует уменьшению метеоризма, обладает умеренным послабляющим действием.

Применяется при острых и хронических колитах и энтероколитах, простой диспепсии и пр.

1. Rp.: *Florum Chamomillae*
Folii Menthae piperitae
Fructus Carvi āā 20,0
Fructus Foeniculi 30,0
Rhizomatis cum radicibus Valerianae 10,0
2. Rp.: *Florum Chamomillae*
Herbae Origani vulgaris āā 50,0

3. Rp.: Folii Menthae piperitae
Fructus Carvi
Fructus Foeniculi
Rhizomatis cum radicibus Valerianae āā 25,0
4. Rp.: Fructus Carvi 5,0
Florum Chamomillae 30,0
Rhizomatis cum radicibus Valerianae 20,0
5. Rp.: Folii Menthae piperitae
Fructus Foeniculi
Rhizomatis cum radicibus Valerianae āā 25,0
MDS. 1 столовую ложку смеси заваривать в стакане кипятку, настаивать 20 мин, процедить через марлю и принимать по 2 столовые ложки 3—4 раза в день

Сбор витаминный — Species vitaminicae

Растительная смесь, содержащая комплекс витаминов, главным образом провитамин А (каротин), витамины С, Р, группы В и др.

Применяется по тем же показаниям, что и другие витаминные комплексы (гипо- и авитаминозы, беременность, реконвалесценция, инфекционные болезни и т. п.)

1. Rp.: Fructus Rosae
Fructus Ribis nigri āā 50,0
2. Rp.: Fructus Rosae
Fructus Sorbi āā 50,0
MDS. Столовую ложку смеси заварить двумя стаканами кипятку, кипятить 10 мин, настаивать 4 ч в плотно закупоренной посуде в прохладном и темном помещении, процедить через марлю и пить по $\frac{1}{2}$ стакана 2—3 раза в день
3. Rp.: Folii Urticae 30,0
Fructus Sorbi 70,0
MDS. Смесь выпускается в виде тонкого порошка для изготовления киселей и для добавления к пищевым блюдам
4. Rp.: Fructus Rosae 30,0
Fructus Ribis nigri 10,0
Folii Myrticae
Dauci carotae āā 30,0
5. Rp.: Fructus Rosae 30,0
Fructus Rubi idaei 10,0
Folii Urticae 30,0

6. Rp.: Fructus Rosae
Fructus Rubi idaei āā 50,0
MDS. Столовую ложку смеси заварить двумя стаканами кипятку, кипятить 10 мин, настаивать 4 ч в плотно закупоренной посуде в прохладном и темном помещении, процедить через марлю и пить до $\frac{1}{2}$ стакана 2—3 раза в день

Сбор грудной — Species pectoralis

Отхаркивающее и антисептическое средство.

Применяется для облегчения сухого кашля при различных заболеваниях бронхов и легких

1. Rp.: Radicis Althaeae
Folii Farfarae āā 40,0
Herbae Origani vulgaris 20,0
2. Rp.: Folii Farfarae 40,0
Folii Plantaginis
Radicis Liquiritiae āā 30,0
MDS. Столовую ложку смеси заварить стаканом кипятку, настаивать 20 мин, процедить через марлю и пить 3 раза в день по полстакана после еды
3. Rp.: Folii Salviae
Fructus Anisi
Gemmarum Pini
Radicis Althaeae
Radicis Liquiritiae āā 10,0
4. Rp.: Folii Farfarae
Fructus Anisi
Radicis Althaeae
Radicis Liquiritiae āā 25,0
MDS. Столовую ложку заварить 2 стаканами кипятку, настаивать 20 мин, процедить через марлю и пить 3 раза в день по $\frac{1}{2}$ стакана как отхаркивающее
5. Rp.: Radicis Althaeae
Florum Althaeae
Florum Verbasci āā 20,0
MDS. Столовую ложку смеси заварить 2 стаканами кипятку, настаивать 20 мин, процедить через марлю и пить по $\frac{1}{2}$ стакана через каждые 3 ч
6. Rp.: Radicis Althaeae
Radicis Liquiritiae āā 20,0
Folii Salviae
Gemmarum Pini āā 10,0

7. Rp.: Radicis Althaeae
Radicis Liquiritiae $\bar{a}\bar{a}$ 20,0
Fructus Foeniculi 10,0

MDS. 1 столовую ложку смеси заварить 2 стаканами кипятку, охладить, процедить и принимать по 1—2 столовые ложки 3—4 раза в день

Сбор желудочный — Species stomachicae

Вяжущее, сокогонное и антисептическое средство.

Применяется для лечения хронических гастритов, преимущественно гипоацидных, а также язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

1. Rp.: Fructus Alni 20,0
Rhizomatis Bistortae 10,0

2. Rp.: Rhizomatis Tormentillae 10,0
Rhizomatis Bistortae 40,0

MDS. Две столовые ложки смеси заварить в стакане кипятку, настаивать $\frac{1}{2}$ ч, процедить через марлю и выпить в течение дня в 3—4 приема

3. Rp.: Corticis Frangulae 30,0
Folii Menthae piperitae 20,0
Folii Urticae 30,0
Radicis Calami

Rhizomatis cum radicibus Valerianae $\bar{a}\bar{a}$ 10,0

MDS. Две столовые ложки смеси заварить 2 стаканами кипящей воды, кипятить 20 мин, процедить через марлю и принимать после охлаждения 3 раза в день по $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ стакана

4. Rp.: Rhizomatis Bistortae
Rhizomatis cum radicibus Sanguisorbae $\bar{a}\bar{a}$ 50,0

MDS. 2 чайные ложки смеси заварить в стакане кипятку, настаивать $\frac{1}{2}$ ч, процедить через марлю и выпить в течение дня в 3—4 приема

5. Rp.: Florum Helichrysi 20,0
Folii Salviae 50,0
Fructus Carvi 10,0
Rhizomatis Tormentillae 20,0

MDS. 2 чайные ложки смеси заварить в стакане кипятку, настаивать до охлаждения, процедить через марлю и пить по полстакана за полчаса до еды

6. Rp.: Fructus Pruni padi 30,0
Fructus Myrtilli 20,0

MDS. 2 столовые ложки смеси заварить 2 стаканами кипящей воды, кипятить 20 мин, процедить через марлю и принимать после охлаждения 3 раза в день по $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ стакана

7. Rp.: Fructus Myrtilli
Rhizomatis Tormentillae
Florum Helichrysi
Folii Salviae
Fructus Carvi āā 10,0

MDS. 2 столовые ложки смеси заварить 2 стаканами кипящей воды, кипятить 10 мин, по охлаждении процедить через марлю, принимать 3 раза в день по полстакана за 15—20 мин до еды

Сбор желчегонный — Species
cholagogae

Желчегонное средство (холекинетик).

Применяется при хронических холециститах, дискинезии желчных путей, желчнокаменной болезни, гепатитах

1. Rp.: Florum Helichrysi 37,0
Folii Menyanthidis 28,0
Folii Menthae piperitae
Fructus Coriandri āā 18,0

2. Rp.: Florum Helichrysi 40,0
Folii Menyanthidis 30,0
Folii Menthae piperitae 20,0
Fructus Coriandri 10,0

MDS. 2 столовые ложки смеси заварить 2 стаканами кипящей воды, кипятить 10 мин, процедить через марлю и принимать по полстакана 3 раза в день за 15 мин до еды

3. Rp.: Florum Helichrysi 30,0
Pulveris radices Rhei 20,0
Folii Millefolii 50,0

MDS. 1 столовую ложку смеси заварить в стакане кипящей воды, остудить, процедить через марлю и выпить полстакана вечером (при желчнокаменной болезни)

4. Rp.: Florum Helichrysi 30,0
Folii Millefolii
Herbae Absinthii
Fructus Foeniculi
Folii Menthae piperitae āā 20,0

MDS. 2 столовые ложки смеси настаивать в 2 стаканах холодной воды 8 ч и выпить в течение дня

Сбор мочегонный — Species diureticae

Все прописи обладают умеренным мочегонным действием, а также являются антисептиками мочевыводящих путей. Пропись № 12 обладает также желчегонным эффектом.

Сборы применяются при инфекции мочевыводящих путей: пиелитах, циститах, почечнокаменной болезни, уретритах, застое мочи при стриктурах уретры и т. д. Сбор № 12 применяется при отеках различного происхождения (сердечных, печеночных, почечных) и в тех же случаях, что и «Сборы желчегонные»

1. Rp.: Folii Uvae ursi 60,0
Florum Cyani
Radicis Liquiritiae āā 20,0
2. Rp.: Folii Uvae ursi
Fructus Juniperi āā 40,0
Radicis Liquiritiae 10,0
3. Rp.: Folii Uvae ursi
Fructus Juniperi āā 40,0
Radicis Liquiritiae 20,0
4. Rp.: Fructus Juniperi
Herbae Equiseti āā 20,0
Rhizomatis Graminis 10,0
5. Rp.: Fructus Juniperi 40,0
Radicis Angelicae
Florum Cyani āā 30,0
MSD. Столовую ложку смеси заварить 2 стаканами кипятку, настаивать 15 мин, процедить через марлю и принимать по указанию врача
6. Rp.: Florum Cyani 10,0
Folii Uvae ursi 20,0
Fructus Petroselinī sativi 10,0
Gemmarum Betulae 10,0
Folii Menyanthidis 40,0
Radicis Inulae 10,0
7. Rp.: Fructus Juniperi
Gemmarum Betulae
Radicis Taraxaci āā 30,0
MSD. 2 чайные ложки смеси заварить в стакане кипящей воды, кипятить 10 мин, процедить через марлю и принимать по полстакана 3 раза в день за 20 мин до еды

8. Rp.: *Herbae Herniariae*
Folii Uvae ursi āā 50,0
 MDS. 2 столовые ложки смеси заварить в стакане кипятку, кипятить 5—10 мин, охладить, процедить через марлю и выпить в течение дня
9. Rp.: *Folii Betulae*
Herbae Equiseti āā 50,0
 MDS. 2 столовые ложки смеси заварить 2 стаканами кипятку, остудить, процедить через марлю и выпить в 3 приема в течение дня
10. Rp.: *Folii Uvae ursi* 30,0
Florum Cyani
Radicis Liquiritiae āā 10,0
11. Rp.: *Folii Uvae ursi* 20,0
Fructus Juniperi
Radicis Liquiritiae āā 10,0
 MDS. 1 столовую ложку смеси на стакан кипятку, остудить, процедить через марлю и принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день
12. Rp.: *Folii Orthosiphoni* 3,5
 D. t. d. N. 20
 S. Один пакет заварить стаканом кипятку, процедить через марлю, пить в теплом виде по $\frac{1}{2}$ стакана за 20—30 мин до еды 2 раза в день

Сбор потогонный — *Species dia-* Жаропонижающее (потогонное)
phoreticae средство.
 Применяется для профилактики и лечения простудных заболеваний

1. Rp.: *Fructus Rubi idaei*
Folii Farfarae āā 40,0
Herbae Origani vulgaris 20,0
2. Rp.: *Florum Tiliae*
Fructus Rubi idaei āā 50,0
 MDS. Две столовые ложки смеси заварить 2 стаканами кипятку, кипятить в закрытом сосуде в течение 5—10 мин, процедить и пить настоем горячим по стакану

Сбор противоастматический — Бронхолитическое средство.
Species antiasthmaticae Применяется для купирования приступов бронхиальной астмы

1. Rp.: Pulveris folii Stramonii
Pulveris folii Theae
Pulveris herbae Lobeliae
Kalii nitratis aa 10,0

Приготовление: селитру растворяют в горячей воде, смачивают раствором смеси порошков и тщательно высушивают

2. Rp.: Folii Hyoscyami 1,0
Folii Belladonnae 2,0
Folii Stramonii 6,0
Natrii nitratis 1,0

MDS. Сжигают половину чайной ложки и вдыхают дым или выкуривают папиросу или сигарету, набитую смесью сбора и табака («Астматол — Asthmatolum»)

Сбор слабительный — Species laxantes

Слабительное средство.
Применяется при привычных запорах, геморрое и т. д. (см. «Рамнил», «Экстракт ревеня» и др.)

1. Rp.: Corticis Frangulae 30,0
Herbae Meliloti
Folii Urticae aa 10,0
Natrii-Kalii tartratis 10,0

MDS. 1 столовую ложку смеси заварить в стакане кипятку, настоять 20 мин, процедить через марлю и пить на ночь по $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ стакана

2. Rp.: Fructus Anisi vulgaris
Fructus Foeniculi aa 10,0
Folii Sennae 40,0
Florum Sambuci 30,0

MDS. Заваривают столовую ложку в 2 стаканах кипятку, варят 10—15 мин, процеживают и пьют $\frac{1}{2}$ стакана 1—2 раза в день

3. Rp.: Corticis Frangulae
Folii Menyanthidis
Herbae Millefolii aa 20,0
Fructus Carvi 10,0

MDS. 1 столовую ложку смеси заварить в стакане кипящей воды, кипятить 10 мин, процедить через марлю, принимать по $\frac{1}{2}$ —1 стакану на ночь

5. Rp.: Folii Sennae 30,0
Corticis Frangulae
Fructus Anisi vulgaris
Radici Liquiritiae aa 10,0

6. Rp.: Folii Sennae
Herbae Millefolii
Corticis Frangulae
Fructus Coriandri
Radicis Liquiritiae āā 20,0

7. Rp.: Folii Sennae 60,0
Corticis Frangulae
Fructus Rhamni catharticae āā 50,0
Fructus Anisi vulgaris
Radicis Liquiritiae āā 20,0
MDS. Столовую ложку смеси заварить в стакане
кипятку, настаивать 30 мин, процедить сквозь
марлю, принимать на ночь по $\frac{1}{2}$ —1 стакану

**Сбор успокаивающий — Species
sedativae**

Срок хранения сборов, в со-
став которых входит трава, ли-
стья и цветки — от 1 до 2 лет,
плоды — от 2 до 3 лет, корни и
корневища — от 3 до 5 лет

Успокаивающее средство.
Применяется для лечения невро-
зов, неврастении, психастении
и т. п.

1. Rp.: Rhizomatis cum radicibus Valerianae 20,0
Florum Chamomillae 30,0
Fructus Carvi 50,0

2. Rp.: Folii Menthae piperitae
Folii Menyanthidis āā 20,0
Rhizomatis cum radicibus Valerianae
Humuli lupuli āā 10,0

3. Rp.: Folii Menthae piperitae 60,0
Folii Menyanthidis 30,0
Rhizomatis cum radicibus Valerianae 15,0
MDS. Заваривать как чай из расчета 1 столовой
ложки на стакан крутого кипятку, настаивать
20 мин, пить по 1 столовой ложке 2—3 раза
в день

4. Rp.: Rhizomatis cum radicibus Valerianae 15,0
Folii Menthae
Folii Menyanthidis āā 20,0
Humuli lupuli 10,0
MDS. 1 столовую ложку сбора заварить двумя ста-
канами кипятку, настоять 30 мин, процедить. Пить
по полстакана 2 раза в день (утром и вечером)

Седальгин — Sedalgin (НРБ)

Состав на 1 таблетку:

Codeini phosphatis 0,01

Coffeini 0,05

Acidi acetylsalicylici

Phenacetini aa 0,2

Phenobarbitali 0,025

Хранение — список Б

Срок годности — не ограничен

Обезболивающее, противовоспалительное и успокаивающее средство

Применяют при головной боли, мигрени, невралгии, невритах, артритах ревматического и иного характера, ишиалгии, люмбаго, послеродовых и послеоперационных болях и т. д.

Rp.: Tabul. «Sedalgin» N. 10

DS. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Седастмон — Sedastmon (ЧССР)

Состав на одну ампулу:

Adrenalini hydrochloridi 0,0008

Extracti hypophysis 1,2 ME

Aquae pro injectionibus 1 ml

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Бронхолитическое и сосудосуживающее средство.

Применяется при бронхиальной астме, ангионевротическом отеке, сывороточной болезни и т. п.

Rp.: «Sedastmon» 1 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 0,3—0,5 мл под кожу

Седобелин — Sedobelin (ЧССР)

Состав на 1 драже:

Radobelini 0,00025

Phenobarbitali 0,05

Paraverini hydrochloridi 0,02

Extracti Crataegi sicci 0,1

Хранение — список Б

Холинолитическое и спазмолитическое средство.

Применяется при спазмах пищеварительного тракта, спастических колитах, желчных и почечных коликах и др.

Rp.: Drag. «Sedobelin» N. 20

DS. По 1 драже 3 раза в день

Седолор — Sedolor (ЧССР)

Состав на 1 таблетку:

Phenacetini 0,3

Amidopyrini 0,15

Coffeini 0,05

Хранение — список Б

Срок годности — 5 лет

Анальгетическое и антипиретическое средство.

Применяется при головной, зубной боли, заболеваниях опорного аппарата, лихорадке и т. п.

Rp.: Tabul. «Sedolor» N. 10

DS. По 1 таблетке 3 раза в день

Секадол — Secadol (ВНР)
Состав на 1 драже:
Ergotamini tartratis 0,001
Coffeini 0,1
Хранение — список А
Срок годности — 4 года

Препарат применяется при мигрени и головных болях другого происхождения

Rp.: Drag. «Secadol» N. 10
DS. По 2—6 драже в день

Селисского мазь — Unguentum Selissky

Свойства и применение — см. «Мазь автоловая»

Rp.: Autoli 85,0
Acidi stearinici 12,0
Zinci oxydi 3,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Селисского мазь засыхающая — Unguentum exsiccans Selissky

Антисептическое средство, обладает защитными свойствами по отношению к коже рук.

Применяется для профилактики кожных заболеваний на производстве

Rp.: Gelatinae medicinalis 20,0
Aquaе destillatae 400,0
Glycerini 150,0
Amyli 175,0
Talci 250,0
Olei Helianthi (aut
Olei jecoris Aselli) 100,0
Acidi borici 15,0
M. f. unguentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи

Приготовление: крахмал и тальк растирают в ступке с маслом или рыбьим жиром. Желатин растворяют в воде на водяной бане, добавляют борную кислоту. После остывания раствор прибавляют небольшими порциями к смеси порошков с жиром при постоянном помешивании

Селисского мазь защитная — Unguentum tegans Selissky

То же

1. Rp.: Gelatinae medicinalis 20,0
Aquaе destillatae 380,0
Talci 225,0
Amyli
Glycerini āā 150,0
Zinci oxydi 75,0
Olei Lini aut
Olei Helianthi 100,0
Acidi benzoici 2,0
(aut Acidi borici 15,0)

2. Rp.: Gelatinae medicinalis 20,0
Aquaе destillatae 400,0
Talci 250,0
Amyli
Glycerini āā 175,0
Zinci oxydi 150,0
Olei Lini aut
Olei Helianthi 100,0
Acidi borici 15,0
M. f. unguentum
DS. Наружное

Сельского мазь пенициллино-
вая — Unguentum Penicillini Se-
lisky

Антисептическое средство.
Свойства и применение — см.
«Мазь пенициллиновая»

Rp.: Benzylpenicillini 500 000 ED
Cerae flavae 5,0
Olei Persicorum 45,0
Gelatinae medicinalis 2,0
Aquaе destill. 48,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Сельцовского жидкость — Liqueur
Seltsovsky

Свойства и применение — см.
«Петрова жидкость»

1. Rp.: Natrii chloridi 7,0
Kalii chloridi 0,2
Magnesii sulfatis 0,04
Glucosi 54,2
Liquoris Veibeli 3,3
Spiritus aethylici 96% 80,0
Aquaе pro injectionibus ad 1000,0
M. Sterilisetur!

Приготовление: этиловый спирт добавляют к стерилизованной смеси остальных компонентов

2. Rp.: Glucosi 30,0
Kalii chloridi 0,06
Magnesii sulfatis 0,016
Spiritus aethylici 96% 26,0
Aquae pro injectionibus ad 100,0
M. Sterilisetur!
DS. Внутривенно. Капельно, разводя в 200 мл изотонического раствора хлорида натрия

Сентон — Sention (Голл.)
Комбинированный препарат, состоящий из гормонов, витаминов и минеральных веществ
Выпускается в капсулах

Неспецифическое общеукрепляющее средство.

Применяется для борьбы с симптомами старения, атеросклерозом, пародонтозом. Предназначается для пожилых людей, страдающих быстрым физическим утомлением, слабостью, истощением, повышенной склонностью к инфекционным заболеваниям, расстройством кишечника, печени. См. «Геровит»

Rp.: Capsul. «Sention» N. 30
DS. По 2 капсулы в день, запивать небольшим количеством воды

Сеппа микстура — Mixtura Seppi
Храпение — список А

Успокаивающее средство.

Применяется при неврозах, неврастении, истерии, связанных с болевым синдромом

Rp.: Natrii bromidi 2,0
Omnoponi 0,08
Adonisidi 5,0
Aquae Menthae piperitae 200,0
MDS. По одной столовой ложке 2 раза в день

Серейского порошки — Pulveres Sereisky

Противоэпилептическое средство.

Применяется в основном при больших припадках. Доза фенобарбитала зависит от тяжести заболевания

Rp.: Phenobarbitali 0,05 (0,07—0,1—0,15)
Bromisovali 0,2 (0,3)
Coffeini-natrii benzoatis 0,015 (0,02)
Papaverini hydrochloridi 0,03 (0,04) aut
Tipheri 0,05 (0,06)
Calcii gluconatis 0,5 (1,0)
M. f. pulvis
D. t. d. N. 50
S. По 1 порошку 3 раза в день

Сернатлиз — Sernatlis

Кератолитическое средство.
Применяется в отологии для растворения ороговевшего эпителия при хроническом адгезивном отите

Рр.: Solutionis Natrii sulfatis 1% 10,0
Lysoli 1% gtts V
MDS. Закапывать в ухо по специальной методике

Серотрансфузин ЦИПК — Sero-transfusinum

Коллоидно-солевой плазмозамещающий раствор.

Состав:
Natrii chloridi 7,5
Kalii chloridi 0,2
Magnesii chloridi 0,1
Dinatrii phosphatis 0,476
Mononatrii phosphatis 0,052
Glucosi 10,0
Aquae pro injectionibus ad 1000 ml
Выпускается в ампулах по 250 мл
Хранение — при температуре 4—6°
Срок годности — не ограничен

Применяют при шоке без кровопотери или с умеренной кровопотерей, при ожоговом шоке, при тяжелых интоксикациях и обезвоживании организма и т. п.

Рр.: Serotransfusini 250 ml
D. t. d. N. 1 in ampul.
S. Вводят под кожу и внутривенно, смешав предварительно с сывороткой крови человека в соотношении 4 : 1

Сигетин — Sygethinum

Мезо-3,4-ди-(пара-сульфофенил)-гексана дикалиевая соль
Синоним: Sigetin
Выпускается в таблетках по 0,05 и 0,1 и в ампулах по 2 мл 1% раствора
Хранение — список Б, в защищенном от света месте
Срок годности таблеток — 2 года; ампул — 1 год; после переконтоля — 6 мес.

Маточное средство, обладает также эстрогенными свойствами и вследствие этого тормозит секрецию гонадотропных гормонов.

Препарат применяется для стимуляции сокращений матки при родах, а также при нарушениях овариально-менструального цикла

Рр.: Sol. Sygethini 1% 2 ml
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. По 1 ампуле внутривенно или внутримышечно

Rp.: Sygethini 0,05 (0,1)
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1—2 таблетки 2 раза в день

**Симановского мазь — Unguentum
Simanovsky**

Сосудосуживающее, противовоспалительное и анестезирующее средство.

Применяется для лечения острого ринита (насморк)

Rp.: Cocaini hydrochloridi 0,1
Mentholi 0,2
Zinci oxydi 1,2
Lanolini 20,0
Vasellini 30,0
M. f. unguentum
DS. Для закладывания в нос

Синалар-Н — Synalar-N (СФРЮ)

6 α , 9 α -Дифтор-16 α -оксипреднизолон 16, 17-ацетонид

Синонимы: Flucort, Fluocinolone acetonid, Localyn, Synandone, Topiclyn

Состав:

Synalari 0,0075

Neomycini sulfatis 0,15

Basis unguenti ad 30,0

Выпускается в тубах по 5, 15 и 30 г

Срок годности мази синалар — не ограничен

Противовоспалительное, антибактериальное и противоаллергическое средство. Мазь содержит синтетический заменитель глюкокортикоидов (см. «Дексаметазон», «Преднизолон») и антибиотик.

Применяется для лечения всевозможных аллергических кожных заболеваний (экзема, дерматиты и дерматозы, псориаз и т. д.). Выпускается мазь «Синалар», не содержащая неомицина, но ее применение нежелательно, особенно при наличии инфекции, так как мазь ослабляет защитные функции кожи

Rp.: Ung. «Synalar-N» 30,0
DS. Наносить на пораженные участки кожи

**Синицина раствор — Solutio Sini-
cyni**

Дезинфицирующее средство.

Применяется для обработки инструментария (см. «Раствор тройной»)

Rp.: Phenoli 3,0
Natrii carbonatis 15,0
Solutionis Formaldehydi 20,0
Aquae destillatae 1000,0
Solutionis Acidi borici 3% 200,0
MDS. В перевязочную

Синкумар — Syncumar (ВНР)
3-[α -(4-нитрофенил)- β -ацетил-этил]-4-оксикумарин

Синонимы: Асеносумарин, Асепосумарол, Neo-Sintrom, Nicoumalone, Sinthrome, Syncoumar, Trombostop

Выпускается в таблетках по 0,004

Хранение — список А
Срок годности — 5 лет

Антикоагулянт непрямого действия, по свойствам и применению аналогичный «Дикумарину». Отличается меньшими кумулятивными свойствами

Rp.: Tabul. «Syncumar» 0,004

D. t. d. N. 20

S. В первый день назначают 3—4 таблетки, второй день — 2—3 таблетки, в следующие дни $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ —1 таблетку в день

Сироп калия йодида — Sirupus Kalii iodidi

Антитиреоидное и отхаркивающее средство.

Применяется для лечения гипертиреоза, атеросклероза, катаракты, при сухом кашле и др.

Rp.: Kalii iodidi 1,0
Sirupi simplicis 100,0

MDS. По 1 чайной ложке 3—4 раза в день

Сироп мятный — Sirupus Menthae

Препарат применяется как исправляющее вкус и запах средство в составе многих прописей для внутреннего употребления

Rp.: Folii Menthae piperitae 10,0
Spiritus aethylici 90% 5,0
Aquae destillatae
Sacchari aa 60,0

MDS. Добавлять в различные микстуры из расчета 1—3 г на прием

Приготовление: листья мяты смачиваются спиртом и настаиваются на воде сутки при 15—20° и непрерывном помешивании. Настой фильтруют, к 40 его частям прибавляют 60 частей сахара и доводят до кипения

Сироп пиперазина адипината — Sirupus Piperazini adipinatis

Свойства и применение — см. «Пиперазина адипинат»

Rp.: Piperazini adipinatis 5,0
Acidi citrici 2,0
Sirupi simplicis 72,0
Natrii benzoatis 0,1
Aquae destillatae 20,0
MDS. По 1 чайной ложке 3—4 раза в день

Сироп противокашлевой — Sirupus contra tussim Отхаркивающее средство.
Применяется при сухом кашле различного происхождения

Rp.: Sirupi simplicis 85,0
Tincturae Ledi palustris 15,0
MDS. По 1 чайной ложке 3—4 раза в день

Сиротинина, пилюли — Pilulae Sirotonini Успокаивающее средство.
Применяется в тех же случаях, что и «Бехтерева драже»

Rp.: Chlorali hydrati 3,0
Bromcamphorae 2,5
(aut Kalii bromidi)
Extracti Valerianae q. s.
Ut f. pilulae N. 30
DS. По 1 пилюле 3 раза в день

Систонал — Sistonol (ЧССР) Гемостатическое средство.
Тромбопластическое вещество, выделенное из крови животных
Применяется при кровотечениях различного происхождения
Выпускается в ампулах по 10 мл
Хранение — в прохладном, защищенном от света месте
Срок годности — 1 год

Rp.: «Sistonol» 10 ml
D. t. d. N. 5 in ampul.
S. По 1—2 ампулы под кожу

Скабиол — Scabiol Противопаразитарное (акарицидное) и антисептическое средство.
Применяется для лечения чесотки

Rp.: Balsami peruviani aut Vinylini 10,0
Styracis liquidi 30,0
Spiritus aethylici absoluti 200,0
Olei Ricini 40,0
MDS. Наносить на пораженные участки кожи

Склерофиллин — Sclerophyllin
(ЧССР)

Состав на 1 драже:
Methylcholini bromidi 0,007
Theophyllini 0,015
Theobromini
Phenobarbitali $\bar{a}\bar{a}$ 0,01
Natrii iodidi 0,003

Хранение — список Б
Срок годности — 3 года

Холинолитическое и гипотензивное средство.

Применяют при атеросклерозе, гипертонической болезни I стадии и т. д.

Rp.: Drag. «Sclerophyllin» N. 20
DS. По 1—3 драже 1—3 раза в день после еды

Скобутил — Scobutyl (ВНР)

N-Бутилскополамина бромид
Синонимы: Bulamin, Buscapina, Buscopan, Butylscopolamini bromidum, Butylspasmin, Hyoscinebutylbromid, Safalgin, Scopolaminebutylbromid, Spasmamina

Выпускается в ампулах по 1 мл
Хранение — список А, в защищенном от света месте
Срок годности — 5 лет

Холинолитическое средство, по свойствам близкое к скополамину.

Применяют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при морской и воздушной болезни, спастических запорах, при дискинезии желчных путей и т. д.

Rp.: Sol. «Scobutyl» 1 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. Внутримышечно глубоко и внутривенно медленно по 1—3 ампулы в день

Скутамил — Scutamil (ВНР)

N-Изопропил-2-метил-2-пропил-1,3-пропандиолдикарбамат
Синонимы: Apesan, Arusal, Atonalyt, Brianil, Caprodat, Carisoma, Carisoprodatum, Carisoprodol, Carisoprol, Carsodol, Diolene, Dolajan, Flexartal, Isobamate, Meprodat, Miocalma, Mioridol, Mioril, Promiodol, Rela, Sanoma, Soma, Somadril, Somalgit, Somanil, Strialgin, Tonolyt

Выпускают в драже по 0,2 и 0,25
Хранение в обычных условиях
Срок годности — 5 лет

Анальгезирующее и противовоспалительное средство.

Применяют при ревматоидном артрите, спондилезе, неврите седалищного нерва, невралгии, люмбаго, артрозах и др. Выпускается также «Скутамил-Ц», содержащий дополнительно парацетамол и отличающийся более сильным эффектом

Rp.: Drag. «Scutamil» 0,2 (0,25)
D. t. d. N. 50
S. По 1 драже 3 раза в день после еды. Драже проглатывают, не разжевывая

Словалгин — Sivalgin (ЧССР)

Состав на 1 таблетку:

Amidopyrini

Phenacetini $\bar{a}\bar{a}$ 0,15

Coffeini

Thiophenantoini $\bar{a}\bar{a}$ 0,05

Препарат по свойствам и применению аналогичен «Ровеналу»

Рр.: Tabul. «Sivalgin» N. 10

DS. По 1—2 таблетки 1—3 раза в день

Смесь аналептическая —

Mixtura analeptica

Состав на 1 ампулу:

Coffeini-natrii benzoatis

Corazoli $\bar{a}\bar{a}$ 0,01

Strychnini nitratis 0,00005

Pycrotoxini 0,00005

Aquae pro injectionibus ad 1 ml

Хранение — список А

Срок годности — 1 год

Аналептик.

Применяют при асфиксии новорожденных, отравлениях барбитуратами и других патологических состояниях для возбуждения дыхания и сердечно-сосудистой системы

Рр.: Mixturae analepticae 1 ml

D. t. d. N. 3 in ampul.

S. 1 мл препарата смешивается с 5 мл изотонического раствора хлорида натрия или 5% раствора глюкозы, вводится в вену пупочного канатика в течение 1 мин

Смесь литическая —

Mixtura lytica

Состав:

1. Sol. Aminazini 2,5% 2 ml

Sol. Diprazini 2,5% 2 ml

Sol. Promedoli 2% 1 ml

2. Sol. Aminazini 2,5% 2 ml

Sol. Dimedroli 2% 2 ml

Sol. Promedoli 2% 2 ml

3. Sol. Aminazini 2,5% 2 ml

Sol. Aethyzini 0,5% 5 ml

Sol. Promedoli 2% 2 ml

Хранение — список А

Срок годности — 2 года

Седативное, нейроплегическое и обезболивающее средство. Усиливает эффект наркотических веществ, сокращая их расход во время операции, снижает реакции организма на операционную травму, снимает психическое напряжение больного перед операцией. Применяется по полдозы накануне операции и за 1—2 ч до нее. Препарат может вызвать гипотензию и урежение дыхания

Рр.: Mixturae lyticae № 1; 2; 3—5 ml

Sterilisetur!

DS. Внутримышечно за 1 ч до операции по 2,5 мл

**Сок подорожника —
Succus Plantaginis**

Консервированный 20% спиртом и 0,15% метабисульфита калия сок надземных частей подорожника большого (*Plantago major* L.) и подорожника блошного (*Plantago psyllium* L.)

Срок годности — 1 год 6 мес.

Сокогонное средство (горечь).
Применяется при гипоацидных гастритах

Rp.: Succus Plantaginis 250,0

DS. По 1 столовой ложке 3 раза в день за 15—20 мин до еды. Принимать в течение 30 дней

**Соксидил — Soxidyl (БНР)
4,4'-Диазоамилокси-тиокарбанилид**

Выпускается в таблетках по 0,5

Хранение — в хорошо укупленных банках

Противотуберкулезный препарат II ряда.

Применяют при туберкулезе в сочетании с другими противотуберкулезными средствами (ГИНК, циклосерин, пиразинамид, этнонамид) в свежих случаях и в хронических стадиях туберкулеза, также в случаях, резистентных к другим туберкулостатическим препаратам

Rp.: Tabul. «Soxidyl» 0,5

D. t. d. N. 30

S. По 6—12 таблеток ежедневно

Солкосерил — Solcoseryl (СФРЮ)

Депротенизированный экстракт крови крупного рогатого скота

Содержит неорганические соли, органические примеси (аминокислоты, кетокислоты, оксикислоты, дезоксирибонуклеазу, пурины, полипептиды)

Хранение — в защищенном от света месте

Биогенный стимулятор.

Применяется при ожогах, кожных пересадках, для профилактики поражений ионизирующей радиацией, гангрене

Rp.: «Solcoseryl» 1 ml

D. t. d. N. 3 in ampul.

S. Внутримышечно или внутривенно по 1 мл ежедневно

Солутан — Solutan (ЧССР)

Состав:

Extracti Belladonnae fluidi 0,01
Extracti Stramonii 0,016
Extracti Primulae
Ephedrine hydrochloridi $\bar{a}\bar{a}$ 0,017
Natrii iodidi 0,1
Novocaini 0,004
Glycerini et Spiritus aquosi ad 1,0

Выпускается во флаконах по 50 мл

Срок годности — 3 года

Бронхолитическое и отхаркивающее средство.

Применяется при бронхиальной астме, хронических бронхитах, эмфиземе легких и т. п.

Rp.: «Solutan» 50 ml

DS. По 10—30 капель 3 раза в день после еды

Соль карловарская искусственная — Sal carolinum factitium

Состав:

Natrii sulfatis 22,0
Natrii hydrocarbonatis 18,0
Natrii chloridi 9,0
Kalii sulfatis 1,0

Срок годности — 1 год

Слабительное средство, обладает умеренным антацидным и желчегонным действием.

Применяется для лечения запоров, гиперацидных гастритов, холециститов, колитов и т. п.

Rp.: Salis carolini factitii 100,0

DS. $\frac{1}{2}$ —2 чайные ложки растворяют в $\frac{1}{2}$ стакана теплой кипяченой воды (на прием)

Соль морская искусственная — Sal marinum factitium

Препарат служит заменителем морских купаний

1. Rp.: Kalii bromidi
Kalii iodidi $\bar{a}\bar{a}$ 10,0
Calcii chloridi sicci 200,0
Magnesii sulfatis dilapsi 1000,0
Natrii chloridi 500,0
 2. Rp.: Natrii chloridi 150,0
Kalii chloridi 20,0
Calcii chloridi cristallisati 300,0
Magnesii chloridi 25,0
Lithii chloridi 1,0
Kalii iodidi 0,5
Kalii bromidi 10,0
MDS. На одну ванну
-

Соль слабительная — Sal purgativum

См. «Соль карловарская искусственная»

Rp.: Natrii sulfatis siccati
Magnesii sulfatis siccati
Kalii sulfatis
Natrii chloridi $\bar{a}\bar{a}$ 20,0
MDS. По 1—2 чайные ложки на $\frac{1}{2}$ л воды

Солюкамфора —

Solucamphre (Франц.)

Камфора-10-сульфоновой кислоты пиперазиновая соль

Синонимы: Camphoral, Coratone, Solucampher, Tonocardin

Синонимы натриевой соли:

Acticamphre, Analeptin «Fragner», Aquosamphol, Camphinjectol, Camphodausse, Camphosol, Camphostyl, Camphrolyse, Camphryl, Canfol, Canforidrina, Cardiocanfene, Eucanfol, Eutonyl «Cophabel», Stellacamphre, Thilocanfol

Под разными названиями выпускаются также кальциевая, висмутовая, аммонийная и оксифенилметиламиноэтаноловая соли камфоры

Выпускается во флаконах по 30 мл и в ампулах по 2 мл 14% водного раствора

Хранение — в обычных условиях

Срок годности — не установлен

Аналептик, обладает кардиотоническим действием.

Применяется по тем же показаниям, что и масляный раствор камфоры для подкожного введения (острая сердечно-сосудистая недостаточность и угнетение дыхания различного происхождения). Отличается от последнего быстротой наступления эффекта и возможностью применения внутримышечно и внутривенно

Rp.: Sol. «Solucamphre» 14% 30,0

DS. По 1—5 мл ($\frac{1}{2}$ —2 ампулы) под кожу, в мышцы или в вену до 2—3 раз в день

Rp.: Sol. «Solucamphre» 14% 2,0

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 1—5 мл ($\frac{1}{2}$ —2 ампулы) под кожу, в мышцы или в вены до 2—3 раз в день

Солюсульфон — Solusulfonum

4,4-Ди-(3-фенил-1,3-дисульфо-пропиламино)-дифенил-сульфона тетранатриевая соль

Синонимы: Cimedone, Solapsonе, Solasulfon, Sulfetron, Sulphonzine

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 1 год

Химioterapevтическое средство.

Применяется для лечения проказы

Rp.: Sol. Solusulfoni 50% 10,0

Sterilisetur!

DS. Внутримышечно 2 раза в неделю, начиная с 0,5 мл, доводя к концу 6-й недели до 3 мл

Солюсурьмин — Solusurminum

Натриевая соль комплексного соединения пентавалентной сурьмы и глюконовой кислоты. Содержит 21—23% сурьмы

Синонимы: Natrii stibogluconas, Pentostam, Solustibosan, Solustin, Stibanose, Stibatim

Выпускается во флаконах в порошке

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 2 года

Химиотерапевтическое средство.

Применяется для лечения кожного и висцерального лейшманиоза

Rp.: Solusurmini 0,25

DS. Содержимое флакона развести до 5% раствора водой для инъекций, вводить, начиная от 3 мл, с ежедневным повышением на 1,5 мл. Суточную дозу доводят до 8—10 мл. Детям лечение проводят по специальной схеме

Сомбревин — Sombrevin (ВНР)

Пропил-4 - (диэтил - карбамоил - метокси)-3-метокси-фенилацетат

Синонимы: Erontol, Propanidid

Выпускается в ампулах по 10 мл 5% раствора

Хранение — список Б

Срок годности — 2 года

Неингаляционный наркотик небарбитуровой структуры. Действует кратковременно.

Применяют при операциях, в отоларингологии, акушерстве и гинекологии, при травматологических и ортопедических вмешательствах, при стоматологических операциях и др. Противопоказан при заболеваниях сердца и в раннем возрасте (до 4 лет)

Rp.: Sol. «Sombrevin» 5% 10 ml

D. t. d. N. 1 in ampul.

S. Внутривенно медленно

Сомнил — Somnil (ЧССР)

Состав 1 ампулы:

Barbitali

Aprobitali aa 0,2

Aquae pro injectionibus ad 2 ml

Снотворное, противосудорожное и седативное средство.

Применяется при бессоннице, судорогах, при эклампсии, столбняке и пр.

Примечание: апробарбитал — барбитуровое снотворное, близкое по свойствам к отечественному барбитамилу

Rp.: «Somnil» 2,0

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. В мышцу глубоко или внутривенно медленно по 1—3 ампулы в день

**Спазмоантастман —
Spasmoantasthman (ЧССР)**

Состав на 1 таблетку:

Amidopyrini
Phenacetini aa 0,2
Theophyllini 0,1
Coffeini 0,05
Extracti Belladonnae 0,01
Pulv. folii Lobeliae 0,094
Ephedrini hydrochloridi 0,02
Papaverini hydrochloridi 0,04
Phenobarbitali 0,02

Хранение — список Б
Срок годности — 5 лет

Бронхолитическое, успокаивающее и противовоспалительное средство.

Применяется при лечении бронхальной астмы, хронического бронхита и т. д. (см. «Солутан»)

Rp.: Tabul. «Spasmoantasthman» N. 12

DS. По 1—2 таблетки через 4—5 ч

**Спазмoverалгин —
Spasmoveralgin (ЧССР)**

Состав на 1 таблетку:

Bromisovali 0,25
Amidopyrini 0,15
Coffeini 0,05
Phenobarbitali 0,02
Papaverini hydrochloridi 0,03
Codeini phosphatis 0,015
Ephedrini hydrochloridi 0,005
Atropini methylbromidi 0,0005

Хранение — список А

Спазмолитическое, обезболивающее и успокаивающее средство.

Применяют при спазмах пищеварительного тракта, желчных и почечнокаменных коликах, тенезмах мочевого пузыря, спазмах сосудов, невралгии, спастической дисменорее и т. п.

Rp.: Tabul. «Spasmoveralgin» N. 10

DS. По 1—2 таблетки 1—3 раза в день взрослому, по $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ таблетки — детям

**Спазмодинил — Spasmodinyl
(ЧССР)**

Состав на 1 таблетку:

Amidopyrini 0,25
Diali
Acidi butylaethylbarbiturici aa 0,02
Papaverini hydrochloridi 0,04
Atropini sulfatis 0,0005

Хранение — список А

По свойствам и применению препарат близок к предыдущей прописи

Rp.: Tabul. «Spasmodinyl» N, 10
DS. По 1—2 таблетки в день

Спазмолитин — Spasmolytinum
β-Диэтиламиноэтилового эфира
дифенилуксусной кислоты гидро-
хлорид

Синонимы: Adiphenin, Dipha-
cil, Patrovina, Spasmolytin, Tra-
sentin, Vagospasmyl, Vegantil,
Vegantin (ПНР)

Выпускается в таблетках по 0,1
Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте

М,Н-холинолитическое и спаз-
молитическое средство.

Применяется при спазмах пище-
варительного тракта, спастиче-
ском колите, спастических при-
вычных запорах, при повышен-
ном тоне гладкой мускулатуры,
язвенной болезни желудка и т. п.

Rp.: Spasmolytini 0,1
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1 таблетке 2 раза в день после еды

Спазмо-эналгит —
Spasmo-Eunalgit (ЧССР)

Состав на 1 таблетку:

Amidopyrini 0,22

Diali 0,03

Radobelini 0,0001

Papaverini hydrochloridi 0,05

Хранение — список Б

Свойства и применение — см.
«Спазмозералгин»

Rp.: Tabul. «Spasmo-Eunalgit» N. 10
DS. По 1—2 таблетки 1—3 раза в день

Спиронолактон — Spironolactonum

γ-Лактон 3-(3-оксо-7α-тиоаце-
тил-17β-окси-4-андростен-17α-
ил)-пропионовой кислоты

Синонимы: Aldactone (ФРГ),
Spirolactone, Spirolang, Verospir-
on (ВНР)

Выпускается в таблетках по
0,025

Хранение — список Б

Срок годности — 3 года

Мочегонное средство (антаго-
нист альдостерона).

Применяют при отеках, свя-
занных с нарушениями сердечной
деятельности, при асцитах в связи
с циррозом печени, при нефроти-
ческих синдромах и отеках раз-
личного происхождения. Не из-
меняет кислотно-щелочного рав-
новесия и ионного баланса, спо-
собствует задержке калия, эф-
фективен в тех случаях, когда
применение более мощных мочег-
онных (салуретики) оказалось
безуспешным

Rp.: Spironolactoni 0,025
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

**Спирт для сосков —
Spiritus mammalis**

Дубящее и кератопластическое средство.

Применяется для профилактики и лечения трещин сосков у женщин в периоде лактации

Rp.: Gallarum turcicae 10,0
Acidi salicylici 0,5
Resinae Benzoës 2,5
Olei Bergamottae gtts III
Olei Sassafrasi gtts V
Spiritus aethylici 90%
Aquae Rosae āā 50,0
MDS. Наружное

**Спирт для укрепления волос —
Spiritus contra defluvium
capillorum**

Препарат раздражает кожу, стимулирует рост волос.

Применяется для профилактики облысения

Rp.: Olei Ricini 25,0
Tannini 5,0
Spiritus aethylici 95% 150,0
Olei aetherei 2,0
MDS. Ежедневно смазывать кожу головы

**Спирт камфорный —
Spiritus camphoratus**

Раздражающее и слабое антисептическое средство.

Применяется для рефлекторной терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата, для профилактики пролежней

Состав:
Camphorae 1,0
Spiritus aethylici 7,0
Aquae destillatae 2,0
Выпускается в различной расфасовке
Срок годности — 10 лет; п/п — 5 лет

Rp.: Spiritus camphorati 100,0
DS. Наружное

**Спирт лавандный —
Spiritus Lavandulae**
Срок годности — 1 год

Входит в состав различных прописей как отдушка и антисептическое средство

Rp.: Olei Lavandulae 1,0
Spiritus aethylici 90% 25,0
Spiritus aethylici 70% 74,0
MDS. Наружное

Спирт ментоловый —
Spiritus Mentholi
Срок годности — 1 год

Свойства и применение — см.
«Спирт камфорный»

1. Rp.: Mentholi 2,0
Spiritus aethylici 90% 50,0
2. Rp.: Mentholi 10,0
Spiritus aethylici 95% 78,0
Solutionis Ammonii caustici 12,0
MDS. Наружное

Спирт огуречный —
Spiritus Cucumeris

Косметическое средство.
Применяется для очищения
лица

Rp.: Seminis Cucumeris concisi 100,0
Solutionis Ammonii caustici 4,0
Spiritus aromatici 5,0
Spiritus aethylici 40% 600,0
MDS. 1 столовую ложку прибавить к воде для умы-
вания

Спирт успокаивающий —
Spiritus nervinus

Свойства и применение — см.
«Мигренал», «Мистол»

Rp.: Odecoloni 85,0
Aetheris aceticі 13,0
Solutionis Ammonii caustici 1,5
Olei Menthae gttс XV
MDS. Наружное

Спирт хлороформный —
Spiritus Chloroformii

Применяется (в качестве вре-
менной меры) для обезболивания
зуба при пульпите и осложненном
кариесе

Rp.: Chloroformii 40,0
Spiritus aethylici 60,0
MDS. Кусок ваты, смоченный хлороформным спир-
том, кладется в полость больного зуба

Спленни — Spleninum
Экстракт селезенки крупного
рогатого скота
Выпускается в ампулах по 1 мл
Хранение — в защищенном от
света месте
Срок годности — 2 года

Детоксицирующее средство.
Применяется для лечения и про-
филактики токсикозов ранних сро-
ков беременности

Rp.: Splenini 1,0
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. По 1 мл внутримышечно 1—2 раза в день

Стекловидное тело

Corpus vitreum

Препарат из стекловидного тела
глаз крупного рогатого скота,
свиней и овец

Выпускается в ампулах по 2 мл
Срок годности — 2 года

Биогенный стимулятор.

Применяют как средство, преду-
преждающее образование грубых
рубцов и контрактур и способст-
вующее их рассасыванию. Обла-
дает болеутоляющим действием
и применяется при невралгиях,
невритах. Способствует образо-
ванию костной мозоли

Rp.: Corporis vitrei 2 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. Под кожу 1 раз в день

Стомол — Stomol

Сокогонное и слабительное сред-
ство, способствует желудочному
пищеварению.

Применяют при гипо- и анацид-
ных гастритах (хронических за-
порах) и т. д.

Rp.: Pepsini 12,0
Extracti Rhei aquosi
Phenolphthaleini aa 3,0
Extracti amari
Extracti Absinthii q. s.
Ut fiant pilulae N. 100
DS. По 1—2 пилюли 2—3 раза в день за 1—1,5 ч
до еды

Стрептаза — Streptasa (ФРГ)

Очищенная стрептокиназа, по-
лученная из фильтратов культуры
β-гемолитических стрептококков
группы С

Выпускается во флаконах в виде
порошка по 100 000 — 750 000 ЕД
во флаконе

Средство для лечения тромбозов
(активатор фибринолиза).

Применяется при тромбоэмбо-
лических заболеваниях в аку-
шерстве и гинекологии, цереб-
ральном тромбозе и т. д. Опти-
мальные клинические результаты
достигаются при раннем лечении
свежих тромбозов (примерно
5 дней после возникновения тром-
ба). Во время лечения стрептазой
необходим контроль за состоя-
нием свертывания крови.

Rp.: «Streptasa» 100 000 ED —
250 000 ED aut
750 000 ED

DS. От 250 000 до 500 000 — 1 000 000 ЕД (доза индивидуальна). Перед применением препарат растворяют в 10—20 мл изотонического раствора натрия хлорида, вводят внутривенно, капельно

Стрептойодол — Streptoiodolum

Антисептическое и кератопластическое средство, близкое к «Линименту Вишневского», «Мазь Микулича» и т. д.

Применяется для лечения вялотекущих инфицированных ран и ожогов

Rp.: Iodi 0,25
Kalii iodidi 0,5
Streptocidi 30,0
Olei Menthae piperitae 1,0
Olei jecoris Aselli 60,0
Glycerini 10,0

MDS. Для перевязок. Перед употреблением нагреть до 60° (не выше) и взболтать

Приготовление: йод и йодид калия растирают в ступке с несколькими каплями воды до растворения и при помешивании добавляют глицерин. К полученному прозрачному раствору прибавляют стрептоцид и небольшими порциями рыбий жир с мятным маслом

Стрептоказол — Streptoxazol
(СФРЮ)

Состав на 1 таблетку:
Streptomycini sulfatis 0,1
Sulfafurazoli 0,4 *
Хранение — список Б
Срок годности — 3 года

Химиотерапевтическое (анти-микробное) средство.

Не всасывается из пищеварительного тракта, вследствие чего применяется для лечения хронической бактериальной дизентерии и бациллоносительства шигелл, острого бактериального энтероколита и т. п.

Rp.: Tabul. «Streptoxazol» N. 50
DS. По 1—2 таблетки 4 раза в день

Стрижевского противоядие при отравлении металлами —
Antidotum metallorum
Strizevsky

Антидот, эффективный при отравлении сулемой и другими солями тяжелых металлов. 100 мл препарата обезвреживают до 4,0 сулемы. При лечении отравления необходимо сочетать с унитином или БАЛ и симптоматической терапией

* Сульфазурол — сульфаниламид, близкий к норсульфазолу.

Rp.: Magnesii sulfatis 3,75
Natrii hydrocarbonatis 12,5
Natrii hydroxydi 1,0
Aquae destillatae 1000,0
(насытить сероводородом)
MDS. По 50—100 мл на прием с водой

Строганова капли желудочные —
Guttae stomachicae Stroganovi

Антисептическое, вяжущее и сокогонное средство.

Применяется при лечении острых гастритов и гастроэнтеритов, сопровождающихся бродильными и гнилостными процессами в желудке

Rp.: Spiritus aetherei
Tincturae Valerianae aethereaе āā 4,0
Tincturae Strychni
Tincturae Arnicae āā 2,0
Tincturae Opii simplicis 3,0
Olei Menthae piperitae 1,0
MDS. По 20—25 капель 2—3 раза в день

Стугерон — Stugeron (БНП)
1-транс-цинамил-4-дифенил-метилпиперазин

Синонимы: Cinnarizin, Cinniprine, Dimitronal, Glanil, Lazeta, Marisan, Midronal, Mitronal, Serpan, Stutgeron, Stutgin

Выпускается в таблетках по 0,025

Хранение — список А

Антигистаминное и сосудорасширяющее средство.

Применяется при морской и воздушной болезни, в гериатрической практике (при нарушениях мозгового кровообращения — атеросклерозе сосудов мозга, сопровождающемся ослаблением памяти, бессонницей, повышенной утомляемостью), а также при головных болях различного происхождения, мигрени и т. п.

Rp.: «Stugeron» 0,025
D. t. d. N. 50 in tabul.
S. По 1 таблетке 3 раза в день, не более 6 таблеток в сутки

Субехолин — Subecholinum

Диметил-аминоэтилового эфира пробковой кислоты дийодметилат
Синонимы: Corkonium, Когкопиум

Выпускается в ампулах в пошке по 0,05

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Дыхательный аналептик рефлекторного действия.

Применяют для стимуляции дыхания при его угнетении, вызванном передозировкой общих анестетиков, при отравлениях барбитуратами и анальгетиками и т. п., а также для усиления вентиляции легких с целью профилактики послеоперационных пневмоний. Отличается от «Лобеллина» более надежным и длительным действием

Рр.: Subecholini 0,05

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. Содержимое одной ампулы (флакона) развести в 1 мл воды для инъекций; вводить по 0,25—0,75 мл под кожу, в мышцы или в вену (медленно)

Сульфадиметоксин — Sulfadimetoxinum

6-(Пара-аминобензолсульфами-до)-2,4-диметоксипиримидин

Синонимы: Abcid, Aristin, Arizonal, Agnosulfan, Bensulfa, Bipoxin, Chemiosalfa, Deltin, Deposul, Dimetazyl, Dosmin, Durasul, Ipersulfa, Longisulfa, Madribon, Madroxin, Metoxin, Neosulfil, Ritarsulfa, Sulfaduran, Sulfaplan, Supersulfa, Ultrasulfan, Vastosulfa и др.

Выпускается в таблетках по 0,5

Хранение — список Б в защищенном от света месте

Срок годности — 5 лет

Химиотерапевтическое средство, пролонгированный сульфамидный препарат.

Эффективен в отношении грамположительных и граммотрицательных бактерий, выгодно отличается большей эффективностью, лучшей переносимостью и меньшей частотой побочных эффектов и осложнений

Рр.: Sulfadimethoxini 0,5

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 4 таблетки на прием и по 2 таблетки в следующие дни (взрослому)

Сульфазин — Sulfazinum

2-(Парааминобензолсульфон-амидо)-пиримидин

Синонимы: Adiazine, Cocodiazine, Codiazine, Cremodiazine, Debenal, Deltazina, Diasulfozyl, Diazolone, Diazyl, Eustral, Infatabs, Lipo-Diazine, Liquadiazine, Miazylsulfonamid, Parkodiazin, Pharmadiazin, Piridisir, Pirimal, Sarnodiazine, Sterazine, Sulfa D, Sulfadiazinum, Sulphadiazine, Sulfapyrimidin, Theradiazine, Ucediazine, Wintradine

Выпускается в таблетках по 0,5

Хранение — список Б

Срок годности — 7 лет; после переконтроля — 6 мес.

Химиотерапевтический, сульфаниламидный препарат, обладающий малой токсичностью и продолжительностью действия. Как и все сульфаниламиды, эффективен против большинства патогенных микроорганизмов.

Показания к применению — заболевания внутренних органов, вызванные грам(+) бактериями, а также гонококками и возбудителями дизентерии, токсикоинфекций и др. Для профилактики гематурии необходимо назначать больному обильное щелочное питье

Рр.: Sulfazini 0,5

D. t. d. N. 30 in tabul.

S. По 4—8 таблеток на первый прием, далее по 2—3 таблетки каждые 3—4 ч в течение 3—4 дней, затем по 2 таблетки каждые 6—8 ч

**Сульфипиридазин—
Sulfapyridazinum**

3-Метокси-6-сульфаниламидо-
пиридазин

Синонимы: Albisulfa, Bradisulfa, Cronazol, Davosin, Deposulfa, Durasulf, Durox, Endismin, Grosul, Lederkyn, Lentosulfa, Lidazin, Longamid, Metazina, Microcid, Minosulfa, Neosulfon, Pantazina, Pirasulfon, Quinoseptyl (ВНР), Spofadazin (ЧССР), Sulamin, Sulfadurazin, Sulfamethoxy-pyridazin, Sulfapirin, Sulfazina, Sulfdurazin, Unisulfa, Volocid и др.

Выпускается в таблетках по 0,5

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 2 года

Химиотерапевтическое средство, сульфаниламид пролонгированного действия.

По спектру действия аналогичен «Сульфадиазину», по дозировкам и применению — «Сульфадиметоксину»

Rp.: Sulfapyridazini 0,5

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 2—3 таблетки в первый день (ударная доза) и по 1 таблетке в последующие дни (поддерживающие дозы)

Сульфасалазин — Sulphasalazin
(СФРЮ)

5-[пара-2-(Пиридилсульфамойл)-фенилазо]-салициловая кислота

Синонимы: Azorygrine, Azulfidine, Benzosulfa, Salazopyridin, Salazopyrin, Salazosulfapyridin, Salicylazosulfapyridin, Salisulf

Выпускается в таблетках по 0,5

Хранение — список Б

Срок годности — 5 лет

Химиотерапевтическое средство, сульфаниламид.

Плохо всасывается, поэтому применяется в основном при колитах, а также при других кишечных инфекциях

Rp.: Tabul. «Sulphasalazin» 0,5

D. t. d. N. 10

S. По 2 таблетки 4—6 раз в день

Сульфозин — Sulfosinum

Средство пирогенной терапии.

Применяется в психиатрии для лечения шизофрении, нейросифилиса, в дерматовенерологии для лечения сифилиса, некоторых форм экземы и т. п.

Rp.: Sulfuris praecipitati 1,0
Olei Persicorum 99,0
M. Sterilisetur!

DS. Внутримышечно, начиная с 0,5—2 мл, увеличивая до 3—7 мл, всего 10 инъекций

Приготовление: персиковое масло стерилизуют в автоклаве при 119—121° в течение 2 ч или горячим воздухом при 180° в течение 30 мин. В горячем масле растворяют 1 г серы. Полученный раствор фильтруют в стерильную склянку с притертой пробкой и стерилизуют паром при 100° в течение 1 ч

Сульфолан — Sulfolan

Свойства и применение — см.
«Мазь серная сложная»

Rp.: Sulfuris depurati 5,0

Zinci oxydi 10,0

Lanolini 85,0

M. f. unguentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи

Суммавит-10 — Summavit-10

(ГДР)

Состав на 1 таблетку:

Axerophtholi 0,0003

Thiamini 0,0005

Riboflavini 0,0005

Pyridoxini 0,0005

Cyanocobalamini 0,000001

Acidi ascorbinici 0,025

Tocopheroli 0,0005

Calciferoli 0,0000125

Calcii pantothenatis 0,0025

Nicotinamidi 0,01

Хранение — в сухом, защищенном от света месте

Срок годности — 6 мес.; дополнительный срок годности после переконтроля — 6 мес.

Витаминный препарат.

Применяется по обычным для поливитаминов показаниям (см. «Б-Комплекс», «Бецевина», «Геровит» и т. п.)

Rp.: Drag. «Summavit» N. 50

DS. По 2—4 драже в день

Сунорэф — Sunoreph;
Преображенского мазь —
Unguentum Preobrazensky

Состав:

Streptocidi

Sulfadimezini

Norsulfazoli aa 5,0

Антимикробное и сосудоуживающее средство.

Применяется для лечения на сморка (ринита)

Ephedrini hydrochloridi 1,0
Camphorae 0,3
Olei Eucalypti gtts XX
Basis unguenti ad 100,0
Выпускается в таре различной
емкости

Rp.: Ung. Sunogephi 10,0
DS. Закладывать в нос 2—3 раза в день

Суппозитории дерматологические —
сложные — Suppositoria
Dermatoli composita

Свойства и применение — см.
«Бетиол», «Анузол»

Rp.: Dermatoli 0,2
Extracti Belladonnae 0,01
Olei Cacao 2,5
M. f. suppositorium rectale
D. t. d. N. 12
S. По 1 суппозиторию утром и на ночь в прямую
кишку

Суппозитории ихтиоловые —
Suppositoria Ichthyoli

То же

Срок годности — 1 год; после
переконтроля — 6 мес.

1. Rp.: Ichthyoli 0,2
Olei Cacao q. s.

2. Rp.: Ichthyoli 0,1
Extracti Opii 0,015
Olei Cacao q. s.
M. f. suppositorium rectale
D. t. d. N. 10
S. По 1 суппозиторию утром и вечером в прямую
кишку

Суппозитории с экстрактом
красавки сложные — Suppositoria
cum extracto Belladonnae
composita

Срок годности — 1 год; после
переконтроля — 6 мес.

Спазмолитическое, обезболи-
вающее и противовоспалительное
средство.

Применяется для снятия болей
в области малого таза (обостре-
нные геморроя, роды, парапроктит
и т. д.)

Rp.: Extracti Belladonnae 0,04
Omnoponi 0,02
Antipyrini 0,3
Olei Cacao 2,5
Ut fiat suppositorium rectale
D. t. d. N. 6
S. По 1 суппозиторию при болях в прямую кишку

Супрастин — Suprastin (ВНР)
N-Диметиламиноэтил-*N*-(пара-хлорбензил)-аминопиридина гидроклорид

Синонимы: Allergan S., Avaprenal, Chlorneoantergan, Chloropyramin, Chloropyribenzamin, Chlorpyraminum, Chlortripelennaminhydrochlorid, Clorpyramine, Halopyramine, Nilfan, Sinopen, Sintral, Synopen, Synpen

Выпускается в таблетках по 0,025 и в ампулах по 1 мл 2% раствора

Хранение — список Б

Срок годности — 3 года для ампул, 5 лет — для таблеток

Антигистаминное средство.
Применяется при аллергических дерматозах (крапивница, экзема, зуд, дерматит), а также при аллергическом рините, конъюнктивите, в начальной стадии бронхиальной астмы и др.

Rp.: Sol. «Suprastin» 2% 1,0
D. t. d. N. 5 in ampul.
S. По 1 ампуле в мышцы или в вену

Rp.: Tabul. «Suprastin» 0,025
D. t. d. N. 20
S. По 1—2 таблетки 3 раза в день

Сурмонтил — Surmontil (Франц.)
D, L-N-(3-Диметиламино-2-метилпропил)-иминодобензила малеат или метансульфонат

Синонимы: Stangyl, Sulmontil, Trimeprimine, Trimepropimimum, Trimipramin

Выпускается в таблетках по 0,025

Антидепрессант.
Применяется для лечения больных с тревожной депрессией, при шизофрении, маниакально-депрессивном психозе и при депрессиях иного происхождения. Противопоказания и осложнения — см. «Имизин»

Rp.: Tabul. «Surmontil» 0,025
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке 3 раза в день. В отдельных случаях при наличии хорошей переносимости препарата применяются более высокие дозы — до 0,8—1,0 в сутки

Суспензия альбуцидо-дикаино-вая — Suspensio Sulfacyli cum Dicaino

Антимикробное и местноанестезирующее средство.
Применяется в глазной практике для лечения инфекционных заболеваний глаз (конъюнктивит, бленоррея, трахома, иридоциклит и т. п.)

Rp.: Dicaini 0,05
Sulfacyli 3,0
Benzylpenicillini 300 000 ED
Olei jecoris Aselli 10,0
MDS. Закапывать в глаз 3—4 раза в день

Приготовление: в асептических условиях

Суспензия железа пирофосфата — Железосодержащий препарат.
Suspensio Ferri pyrophosphatis Применяется при лечении же-
лезодefицитных анемий (см.
«Жектофер» и др.)

Rp.: Natrii pyrophosphatis 2,0
Glycerini 5,0
Solutionis Ferri trichloridi 3,0
Aquae destillatae ad 100,0
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Приготовление: пирофосфат натрия растворяют в 40,0 воды, при-
бавляют глицерин и фильтруют. При слабом помешивании добавляют
смесь раствора хлорида железа и 40,0 воды и, наконец, остальную воду
(до 100,0)

Суспензия йодоформа — Антисептическое средство.
Suspensio Iodoformii Применяется для лечения хро-
нических язв, остеомиелита, кост-
ного туберкулеза, вялотекущих
ран и т. п. в виде тампонады пол-
остей

Rp.: Iodoformii 10,0
Glycerini
Spiritus aethylici aa 45,0
MDS. Для перевязок

Суспензия йодоформно-йодная — То же
Suspensio Iodoformii cum Iodo

Rp.: Iodi 1,0
Glycerini 40,0
Iodoformii 9,0
MDS. Для перевязок

Сустак — Sustac (СФРЮ)
1,2,3-Пропантриола тринитрат
Синонимы: см. «Нитроглице-
рин»
Специальная лекарственная
форма нитроглицерина, обеспе-
чивающая пролонгирование его
действия

Миотропный спазмолитик, про-
лонгированный препарат нитро-
глицерина. По скорости наступле-
ния эффекта близок к «Нитрогли-
церину» (10—15 мин), по дли-
тельности — к «Эриниту» (3—4 ч).
Показания к применению —
те же, что у вышеупомянутых

Выпускается в таблетках по 0,0026 нитроглицерина («мите») и по 0,0064 нитроглицерина («форте»)

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 4 года

препаратов (стенокардия, преимущественно в межприступном периоде). Противопоказания и осложнения — те же, что у нитроглицерина и других нитратов и нитритов

Rp.: «Sustac-mite» 0,0026

D. t. d. N. 25 in tabul.

S. Проглатывать по 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: «Sustac-forte» 0,0064

D. t. d. N. 25 in tabul.

S. По 1 таблетке 2 раза в день

Сустанон-250 — Sustanon-250
(СФРЮ, Голл.)

Состав на 1 ампулу:

Testosteroni propionatis 0,03

Testosteroni phenylpropionatis

Testosteroni isocaproatis āā 0,06

Testosteroni decanoatis 0,1

Olei Persicorum ad 1 ml

Хранение — список Б

Срок годности — 5 лет

Препарат мужского полового гормона (андроген) пролонгированного действия.

Применяют у мужчин — при необходимости введения высоких доз андрогенов (после кастрации, при импотенции, климаксе и т. п.), у женщин — при заболеваниях, требующих антиэстрогенного воздействия (при эндометриозе, раке молочной железы, первичном раке половых органов и т. д.)

Rp.: «Sustanon-250» 1 ml

D. t. d. N. 3 in ampul.

S. Внутримышечно 1 раз в месяц

Сябро порошки —
Pulveres Siabro

Спазмолитическое средство, нормализует процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе.

Применяется для лечения головной боли, вегетоневрозов, сопровождающихся ваготонией, и т. д.

Rp.: Platyphyllini hydrotartratis 0,005

Natrii bromidi

Coffeini āā 0,15

M. f. pulvis

D. t. d. N. 15

S. По 1 порошку 2—4 раза в день

Табекс — Tabex (НРБ)

Одна таблетка содержит 0,0015 цитизина

Срок годности — 2 года

Препарат применяется для устранения никотиновой абстиненции, что может способствовать прекращению курения табака. Если результаты неудовлетворительны, лечение прекращают и попытку можно повторить через 2—3 мес. При положительном результате лечение продолжают по следующей схеме: с 4-го по 12-й день по 1 таблетке через каждые $\frac{1}{2}$ ч (всего 5 таблеток в день), с 13-го по 16-й день — по 1 таблетке через 3 ч (всего 4 таблетки в день), с 17-го по 20-й день — по 1 таблетке через каждые 5 ч (всего 3 таблетки в день), с 20-го по 25-й день — по 1—2 таблетки в день. Не позднее 5-го дня после начала лечения табексом необходимо полностью отказаться от курения. Для закрепления результата лечения курильщик не должен выкуривать ни одной сигареты

Rp.: Tabul. «Tabex» N. 100

DS. По 1 таблетке через 2 ч (6 таблеток в день) в течение 3 дней

**Таблетки азиатские —
Tabulettae Acidi arsenicosi
obductae**

Состав на 1 таблетку:

Acidi arsenicosi anhydrici 0,001

Pulveris Piperis nigri 0,025

Extracti Absinthii q. s.

Хранение — список А

Срок годности таблеток, покрытых оболочкой, — 1 год; после переконтроля — 1 год

Общеукрепляющее и антинемическое средство.

Применяют при неврозах, истощении и при анемиях (в сочетании с препаратами железа)

Rp.: Tabulettae Acidi arsenicosi obductae N. 50

DS. По 1 таблетке (пилюле) 2 раза в день после еды

**Таблетки желудочные —
Tabulettae stomachicae**

Состав на 1 таблетку:

1. Extracti Belladonnae 0,01

Bismuthi subnitratris

Phenylii salicylatis aa 0,25

Вязущее, спазмолитическое (холнолитическое) и антисептическое средство.

Применяется для лечения гиперацидных гастритов, неврозов желудка, сопровождающихся спаз-

2. Extracti Belladonnae 0,01
Bismuthi subnitratris 0,25.
3. Extracti Belladonnae 0,01
Extracti Absinthii 0,012
Extracti Valerianae 0,015
4. Benzonaphtholi
Bismuthi subnitratris $\bar{a}\bar{a}$ 0,25
Extracti Belladonnae 0,015
Срок годности — 3 года.

мами и болями, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, пептических язв и т. д.

Рр.: Tabul. stomachicae № 1 (2, 3, 4) N. 10
DS. По 1 таблетке 3 раза в день после еды

Тавегил — Tavegil (BHP)
1-Метил-2,2-(α -метил-пара-хлордифенилметокси)этил-пирролидин
Выпускается в таблетках по 0,001
Срок годности таблеток — 5 лет
Хранение — список Б

Антигистаминное средство, по строению и свойствам имеющее сходство с «Супрастином».

Применяется для лечения преимущественно кожных аллергических реакций (крапивница, отеки Квинке, дерматиты и т. п.). Обладает также седативным действием

Рр.: «Tavegil» 0,001
D t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке 2 раза в день, не более 4 раз в день

Таламонал — Thalamonal (Бельг.)
Состав:
Phentanyli 0,05
Droperidoli 0,0025
Aquaе pro injectionibus 1,0
Выпускается во флаконах по 10 мл и в ампулах по 2 мл
Хранение — список А
Срок годности — 5 лет

Комбинация сильного нейролептика с очень сильным наркотическим анальгетиком.

Применяется для нейролептанальгезии (вид общей анестезии) при различных оперативных вмешательствах. Возможные осложнения — снижение артериального давления, угнетение дыхания

Рр.: «Thalamonal» 2,0
D. t. d. N. 5 in ampul.
S. Для общего обезболивания, вводить в вену. Дозировка строго индивидуальна

Таллан — Tallan

Подсушивающее и антисептическое средство.

Применяется в кожной практике для лечения опрелостей

Rp.: Naphthalani liquidi raffinati 2,0
Talcii 98,0
M. f. aspersio
DS. Присыпка

Тальбин — Talbin (ЧССР)
Состав на 1 таблетку:
Bismuthi tannatis 0,1
Tannalbini 0,3
Хранение — в сухом месте

Вяжущее и антисептическое средство.

Применяют для лечения острых гастроэнтеритов, энтеритов, колитов совместно с антимикробной терапией

Rp.: Tabul. «Talbin» N. 20
DS. По 6—10 таблеток в день

Талусин — Talusin (СФРЮ)
3β,14β - Диокси - 4,20,22 - буфариенолид-3β-рамнозид
Вторичный гликозид из морского лука (*Scilla maritima* var. *alba*)
Синонимы: Caradrin, Proscillaridin, Proscillaridin A, Proscillid, Stellarid
Выпускается в таблетках по 0,00025
Хранение — список А

Сердечный гликозид быстрого действия, по свойствам близкий к «Строфантину». В связи с приемом препарата внутрь действие его наступает медленнее и длится дольше, чем у последнего.

Применяется при острой и сердечной хронической недостаточности, преимущественно при плохой переносимости препаратов наперстянки. Обладает также мочегонными свойствами, менее других препаратов морского лука склонен к кумуляции. Противопоказания и осложнения — те же, что и для других сердечных гликозидов (см. «Строфантин», «Дигоксин» и др.)

Rp.: «Talusin» 0,00025
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1—2 таблетки 3 раза в день

Тансал — Tansalum
Состав на 1 таблетку:
Tannalbini
Phenylis salicylatis aa 0,3
Хранение — в сухом месте
Срок годности — 5 лет

Дезинфицирующее и вяжущее средство.

Применяют при заболевании желудочно-кишечного тракта (энтериты, колиты)

Rp.: Tabul. Tansali N. 10
DS. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Тардил — Tardil (ВНР)
Состав на 1 таблетку:
Barbamylī 0,125
Noxyroni 0,125
Diprazini 0,0075
Хранение — список Б
Срок годности — 5 лет

Снотворное и успокаивающее средство.

Применяется при расстройстве процесса засыпания и нарушении сна

Rp.: Tabul. «Tardil» N. 10
DS. По 1—2 таблетки на ночь

Таро — Taro

Депиляторий.
Применяют для лечения грибковых заболеваний волосистой части головы и в косметических целях

Rp.: Barii sulfidi 0,55
Talcī 9,45
M. f. pulvis
DS. К порошку депилятория добавляют воды до образования кашицы, которую наносят на волосистые места. Через 5—10 мин кашицу снимают тупым ножом

Тауремизин — Tauremisinum
Полициклический лактон, обладающий некоторым структурным сходством с камфорой. Выделен из полыни таврической (*Artemisia taurica* Willd)

Выпускается в таблетках по 0,005, ампулах по 1 мл 0,25% и во флаконах по 10 мл 0,5% раствора

Срок годности таблеток и ампул — 2 года

Аналептик, обладает общетонизирующим действием. Применяется для стимуляции дыхания и повышения кровяного давления при острой сердечной слабости, коллапсе, инфекционных заболеваниях, отравлениях наркотиками, снотворными и другими ядами, угнетающими дыхательный и сосудодвигательный центры

Rp.: Tauremisini 0,005
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день
Rp.: Sol. Tauremisini 0,25% 1,0
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. Под кожу, в мышцы или в вену по 0,5—1 мл

Rp.: Sol. Tauremisini 0,5% 10,0
DS. По 30 капель 2—3 раза в день

Тебафен — Tebafen (BHP)
Состав на 1 таблетку:
Nicotinaldehydthiozamin-carbazini
0,05
Isoniazidi 0,04

Противотуберкулезный комбинированный препарат, по свойствам близкий к «Изониазиду». Отличается от последнего замедленной выработкой толерантности возбудителя

Rp.: Tabul. «Tebafen» N. 100
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день с постепенным увеличением дозы до 0,005 на 1 кг веса тела

Тегретол — Tegretol (Швейц.)
5-Карбамоил-5Н-дибенз-(b.f.)-азепин
Синонимы: Carbamazepin, Tegretal
Выпускается в таблетках по 0,1 и 0,2
Хранение — список Б
Срок годности — 5 лет

Противоэпилептическое средство. Кроме того, применяется также для лечения органических поражений черепно-мозговых нервов (невриты, арахноидит и т. п.)

Rp.: «Tegretol» 0,1 (0,2)
D. t. d. N. 50 in tabul.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день, с постепенным снижением дозы до 1/2 таблетки 2—3 раза в день

**Теймурова паста —
Pasta Teimurovi**

Состав:
Acidi borici
Natrii tetraboratis aa 7,0
Acidi salicylici 1,0
Zinci oxydi 30,0
Talci 28,0
Hexamethylentetramini 3,0
Solutionis Formaldehydi 3,5
Plumbi acetatis 0,3
Glycerini 12,0
Olei Menthae piperitae 0,3
Срок годности — 1 год

Антисептическое, кератолитическое подсушивающее, вяжущее и дезодорирующее средство. Применяется для лечения различных кожных заболеваний — поверхностных микозов, экземы, опрелостей и т. п.

Rp.: Pastae Teimurovi 50,0
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Текодин — Thecodinum
Оксидигидрокодеина гидрохлорид
Синонимы: Bionine, Cardanon, Cofacodal, Dinarkon, Dolodorm,

Наркотический анальгетик, полусинтетическое производное морфина. Применяется при болях после тяжелых ранений, после опера-

Dicodal, Eucodal, Eukodal, Ludonal, Medicial, Narcodal, Narcosin, Opton, Oxycodonhydrochlorid, Percodan, Sintiodal, Tekodin, Valbine

Выпускается в таблетках по 0,005 и в ампулах по 1 мл 1% и 2% раствора

Хранение — список А

Срок годности — 3 года; после переконтроля — 1 год

ций, при инфаркте миокарда, сердечной астме, отеке легких и т. д., легче переносится больными, чем морфин. Анальгезия, угнетение дыхания, пристрастие — без особых отличий от морфина

Rp.: Thecodini 0,005
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1 таблетке при болях

Теминал — Theminalum

Состав на 1 таблетку:

Theobromini

Amidopyrini aa 0,25

Phenobarbitali 0,02

Хранение — список Б

Срок годности — 3 года

Спазмолитическое и успокаивающее средство.

Применяется при стенокардии, спазмах сосудов головного мозга, гипертонической болезни I стадии

Rp.: Tabul. Theminali N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Теоверин — Theoverinum

То же

Состав на 1 таблетку:

Theobromini 0,25

Papaverini hydrochloridi 0,03

Barbamyli 0,075

Хранение — список Б

Срок годности — 4 года

Rp.: Tabul. Theoverini N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Теодибаверин — Theodibaverinum

Спазмолитическое, успокаивающее средство.

Состав на 1 таблетку:

Theobromini 0,15

Papaverini hydrochloridi

Dibazoli aa 0,02

Хранение — список Б

Срок годности — 2 года

Применяется для лечения спазмов полых органов, стенокардии, гипертонической болезни I стадии

Rp.: Tabul. Theodibaverini N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Теодинал — Theodinalum

То же

Состав на 1 таблетку:

Theobromini 0,25

Dibazoli

Phenobarbitali $\bar{a}\bar{a}$ 0,02

Хранение — список Б

Срок годности — 1 год

Rp.: Tabul. «Theodinalum» N. 10

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Теофедрин — Theophedrinum

Бронхолитическое, успокаивающее и анальгетическое средство.

Состав на 1 таблетку:

Пропись № 1:

Theobromini

Theophyllini

Coffeini $\bar{a}\bar{a}$ 0,05

Amidopyrini

Phenacetini $\bar{a}\bar{a}$ 0,2

Ephedrini hydrochloridi

Phenobarbitali $\bar{a}\bar{a}$ 0,02

Extr. Belladonnae sicci 0,004

Cytisini 0,0001

Пропись № 2:

Theophyllini

Theobromini

Coffeini $\bar{a}\bar{a}$ 0,05

Amidopyrini

Phenacetini $\bar{a}\bar{a}$ 0,2

Folii Belladonnae

Ephedrini hydrochloridi

Phenobarbitali $\bar{a}\bar{a}$ 0,02

Cytisini 0,0001 seu

Lobelini hydrochloridi 0,0002

Хранение — список Б

Срок годности — 3 года

Применяется для лечения бронхиальной астмы, хронического бронхита, эмфиземы легких, хронической легочной недостаточности

Rp.: Tabul. Theophedrini N. 10

DS. По $\frac{1}{2}$ —1 таблетке, при сильных приступах один раз в день

Тепалусал — Therapusalum

Спазмолитическое, гипотензивное и успокаивающее средство.

Состав на 1 таблетку:

Theobromini 0,25

Phenobarbitali

Salsolini hydrochloridi

Paraverini hydrochloridi $\bar{a}\bar{a}$ 0,03

Хранение — список Б

Срок годности — 5 лет

Показания к применению — см. «Теминал»

Рр.: Tabul. Therapalusali N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Терафиллин — Theraphyllinum То же
Состав на 1 таблетку:
Theobromini 0,25
Papaverini hydrochloridi
Phenobarbitali $\bar{a}\bar{a}$ 0,03
Platyphyllini hydrotartratis 0,003
Хранение — список Б.
Срок годности — 1 год

Рр.: Tabul. Theraphyllini N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Терален — Teralen (Франц.) Нейроплегическое, антигистаминное, анальгезирующее средство, близкое по свойствам к «Левомепромазину». Отличается несколько меньшей активностью
10-(3-Диметиламино-2-метилпропил)-фенотиазина тартрат
Синонимы: Alimemazin, Methylpromazine, Nedeltran, Palpex, Panectyl, Repeltin, Tamaril, Teralene, Trimeprazine, Vallergan, Varialgil

Выпускается в таблетках по 0,005 и во флаконах по 30 мл 4% раствора

Хранение — список Б
Срок годности флаконов — 2 года, таблеток — 5 лет

Рр.: «Teralen» 0,005
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1—8 таблеток в день (взрослому); детям — 0,75 мг до 1 мг на 1 кг веса в сутки

Рр.: Sol. «Teralen» 4% 30 ml
DS. По 5—40 капель в день в 3—4 приема

Термопсис — Thermopsis Отхаркивающее и успокаивающее кашель средство.
Состав на 1 таблетку: Применяется при сухом кашле различной этиологии
Pulveris radidis Thermopsisidis 0,01
Codeini 0,02
Natrii hydrocarbonatis
Pulveris radidis Liquiritiae $\bar{a}\bar{a}$ 0,2
Хранение — список Б
Срок годности — 4 года

Рр.: Tabul. Thermopsisidis N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Терпилан — Terpilan (ЧССР) Раздражающее средство.
Состав на 1 ампулу: Применяется для неспецифического лечения различных заболеваний, преимущественно аллергической природы (бронхиальная астма, экзема и т. д.). По свойствам и применению близок к отечественному необензинолу
Olei Terebinthinae 0,05
Chinini hydrochloridi 0,005
Benzocaini 0,02
Olei Persicogum ad 1 ml
Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Рр.: «Terpilan» 1 ml
D. t. d. N 10 in ampul.
S. По 1 ампуле 2—3 раза в день, глубоко в ягодичную мышцу

Террасол — Terrasol (ПНР) Химиотерапевтическое средство.
Состав на 1 таблетку: Применяют для лечения трихомониоза у женщин. См. также «Осарцид»
Osarsoli 0,25
Oxytetracyclini hydrochloridi 0,1
Sacchari lactis 0,6
Хранение — список А
Срок годности — 1 год

Рр.: Tabul. «Terrasol» N. 10
DS. По 1 таблетке на ночь. Вводят во влагалище

Тесальбен — Thesalbenum См. «Тальбин»
Состав на 1 таблетку:
Thealbini 0,5
Phenylii salicylatis
Benzonaphtholi aa 0,1
Хранение — в сухом месте
Срок годности — 3 года; дополнительный срок годности после переконтроля — 1 год 6 мес.

Рр.: Tabul. Thesalbeni N. 10
DS. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Тесаминал — Thesaminalum Спазмолитическое и гипотензивное средство.
Состав на 1 таблетку: Применение — см. «Теминал», «Тепалюсал»
Theobromini 0,15
Amidopyrini 0,3
Phenobarbitali
Salsolini hydrochloridi aa 0,03
Хранение — список Б

Рр.: Tabul. Thesaminali N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

**Тестобромлецит —
Testobromlecithum**

Состав на 1 таблетку:
Bromisovalii 0,1
Methyltestosteroni 0,005
Lecithini 0,05
Amyli 0,025
Sacchari 0,25
Talcii 0,007
Magnesii subcarbonatis 0,073
Срок годности — 2 года

Андрогенное и успокаивающее средство.

Применяется при вазомоторных и вегетативных нервных нарушениях у мужчин, мужском климактерии, переутомлении и нервном истощении

Рр.: Tabul. Testobromlecithi N. 20
DS. По 1 таблетке 2 раза в день под язык

**Тестостерона фенилпропионат —
Testosteroni phenylpropionas**
17β-Окси-4-андростен-3-он-17-
(β-фенилпропионат)

Синонимы: Androteston P. P.
Fenhombreol, Neoviron, Retandrol (ВНР), Testosteron longo, Testosteronphenylpropionat

Выпускается в ампулах в виде 1%, 2,5% и 5% масляного раствора

Хранение — список Б, в защищенном от света месте
Срок годности — 3 года

Андрогенный препарат.

Свойства и применение — см. «Метилтестостерон» и «Метандростенолон». Отличается большей (в 3—4 раза) активностью по сравнению с «Метилтестостероном», а также гораздо более длительным эффектом

Рр.: Sol. Testosteroni phenylpropionatis oleosae 1% (2,5%
aut 5%) 1 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. По 1—2 ампулы раз в неделю внутримышечно

**Тестостерона энантат —
Testosteroni oenanthas**

Тестостерон-17-энантат
Синонимы: Androtardyl, Delatetryl, Orquisteron-E-Depot, Primoniast-Depot, Primotest-Depot, Primoteston-Depot, Proviron-Depot, Testahomen-Depot, Testo-Enant, Testoron retard, Testoviron-Depot

Выпускается в ампулах по 1 мл 20% масляного раствора

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 6 мес.; после переконтроля — 1 мес.

Андрогенный препарат пролонгированного действия. Отличается от вышеописанного «Тестостерона фенилпропионата» более длительным (в 3—4 раза) действием

Rp.: Solutionis Testosteroni oenanthatis oleosae 20% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в 2—4 недели

Тестонат — Testoenatum

Состав на 1 ампулу:
Testosteroni propionatis 0,02 (0,04)
Testosteroni oenanthatis 0,08 (0,16)
Olei Persicorum ad 1 ml

Синонимы: Testosteron-Depot
Выпускается в ампулах по 1 мл
10% и 20% раствора

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Андроген пролонгированного действия.

Применяют в тех же случаях, что и «Тестостерона фенолпропионат», «Метилтестостерон»

Rp: Sol. Testoenati oleosae 10% (20%) 1,0
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. По 1 мл 1 раз в 2 недели в мышцы

Тетурам — Teturamum

Тетраэтилтиурамдисульфид
Синонимы: Abstensil, Abstinyl, Alcophobin, Antabus, Antethyl (BHP), Anticol, Antietil, Disulfiram, Noxal, Refusal, Stopethyl, Thiuram, Thiuranide

Выпускается в таблетках по 0,1, 0,15 и 0,25

Хранение — список Б, в защищенном от света месте
Срок годности — 2 года

Препарат предназначен для лечения хронического алкоголизма. Блокирует окисление алкоголя на стадии «кетоновых тел» и при одновременном приеме алкоголя может вызвать ацидотическую кому. Лечению подлежат только соматически здоровые люди и в стационаре

Rp.: Teturami 0,15 (0,25, 0,1)
D. t. d. N. 50 in tabul.
S. По 0,5 ежедневно в течение длительного срока

Тефелидин — Thephelidinum

Состав на 1 таблетку:
Theobromini 0,25
Phenobarbitali
Salsolini hydrochloridi
Papaverini hydrochloridi aa 0,03

Хранение — список Б
Срок годности — 5 лет

Спазмолитическое и сосудорасширяющее средство (см. «Теминал», «Тепалюсал»)

Rp.: Tabul. «Thephelidinum» N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

**Тильмана капли —
Guttae Thilmani**

Сокогонное и успокаивающее средство.

Применяется при желудочно-кишечных расстройствах

Rp.: Tincturae Strychni 10,0
Tincturae Opii simplicis 20,0
Tincturae Ipecacuanhae 10,0
Tincturae Menthae 40,0
Tincturae Valerianae aetherae 80,0
MDS. По 15—20 капель 2—3 раза в день перед едой

Тимолицид — Thymolicid

Применение — см. «Мазь тимоловая»

Rp.: Thymoli 0,45
Olei Vaselini 100,0
MDS. Наружное

Тиаоацетазон — Thioacetazonum

Пара-ацетамидобензальдегида тиосемикарбазон

Синонимы: Aktivon, Ambathiozonum, Amithiozon, Antib, Benthiozon, Benzothiozon, Botiran, Conteben, Contibioli, Diasan, Domakol, Flivazone, Ilbion, Livazone, Myvizone, Neotibil, Neustab, Nortobione, Novakol, Onivizone, Panrone, Parazone, Seroden, Siocarbazone, Tebalon, Tebasid, Tebecure, Tebemar, Tebethion, Tebeuno, Tebezon, Thibon, Thiomicid, Thiotebezine, Tibicur, Tibisan, Tubercazon

Выпускают в таблетках по 0,01, 0,025 и 0,05

Хранение — список Б

Срок годности — 2 года; после переконтроля — 6 мес.

Противотуберкулезный препарат II ряда.

Применяют при туберкулезе слизистых и серозных оболочек, лимфаденитах, скрофулодерме, при специфических свищах

Не эффективен при менингите, малоэффективен при легочном туберкулезе.

Применяется только совместно с «Изониазидом», «Натрия пара-аминосалицилатом», «Стрептомицином». Может быть использован для лечения ранних форм проказы

Rp.: Thioacetazoni 0,01 (0,025, 0,05)
D. t. d. N. 50 in tabul.
S. По 1 таблетке на прием 2—3 раза в сутки

Тиодазин — Thiodazin (ПНР)
Состав на одну ампулу:
Jodazini M 0,1
Piperazini 0,05
Thioureae 0,001
Aquaе pro injectionibus ad 5 ml
Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Противовоспалительное и анальгезирующее средство.

Применяется при остром и хроническом полнартрите, ишиасе, невралгии и люмбаго

Примечание. Йодазин М — йодсодержащее химиотерапевтическое и противовоспалительное средство

Rp.: Sol. «Thiodazin» 5 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. Внутримышечно по 1 ампуле через день

Тиоспазмин — Thiopasmin (ЧССР)
Гексадифенсульфония йодид
Синонимы: Hexadiphensulfoni-
umiodid, Hexasoniumjodid
Выпускается в драже по 0,025
Хранение — список Б

Спазмолитическое средство.
Применяют при спазмах пищева-
рительного тракта, язве же-
лудка и двенадцатиперстной киш-
ки, при повышенной кислотности,
желчных и почечных коликах и др.

Rp.: «Thiopasmin» 0,025
D. t. d. N. 50 in dragee
S. По 1 драже 2—5 раз в день. Драже проглатываются, не разжевывая

Тиреотропин — Thireotropin
(ЧССР)
Тиреотропный гормон, приго-
товленный из передней доли гипо-
физа рогатого скота
Выпускается в ампулах по
10 МЕ в 1 ампуле
Хранение — в прохладном, за-
щищенном от света месте
Срок годности — 1 год

Гормональный препарат.

Применяется для диагноза пер-
вичных и вторичных гипертирео-
зов, для диагностики и терапии
злокачественных опухолей щито-
видной железы, для нормализа-
ции функции щитовидной железы
и т. п.

Rp.: «Thireotropin» 10 ME
D. t. d. N. 5 in ampul.
S. Для дифференциальной диагностики вводится
в течение 2—3 дней 5—10 МЕ внутримышечно.
При острых тиреоидитах вводится внутримышечно
в течение 4—5 дней 5—10 МЕ в день

Тиреде раствор — Solutio Tyrode

Свойства и применение — см.
«Рингера раствор», «Рингера-
Локка раствор»

Rp.: Natrii chloridi 8,0
Kalii chloridi 0,2
Natrii hydrocarbonatis 0,1
Calcii chloridi 0,2
Magnesii chloridi 0,1
Natrii phosphatis 0,05
Glucosi 1,0
Aquae pro injectionibus ad 1000,0
M. Sterilisetur!
DS. Для внутривенного введения

Тиротан — Thyrotan (ГДР)
Высушенная щитовидная железа крупного рогатого скота
Выпускается в драже по 20 ЕД
Хранение — в сухом, прохладном месте

Гормональный препарат.
Применяют при микседеме, кретинизме и тиреогенном ожирении

Rp.: «Thyrotan» 20 ED
D. t. d. N. 40 in dragee
S. По 1 драже в первые дни, повышая дозу до 3—4 драже в день

Токсапин — Toxapinum
Препарат пчелиного яда в виде раствора в воде или в масле.
В 1 ампуле (1 мл водного или масляного раствора) содержится 0,006 пчелиного яда
Синоним: Mellisin
Хранение — в защищенном от света месте
Срок годности — 2 года

Биогенный препарат.
Применяют для уменьшения болей и воспалительных явлений в суставах и мышцах при ревматизме, при неспецифических полиартритах, миозитах, радикулитах, ишиасе, невралгии, при аллергических заболеваниях, при трофических язвах, облитерирующем эндартерите, тромбофлебите и др. (см. «Вирапин»)

Rp.: Toxapini 1 ml
D. t. d. N. 20 in ampul.
S. Под кожу или в мышцы (в межлопаточную или пояснично-крестцовую область). Инъекции делают в 2—3 места, вводя по 0,2—0,3 мл в каждое место ежедневно или через день. Препарат можно вводить с помощью электрофореза (с положительного полюса)

**Толедо бальзам —
Balsamum Toledo**

Свойства и применение — см.
«Линимент метилсалицилата
сложный»

Rp.: Spiritus aethylici 90% 5,0
Aquaе coctae 50,0
Extracti Gentianae 5,0
Kalii iodidi 4,0
Natrii salicylatis 5,0
Methylii salicylatis 2,0
MDS. Для растирания

Тонгевит — Tongevit (ВНР)

В своем составе имеет: витамины А, В₁, В₂, В₄, В₁₂, С, D, Е, К, амид никотиновой кислоты, холинзид и метандростендиол
Выпускается в капсулах
Срок годности — 1 год 6 мес.

Поливитаминовый комплекс.

Применяют в случаях пониженного потребления витаминов, пониженного всасывания их, повышенной потребности организма в витаминах, при анацидном гастрите, хроническом энтерите и колите, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при сахарном диабете, при инфекционных заболеваниях, гипертиреозе, при старческом костном изменении (остеоатрофия, остеопороз), при физическом и умственном переутомлении людей пожилого возраста

Rp.: Capsul. «Tongevit» N. 20
DS. По 1—2 капсулы 3 раза в день, курс лечения — 4 недели

Тонофос — Tonophos (ПНР)

n-Диметиламинофенилфосфиновой кислоты натриевая соль

Синонимы: Aminofenofos, Fosfamin, Phosphamin, Steno-fosfer
Выпускается в ампулах по 1 мл 1%, 2% раствора и в таблетках по 0,05

Хранение — в защищенном от света месте

Срок годности — 2 года

Общетонизирующее средство.

Применяется при расстройстве минерального обмена, нервном и физическом истощении, анемии, отсутствии аппетита, неврозах, гипотонии и т. п.

Rp.: «Tonophos» 0,05
D. t. d. N. 30 in tabul.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Sol. «Tonophos» 1% (2%) 1 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. Внутримышечно по 1 ампуле в день

Торфот — Torfotum

Дистиллят торфа
Хранение — в обычных усло-
виях
Срок годности — 2 года

Биогенный стимулятор.

Применяется при лечении глаз-
ных заболеваний: блефарита,
конъюнктивита, кератита, помут-
нения стекловидного тела, миопи-
ческого хориоретинита, а также
при лечении артритов, радикули-
тов, миалгии

Rp.: Torfoti 1 ml

D. t. d. N. 50 in ampul.

S. Под кожу по 1 мл ежедневно в течение 30—45
дней; под конъюнктиву — 0,2 мл через день

Тосмилен — Tosmilen

(Австрия)

Декаметилен-бис-бромметилат-
м-диметиламинофенилового эфи-
ра диметилкарбаминовой кислоты
Синонимы: Demecariumbromid,
Demecastigmini bromidum, Frum-
tosnii, Humorsol, Visumiotic

Хранение — список А
Срок годности — 3 года

Антихолинэстеразное средство
(см. «Галантамин», «Оксазил»).

Применяется при первичной и
вторичной глаукоме

Rp.: Sol. «Tosmilen» 0,25%
(0,5%, 1%) 5 ml
DS. Глазные капли

Тразикор — Trazicor (ВНР)

1-(Ортоаллилоксифенокси)-3-
изопропиламино-2-пропанола гид-
рохлорид

Выпускается в таблетках по
0,02 и в ампулах по 0,02 в виде
порошка с приложением раство-
рителя

Хранение — в защищенном от
света месте

Срок годности — 5 лет

β-Адренолитик, близкий по
свойствам к «Индералу».

Применяется при стенокардии
(возможны сочетания с миотроп-
ными спазмолитиками), сердеч-
ных аритмиях, сопровождающих-
ся тахикардией и связанных с по-
вышением возбудимости и автома-
тизма (синусовая тахикардия, па-
роксизмальная тахикардия и т. д.),
а также при тиреотоксикозе, фео-
хромоцитоме, во время наркоза,
проводимого галлоидсодержащими
анестетиками, эфиром и цик-
лопропаном. Противопоказан при
брадикардии, бронхиальной астме,
выраженной сердечной недоста-
точностью

Rp.: «Trazicor» 0,02

D. t. d. N. 40 (200) in amp. (tabul.)

S. Содержимое ампулы растворить в приложенном растворителе, вводить в вену медленно или в мышцы по $1/2$ —2 ампулы. Таблетки применять по 1—2 в день 2—3 раза.

**Трапезникова микстура —
Mixture Trapeznikovi**

Успокаивающее средство, по
применению близкое к «Бехтерева
микстура»

Rp.: Natrii bromidi

Chlorali hydrati $\bar{a}\bar{a}$ 4,0

Tincturae Valerianae 10,0

Aquae destillatae 250,0

MDS. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день

Трасилол — Trasylol

Препарат, получаемый из око-
лоушных желез крупного рога-
того скота. 1 мл трасилола (рас-
твор препарата в изотоническом
растворе натрия хлорида) содер-
жит 5000 ЕД

Синонимы: Contrical, Tsalol
(СФРЮ)

Выпускается в ампулах по 5 мл
(25 000 ЕД)

Хранение — в защищенном от
света месте

Срок годности — 5 лет

Ингибитор ряда протеолитиче-
ских ферментов.

Применяют при остром панкре-
атите, хроническом возвратном
панкреатите, при хирургическом
вмешательстве на поджелудочной
железе и близлежащих органах,
при остром паротите

Rp.: «Trasylol» 5 ml (25 000 ED)

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. Внутривенно одномоментно (медленно) капельно;
1-й день — 1—2 ампулы; следующие дни тоже
1—2 ампулы в день с последующим снижением
дозы

Траскова микстура —

Mixture Traskovi
Срок годности — 3 мес.

Отхаркивающее и успокаиваю-
щее средство.

Применяется для лечения брон-
хиальной астмы, хронического и
острого бронхита, бронхоэктати-
ческой болезни, эмфиземы лег-
ких и др.

Rp.: Folii Urticae

Herbae Equiseti

Folii Menthae piperitae $\bar{a}\bar{a}$ 32,0

Herbae Adonidis vernalis

Fructus Anisi vulgaris

Folii Pini āā 12,5
Fructus Cynosbati 6,0
Kalii iodidi
Natrii iodidi
Glycerini āā 100,0
Natrii hydrocarbonatis 19,0
Argenti nitratis 0,003
Aquaе destillatae ad 1000,0
MDS. По 1 столовой ложке после еды с теплым мо-
локом.

Способ приготовления: измельченное растительное сырье помещают в стеклянную колбу и заливают 1 л перегнанной воды. К стеклянной колбе присоединяют обратный холодильник и ставят на подогретую до + 70° водяную баню. После начала кипения жидкости нагревание продолжают в течение 2 ч. После этого настаивание на горячей водяной бане (без подогрева) продолжается в течение 1 ч. Жидкость процеживают через вату и марлю (4 слоя). Находящийся в колбе растительный материал промывают кипящей перегнанной водой и процеживают через ту же вату и марлю. К полученному отвару при температуре + 40° С прибавляют отдельными небольшими порциями гидрокарбонат натрия 19,0. После этого к жидкости вначале добавляют 0,003 нитрата серебра, а затем последовательно йодид калия, йодид натрия и глицерин по 100,0 при постоянном помешивании до полного растворения солей. Жидкость отстаивается в течение 2 суток при комнатной температуре, при этом выпадает осадок. По истечении двух суток жидкость отфильтровывают и добавляют перегнанной воды до получения одного литра препарата

Третамин — Tretaminum
2,4,6-Триэтиленимино-1,3,5-
триазин
Синонимы: Triäthylenmelamin,
Triamelin, Triethanomelamine,
Triethylene Melamine

Выпускается в ампулах по
0,001 и 0,002

Хранение — список А, в про-
хладном месте

Противоопухолевое цитостати-
ческое средство.

Применяется для лечения рети-
нобластом

Rp.: Tretamini 0,001 (0,002)

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Внутримышечно из расчета 0,06—0,08 мг на 1 кг
веса больного. Перед употреблением препарат рас-
творяют в 5 мл стерильной воды для инъекций

Триамцинолон — Triamcinolon
9α-фтор-16α-оксипреднизолон
Синонимы: Adcortyl, Aristo-
cort, Delfacort, Delphicort, Delso-
lone, Flogicort, Fluosterolone, Flu-
oxiprednisolon, Kenacort (Англия),

Гормональный препарат, ана-
лог глюкокортикоидов.

Применяется в тех же случаях,
что и «Преднизолон». Отличается
большой эффективностью

Ledercort, Omcilon, Oticortrix, Polcortolon (ПНР), Positon, Sado-cort, Supercort, Trialona, Triam-cort, Volon

Выпускается в таблетках по 0,001 и 0,004

Хранение — список Б

Срок годности таблеток — 6 лет (ЧССР)

Рр.: Triamcinoloni 0,001 (0,004)

D. t. d. N. 50 in tabul

S. По 2—5 таблеток в день с постепенным снижением по 2 мг каждые 2—3 дня

Трийодтиронин —

Triiodthyronin (ГДР)

L-3,3',5-Trijodthyronin

Синонимы: Vasoprocin, Cynomel, Cytobin, Cytomel, Ibiothyron, Jodotrioxon, Jotiron, J-Tiron, Levotrin, Liothyronin, Tertroxin, Thybon, Tirogen, Tiroton, Ti-Tre, Trionine, Triothyronone, Tyjodin

Выпускается в драже по 0,00001

Хранение — список Б

Срок годности — 3 года

Гормон щитовидной железы.

Применяют при гипотиреозе, микседеме, ожирении, депрессии и пучеглазии

Рр.: «Triiodthyronin» 0,00001

D. t. d. N. 20 in dragee

S. До 50—100 мкг в день

Трийотраст — Triiotrastum

3-Ацетиламино-2,4,6-трийод-бензойной кислоты натриевая соль

Синонимы: Acetiodone, Acetri-zoat-Natrium, Bronchoselectan, Contraxine, Diaginol, Fortombri-ne, Gerotrast, Iodopact, Jodoren, Jodozoat — Natrium, Natrii acetri-zoas, Opagraf, Salpix, Trijoden, Triopac, Triumbren (ЧССР), Tri-urof, Triuropan (ПНР), Urospect, Vesamin

Выпускается в ампулах:

30% 2 и 10 мл

50% 2, 10 и 20 мл,

70% 2, 10 и 20 мл

Хранение — в прохладном, защищенном от света месте

Срок годности — 3 года

Рентгеноконтрастное средство.

Применяют при урографии, пиелографии, уретроцистографии, вено- и ангиографии, аортографии, ангиокардиографии.

Примечание: перед применением препарата определяют чувствительность больного к йоду. Для этой цели вводят в вену (за 1—2 дня) 2 мл раствора нужной концентрации

Rp.: Sol. Triiotrasti 30% (50%, 70%) 20 ml

D. t. d. N. 2 in ampul.

S. Внутривенно (в локтевую вену, в тыльную вену стопы или в бедренную вену). Вводят медленно

Тримекаин — Trimecainum

2,4,6-Триметиланилида диэтил-аминоуксусной кислоты гидрохлорид

Синонимы: Mesdicain, Mesidicaine, Mesocain, Trimecaini hydrochloridum

Хранение — список Б

Местноанестезирующее вещество. По свойствам аналогично «Ксикаину».

Для инфильтрационной анестезии применяют тримекаин в виде 0,25—0,5—1% раствора. 0,25% раствор вводят до 800 мл; 0,5% раствор вводят до 400 мл; 1% раствор вводят до 100 мл. Для проводниковой анестезии применяют 1% раствор до 100 мл или 2% раствор до 20 мл

Rp.: Sol. Trimecaini 0,25% (0,5%, 1%) 500,0

Sterilisetur!

DS. Для местной анестезии

Триоксазин — Trioxazin (ВНР)

N-(3,4,5-Триметоксибензоил)-тетрагидро-1,4-оксазин

Синонимы: Sedoxazin, Trimetozipum

Выпускается в таблетках по 0,3

Хранение — список Б

Срок годности — не ограничен

Успокаивающее средство («малый» транквилизатор).

Применяют при невротических состояниях, сопровождающихся явлениями возбуждения, повышенной раздражительности, тревоги, страха, при бессоннице и т. п.

Rp.: «Trioxazin» 0,3

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Триоппан — Triospan (ВНР)

Состав на 1 таблетку:

Isopropamidiodidi 0,005

Phenobarbitali 0,015

Nospani 0,04

Хранение — список Б

Срок годности — 5 лет

Холинолитическое, спазмолитическое и успокаивающее средство.

Применяется при язвенной болезни желудка, хронических гастритах и колитах, холециститах, спазмах полых органов и т. д. Курс лечения при заболеваниях желудка — 6 недель

Rp.: Tabul. «Triospan» N. 50

DS По 1 таблетке 3 раза в день

Трипсимуск — Tripsimusc (ПНР)

Состав на 1 ампулу:

Tripsini

Diprazini \overline{aa} 0,025

Huscaini 0,05

К каждой ампуле прилагается по 5 мл растворителя (пропиленгликоля)

Хранение — в обычных условиях

Срок годности — 2 года

Противовоспалительное средство.

Применяется при тромбозе, флеботромбозе, послеоперационной тканевой реакции, язве голени, диабетической гангрене, пролежнях, хроническом поражении легких, бронхов и плевры, бронхоэктазии, воспалении лобной и гайморовой пазухи. Противопоказан при нарушениях свертывания крови и при поражениях паренхимы почек

Rp.: «Tripsimusc» 0,1

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Содержимое ампулы растворить в 5 мл приложенного растворителя, вводить по 1 мл 1—2 раза в день

Триптизол — Tryptizol

(Англия, СФРЮ)

5-(3'-Диметиламинопропилиден)-добензо-(a,d)-1,4-циклогептадиена гидрохлорид

Синонимы: Aderpil, Amitriptylinhydrochlorid, Elatrol, Elavil, Horizon, Lantron, Laroxyl, Proheptadien, Redomex, Saroten, Sarotex, Triptyl, Tryptanol

Выпускается в таблетках по 0,025 и в ампулах 0,1% раствора 10 мл

Хранение — список Б

Срок годности — 4 года

Антидепрессант, близкий к «Трансамину», «Имизину» и пр.

Применяют при различных депрессивных состояниях, в том числе при шизофренической депрессии, маниакальной и реактивной депрессии. Эффективен при лечении больных с навязчивыми идеями, при чувстве страха и тревоги, угнетении настроения, бессоннице и др. Противопоказан при глаукоме. Может применяться вместе с производными фенотиазина

Rp.: «Tryptizol» 0,025

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: «Tryptizol» 0,1% 10 ml

D. t. d. N. 6 in ampul.

S. По 2—3 мл ежедневно внутримышечно или внутривенно

Трисалин — Trisalin (ЧССР)

Состав на 1 ампулу «mite»:

Natrii glycerophosphatis 0,1

Natrii kakodilatis 0,05

Общеукрепляющее и тонизирующее средство.

Применяется при физической и умственной усталости, неврасте-

Strychnini nitratis 0,0005
Aquaе pro injectionibus ad 1 ml
Состав на 1 ампулу «forte»:
Natrii glycerophosphatis 0,1
Natrii kakodilatis 0,1
Strychnini nitratis 0,001
Aquaе pro injectionibus ad 1 ml
Хранение — список А, в защищенном от света месте

нии, подавленном состоянии и т.п.
Близок к отечественному препарату «Дуплекс»

Rp.: Sol. «Trisalin» («mite» aut «forte») 1 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. Под кожу или внутримышечно по 1 ампуле через день

Триседил — Trisedyl (БНР)
4-Фтор-4-1-[4-окси-4-(3"-трифторметил)-фенил]-пиперидино-бутирофенона гидрохлорид
Выпускается в таблетках по 0,0005 и в ампулах по 1 мл 0,25% раствора
Хранение — список Б
Срок годности — 5 лет

Нейролептик («большой» транквилизатор), по свойствам и применению аналогичный «Галоперидолу».

Применяется в психиатрии при остром психомоторном возбуждении, маниакальных состояниях и т.п.

Rp.: Tabul. «Trisedyl» 0,0005
D. t. d. N. 20
S. Начиная с 1 таблетки в день, суточную дозу постепенно увеличивают до 3—4 таблеток

Rp.: Sol. «Trisedyl» 0,25% 1 ml
D. t. d. N. 20 in ampul.
S. Внутримышечно по 1/2—1 ампуле в день

Трисульфам — Trisulfan (ПНР)
Состав на 1 таблетку:
Norsulfazoli 0,2
Sulfadimezini
Sulfacyli aa 0,15
Хранение — список Б
Срок годности — 5 лет; после переконтроля — 5 лет

Химиотерапевтическое средство. Комбинированный сульфаниламидный препарат.

По применению аналогичен «Сульфазину» и «Норсульфазолу»

Rp.: Tabul. «Trisulfan» N. 10
DS. По 4 таблетки на первый прием, затем по 2 таблетки каждые 4 ч (по схеме)

Трифтазин — Triftazinum
2-Трифторметил-10-[3-(1-метил-4-пиперазинил)-пропил]-фенотиа-

Нейролептик («большой» транквилизатор), близкий к «Аминазину». Отличается более сильным

вина дигидрохлорид

Синонимы: Eskazinyl, Jatropene-
gal, Modalina, Stelazin (Англ.),
Terfluzine, Trifluoroperazine, Tri-
fluperazine, Triptazine

Выпускается в драже от 0,001
до 0,01 и в ампулах по 1,0 0,2%
раствора

Хранение — список Б

Срок годности драже — 3 года,
0,2% ампул — 1 год

седативным и противорвотным дей-
ствием; депрессия выражена сла-
бее.

Применяется в психиатрической
практике при лечении различных
форм шизофрении, маниакально-
депрессивного психоза, неврозов
и других заболеваний централь-
ной нервной системы и т. п. (см.
«Аминазин»)

Rp.: Triftazini 0,001

D. t. d. N. 30 in dragee

S. По 1—2 драже (0,001) с постепенным повышением
до появления терапевтического эффекта

Rp.: Sol. Triftazini 0,2% 1,0 ml

D. t. d. N. 6 in ampul.

S. Внутримышечно вводят в случаях, требующих
быстрого эффекта

Тропарин — Troparin

Состав на 1 таблетку:

Methylhomatropini bromidi 0,0015

Paraverini hydrochloridi 0,04

Хранение — список А

Холинолитическое и спазмолити-
ческое средство.

Применяют при кардио- и пи-
лороспазме, язве желудка и двена-
дцатиперстной кишки, холеци-
стите, рвоте беременных, спа-
стическом запоре, почечных ко-
ликах, бронхиальной астме, спа-
стическом кашле, ангиоспазмах,
коклюше, стенокардии, мозговых
ангиоспазмах, мигрени, цистите
и т. п.

Rp.: Tabul. «Troparinum» N. 20

DS. По 1—3 таблетки 3 раза в день. В случае острой
необходимости вводят подкожно 1—2 мл

Тропарин комбинированный — Troparin et Phenobarbitalum

Состав на 1 таблетку:

Methylhomatropini bromidi 0,002

Phenobarbitali 0,02

Paraverini hydrochloridi 0,04

Хранение — список А

Применяют в тех же случаях,
как и тропарин, но действует
также и успокаивающе

Rp.: Tabul. Troparin et Phenobarbitalum N 20

DS. По 1—2 таблетки 3 раза в день

Тропафен — Тропарphenum
Тропинового эфира α -фенил- β -ацетоксифенил-пропионовой кислоты гидрохлорид

Синоним: Tropodifen

Выпускается в ампулах по 1 мл 1% и 2% раствора

Хранение — список Б

α -Адренолитик, по свойствам и применению близкий к «Фентоламину».

Применяют для лечения заболеваний, связанных с нарушением периферического кровообращения (эндартериит, болезнь Рейно, акроцианоз и др.), а также для купирования гипертонических кризов

Rp.: Sol. Troparpheni 1% (2%) 1 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Под кожу, внутримышечно по 1 мл 1% или 2% раствора

Трунечка сыроватка —
Serum Trunetschky

Препарат предназначен для лечения и профилактики атеросклероза и обменных артрозов. Препарат может применяться как внутрь, так и парентерально

Rp.: Natrii sulfatis 0,44

Natrii chloridi 4,92

Natrii phosphatis 0,15

Natrii carbonatis 0,21

(aut Kalii carbonatis 0,26)

Kalii sulfatis crystallisati 0,4

(aut Kalii chloridi 0,35)

Aquae destillatae ad 100,0

MDS. Внутрь по столовой ложке 2 раза в день перед едой

Тубокурарина хлорид —
Tubocurarinī chloridum (ЧССР)

Алкалоид «трубчатого» курапе из растения *Chondodendron tomentosum*

Синонимы: Amelizol, Curadentensin, Curalgessina, Curarin «Asta», Delacurarine, Intocostrin-T, Myostatine, Myrcin, Tubadil, Tubarine, Tubocuran, d-Tubocurarinchlorid, Tubocurin

Выпускается в ампулах по 2 и 5 мл 1% раствора

Срок годности — 3 года

Миорелаксант антидеполяризующего действия, близкий к «Диплацину», «Ремиолану».

Применяют главным образом в хирургии как средство, расслабляющее скелетную мускулатуру. Препарат применяют также в психиатрической практике для предупреждения травматических повреждений при судорожной терапии шизофрении, а также в ортопедии и травматологии с целью вправления сложных вывихов и для расслабления мускулатуры при репозиции отломков

Rp.: Sol. Tubocurarinī chloridi 1% 2 ml (5 ml)

D. t. d. N. 25 in ampul.

S. Внутривенно

Убретид — Ubretid (Австрия)
Гексаметилен-1,6-бис-(*N*-метил-
карбаминовой кислоты 3-пириди-
лового эфира метилгидроксида)
дибромид

Синоним: Distigminbromid
Выпускается в таблетках по
0,0005 и в ампулах по 1 *мл* 0,05%
раствора

Хранение — список А

Антихолинэстеразный препа-
рат длительного действия.

Применяется для профилактики
и лечения послеоперационной ато-
нии кишечника, для лечения миа-
стении (см. «Прозерин»)

Rp.: «Ubretid» 0,0005
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. Внутрь по 1 таблетке 1—2 раза в день

Rp.: Sol. «Ubretid» 0,05% 1 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. По 0,5 *мл* 1—2 раза в сутки

Уксус ароматный —
Acetum aromaticum

Местнораздражающее и антисеп-
тическое средство.

Применяется для обработки ко-
жи с целью профилактики гной-
ничковых заболеваний и т. п.

1. Rp.: Olei Caryophyllorum
Olei Lavandulae
Olei Citri āā 4,0
Olei Bergamottae
Olei Thymi āā 2,0
Olei Cinnamomi 1,0
Acidi acetici concentrati 48,0
MDS. Дать понюхать смесь на ватке при обмороке
2. Rp.: Olei Bergamottae
Olei Citri āā 2,0
Olei Eucalypti
Olei Rosmarini āā 1,0
Olei Thymi 2,0
Aetheris acetici 20,0
Spiritus aethylici 90% 350,0
Acidi acetici 30% 384, 0
Aquae destillatae 1728,0
Caryophylli contusi
Corticis Cinnamomi contusi 20,0
MDS. Наружное
3. Rp.: Olei Caryophyllorum 12,0
Olei Lavandulae
Olei Citri āā 8,0
Olei Bergamottae 4,0
Olei Cinnamomi 2,0
Olei Thymi 4,0
Acidi acetici 96% 100,0
MDS. То же, что пропись I

4. Rp.: Olei Bergamottae
Olei Citri āā 10,0
Olei Caryophyllorum 5,0
Olei Cinnamomi 1,0
Olei Lavandulae
Olei Thymi āā 3,0
Aetheris aceticici 75,0
Spiritus aethylici 90% 125,0
Aceti 250,0
MDS. Наносить на пораженные участки кожи

Унгветол — Unguetolum Фунгистатическое и антимикробное средство.
Состав: Применяется для лечения поверхностных микозов, себорей, экземы, стрептодермии и т. п.
Trinitrotoluoli 2,0
Unguenti Zinci 80,0
Olei jecoris Aselli 20,0

Rp.: Unguetoli 100,0
DS. Наносить тонким слоем на пораженные участки кожи

Ундевит — Undevit Поливитаминный комплекс, по свойствам близкий к «Геровиту».
Состав на 1 таблетку или драже: Применяется людьми среднего и пожилого возраста с лечебной и профилактической целью при явлениях преждевременного старения
Retinoli acetatis 3300 ИЕ (0,001)
Thihamini chloridi 0,002
Riboflavini 0,002
Pyridoxini hydrochloridi 0,003
Cyanocobalamini 0,000002
Nicotinamidi 0,02
Rutini 0,01
Tocopheroli acetatis 0,01
Acidi folici 0,0005
Calcii pantothenatis 0,003
Acidi ascorbinici 0,075
Хранение — в защищенном от света месте
Срок годности — 1 год

Rp.: Dragee Undeviti N. 50
DS. С профилактической целью по 1 драже 3 раза в день; с лечебной целью — по 2 драже 3 раза в день

Унион — Union Кератолитическое средство.
Используется для удаления мозоли
Rp.: Emplastri citrini 9,0
Emplastri adhaesivi 6,0
Acidi salicylici 2,0
MDS. Наружное

Унитиол — Unithiolum

2,3-Димеркаптопропансульфонат натрия

Выпускается в ампулах по 5 мл 5% раствора и таблетках по 0,25 (0,5)

Хранение — в обычных условиях при комнатной температуре

Срок годности — 5 лет; после переконтроля — 3 года

Антидот.

Применяют для лечения острых и хронических отравлений соединениями мышьяка, ртути, хрома, висмута и других металлов (но не свинца!)

Rp.: Unithioli 0,25 (0,5)
D: t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1 таблетке 2—4 раза в день

Rp.: Sol. Unithioli 5% 5 ml
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. Вводить внутримышечно по 5 мл 3—4 раза в сутки

**Унна паста цинковая —
Pasta Zinci Unna**

Защитное средство для кожи.
Применяется при работе с агрессивными веществами и органическими растворителями

1. Rp.: Gelatinae medicinalis 3,0
Zinci oxydi 1,0
Glycerini
Aquae destillatae āā 3,0
2. Rp.: Gelatinae medicinalis 10,0
Aquae destillatae 40,0
Glycerini 25,0
Zinci oxydi 10,0
Glycerini 15,0
3. Rp.: Gelatinae medicinalis 15,0
Aquae destillatae 45,0
Glycerini 10,0
Zinci oxydi
Glycerini āā 15,0
4. Rp.: Gelatinae medicinalis 15,0
Aquae destillatae 35,0
Glycerini 25,0
Zinci oxydi 10,0
Glycerini 15,0
5. Rp.: Gelatinae medicinalis 20,0
Aquae destillatae 40,0
Glycerini 10,0

Zinci oxydi
Glycerini aa 15,0
M. f. pasta

DS. Наносится на кожу в расплавленном виде (подогреть перед употреблением)

Приготовление: мелко изрезанный желатин помещают в тарированную фарфоровую чашку, обливают предписанным количеством воды и оставляют до разбухания. После превращения желатина в мягкие студенистые кусочки в чашку прибавляют глицерин и нагревают смесь на водяной бане при помешивании до получения однообразного раствора. Взвесив чашку, восполняют убыль в весе, образовавшуюся за счет испарения воды. Окись цинка тщательно растирают со второй порцией глицерина в подогретой ступке и к полученной смеси присоединяют теплый желатиновый раствор

Унна мазь пирогаллоловая
сложная — Unguentum
Pyrogalloli compositum Unna

См. «Мазь ихтиоловая сложная»

Rp.: Acidi pyrogallici 5,0
Acidi salicylici 2,0
Ichthyoli 5,0
Vasellini 88,0
M. f. unguentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи.

Унна мазь резорциновая
сложная — Unguentum
Resorcini compositum Unna

См. то же

Rp.: Resorcini
Ichthyoli aa 5,0
Acidi salicylici 2,0
Basis unguenti 88,0
M. f. unguentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи

Унна мазь свинцовая —
Unguentum Plumbi Unna

См. «Мазь свинцовая»

Rp.: Vasellini 30,0
Olei Olivarum 8,0
Solutionis Plumbi subacetatis 10,0
Glycerini 5,0
M. f. unguentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи

Унна помада — Pomada Unna

Косметическое средство для кожи лица

1. Rp.: Olei Cacao 20,0 Служит основой для других
Olei Vaselini 40,0 прописей
Olei Rosae 0,1
2. Rp.: Sulfuris praecipitati 1,0
Pomadae Unnae 30,0
3. Rp.: Lanolini 1,0
Basis unguenti 12,0
Aquae Rosae
Aquae Naphae āā 2,0
4. Rp.: Olei Cacao 26,0
Olei Olivarum 13,0
Balsami peruviani aut Vinylini 1,0
M. f. unguentum
DS. Наружное

Унна спирт — Spiritus Unna

Кератолитическое, обезжиривающее, подсушивающее и раздражающее средство.

Применяется для лечения жирной себореи (перхоти)

- Rp.: Resorcini 5,0
Spiritus aethylici 95% 150,0
Spiritus coloniensis 50,0
Olei Ricini 2,0
MDS. Для смазывания корней волос

Урбазон — Urbason (ФРГ)

6- α -Метилпреднизолон

Синонимы: Besonia, Bioprednon, Medesone, Medrelon, Medrol, Mestristolone, Mesopren, Metastab, Methylprednisolon, Metilstendiolo, Metrisone, Moderin, Suprametil, Wyacort

Выпускается в таблетках по 0,004

Хранение — список Б

Полусинтетическое производное глюкокортикоида кортизона.

По применению аналогично «Преднизолону»

- Rp.: «Urbason» 0,004
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 2—10 таблеток ежедневно

Уреапласт — Ureaplastum

Состав:

Ureae purae 20,0
Aquae destillatae 10,0
Cerae 5,0
Lanolini 20,0
Emplastrum Plumbi 45,0

Кератолитическое средство.

Применяется для удаления ногтей при онихомикозах

Rp.: Ureaplasti 100,0

DS. Наносить на пораженные ногти. Через 4—5 суток нанесения соскрести препарат вместе с размягченным слоем ногтя. При необходимости повторить процедуру 1—2 раза

Уробесалол — Urobessalolum

Состав на 1 таблетку:
Extracti Belladonnae 0,015
Hexamethylentetramini
Phenylis salicylatis aa 0,25
Хранение — в сухом месте

Антимикробное и спазмолитическое средство.

Применяется при заболеваниях кишечника, цистите и пиелонефрите

Rp.: Tabul. Urobessaloli N. 10

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Уродан — Urodanum

Состав:
Piperazini phosphatis 2,5
Hexamethylentetramini 8,0
Natrii benzoatis 2,5
Lithii benzoatis 2,0
Dinatrii phosphatis 10,0
Natrii hydrocarbonatis 37,5
Acidi tartarici 35,6
Sacchari 1,9

Выпускается в гранулах
Срок годности — 1 год; после переконтроля — 6 мес.

Препарат способствует нормализации минерального и азотистого обмена.

Применяется при подагре, обменных артрозах, нефро- и холелитиазе

Rp.: Urodani 250,0

DS. По $\frac{1}{2}$ —1 чайной ложке на $\frac{1}{2}$ стакана воды

Уродонал — Urodonal

То же

Примечание: сидонал (соль пиперазина и хинолинкарбоновой кислоты) — противоревматическое средство

Rp.: Hexamethylentetramini 0,5

Sidonali (Piperazini chininici) 6,0

Lysidini 8,0

Natrii benzoatis 2,5

Lithii benzoatis 2,0

Dinatrii phosphatis 10,0

Natrii hydrocarbonatis et

Acidi tartarici ad 100,0

Ut fiant granulae

DS. По $\frac{1}{2}$ —1 чайной ложке на $\frac{1}{2}$ стакана воды
2 раза в день

Урокармин — Urocarmin (ЧССР)
4-этокси-2,4-диаминоазобензола гидрохлорид

Синонимы: Aethoxazenum, Car-murit, Cystidium, Cystural B, Diamazol, Diaphenyl, Etoxa-zeu, Pyraseptic, Salvuron, Serenium
Выпускается в таблетках по 0,1
Хранение — в сухом месте

Химиотерапевтическое средство.
Применяют при остром и хроническом цистите, пиелостите и других инфекционных болезнях мочевыводящих путей

Rp. Tabul. «Urocarmin» 0,1
D. t. d. N. 50
S. По 1—2 таблетки 3 раза в день

Уросал — Urosalum
Состав на 1 таблетку:
Hexamethylentetramini 0,25
Phenylii salicylatis 0,25
Хранение — в сухом месте
Срок годности — 2 года

Свойства и применение — см.
«Уробесалол»

Rp.: Tabul. «Urosalum» N. 6
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Урограф — Urotrast
3,5-дифод-1-метил-4-оксо-1,4-дигидропиридин-2,6-дикарбоновой кислоты динатриевая соль
Синонимы: Contraste Urologico, Jodoxyl, Lumoxyd, Natrium methylidijodchelidamicum, Neopielofanina, Neo-Yorax, Nitasom, Opa-xil, Pielectan, Sugiuron, Uridog-nost, Urografin B, Uroselectan B, Urumbrin

Выпускается в ампулах по 20 мл 60 и 75% раствора
Хранение — в защищенном от света месте
Срок годности — 2 года

Рентгенодиагностическое средство.

Применяют при внутривенной урографии, аортографии, легочной и мозговой ангиографии, венографии, ретроградной пиелографии, уретроцистографии, до- и послеоперационной холангиографии, панкреатографии, цистографии, плацентографии

Примечание: для проверки чувствительности проводят тест-пробу

Rp.: Sol. Urotrasti 60% (75%) 20 ml
D. t. d. N. 5 in ampul.
S. Внутривенно медленно

Фалитром — Falitrom (ГДР)
3-(1'-Фенилпропил)-4-оксику-
марин

Синонимы: Falithrom, Liqua-
mar, Marcoumar, Marcumar, Phen-
procoumarol, Phenprocoumon,
Phenylpropylhydroxycumarinum

Выпускается в таблетках по
0,03

Хранение — список А

Rp.: «Falitrom» 0,03

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. Первый день — 6 таблеток, второй день — 4 таб-
летки

Антикоагулянт непрямого дей-
ствия, близкий к «Дикумарину».

Применяют при тромбозе вен
ног, эмболии, инфаркте миокарда
и легкого, закупорке артерий, для
профилактики тромбозов и пр.

Фалихол — Falichol (ГДР)

Состав на 1 драже:

Fellis Tauri 0,15

Hexamethylenetetramini 0,075

Phenolphthaleini 0,0135

Magnesii ustae 0,03

Camphorae 0,0012

Mentholi 0,0012

Hydrargyri chloridi 0,0048

Хранение — в сухом, защищен-
ном от света месте

Rp.: Drag. «Falichol» N. 15

DS. Начальная доза — 1 драже вечером, с 3-го
дня утром, вечером и иногда днем по 1 драже.
Таблетки проглатывают, не раз-
жевывая

Желчегонное (холеретик и холе-
кинетик) средство.

Применяют для лечения хрони-
ческого холецистита, гепатита, хо-
лелитиаза и пр.

Фарингосепт — Faringosept
(НРБ)

1,4-Бензохинонаминогидра-
зонтиосемикарбазона моногидрат

Синонимы: Ambazon, Anginon,
Guanothiazon, Inversal, Iversal,
Ivertol, PrimaI, Sepsoral

Выпускается в таблетках по 0,01

Хранение — в обычных усло-
виях

Антисептическое средство.

Применяется для лечения и про-
филактики заболеваний полости
рта (тонзиллиты, стоматиты, со-
стояния после тонзиллэктомии и
экстракции зубов)

Rp.: Tabul. «Faringosept» 0,01

D. t. d. N. 20

S. По 1 таблетке 3—5 раз в день после еды под язык
до полного рассасывания. После лечения воз-
держиваться от еды в течение 3 ч

Фарктил — Farctyl
(Швейцария)

Выпускается в ампулах по 3 мл
и в капсулах по 0,25

Комбинированный препарат.

Применяется при стенокардии, сифилитическом коронарите, артериосклеротической гипертонии, инфаркте миокарда

Rp.: Sol. «Farctyl» 3 ml

D. t. d. N. 6 in ampul.

S. По 1 ампуле внутривенно 3 раза в день до снятия болей

Rp.: Capsul. «Farctyl» 0,25

D. t. d. N. 20

S. По 1 капсуле 3 раза в день

Фаулеров раствор мышьяка —

Solutio arsenicalis Fowleri

Раствор арсенита калия — Li-
quor Kalii arsenitis

Хранение — список А

Мышьяковистый препарат. В малых дозах стимулирует эритропоз и проявляет общетонизирующее действие, в больших — угнетает лейкопоз.

Применяется при анемии, истощении, неврастении, миастении по 1—3 капли 2—3 раза в день. При обострении хронического лейкоза умеренной тяжести назначают по схеме, разработанной в ЦОЛИПК, начиная с 4—5 капель 3 раза в день, ежедневно прибавляя по 1 капле на прием. После дозы 9—10 капель на прием делают трехдневный перерыв. После перерыва больной принимает раствор в той же дозе циклами по 4 дня с трехдневными перерывами. Через 3 недели дозу снижают до исходной, ежедневно уменьшая на 1 каплю на прием. Препарат принимают после еды. В случае появления тошноты, рвоты, поноса лечение прекращают. Противопоказан при поражениях почек и периферических нервов, нарушениях пищеварения, сопровождающихся поносом и выраженной анемией

Rp.: Acidi arsenicosi anhydrici 1,0
Kalii carbonatis 1,0
Spiritus camphorati 1,0
Spiritus aethylici 9,0
Acidi hydrochlorici diluti q. s.
Aquae destillatae ad 100,0

MDS. Внутрь от 1 до 10 капель 3 раза в день

Приготовление: 1,0 калия карбоната растворяют в 1 мл горячей воды, прибавляют 1,0 мышьяковистого ангидрида и нагревают до полного растворения. Раствор разбавляют 50 мл воды и прибавляют понемногу при непрерывном взбалтывании разведенной соляной кислоты до нейтральной реакции. К охлажденной жидкости прибавляют при взбалтывании смесь из 1 мл камфорного спирта и 9 мл спирта и воды до 100 мл. После отстаивания раствор фильтруют

Фенальгин — Phenalgin (ЧССР)

Состав на 1 таблетку:

Phenacetini

Salicylamidi aa 0,2

Phenobarbitali 0,025

Codeini phosphatis 0,01

Coffeini 0,05

Хранение — список Б

Состав фенальгина отечественного производства:

Analgin

Amidopyrini

Phenacetini aa 0,125

Срок годности — 1 год

Болеутоляющее, успокаивающее и противовоспалительное средство.

Применяется при головной и зубной болях, мучительном кашле, заболеваниях опорного аппарата и периферических нервов

Rp.: Tabul. «Phenalgin» N. 10

DS. По 1 таблетке 1—3 раза в день

Фенамин — Phenaminum

d,l-1-Фенил-2-аминопропана

сульфат

Синонимы: Aktedrin, Amphetamin, Amphetamin, Astedin, Benzedrin, Benzpropamin, Euphodyn, Fenedrin, Isoamin, Isomyn, Leodrin, Mecodrin, Oktedrin, Propenyl, Psychedrin, Psychoton, Sedolin, Simpatedrin, Sympamin, Vapredrine

Выпускается в таблетках по 0,01

Хранение — список А

Срок годности — 5 лет; п/п — 3 года

Психостимулирующее средство.

Применяют при депрессивных состояниях различного происхождения, отравлении наркотическими и снотворными средствами, при вторичной слабости родовой деятельности, у здоровых — для временного повышения умственной и физической работоспособности. Противопоказания: гипертензии различного происхождения, церебральный атеросклероз, миокардиты и миокардиодистрофии, возбуждение, бессонница

Rp.: Phenamini 0,01
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1 таблетке 1 раз в день

Фенасал — Phenasalum
2',5-Дихлор-4'-нитросалицил-анилид
Синонимы: Aten, Cestocid, Cop-harten, Kontal, Lintex, Mansonil, Mato, Niclosamidum, Sulqui, Tenairene, Tredemine, Vermitin, Yomesan
Хранение — список Б
Срок годности — 4 года

Противоглистное средство.
Применяют при инвазии широким лентецом и невооруженным цепнем. Часто комбинируют с дихлорофеном, акрихином и др. При инвазии вооруженным цепнем не применяют

Rp.: Phenasali 0,5
D. t. d. N. 20
S. Детям до 5 лет — 0,5,
» от 5 до 9 — 1,0,
» от 9 до 12 лет — 1,5.
Взрослым — 2 г порошка. Принимать на ночь вместе с $1\frac{1}{2}$ чайной ложки гидрокарбоната натрия

Фенатрин — Phenatrin
Состав на 1 таблетку:
Atropini sulfatis 0,0005
Papaverini hydrochloridi
Phenobarbitali aa 0,02
Хранение — список А

Холинолитическое, спазмолитическое и успокаивающее средство.
Применяют при гипертонической болезни I стадии, стенокардии, холецистите и других состояниях, сопровождающихся спазмами гладких мышц

Rp.: Tabul. «Phenatrinum» N. 10
DS. По 1 таблетке 2 раза в день

Фенверин — Phenverinum
Состав на одну таблетку:
Extracti Belladonnae
Papaverini hydrochloridi aa 0,02
Phenyli salicylatis 0,3
Хранение — список Б

Свойства и применение аналогичны «Бесалолу», «Уробесалолу»

Rp.: Tabul. «Phenverinum» N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Фенокodin — Phenocodin (ЧССР)

Состав на 1 таблетку:

Phenobarbitali 0,009

Codeini hydrochloridi 0,015

Хранение — список Б

Срок годности — 5 лет

Противокашлевое и успокаивающее средство.

Применяют при позывах к кашлю, в особенности при наличии опасности кровохаркания

Рр.: Tabul. «Phenocodin» N. 10

DS. По 1 таблетке 1—3 раза в день

Фентоламин — Phentolaminum

2-[N-Пара-толил-N-(мета-оксифенил)-аминометил]-2-имидазолин гидрохлорид или метансульфонат

Синонимы: Dibasin, Phentolamine, Regitine, Rogitine

Выпускается в таблетках по 0,025 и в ампулах в порошке по 0,005

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 2 года; после переконтроля — 1 год

α-Адренолитик (см. «Дигидроэрготамин»).

Применяют при расстройстве периферического кровообращения, а также при лечении трофических язв конечностей, вялозаживающих ран, пролежней, отморожений. Может также применяться для купирования гипертонических кризов. Препарат выбора при лечении феохромоцитомы

Рр.: Phentolamini hydrochloridi 0,025

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 1—2 таблетки 3—5 раз в день после еды

Рр.: Phentolamini methansulfonatis 0,005

D. t. d. N. 6 in ampul.

S. Развести в 1 мл воды для инъекций, вводить в мышцы

Фепранон — Phepranonum

1-Фенил-2-диэтиламино-1-пропанола гидрохлорид

Синонимы: Abulemin, Adiposon, Alipid, Amferpranonum, Anorex, Keramin, Liposlim, Magrene, Menutil, Modulor, Obesitex, Parabolin, Parvin, Sinapet, Teranil

Выпускается в таблетках по 0,025

Хранение — список А

Срок годности — 2 года

Анорексигенный препарат.

Применяют при ожирении у лиц с резко выраженными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Может вызвать пристрастие

Рр.: Phepranoni 0,025

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 1 таблетке 2 раза в день (за 1 ч до завтрака и обеда)

Ферковен — Ferrcovenim

Препарат железа для внутривенного введения.

Состоит из сахара железа, глюконата кобальта и раствора углеводов.

В 1 мл содержится 0,02 железа и 0,00009 кобальта

Хранение — в защищенном от света месте

Срок годности — 2 года

Препарат железа.

Применяют при лечении гипохромных анемий различной этиологии

Rp.: Ferrcoveni 1 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. В вену 1 раз в день в течение 10—15 дней. Первые 2 инъекции вводят по 2 мл, затем по 5 мл. Введение производят медленно (в течение 8—10 мин)

Феррокаль — Ferrocalum

Состав на 1 таблетку:

Ferri sulfatis (II) 0,2

Calcii fructosodiphosphatis 0,1

Lecithini 0,02

Хранение — в сухом месте

Срок годности — 1 год

Общеукрепляющее средство.

Применяется при различных формах вторичного малокровия (гипохромных анемиях), при общем упадке сил, после инфекционных заболеваний и т. п.

Rp.: Tabul. «Ferrocalum» N. 20

DS. От 2 до 6 таблеток 3 раза в день после еды

Ферронат — Ferronat (ЧССР)

Состав на 1 драже:

Ferri gluconatis 0,2

Acidi ascorbinici 0,02

Хранение — в сухом месте

Срок годности — 6 мес.

Свойства и применение — см. «Ферковен»

Rp.: Dragee «Feronat» N. 50

DS. По 1—3 драже 2—3 раза в день после еды. Таблетки проглатывать целиком, не разжевывать и не запивать водой

Ферроцерон — Ferrroceronum *

Карбоксибензоилферроцена натриевая соль

Железосодержащий препарат.

Применяется для лечения различных анемий, наилучший эф-

* Ранее назывался «Эритростимулин».

Выпускается в таблетках по 0,3
Хранение — в прохладном ме-
сте
Срок годности — 2 года

фект наблюдается при железодо-
фицитных анемиях. Во время ле-
чения моча может окрашиваться
в красный цвет, что не является
опасным

Rp.: Ferroceroni 0,3
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке 3 раза в день после еды

Феррум лек — Ferrum Lек
(СФРЮ)

То же

1 ампула для внутримышечного
введения (2 мл) содержит 100 мг
железа в виде ферри-полиизомаль-
тозы

1 ампула для внутривенного
введения (5 мл) содержит 100 мг
железа в виде ферри-сахарата

Хранение — в защищенном от
света месте

Срок годности — 5 лет

Rp.: «Ferrum Lек» 2 (5) ml
D. t. d. N. 5 in ampul.
S. Внутримышечно или внутривенно; в последнем
случае содержимое ампулы разбавляют 10 мл
изотонического раствора натрия хлорида

Ферстера капли —
Guttae Fersteri

Холинолитическое, спазмолити-
ческое, седативное и обезболиваю-
щее средство.

Применяется для предопераци-
онной подготовки (см. «Смеси ли-
тические»)

Rp.: Scopolamini hydrobromidi 0,01
Nitroglycerini 0,005
Morphini hydrochloridi 0,1
Aquaе destillatae 10,0
MDS. По 5 капель 2—3 раза в день

Фетанол — Phethanolum

1-м-Оксифенил-2-этиламиноэта-
нола гидрохлорид

Синонимы: Aethyladrianol, Ef-
fontil, Effortil, Efortil

Выпускается в таблетках по
0,005 и в ампулах по 1 мл 1%
раствора

Хранение — список Б, в защи-
щенном от света месте

Срок годности таблеток — 3 го-
да, ампул — 2 года

α-Адреномиметик, сходный с
«Норадреналином» и «Мезатоном».

Применяют для повышения ар-
териального давления при гипото-
нии различного происхождения —
при шоке, коллапсе, передози-
ровке ганглиоблокаторов и сим-
патолитиков и т. п.

Rp.: Solutionis Phethanoli 1% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. По 1 мл под кожу

Rp.: Phethanoli 0,005
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Федорова жидкость —
Liquor Feodorovi
Хранение — список А

Противошоковое средство.
Показания к применению — см.
«Банайтиса жидкость»

Rp.: Natrii chloridi 15,0
Calcii chloridi 2,0
Tecodini 0,08
Ephedrini hydrochloridi 0,2
Aquae pro injectionibus ad 1000,0
M. Sterilisetur!
DS. Для внутривенного капельного введения

Федорова капли —
Guttae Feodorovi
Хранение — список А

Сокогонное и обезболивающее средство, обладает также анти-микробными свойствами.
Применяется для лечения острых гастроэнтеритов и кишечных колик совместно с химиотерапией

Rp.: Tincturae Opii simplicis
Spiritus camphorati
Tincturae Capsici aa 30,0
Chloroformii 1,0
Spiritus aethylici 38% 15,0
MDS. По 10—20 капель 2—3 раза в день

Фибрекс — Fibrex (ГДР)
Состав на 1 таблетку:
Chinini hydrochloridi
Coffeini aa 0,03
Acidi acetylsalicylici 0,1
Phenacetini 0,3
Хранение — список Б
Срок годности — 2 года

Жаропонижающее и анальгезирующее средство.
Применяется для лечения головной и зубной боли, лихорадки, невритов, миозитов, невралгий и др.

Rp.: Tabul. «Fibrex» N. 10
DS. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Фибриноген — Fibrinogenum

Фибриноген является естественной составной частью крови

Выпускается во флаконах по 1,0—2,0. К каждому флакону прикладывается флакон с растворителем в количестве, необходимом для растворения фибриногена.

Срок годности — 2 года

Кровоостанавливающее средство.

Применяют после операции на легких, печени, почках, предстательной железе, при массивных кровотечениях в акушерско-гинекологической практике, при кровотечениях у больных гемофилией (форма А) и при других кровотечениях, связанных с пониженным содержанием фибриногена в крови

Рр.: Fibrinogeni 1,0 aut 1,8—2,0

D. t. d. N. 6

S. В вену капельным или капельно-струйным методом, предварительно растворив в прилагаемом растворителе

Фибринолизин — Fibrinolysinum

Фибринолизин (или плазмин) является ферментом, образующимся при активации содержащегося в крови профибринолизина (плазминогена)

Выпускается во флаконах в сухом виде по 20 000—40 000 ЕД

Хранение — при температуре не выше 4°

Срок годности — 2 года; дополнительный срок после переконтоля — 6 мес.

Тромболитическое средство.

Применяют при тромбоэмболии легочной и периферических артерий, тромбоэмболии сосудов мозга, свежем инфаркте миокарда, острым тромбофлебите и обострении хронического тромбофлебита. См. также «Стрептаза»

Рр.: Fibrinolysini 20 000 ED (30 000 aut 40 000 ED)

D. t. d. N. 6

S. Внутривенно капельно, растворив в содержимом приложенного флакона до концентрации 100 ЕД/мл

ФиБС — FiBS

Препарат является отгоном лиманной грязи, содержит коричную кислоту и кумарины

Выпускается в ампулах по 1 мл

Хранение — в темном и прохладном месте

Срок годности — 4 года

Биогенный стимулятор.

Применяют при лечении глазных заболеваний: блефарита, конъюнктивита, кератита, помутнения стекловидного тела, миопического хориоретинита и др. Применяют также для лечения артритов, радикулитов, миалгии и других заболеваний

Рр.: Sol. «FiBS» 1 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Под кожу по 1 мл 1 раз в день

Филатова жидкость —
Liquor Filatovi

Пропись № 3 — применение см.
«Рингера раствор», № 43 — см.
«Петрова — Белякова жидкость»

№ 3. Rp.: Natrii chloridi 15,0
Calcii chloridi 0,1
Kalii chloridi 0,2
Natrii hydrocarbonatis 0,1
Aquaе pro injectionibus 1000,0

Рекомендуется использовать в смеси с консервированной кровью
(10 : 1)

№ 43. Rp.: Natrii chloridi 8,0
Calcii chloridi 2,0
Glucosi
Spiritus aethylici āā 50,0
Barbitali 0,8
Methyleni coerulei 0,002
Aquaе pro injectionibus ad 1000,0
M. Sterilisetur!
DS. Внутривенно капельно

Филимонова мазь —
Unguentum Filimonovi

Вяжущее, антимикробное и про-
тивовоспалительное средство.
Применяется для лечения гемор-
роя и трещин заднего прохода

Rp.: Hydrargyri monochloridi 2,0
Bismuthi subnitratіs 4,0
Camphorae
Streptocidi āā 1,0
Vasellini 20,0
M. f. unguentum
DS. Наносить на пораженные участки тела

Фитоферролактол —
Phytoferrolactolum

Применение — см. «Ферроце-
рон»

Состав на 1 таблетку:
Phytini
Ferri lactatis āā 0,2
Хранение — в обычных усло-
виях

Rp.: Tabul. Phytoferrolactoli N.20
DS. По 1 таблетке 3 раза в день после еды

Фламин — Flaminum

Сухой концентрат бессмертника, содержащий сумму действующих веществ (флавонов) этого растения (*Helichrysum aeneum* DC)

Выпускается в таблетках по 0,05

Хранение — в сухом, прохладном месте

Срок годности — 2 года

Желчегонное средство (холекинетик).

Применяется для лечения хронических воспалительных заболеваний печени, желчного пузыря и желчных путей — холециститов и гепатохолециститов, дискинезии желчных путей

Рр.: Flaminum 0,05

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По одной таблетке 3 раза в день за $\frac{1}{2}$ ч до еды

Флатус — Flatus

Хранение — в плотно закрытых сосудах

Слабительное и адсорбирующее газы в кишечнике средство.

Применяется при запорах, геморрое, метеоризме

Рр.: Extracti Aloës

Extracti Rhei $\bar{a}\bar{a}$ 0,1

Rhizomatis Rhei 0,5

Fructus Foeniculi

Fructus Carvi $\bar{a}\bar{a}$ 1,0

Phenolphthaleini 0,5

Olei aetherei 0,15

Magnesiae ustae 0,5

Natrii hydrocarbonatis 3,5

Massae pilularum q. s.

ut fiant pilulae N. 50

DS. По 2—4 пилюли после еды

**Флеминкса жидкость —
Liquor Vleminkxy**

Акарицидное средство, применяется для лечения чесотки

Рр.: Calcii oxydi 1,0

Sulfuris 2,0

Aquae destillatae 20,0

MDS. Натирать пораженные места после обмывания.

Способ приготовления: 1 часть окиси кальция гасят 1 частью воды. К полученному раствору гидрата окиси кальция прибавляют 2,0 очищенного серного порошка, 19,0 воды, смесь кипятят в фарфоровой чашке при постоянном помешивании до растворения серы и упаривают до $\frac{3}{4}$ первоначального объема. Жидкости дают отстояться, затем процеживают через вату и разливают в небольшие склянки, наполняя их под пробку

Флористен — Floristen (ЧССР)
Препарат из зверобоя продырявленного (*Hypericum perforatum* L.)

1 ампула емкостью 1 мл содержит 5 мг сухого остатка активного комплекса

Хранение — в обычных условиях

Биогенный стимулятор.

Применяют в гинекологии (аднексит, периметрит), при подготовке к операции по поводу воспалительных заболеваний придатков, при неопределенных болях в тазу и т. п.

Rp.: «Floristen» 0,005

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 1—2 ампулы под кожу или внутримышечно 2—3 раза в неделю, разводя в 1 мл воды для инъекций

**Фогельсона капли —
Guttae Fogelsoni**

Свойства и применение — см. «Зеленина капли», «Корвалол»

Rp.: Mentholi 0,5

Tincturae Belladonnae 5,0

Tincturae Valerianae

Tincturae Convallariae aa 10,0

MDS. По 15—20 капель 2—3 раза в день

**Фолликотропин —
Follicotropinum (ЧССР)**

Препарат изготавливается из передних долей гипофизов убойного скота

Выпускается во флаконах по 10 ЕД в каждом с приложением 3 мл растворителя

Хранение — в прохладном, защищенном от света месте

Срок годности — 2 года

Фолликулостимулирующий гормон (пролан А).

Применяется в случае гипофункции передней доли гипофиза (адипозо-генитальный синдром), недоразвитии и гипофункции яичников — первичной и вторичной аменорее и дисменорее и т. п.

Rp.: «Follicotropini» 10 ED

D. t. d. N. 5

S. Содержимое флакона растворить в 3 мл приложенного растворителя, вводить внутримышечно через день, на курс — 3—5 инъекций

Фомар — Fomag

Дезодорирующее, дубящее и подсушивающее средство.

Применяется для лечения потливости ног

Rp.: Solutionis Formaldehydi 10,0
Perhydroli 11,0
Magnesii peroxydi 0,2
Spiritus aethylici 70% 79,0
MDS. Часть чулка, соответствующая стопе, сма-
чивается жидкостью и высушивается

Формидрон — Formidron То же

Rp.: Solutionis Formaldehydi 10,0
Spiritus aethylici 96% 40,0
Aquaе destillatae 5,0
Odecoloni 0,5
MDS. Для обработки ног

Формоалестен — Formoalesten Антимикробное средство.
Продукт конденсации сульфа- Применяется при энтерите, эн-
цетамида с формальдегидом тероколите, бактериальной дизен-
Выпускается в таблетках по 0,5 терии, диспепсических состояниях
Хранение — в сухом, прохлад- и т. п.
ном месте

Rp.: «Formoalesten» 0,5
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 2 таблетки 3 раза в день.
При тяжелых формах болезни — по 3—4 таб-
летки 3—4 раза в день

Формофорин — Formoforin См. «Фомат»

Rp.: Solutionis Formaldehydi 1,5
Thymoli 1,0
Zinci oxydi 344,5
Amyli 653,0
MDS. Присыпать ступни ног

Фортевит — Fortevit (СФРЮ) Поливитаминный препарат,
Состав на 1 капсулу: близкий к «Ундевиту».
Retinoli acetatis 0,04 Применяется беременными и
Ergocalciferoli 0,016 кормящими женщинами, при физи-
Thiamini chloridi 0,0005 ческой и умственной отсталости,
Riboflavini 0,05 общей слабости, при гипо- и ави-
Calcii pantothenatis 0,000001 таминозах, для профилактики же-
Pyridoxini hydrochloridi 0,0001 лезодефицитной анемии, для по-
Nicotinamidi 0,008 вышения сопротивляемости орга-
Acidi folic 0,005 низма инфекциям и при тех же

Суанособаламини 0,000001
Асиди асорбиничи 0,001
Менадиони бисульфатис натриј 300 ИЕ
(0,05)
Салии фосфатис 0,04
Хранение — список Б
Срок годности — 1 год

показаниях, что и «Геровит» и «Ундевит»

Рр.: Caps. «Fortevit» N. 50
DS. По 1—3 капсулы 1—3 раза в день

Фосфрен — Phosphrenum

Состав на 1 драже:
Lecithini 0,05
Салии фосфатис 0,07
Ферри лактатис 0,05
Плазматис сикци 0,1
Хранение — в обычных условиях
Срок годности — 5 лет

Общеукрепляющее средство.
Применяется при общем упадке сил, переутомлении, неврастении, малокровии и т. п.

Рр.: Dragee Phosphreni N. 50
DS. По 2 таблетки (драже) 2—3 раза в день

Фосфэстрол — Phosphoestrolum

Диэтилстильбэстрола дифосфорный эфир. Тетранатриевая соль растворяется в воде
Синонимы: Cytonal, Diphostilben (ЧССР), Fosfestrolum, Fostrolin (ПНР), Nonvan, Nonvol, Stilphostrol

Выпускается в таблетках по 0,1, в ампулах по 5 мл 5% или 10% раствора (динатриевая соль)
Хранение — список Б, в защищенном от света месте
Срок годности — 2 года, раствора — 1 год

Синтетический эстроген, избирательно применяющийся для лечения рака предстательной железы любой стадии. Отличается от природных и синтетических эстрогенов большей избирательностью и длительностью действия, дает меньше осложнений

Рр.: Phosphoestrolis 0,1
D. t. d. N. 30 in tabul.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Рр.: Sol. Phosphoestrolis 5% (10%) 5 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. Внутривенно вводят сначала 2,5 мл 5% раствора. При хорошей переносимости в дальнейшем вводят ежедневно по 5 мл 5% раствора в течение 20—25 дней, после чего в течение 2—3 месяцев назначают перорально по 0,1 г 2—3 раза в день

Фохта жидкость — Liqueur Fochti

Антисептическое средство.
Применяется для лечения кольпитов, бартолинитов и пр. различной этиологии

Rp.: Hydrargyri dichloridi 0,5
Aquaе destillatae 500,0
Tincturae Opii simplicis 10,0
MDS. Для спринцевания

Франковского спирт — Spiritus Frankovsky

Местнораздражающее средство.
Применение — см. «Мазь боляги»

Rp.: Spongilliae fluviatilis 1,0
Camphorae 2,0
Olei Terebinthinae 16,0
Spiritus aetherei 2,0
MDS. Для растирания

Френолон — Phrenolon (ВНР)

3,4,5-Триметоксибензоата-2-хлор-10-[3'14-(2-оксиэтил)пиперазинил [пропил]-фенотиазина дифумарат или диэтилсульфонат

Синонимы: Frenolon, Methophenazin, Metofenazat

Выпускается в драже по 0,005 и в ампулах по 1 мл 0,5% раствора

Хранение — список Б

Срок годности драже — 3 года, ампул — 2 года

Нейролептик.

По свойствам и применению близок к «Аминазину», отличаюсь от последнего замедленным наступлением эффекта (через 3—5 дней) и отсутствием сонливости, вялости и адинамии у больных после его применения

Rp.: Sol. «Phrenolon» 0,5% 1 ml
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. Внутримышечно по 1—2 ампулы, до 3—6 ампул в день

Rp.: Drag. «Phrenolon» 0,005
D. t. d. N. 50
S. По 1 драже 3 раза в день

Фтазин — Phthazinum

6-(Пара-фталиламинобензол-сульфамидо)-3-метоксипиридазин

Выпускают в таблетках по 0,5

Хранение — список Б, в хорошо закупоренных банках, в защищенном от света месте

Срок годности порошка — 3 года, таблеток — 2 года

Химиотерапевтическое средство, сульфаниламид.

В связи с плохой всасываемостью в пищеварительном тракте применяют исключительно при лечении дизентерии, энтероколитов, колитов и т. п.

Rp.: Phthazini 0,5

D. t. d. N. 12 in tabul.

S. По 2 таблетки 2 раза в первый день, в последующие дни по 1 таблетке 2 раза в день

Фторокорт — Ftorocort (ВНР)

9 α -Фтор-16 α -17-изопропилиден-диоксипреднизолон

Выпускается в виде 0,1% мази в тубах по 10 г

Хранение — в обычных условиях

Противовоспалительное и противоаллергическое средство (производное преднизолона).

Применяется при различных аллергических поражениях кожи и т. п. (см. «Синалар-Н»). Отличается высокой эффективностью, хорошей переносимостью. Как и при использовании других стероидных препаратов, в качестве осложнения возможно развитие гнойничковых поражений кожи

Rp.: Ung. «Ftorocort» 0,1% 10,0

DS. Смазывать (не втирая) пораженную поверхность 2—3 раза в день или накладывать окклюзивную повязку

Фторотан — Phthorothanum

1,1,1-Трифтор-2-хлор-2-бромэтан

Синонимы: Alotano, Fluctan, Fluothane (Англия), Ftorotan, Nalothan, Narcotan ЧССР, Phthorotan

Выпускается во флаконах по 50 и 250 мл

Хранение — список Б, в прохладном и защищенном от света месте

Срок годности — 1 год; после переконтроля — 1 год

Ингаляционный наркотик (общий анестетик).

Применяют для наркоза концентрацию 3—4 об% во вдыхаемой смеси в начале наркоза. Для поддержания наркоза — 0,5—1,5 об%. Препарат обладает хорошей наркотической широтой, не дает стадии возбуждения. Наркоз наступает через 2—4 мин. В связи с большой активностью масочный наркоз допустим только для кратковременных операций, а аппаратный — лишь при наличии специального испарителя («Фторотэк»).

Наркоз фторотаном может проводить лишь опытный анестезиолог. Осложнения: гипотензия, брадикардия. Возможны поражения печени, сенсибилизация миокарда к симпатомиметикам

Rp.: Phthorotani 50,0 (250,0)
DS. Для ингаляционного наркоза

Фторурацил — Phthoruracilum
2,4-Диоксо-5-фторпиримидин
или 5-фторурацил
Синонимы: Fluorouracil, Fluracilum, Fluril

Выпускается в виде 5% раствора натриевой соли в ампулах по 5 мл

Хранение — список А, в прохладном, защищенном от света месте

Срок годности — 1 год

Противоопухолевое средство (антиметаболит).

Эффективен при лечении иноперабельных форм рака желудка, толстого кишечника, поджелудочной железы, легкого, молочной железы и яичников. Довольно токсичен. Лечение отменяют при снижении тромбоцитов ниже 100 000 или лейкоцитов ниже 3000 в 1 мкл крови, а также при появлении стоматитов, поноса, дерматитов

Rp.: Sol. Phthoruracili 5% 5 ml
D. t. d. N. 5 in ampul.

S. Внутривенно капельным методом или в виде одномоментной инъекции. Для капельного введения разводят необходимое количество раствора фторурацила (0,05—0,75—1 г препарата на больного) в 500 мл 5% раствора глюкозы и вливание производят в течение 3—4 ч. При одномоментной инъекции вводят препарат из расчета 15 мг/кг веса ежедневно в течение 3—4 дней, а затем в половинной дозе (7,5 мг/кг) через день

Фубромеган — Fubromeganum
1-Метил-3-диэтиламинопропилового эфира-5-бромфуран-2-карбоновой кислоты йодметилат

Выпускается в ампулах по 1 мл 2% раствора

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Холинолитик (см. «Мепанит», «Метагин»).

Применяют при спазмах гладкой мускулатуры внутренних органов (почечные, печеночные, кишечные колики), при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при бронхиальной астме и т. д.

Rp.: Solutionis Fubromegani 2% 1 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Под кожу или внутримышечно, начиная с 0,5 мл 2% раствора 1—3 раза в день. При хорошей переносимости дозу постепенно увеличивают до 2 мл 1—2 раза в день

Фурагин — Furaginum
1-[β-(5-Нитрофурил-2)-акрилин]-аминогидантоин
Выпускается в таблетках по 0,05
Хранение — список Б
Срок годности — 4 года

Химиотерапевтическое средство.
Применяют при лечении заболеваний мочевых путей (острых и хронических пиелонефритов, циститов, уретритов, инфекции после оперативных вмешательств на органах мочеполовой системы и др.)

Rp.: Furagini 0.05
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 2 таблетки 3 раза в день после еды

Rp.: Sol. Furagini 1 : 13 000 — 500,0
DS. Для промываний

Фурагин растворимый — Furaginum solubile
1-[β-(5-Нитрофурил-2)-акрилин]-аминогидантоин калиевая соль
Хранение — список Б, в защищенном от света месте
Срок годности — 2 года

Химиотерапевтическое средство, эффективное против грам (+)- и грам (—)-микробов.

Применяют при тяжелых формах воспалительных заболеваний, вызванных патогенным стафилококком, стрептококком и другими возбудителями, чувствительными к препарату. Назначают также при сепсисе, раневой и гнойной инфекции, пневмонии, воспалениях женских половых органов и мочевыводящих путей, анаэробной инфекции в случаях, устойчивых к антибиотикам и сульфаниламидам

Rp.: Sol. Furagini solubilis 0,1% 20,0 (50,0 aut 100,0)
Sterilisetur!
DS. Внутривенно капельным методом (в течение 3—4 ч). Дневная доза для взрослого человека — от 300 до 900 мл 0,1% раствора

Фурадонин — Furadoninum
N-(5-Нитро-2-фулфурильден)-1-аминогидантоин
Синонимы: Alfuran, Chemiofuran, Cistofuran, Furadantin, Furadantoin, Furanex, Furanten, Furasept, Furilin, Furina, Furobactina, Nifurantin, Nitrofuracin, Nitrofurantoin (BHP), Nitrofurin, Rectofuran, Trocurin, Urofurin, Urolisa, Vagifuran, Welfurin
Выпускается в таблетках по 0,1
Хранение — список Б
Срок годности — 1 год

Химиотерапевтическое средство, Применяется для лечения инфекционных заболеваний мочевых путей (пиелиты, пиелонефриты, циститы, уретриты и т. п.)

Rp.: Furadonini 0,1

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 1 таблетке 3 раза в день, запивая большим количеством жидкости

Фуразолин — Furazolinum
5-Морфолинометил-3-(5-нитро-2-фурфурилиденамино)-2-оксазолон

Синонимы: Altabactina, Altafur, Biofurin, Furaltadone, Furalton, Furamidone, Furmethonol, Furitale, Germicina, Medifuran, Megafur, Neofuran, Nifadone, Nitrofur, Nitrofuraltadone, Otifuril, Polival, Sepsinol, Sistogram, Spectrafur, Unifur, Viofural

Выпускается в таблетках по 0,05

Хранение — список Б

Срок годности — 5 лет

Химиотерапевтическое средство, близкое к «Фурагину» и «Фурадонину».

Применяют в тех же случаях

Rp.: Furazolini 0,05

D. t. d. N. 19 in tabul.

S. По 1—2 таблетки 3—4 раза в день (после еды)

Фуразонал — Furazonalum
1-(5-Нитро-2-фурфуриденамино)-1,3,4-триазол
Выпускают в таблетках по 0,1
Хранение — список Б

Химиотерапевтическое средство, близкое к «Фурагину».

В связи с плохой всасываемостью применяют в основном при острой и хронической бактериальной дизентерии и других кишечных инфекциях

Rp.: Furazonali 0,1

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 1 таблетке 4 раза в день после еды

Фурапласт — Furaplastum
Состав:
Furacilini 0,25
Dimethylphthalati 25,0
Resinae perchlorvinilylicae 100,0
Acetoni 400,0
Chloroformii 475,0

Выпускают во флаконах темного стекла емкостью 10—100 мл

Хранение — список Б, в герметически закупоренной посуде. Беречь от огня!

Срок годности — 2 года

Антисептическое средство. Образуется на коже плотную эластичную пленку.

Применяется для обработки мелких кожных повреждений (порезы, царапины, ссадины, трещины и др.) вместо повязки

Rp.: Furaplasti 10,0 (15,0, 20,0, 100,0)
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Фурина микстура —
Mistura Furini

Химиотерапевтическое (противомалярийное) средство.

Применяется в тех же случаях, что и хинин. Отличается лучшим всасыванием

Rp.: Chinini sulfatis 2,0
Acidi sulfurici diluti 1,0
Aquaе destillatae 200,0
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Харахорина капли желудочные —
Guttae stomachicae Charachorini

Сокогонное, антисептическое и вяжущее средство.

Применяется для лечения гипацидных гастритов

Rp.: Corticis Citri
Corticis Chinae
Herbae Centaurii
Ligni Quassiae
Rhizomatis Galangae āā 22,0
Folii Menthae piperitae
Folii Salviae
Florum Cassiae āā 2,0
Fructus Cardamomi 1,0
Spiritus aethylici 70% 1000,0
Olei Menthae 24,0
Spiritus aetherei 300,0
Sacchari tosti ad colorem
MDS. По 25—30 капель 2—3 раза в день

Приготовление: растительное сырье настаивают на спирте несколько дней, процеживают, отжимают и прибавляют мятное масло, гофманские капли и жженный сахар

Хаселк жидкость № 1 —
Liquor «Chaselk» N. 1

Свойства и применение — см.
«Фурапласт»

Rp.: Zinci oxydi 1,0
Olei Ricini gtts V
Olei Vaselini gtts III
Collodii 20,0

То же

Хаселк жидкость № 2 —
Liquor «Chaselk» N. 2

Rp.: Hydrargyri dichloridi 0,1

Zinci oxydi 5,0

Olei Ricini 1,25

Olei Vaselini 0,75

Collodii 100,0

MDS. Наносить на пораженные участки кожи.

Приготовление: окись цинка тщательно растирают в ступке с касторовым и вазелиновым маслом до однородной массы, затем добавляют коллодий. Смесь быстро перемешивают и переносят в отпускную склянку. При хранении и частом употреблении смесь сгущается, но при добавлении в эту же склянку свежей порции жидкости смесь становится годной к употреблению

Хемокальциум — Chemocalcium
(ЧССР)

12,5% раствор глюкогептоната кальция в ампулах по 10 мл

Хранение — в закупоренных коробках

Срок годности — 1 год

Препарат для кальциевой терапии.

Применяется при недостатке кальция, аллергических болезнях, хронических воспалительных процессах, туберкулезе, легочных и желудочных кровотечениях, зудящих дерматозах, экссудативной экземе и др.

Rp.: Sol. «Chemocalcium» 12,5% 10 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 1—2 ампулы в день внутривенно, медленно или в ягодичную мышцу

Хинаскорбин — Chinascorbin
(ЧССР)

Состав на 1 таблетку (драже):

Chinini sulfatis 0,06

Acidi ascorbinici 0,03

Coffeini 0,01

Хранение — список Б

Жаропонижающее средство.

Применяют при заболеваниях простудного характера и т. п.

Rp.: Dragee «Chinascorbin» N 50

DS. По 4—8 драже в день

Хингамин — Chingaminum

7-Хлор-4-(4'-диэтиламино-метил-бутиламино) хинолина дифосфат

Синонимы: Aralen, Arechin, Betaphate, Chlorochin, Delagil (ВНР), Gontochin, Iroquine, Malarex, Nivahine, Resochin (ФРГ), Sanoquin, Tanakan

Выпускается в таблетках по 0,25

Шизонтотропное и противоаллергическое средство.

Применяется для профилактики и лечения различных форм малярии, а также амебных гепатитов и абсцессов печени, при хронической дискоидной красной волчанке и других коллагенозах

Rp.: Chingamini 0,25
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. Назначают по схеме

Хинопин — Chinopyrinum

Свойства и применение — см.
«Йодхинопин», «Хинаскорбин»

Rp.: Chinini hydrochloridi 3,0
Antipyrini 2,0
Aquaе pro injectionibus 6,0
M. Sterilisetur!
DS. Подкожно по 0,5—1 мл

**Хлонского жидкость —
Liquor Chlonsky**

Свойства и применение — см.
«Камфофенол»

Rp.: Camphorae 6,0
Phenoli 3,0
Spiritus aethylici 96% 1,0
MDS. Наружное

Хлоракон — Chloraconum
3-Хлорпропионовой кислоты
бензиламид
Синонимы: Beclamid, Benzchlo-
logroramide, Benzylamide, Hibi-
con, Nydrane, Posedran, Posedrine
Выпускается в таблетках по 0,5
Хранение — в сухом, защищен-
ном от света месте
Срок годности — 5 лет

Противоэпилептическое сред-
ство.

Применяется для лечения эпи-
лепсии с большими судорожными
припадками и при психомоторном
возбуждении эпилептического ха-
рактера

Rp.: Chloraconi 0,5
D. t. d. N. 30 in tabul.
S. По 1 таблетке 4 раза в день

Хлорбутин — Chlorbutinum
Пара-*N*-[Ди-(2-хлорэтил)-ами-
нофенил]-масляная кислота
Синонимы: Amboclorin, Chlo-
rambutil, Chloraminophene, Leu-
keran (Англия), Linfolysin
Выпускается в таблетках по
0,002 и 0,005
Хранение — список А, в защи-
щенном от света месте
Срок годности хлорбутина —
1 год, лейкорана — 3 года

Противоопухольное (цитостати-
ческое) средство. Применяют при
лечении хронического лимфлей-
коза и лимфогранулематоза

Противопоказания и осложне-
ния — см. «Сарколизин», «Дегра-
нол» и др.

Rp.: Chlorbutini 0,002 (0,005)

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. Принимать по схеме, в зависимости от количества лейкоцитов в крови

Хлорэтон для ингаляций — Chlorotonium pro inhalatione

Синоним: Chlorobutanolum pro inhalationibus

Срок годности — 5 лет; после переконтроля — 2 года

Антисептическое, слабое местно-обезболивающее и сосудосуживающее средство.

Применяется для лечения насморка, острых респираторных заболеваний (в виде ингаляций), для устранения кожного зуда (растирание)

Rp.: Chlorobutanoli hydratis 0,5

Mentholi

Camphorae aa 0,625

Olei Vaselini 25,0

MDS. Наружное

Хлорзоксазон — Chlorzoxasone (ВНР)

5-хлор-бензоксазолин-2

Синонимы: Benzoflex, Biomiran, Chlorzoxason, Mioran, Neoflex, Охуген, Paraflex

Хранение — список Б

Центральный миорелаксант, обладает также седативным и анальгетическим действием.

Применяют при миалгии (люмбаго, брахиалгия, кривошея и т. п.); при артритах, ушибах, растяжении, спондилартрозе и т. п., а также при спастических болях при переломах, вытяжениях и гипсовых повязках

Rp.: «Chlorzoxasone» 0,25

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 1 таблетке 3 раза в день

Хлорофиллипт — Chlorophylliptum

Смесь хлорофиллов из листьев эвкалипта, содержащая хлорофиллы «а» и «в».

Выпускается в виде 1% спиртового раствора (местно и внутрь), 2% масляного раствора (местно) и 0,25% водного раствора в ампулах по 2 мл (для внутривенного введения)

Хранение — в прохладном, защищенном от света месте

Противомикробное средство.

Применяется преимущественно для лечения заболеваний, вызванных антибиотикоустойчивыми штаммами стафилококков. Применяется наружно для лечения инфицированных ран и ожогов, вялотекущих язв, эрозий шейки матки и пр., внутрь и в клизмах — для лечения стафилококковых энтеритов и колитов, а также при стафилококконосительстве, внут-

ривенно — для лечения стафилококковых пневмоний и сепсиса. Препарат может вызвать аллергию, поэтому перед первым применением его больному дают внутрь 25 капель 1% спиртового раствора в 1 столовой ложке воды; при отсутствии аллергических явлений возможно применение его в дальнейшем

Rp.: Sol. Chlorophyllipti 0,25% 2,0

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Содержимое ампулы развести в 20 раз стерильным изотоническим раствором хлорида натрия, вводить в вену медленно

Rp.: Sol. Chlorophyllipti spirituosae 1% 60,0

DS. Для лечения язв и ожогов развести в 240 мл 0,25% раствора новокаина, для спринцевания влагалища развести 1 ложку на 1 л воды; этот же раствор применяется и для клизм, внутрь — по 1 чайной ложке перед едой 3 раза в день, запивая водой (или разведя водой предварительно)

Rp.: Sol. Chlorophyllipti oleosae 2% 50,0

DS. Смачивать тампоны, предназначенные для введения во влагалище (при эрозиях шейки матки)

Хлорпропамид — Chlorpropamidum

N-Пропил-N'-(пара-хлорбензолсульфанил)-мочевина

Синонимы: Bioglumin, Catanil, Clordiabet, Diabamide, Diabaryl, Diabenal, Diabetabs, Diabetasi, Diabet-Pages, Diabexan, Diabines (США), Diatron, Eubetin, Galiron, Meldian (СФРЮ), Melisar, Normoglic, Oradian (ВНР), Oro-Diabin, Prodiaben

Выпускается в таблетках по 0,1 и 0,25

Хранение — список Б

Срок годности — 2 года

Антидиабетический препарат, стимулирует секрецию инсулина. В связи с таким механизмом действия применяется только при диабете пожилого возраста в случаях легкой и средней тяжести, когда нет надобности в назначении инсулина.

По свойствам и применению аналогичен «Букарбану» и «Бутамиду», отличаясь большей активностью

Rp.: Chlorpropamidi 0,1 (0,25)

D. t. d. N. 30 in tabul.

S. По 2 таблетки в день в один прием после завтрака

Хлорпротиксен — Chlorprothixen
(ЧССР)

Транс-2-хлор-9-(3-диметиламинопропилиден)-тиоксантена ацетат или гидрохлорид

Синонимы: Chlothixen, Chlorprothixenhydrochlorid, Rentovet, Tactaran, Taras(s)an, Traquilan, Traxal, Trictal, Truxil, Vefacalm

Выпускается в таблетках по 0,015, 0,02 и 0,05

Хранение — список Б

Срок годности — 2 года

Нейролептик.

Применяется в психиатрии при реактивных депрессиях с явлением страха, при состоянии возбуждения, для усиления действия барбитуратов; в хирургии — при подготовке к операции и после операции; в гинекологии — при травмах, в климактерическом периоде и др.

Rp.: «Chlorprothixen» 0,015 (0,02 aut 0,05)

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. По 1—3 таблетки в день

Хлорурит — Chlorurit (ВНР)
6-Хлор-7-сульфонамидо-(1,2,4-бензодигидро-триадазин)-1,1-диоксид

Синонимы: Alurene, Aquil, Chlorosal, Chlorothiazid, Clorazide, Clorgin, Cloruril, Depletina, Diuractin, Diuresal, Diurex, Diuril, Diuxin, Eudrin, Fenuril, Flumen, Ipotiazide, Miuril, Natruril, Neo-Dema, Niagar, Saluret, Saluretic, Saluretil, Saluric, Salutrid, Tonigon, Urinex, Uroflux, Yadafan и др.

Хранение — список Б

Срок годности — 5 лет

Мочегонное средство (салуретик), по свойствам аналогичное «Дихлотиазиду».

Применяется при отеках разной этиологии, гипертонической болезни II—III стадии

Rp.: «Chlorurit» 0,5

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 1—1½ таблетки в сутки.

При длительном применении рекомендуется делать перерывы 2—3 раза в неделю

Ходаковского жидкость —
Liquor Chodakovsky

Местнораздражающее, кератолитическое и обезжиривающее средство.

Применяется для лечения жирной себореи и других кожных заболеваний

Rp.: Acidi salicylici 3,0
Tincturae Capsici 2,0
Naphthalani liquidi 10,0
Spiritus aethylici 90% 100,0
MDS. Для втирания в кожу

Холагол — Cholagolum (ЧССР)
Состав:
Extracti radicis Curcumae 0,0225
Emodini 0,009
Magnesii salicylatis 0,18
Olei aetheri 5,535
Spiritus aethylici 0,8
Olei Olivarum ad 10,0
Выпускается во флаконах по
5 мл
Срок годности — 3 года

Rp.: «Cholagolum» 5 ml
DS. По 5 капель 3 раза в день перед едой

Желчегонное средство (холеки-
нетик).

Применяется для лечения холе-
цистита, холангита, дискинезии
желчных путей, желчнокаменной
болезни и гепатохолециститов

**Холина хлорид —
Cholini chloridum**
(2-Оксиэтил)-триметиламмония
хлорид
Синонимы: Bilineurine, Biocho-
line, Choline chloride, Colisan,
Hepacholine, Hepatosan. Hormoc-
line, Lipotrie, Luridine, Lyochol-
ine, Neocolina, Paresan, Sincaline,
Takolin

Выпускается в ампулах по 10 мл
20% раствора

Хранение — в обычных усло-
виях

Срок годности — 3 года; допол-
нительный срок годности после
переконтроля — 1 год 6 мес.

Витамин группы В.

Применяют при заболеваниях
печени: болезни Боткина, гепати-
тах, циррозе печени (главным
образом в ранних стадиях)

Rp.: Sol. Cholini chloridi 20% 10 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Внутривенно капельным методом в виде 1% рас-
твора на изотоническом растворе натрия хлорида
или 5% растворе глюкозы со скоростью не более
30 капель в минуту. Раствор готовят ex tempore.
В один прием вводят до 200—300 мл раствора.
Внутривенные введения дополняют назначением
20% раствора внутрь

Холевид — Cholevid (СФРЮ)
2-Этил-3-(3-амино-2,4,6-трийод)-
фенилпропионовая кислота
Выпускается в таблетках по 0,5
Хранение — в сухом защищен-
ном от света месте
Срок годности — 5 лет
Срок годности ПНР — без срока

Рентгеноконтрастное сред-
ство.

Применяется для пероральной
холангиографии, холецистогра-
фии. Близок к «Билитрасту»

Rp.: «Cholevid» 0,5

D. t. d. N. 12 in tabul.

S. 6 таблеток назначают вечером, 6 таблеток за
3—4 ч до исследования, для фракционного метода
исследования желчевыводящих протоков

Холензим — Cholenzinum
Препарат из желчи и ферментов
поджелудочной железы и кишеч-
ника убойного скота
Выпускается в таблетках по 0,5
Хранение — в сухом, защищен-
ном от света месте
Срок годности — 2 года; после
переконтроля — 6 мес.

Желчегонное средство (холере-
тик).

Применяют при гепатитах, хо-
лециститах, при заболеваниях же-
лудочно-кишечного тракта и т. д.
(см. «Дехолин»)

Rp.: Cholenzimi 0,5

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 1 таблетке 1—3 раза в день

Холоплант — Choloplant (ГДР)
Состав на 1 таблетку:
Pulveris Nucis vomicae 0,0005
Pulveris fructus Berberis 0,0025
Pulveris herbae Chelidonii 0,025
Cheloni 0,375
Felis Tauri sicci 0,0425
Хранение — список Б

Желчегонное средство, преимущ-
ественно холекинетик.

Свойства и применение — см.
«Дехолин», «Холензим»

Rp.: Tabul. «Choloplant» N. 20

DS. По 1—2 таблетки 3 раза в день

Хориогонин — Choriogonin (ВНР)

Лисофилизированный препарат натурального гормона плаценты

Синонимы: Antelobine, Choric gonadotrophin, Entromone, Follutein, Gonabion, Gonadotropinum chorionicum

Выпускается во флаконах по 500 ЕД и по 1500 ЕД с приложением 2 мл растворителя

Хранение — в защищенном от света месте, при температуре не выше 20°

Срок годности — 2 года

Лютеинизирующий гормон, выделяемый плацентой. Способствует выработке прогестагенов и развитию половых признаков.

Применяется у женщин при метроррагии и привычном аборте, у мужчин — при гипогенитализме, гипофизарном нанизме

Rp.: «Choriogonin 500 ED (1500 ED)

D. t. d. N. 5

S. Развести в 2 мл растворителя, вводить внутримышечно по 1—2 тыс. ЕД (детям по 100—500 ЕД) 2—3 раза в неделю

Хофитол — Chophitol (Франц.)

Очищенный экстракт из артишока (*Synagis, solimus*), разведенный стерильным изотоническим раствором натрия хлорида

Выпускается в ампулах по 5 мл

Средство способствует нормализации азотистого обмена.

Применяется при азотемии, острым инфекционным и токсическим нефрите, при нефропатии беременных, а также при острой почечной недостаточности

Rp.: «Chophitol» 5 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S.: Внутривенно по 1 ампуле через день в течение 10—12 дней

Хризомаллин — Chrysomallinum

Продукт обмена гриба *Actinomyces chrysomallus*

Выпускается в ампулах по 0,0005 препарата, растворенного в 45% этиловом спирте

Хранение — список А, в защищенном от света месте при t° не выше 5°

Противоопухолевое средство (антибиотик).

Препарат обладает широким спектром противоопухолевого действия; проявляет наиболее выраженное противоопухолевое действие при хорионэпителиоме матки, при лечении опухоли Вильмса у детей, лимфогранулематозе и раке яичников. Не угнетает кроветворения, благодаря чему может применяться при лейкопении и в сочетании с цитостатическими алкилирующими агентами

Rp.: Chrysomallini 0,0005 (0,001)

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. Внутривенно. Необходимое количество препарата растворяют в 8—10 мл изотонического раствора натрия хлорида и медленно вводят в вену. Разовая доза для взрослых — 0,5—1 мг, для детей — 15 мкг на 1 кг веса. Препарат вводят через день или 1 раз в 3 дня (6—15 и более инъекций)

Целанид — Celanidum

Сердечный гликозид из листьев наперстянки шерстистой (*Digitalis lanata* Ehr.)

Синонимы: Cedilanid, Cedisanol, Cedistabil, Ceglunat, Celadigal, Cristalanat C, Digilanid C, Isolanid (ВНР), Lanatosid C

Выпускается в таблетках по 0,00025 и в ампулах по 1 мл 0,02% раствора

Хранение — список А

Срок годности — 3 года

Кардиотоническое средство.

Применяется при сердечно-сосудистой недостаточности, фибрилляции предсердий, пароксизмальной тахикардии, остром миокардите, а также при миокардиодистрофии. По кумулятивным свойствам и скорости наступления эффекта близок к «Дигоксину»

Rp.: Celanidi 0,00025

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 1 таблетке 2 раза в день

Rp.: Sol. Celanidi 0,02% 1,0

D. t. d. N. 20 in ampul.

S. Внутривенно по 1—2 мл в 1 сутки, разведя в 20 мл 20—40% раствора глюкозы

Цепорин — Ceroṛin (СФРЮ)

7-(2-Тионилацетамидо)-3(1-пирридилметил)-3-цефем-4-карбоновой кислоты бетаиновая соль

Синонимы: Cefaloridinum, Ceflogin, Cephaloridine, Ceroṛan, Glaxoridin, Keflordin

Выпускается во флаконах по 0,25, 0,5 и 1,0

Хранение — в прохладном месте

Срок годности СФРЮ — 2 года

Антибиотик, активный в отношении грамположительных и грамотрицательных микробов. Спектр действия почти совпадает со спектром бензилпенициллина.

Применяется по тем же показаниям, что и последний, в случаях непереносимости пенициллина или возникновении устойчивости микроорганизмов к нему. Неэффективен при заболеваниях, вызванных грибами, простейшими, синегнойной палочкой. Может давать перекрестную устойчивость с метициллином и оксациллином

Рр.: «Серорин» 0,25 (0,5, 1,0)

D. t. d. N. 10

S. Содержимое флакона развести в 10—20 мл стерильного изотонического раствора хлорида натрия. Вводить по 0,5—2,0 в вену, в мышцы или под кожу 2—3 раза в день

Церебролизин — Cerebrolysin
(ФРГ)

Гидролизат мозгового вещества, полученный особым методом, содержащий главным образом аминокислоты

Выпускается в ампулах по 1 мл

Хранение — в прохладном и защищенном от света месте

Срок годности — без срока

Препарат стимулирует работу мозга.

Применяют при заболеваниях, сопровождающихся ослаблением мозговой деятельности различной этиологии, в том числе при комплексе симптомов после перенесенного энцефалита, операциях на головном мозге, а также при нервных и психических заболеваниях, сопровождающихся рассеянностью и ослаблением памяти. Церебролизин показан детям, у которых наблюдается отсталость умственного развития

Рр.: «Cerebrolysin» 5% 1 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 1 мл в мышцы

Цетамифен — Cetamiphenum

Этаноламинная соль фенилэтилуксусной кислоты, раньше назывался Rhenexol

Выпускается в таблетках по 0,25

Хранение — в обычных условиях

Срок годности — 5 лет

Препарат нормализует обмен холестерина.

Применяется при атеросклерозе и заболеваниях, сопровождающихся гиперхолестеринемией

Рр.: Cetamipheni 0,25

D. t. d. N. 30 in tabul.

S. По 2 таблетки 3—4 раза в день

Циамид — Cyamidum

Состав на 1 таблетку:

Calcii cyamidum 0,05

Acidi citrici 0,1

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Препарат применяют для лечения хронического алкоголизма.

Принцип лечения — см. «Тетурам»

Rp.: Tabul. «Cyamidum» N.10

DS. В течение первых 2 дней больному дают утром по $\frac{1}{2}$ таблетки для проверки переносимости. При отсутствии побочных явлений больному назначают по 1—2 таблетки ежедневно после еды в течение 1—2 мес.

Цибальгин — Cibalgin (Швейц.)

Состав на 1 таблетку:

Diali 0,05

Amidorugini 0,2

Хранение — список Б

Анальгезирующее (успокаивающее) средство.

Применяется при болях (головная, зубная, боль в ушах), при невралгии, при послеоперационных травмах, при альгодисменорее и т. д.

Rp.: Tabul. «Cibalgin» N. 10

DS. По 1—2 таблетки при болях

Циквалон — Cycvalonum

2,6-Диванилалциклогексанон

Синонимы: Veveno, Cyclovalonum, Divanil, Divanon, Flavugal, Sincolin semprlice, Vanilone

Выпускается в таблетках по 0,1

Срок годности — 2 года

Желчегонное средство (холеретик).

Применяют при хронических холециститах, холангитах, холецистогепатитах, желчнокаменной болезни и др.

Rp.: Cycvaloni 0,1

D. t. d. N. 30 in tabul.

S. По 1—3 таблетки 3—4 раза в день

Цикламид — Cyclamidum

N-(4-метилбензолсульфонил)-N'-циклогексилмочевина

Синонимы: Adiabil, Agliral, Cicloral, Diabil, Diaboral, Glycycyclamidum, Tolhexamide

Выпускается в таблетках по 0,5

Хранение — список Б

Антидиабетический препарат. По действию и применению аналогичен «Букарбану» и «Хлорпропамиду»

Rp.: Cyclamidi 0,5

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. Вначале назначают ударную дозу (1,5—3,0 г), затем ее постепенно снижают до 0,5 г в сутки

**Циклобарбитал —
Cyclobarbitalum**

5-(Циклогексенил)-5-этил-бар-
битуровая кислота

Синонимы: Äthylhexabital, Am-
posed, Cavonyl, Cyclobarbitol, Cys-
clobarbitone, Cycloform, Cyclohe-
xal, Cyclosedal, Cydorm, Dorma-
med, Hexemal, Hypnoval, Medi-
dorm, Normanox, Palinum, Pano-
dorm, Phanoctal, Phanoform (ФПГ),
Philodorm, Prällumin, Sonaform,
Spatinox, Tetrahydrogardenal, Tet-
rahydrophenobarbital

Выпускается в таблетках по 0,2

Хранение — список Б

Срок годности — 2 года

Барбитурат средней продолжи-
тельности действия. Снотворное и
успокаивающее средство.

Применяется при бессоннице,
при состоянии возбуждения, нев-
растеническом состоянии возбуж-
дения — неврастеническом синд-
роме

Rp.: Cyclobarbitali 0,2

D. t. d. N. 10 in tabul.

S. Как снотворное — по $\frac{1}{2}$ —2 таблетки на ночь;
как успокаивающее — по $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ —1 таблетке
1—2 раза в день

Циклодол — Cyclodolum

1-Фенил-1-циклогексил-3-*N*-пи-
перидил-пропанола гидрохлорид

Синонимы: Aparkan (ВНР), Ar-
tane, Benzhexolhydrochlorid, Paci-
tane, Paralest, Pargitan, Parko-
pan, Partigan, Peragit, Pipanol,
Romparkin, Tremin, Triesifeni-
dile, Trihexyphenidylhydrochlorid,
Triphenidyl

Выпускается в таблетках по
0,001; 0,002 и 0,005

Хранение — список А

Срок годности — 4 года

Холинолитик с преимуществен-
но центральным действием.

Применяют при паркинсонизме,
болезни Паркинсона, болезни
Литтля, спастических параличах
и т. п.

Rp.: Cyclodoli 0,001 (0,002, 0,005)

D. t. d. N. 30 in tabul.

S. По 1 таблетке 2 раза в день

**Циклометиазид —
Cyclomethiazidum**

3-Циклопентилметил-6-хлор-7-
сульфамил-3,4-дигидро-1,2,4-бен-
зотиадазин-1,1-диоксид

Мочегонное средство (салуре-
тик).

По свойствам и применению
аналогичен «Дихлотиазиду», «Хло-
пуриту». Более активен

Синонимы: Cyclopenthiamid, Navidrex, Navidrix, Salimid
Выпускается в таблетках по 0,0005

Хранение — список Б
Срок годности — 4 года

Rp.: Cyclomethiazidi 0,0005
D. t. d. N. 50 in tabul.
S. По 1—2 таблетки в день

Циклофосфамид — Cyclophosphamid (ГДР)
N,N-Ди-(2-хлорэтил)-N'-О-пропиленовый эфир диамида фосфорной кислоты

Синонимы: Cyclophosphan, Cytophosphan, Cytoxan, Endoxan, Endoxana, Enduxan, Genoxal, Mitoxan, Procytox, Sendoxan

Выпускается в виде порошка в герметически закрытых флаконах по 0,1 и 0,2 г, а также в драже по 0,05

Хранение — список А
Срок годности — 3 года; после переконтроля — 2 года

Rp.: «Cyclophosphamid» 0,1 (0,2)
D. t. d. N. 10 in ampul.

Rp.: «Cyclophosphamid» 0,05
D. t. d. N. 50 in dragee

S. Внутримышечно или внутривенно вводят по 0,1—0,2 в виде 2% раствора 2—3 раза в день, растворив в 10 мл воды для инъекций. После окончания курса лечения (в случае необходимости) применяют поддерживающую терапию по 1—2 драже в день

Противоопухолевое (цитостатическое) средство.

Применяют при лечении лимфогранулематоза, лимфосаркомы, ретикулосаркомы, хронического лимфолейкоза и др.

Циклосерин — Cycloserin
D-4-Амино-3-изоксазолидинон
Из ВНР поступает тартрат циклосерина под тем же названием, 0,637 которого соответствуют 0,25 чистого циклосерина

Синонимы: Aristoserina, Cyclosarine, Ciclovolidin, Closin(e), Cyclomycin, Cyclorin, Farmiserina,

Противотуберкулезное средство II ряда.

Применяют при хроническом туберкулезе легких. Может сочетаться с другими противотуберкулезными средствами. Осложнения: головокружение, бессонница, иногда острое психомоторное возбуждение с галлюцинациями.

Micoserina, Miroseryn, Orientomycin, Oriserin, Oхамycin, Sercyclina, Serociclina, Seromicina, Tebemicin, Tibicin, Tisomycin, Wasserina

Выпускается в таблетках по 0,25
Хранение — список Б
Срок годности — 4 года, ВНР — 5 лет, СССР — 2 года

Противопоказан при органических заболеваниях ЦНС и при психических заболеваниях

Rp.: Cycloserini 0,25

D. t. d. N. 40 in tabul.

S. Начинают с 1 таблетки в день.

При хорошей переносимости дозу постепенно повышают на 1 таблетку в день, доводя до среднесуточной дозы — 3—4 таблетки в день

**Циммермана капли —
Guttae Zimmermani**

Спазмолитическое и успокаивающее средство.

Применяется при гипертонической болезни I стадии (церебральная форма)

1. Rp.: Atropini sulfatis 0,003
Papaverini hydrochloridi 0,2
Aquae Menthae piperitae 20,0

2. Rp.: Atropini sulfatis 0,003 Общетонизирующее и спазмолитическое средство.
Strychnini nitratis 0,02 Применяется при гипотонии,
Aquae Menthae piperitae 20,0 астено-вегетативном синдроме
MDS. По 15 капель 3 раза
в день

3. Rp.: Novocaini 0,1 То же, что и капли № 1,
Papaverini hydrochloridi 0,2 но слабее
Aquae Menthae piperitae 20,0
MDS. По 20 капель 3 раза
в день

Цинкундан — Zincundanium

Состав:
Salicylanilidi
Zinci undecylenatis
Acidi undecylenici aa 10,0
Basis unguenti 70,0

Выпускается в различной упаковке

Противомикробное средство.

Применяется для лечения поверхностных дерматомикозов (кандидамикозы, эпидермофития, руброфития и т. п.)

Rp.: Zincundani 100,0

DS Наносить на пораженные участки кожи

Цинхофен — Cinchophenim

2-Фенилдинхониновая кислота

Синонимы: Acidochinon, Acidum phenylcinchonicum, Aciphen, Agophen, Aminophan, Artamin, Atophanum, Betosan, Chinophenum, Erbefan, Fenoquin, Leophan, Nytophan, Polyphlogin, Rheumatophine, Tervalon, Tophol, Tophosan, Urofene, Viophan и др.

Выпускается в таблетках по 0,5

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — 10 лет; после переконтроля — 5 лет

Препарат способствует выведению уратов из организма.

Применяют при подагре, обменных артритах

Rp.: Cinchopheni 0,5

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день. Запивать 2% раствором гидрокарбоната натрия или щелочной минеральной водой

Цистенал — Cystenal (BHP)

Состав:

Extracti Rubiae tinctorum 0,01

Magnesii salicylatis 0,15

Olei aetherei 6,15

Spiritus aethylici 0,8

Olei Olivarum ad 10,0

Выпускается во флаконах по 10 мл

Срок годности — 3 года (BHP), 2 года (ЧССР)

Спазмолитическое средство, способствует дезинфекции мочевыводящих путей, обладает слабым мочегонным действием.

Применяется при хронических пиеллоциститах, почечнокаменной болезни. Противопоказан при нарушении функции почек

Rp.: «Cystenal» 10 ml

DS. По 3—4 капли на сахар за полчаса до еды. При приступе 20 капель на 1 прием

Цитрамон — Citramonim

Состав на 1 таблетку:

Acidi acetylsalicylici 0,24

Phenacetini 0,18

Coffeini 0,03

Cacao pulv. 0,03

Acidi citrici 0,02

Sacchari 0,5

Хранение — список Б, в сухом, защищенном от света месте

Анальгетическое средство.

Применяется при головной боли, невралгии, простудных заболеваниях и др.

Rp.: Tabul. Citramoni N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Цитрокарбон — Citrocarbon
(ЧССР)
Вязнущее и адсорбирующее средство.
Состав на 1 таблетку: Применяют при болезнях пищеварительного тракта, сопровождающихся метеоризмом
Carbonis activati 0,25
Bismuthi subgallatis 0,025
Acidi citrici 0,00375
Хранение — в сухом месте

Rp.: Tabul. «Citrocarbon» N. 20
DS. По 2—4 таблетки несколько раз в день

Цитронал — Citronal
Препарат нормализует моторику и секрецию пищеварительного тракта.
Применяется при различных желудочно-кишечных заболеваниях инфекционной этиологии в дополнение к антимикробной терапии

Rp.: Chinini hydrochloridi 0,5
Acidi citrici 10,0
Extracti Frangulae spissie 6,0
Extracti folii Myrtilli 4,0
Extracti et pulveris radices Liquiritiae q. s.
Ut fiant pilulae N. 100
DS. По 1 пилюле 2—3 раза в день

Цихоль — Cicholum
Анестезирующее и противовоспалительное средство.
Комплекс холевоксислого натрия с цитралем в виде водного раствора, содержащего 0,2% цитрала в ампулах по 2 мл
Применяется в глазной практике для обезболивания глаза при конъюнктивитах, иритах, глаукоме и т. д. Препарат можно применять также под кожу по 1—2 мл с прибавлением 0,25—0,5 мл 0,5% раствора новокаина
Хранение — в защищенном от света месте

Rp.: Sol. Cicholi 2 ml
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. Под кожу. Вводить медленно

Чумакова паста —
Pasta Tschumakovi

Защитное средство для кожи
рук при работе с охлаждающими
эмульсиями, применяемыми при
резании металлов

Rp.: Olei mineralis
Boli albae
(aut Zinci oxydi) āā 41,5
Paraffini 17,0
M. f. pasta
DS. Для нанесения на кожу рук.

Приготовление: парафин расплавляется и смешивается с машин-
ным маслом. К полученной смеси небольшими порциями при расти-
рании добавляется белая глина или окись цинка, после чего паста
при помешивании нагревается до исчезновения твердых частиц пара-
фина

Шарко микстура —
Mixtura Scharco

По свойствам и применению
аналогична «Бехтерева микстура»

Rp.: Infusi rhizomatis cum
radicibus Valerianae 6,0—200,0
Natrii bromidi 6,0
Codeini phosphatis 0,2
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день после еды

Шелагурова порошки —
Pulveres Schelagurovi
Хранение — список А

Бронхолитическое, противвос-
палительное и противокашлевое
средство.

Применяется для лечения брон-
хиальной астмы, астматического
бронхита и т. п.

Rp.: Euphyllini 0,2
Acidi acethylsalicylici 0,15
Ephedrini hydrochloridi 0,025
Aethylmorphini hydrochloridi 0,015
M. f. pulvis
D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 1—2 раза в день

Шинкаревского жидкость —
Liquor Schinkarevsky

Местноанестезирующее средст-
во.

Применяется для анестезии сли-
зистых в стоматологии и уроло-
гии

Rp.: Anaesthesini 3,0
Diacaini 0,5
Mentholi 0,05
Aetheris 6,0
Spiritus aethylici 96% 3,0
Chloroformii
Aquae destillatae āā 1,0
MDS. В перевязочную

Приготовление: в смеси этилового спирта 96% и этилового эфира растворяют анестезин, добавляют дикаин и дистиллированную воду и взбалтывают до полного растворения порошкообразных веществ, затем добавляют ментол и хлороформ (беречь от огня). Приготавливается *ex tempore*

Шлейха жидкость —
Liquor Schleichi
Хранение — список А

Обезболивающее средство.
Применяется при болевом синдроме любой этиологии (травма, невриты, радикулит и т. п.). При длительном применении может вызывать пристрастие

Rp.: Cocaini hydrochloridi 0,1
Morphini hydrochloridi 0,02
Natrii chloridi 0,2
Aquae destillatae 100,0
MDS. По 1 столовой ложке при болях

Шмидта микстура —
Mixture Schmidti

См. «Бехтерева микстура»

Rp.: Insufi rhizomatis
cum radicibus Valerianae 4,0—200,0
Natrii bromidi 2,0
Coffeini-natrii benzoatis 0,2
MDS. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день

Шмуккера примочка охлаждающая —
Fomentum frigidum Schmuckeri

Охлаждающее и противовоспалительное средство. Действие основано на поглощении тепла в процессе растворения селитры.

Применяется при свежих травмах (ушибы, разрывы связок), при поверхностных гнойно-воспалительных заболеваниях (флегмона, рожистое воспаление) и т. п. Смесь нашатыря и селитры закладывают между двумя слоями марли или ткани и обливают разведенным уксусом. Используют в виде примочки (компресса)

Рр.: Ammonii chloridi
Kalii nitratis aa 15,0
Sol. Aceti 6% 150,0
Aquae 600,0
MDS. Наносить на пораженные участки кожи

Шнее жидкость —
Liquor Schnee
Срок годности — 1 год

Препарат используется для спиртово-анестезирующей блокады при свежем геморрое и трещинах заднего прохода

Рр.: Sovcaini 0,1
Spiritus aethylici 2,0
Olei Persicorum 18,0
M. Sterilisetur!
DS. По 1 мл под трещину прямой кишки или под основание геморроидального узла

Шнырева паста (мазь) —
Pasta Schniryovi

Свойства и применение — см. «Мазь ихтиоловая сложная», «Мазь висмутовая сложная». При количестве вазелина 50,0 получается паста, при 80,0 — мазь

Рр.: Ichthyoli 5,0
Bismuthi subnitratis 1,0
Amyli
Zinci oxydi aa 25,0
Vasellini 50,0 (80,0)
M. f. pasta (unguentum)
DS. Наносить на пораженные участки кожи

Эвкатол — Eucatol

Свойства и применение — см. «Настойка эвкалипта»

Рр.: Tincturae Eucalypti 10,0
Mentholi 0,05
Spiritus aethylici 90% 10,0
MDS. Внутрь по 20—25 капель 3 раза в день, для ингаляции — по 30—50 капель на процедуру

Эдан — Edan (ПНР)
β-Диэтиламиноэтилового эфира 2-ацетоксibenзойной кислоты гидрохлорид
Выпускается в ампулах по 0,1 сухого препарата
Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Местный анестетик, близкий к новокаину.
Применяется для местной инфильтрационной и проводниковой анестезии в ларингологии, гинекологии и стоматологии

Rp.: «Edan» 0,1
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. Содержимое ампулы следует растворить в 10 мл прилагаемого растворителя

Эдельберга сбор слабительный — Слабительное средство.
Species laxantes Edelbergi Применяется для лечения привычных запоров, при геморрое и т. п.

Rp.: Corticis Viburni concisi 60,0
Folii Menyanthidis
Florum Millefolii aa 20,0
Fructus Carvi concisi 1,0
MDS. Заваривают 1 столовую ложку сбора в 1 стакане воды, кипятят 15 минут, отжимают, процеживают, пьют по 1 столовой ложке 3—4 раза в день

Эксангит — Exangit (ВНР) Противокашлевое средство.
3,6,9,12,15,18,21,24,27-Ноноксаоктакозил-п-бутиламинобензоат Применяется при кашле различного происхождения
Синонимы: Benzonatad, Benzoponatine, Tessalin, Tessalon, Ventussin
Выпускают в драже по 0,01 и 0,05
Хранение — список Б

Rp.: «Exangit» 0,05 (0,01)
D. t. d. N. 50 in dragee
S. По 1 драже 3—6 раз в день

Экстракт горький густой — Preparat применяется для изготовления пилюль
Extractum amaram spissum

Rp.: Extracti Absinthii
Extracti Gentianae
Extracti Menyanthidis aa q. s.
MDS. Для заделки пилюль

Экстракт печени — Антианемическое средство.
Extractum Heparis (ЧССР) Применяется при анемиях различного происхождения, в первую очередь при злокачественной анемии.
Состав: очищенный экстракт печени, с биологически титрованным

содержанием цианокобаламина; в одной ампуле — 20 мкг цианокобаламина

Выпускается в ампулах по 2 мл
Хранение — в защищенном от света месте

мии Аддисона — Бирмера и при пернициозоподобных анемиях.

Препарат близок к отечественному антнанимину, а также к камполону

Rp.: Extracti Heparis 2 ml.
D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Внутримышечно по 1 ампуле в день или через день

Экстракт тополевый —
Extractum Populi

Препарат применяется для изготовления «Мази тополевой»

Rp.: Gemmae Populi 20,0
Spiritus aethylici 90% 80,0
M. f. extractum
DS. Наружное

Приготовление: смесь настаивают 12 ч при частом взбалтывании, настойку фильтруют и выпаривают до консистенции экстракта

Эликсир грудной —
Elixir pectorale

Отхаркивающее средство.
Применяется при сухом кашле любого происхождения

Состав:
Extracti radices Liquiritiae 60,0
Solutionis Ammonii Caustici 10,0
Olei Anisi vulgaris 1,0
Spiritus aethylici 49,0
Aquae destillatae 180,0
Срок годности — 3 года

Rp.: Elixiri pectoralis 50,0
DS. По 20—30 капель несколько раз в день

Эликсир желудочный —
Elixir stomachicum

Сокогонное, вяжущее и послабляющее средство.

Применяется для лечения хронического гипоацидного гастрита, гастроэнтеритов, колитов

Rp.: Herbae Absinthii
Corticis Aurantii
Radices Gentianae aa 25,0
Radices Rhei 10,0
Aloës
Corticis Cascarillae aa 5,0
Spiritus aethylici 500,0
Aquae destillatae ad 1000,0
MDS. По 1/2—1 чайной ложке перед едой

Приготовление: растительное сырье настаивают на спирте, процеживают, отжимают остаток и добавляют воды до 1000,0

Эликсир хлороформный —
Elixir Chloroformii

Успокаивающее и противорвотное средство.

Применяется при токсической рвоте, судорожном синдроме, повышенной возбудимости

Rp.: Chloroformii 5,0
Spiritus aethylici 90% 40,0
Sirupi simplicis 140,0
MDS. Но 1/2—1 столовой ложке на прием

Эмульсия касторового масла —
Emulsum olei Ricini

Слабительное средство.

Применяется при запорах, для подготовки к операции, родам, рентгеновскому исследованию пищеварительного тракта и т. п. Отличается от чистого касторового масла лучшими органолептическими свойствами

Rp.: Olei Ricini 8,0
Gummi arabici 2,0
Aquae folii Aurantii 3,0
Aquae Cinnamomi 7,0
Aquae destillatae 3,0
M. f. emulsum
DS. На один прием

Эндиарон — Endiaron (ЧССР)
5,7-Дихлор-8-оксихинолин
Синонимы: Chloroxine, Chlorquinol, Halquinol, Permin, Quixalin

Выпускается в таблетках по 0,25
Хранение — список Б

Химиотерапевтическое средство, активное против многих бактерий и простейших.

Применяют при кишечных инфекциях — при амебной и бактериальной дизентерии и других энтеритах и колитах

Rp.: «Endiaron» 0,25
D. t .d. N. 10 in tabul.
S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день после еды

Энтеросептол — Enteroseptol
(ВНР)

5-хлор-7-йод-8-оксихинолин
Синонимы: Alchloquin, Amebil, Amoanol, Bactol, Chinoform, Clloquinol, Colicid, Diarroform, Emaform, Enteritan, Enterocol, Ente-

Препарат по строению весьма сходен, а по свойствам и применению совершенно идентичен предыдущему

rozol, Gamaquin, Gastroform, Iodoenterol, Ioxyl, Lekosept, Nioform, Rometin, Vioform, Viozol и др.

Выпускается в драже по 0,25

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности — не ограничен

Rp.: «Enteroseptol» 0,25

D. t. d. N. 20 in dragee

S. По 2—3 таблетки 3 раза в день при острой форме амёбной дизентерии. В других случаях по 1—2 драже 3 раза в день

Эпидермин — Epiderminum

Индифферентная мазевая основа

Rp.: Ceræ albae

Glycerini

Mucilaginis Cummi arabici

Aquae destillatae āā 10,0

M. f. unguentum

DS. Наружное

Эпиларктин — Epilarctin (ГДР)
1 мл препарата содержит 0,00004
яда гремучей змеи в стерильном
изотоническом растворе натрия
хлорида

Хранение — список А, в прохладном и защищенном от света месте

Срок годности — 2 года

Препарат обладает нейротропным действием.

Применяют при эпилепсии, хоре, мигрени и головных болях, при вегетативных дистониях

Rp.: Sol. «Epilarctin» 0,004 % 1 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Под кожу или внутримышечно. Курс лечения по схеме, приложенной к препарату

Эргам — Ergam (ВНР)

Эрготоксина этансульфонат

Выпускается в ампулах по 1 мл 0,03% раствора.

Хранение — список А, в защищенном от света месте при температуре не выше 10°

Срок годности — 1 год

Маточное средство.

Применяется при кровотечениях после аборта, кесарева сечения, атонии матки после отделения последа, субинволюции матки, метроррагии, меноррагии. Возможное осложнение — снижение артериального давления

Rp.: Sol. «Ergam» 0,3% 1 ml
D. t. d. N. 5 in ampul.
S. По 1/2—1 ампуле (0,15—0,3 мг) под кожу или внутримышечно

Эргометрина малеат —
Ergometrini maleas (ЧССР)
β-Пропаноламида лизергиновой кислоты малеат

Синонимы: Cornocentin, Ergomal, Ergomet, Ergostabil, Ergotrate Maleate, Ermalate, Ergmetrin, Margonovine, Panergal, Secometrin

Выпускается в таблетках по 0,0002 и в ампулах по 1 мл 0,02 % раствора

Хранение — список Б, в хорошо закупоренных банках оранжевого стекла в защищенном от света месте

Срок годности таблеток — 4 года, ампулы ЧССР — 3 года; срок годности ампул ВНР — 1 год

Маточное средство.
По показаниям к применению аналогичен предыдущей прописи. Отличается меньшими побочными эффектами

Rp.: Ergometrini maleatis 0,0002
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Ergometrini maleatis 0,02% 1 ml.
D. t. d. N. 3 in ampul.
S. По 1 мл в мышцы или в вену в экстренных случаях

Эрготамина тартрат —
Ergotamini tartras (ЧССР)
Синонимы: Ergal, Ergocito, Ergofeina, Ergomar, Ergotan, Ergotartarat, Exmigra, Fermergin, Gynecorn, Gynergen, Gynofort (ВНР), Lingraine, Neo-Ergotin, Neo-Secoran, Secagyn, Secanorm, Secotamin, Seciran.

Выпускается в драже по 0,001, в ампулах по 1 мл 0,05 % раствора и во флаконах по 10 мл 0,025 % и 0,1 % раствора.

Хранение — список А, в защищенном от света месте, при температуре не выше 10°

Срок годности таблеток — 4 года, ампул — 3 года, капель во флаконах — 2 года

Препарат по свойствам и применению аналогичен «Эргометрину» и «Эргаму», отличается более длительным действием

Rp.: Ergotamini tartratis 0,001

D. t. d. N. 25 in dragee

S. По 1 драже 2—3 раза в день

Rp.: Sol. Ergotamini tartratis 0,05% 1 ml

D. t. d. N. 5 in ampul.

S. Под кожу или в мышцы (в экстренных случаях — в вену) по 0,5—1 мл в день

Эревит — Erevit (ЧССР)

α -Токоферолаацетат

Синонимы: Acetyltocopherolum, Alfacol, Austrovit E, Contopheron, Cotopherol, Daggravit E, Davitamon E, Dumovit E, Ecoferol, Econ, Efer, E-Ferol, Ephynal, Epsilan-M, Esol, Esorb, Eterapion, Eviabit, E-Vicotrat, Eviol, Evipherol, E-Viterbin, Evitol, Fertilvit, Germinol, Gevex, Godabion E, Juvela, Mephatopherol, Pletocol, Syntopherol Acetate, Tocopherolo Bioglan, Tocomine, Tocopherex, Tocophrin, Tocos, Tocovigor, Tofaxin, Toferol, Vi-Etal, Viteolin, Wandervit E и др.

Выпускают 5%, 10% и 30% масляные растворы в ампулах по 1 мл

Хранение — в прохладном, защищенном от света месте. Ультрафиолетовые лучи разрушают витамин

Срок годности ампул — 4 года, драже — 5 лет

Препарат витамина E.

Применяется при нервных заболеваниях (амиотрофическом боковом склерозе и др.), мышечных дистрофиях, красной волчанке, псориазе и др. Может применяться при угрожающем выкидыше и склонности к преждевременным родам, при нарушении менструального цикла, при привычном выкидыше (в сочетании с прогестероном)

Rp.: Sol. «Erevit» 5%, (10%, 30%) 1 ml

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Внутримышечно

Эринит — Erynitum

Пентаэритритол тетранитрат

Синонимы: Angicap, Angitol, Artery, Corynitrat, Duotrate, Lentrat, Metranil, Mycardol, Niritol, Nitropentaerythrit, Nitropenton (ВНР), Pentaerythryltetranitrat, Pentalong, Pentaryl, Pentral, Pentrit, Pentritol, Pentyoxylon, Perangil, Prevangor, Subicard, Tetranite, Tetrasule, Vasocor, Vasodiatol и др.

Коронарорасширяющее средство.

Применяют при хронической коронарной недостаточности для предупреждения приступов стенокардии. Действие развивается медленнее, чем у нитроглицерина, но более продолжительно

Выпускается в таблетках по 0,01

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности эринита — 1 год, нитропентона (ВНР) — 5 лет

Rp.: Eryniti 0,01

D. t. d. N. 50 in tabul.

S. По 1—2 таблетке 3—4 раза в день перед едой

Эрпозид — Ergozid (ВНР)

Состав на 1 таблетку:

Dichlothiazidi 0,01

Reserpini 0,0001

Хранение — список Б

Срок годности — 3 года

Гипотензивное и мочегонное средство.

Применяют при умеренных и тяжелых формах гипертонической болезни (II и III стадии)

Rp.: Tabul. «Ergozid» N. 50

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Эскодол — Escodolum

Состав на 1 ампулу:

Promedoli 0,02

Scopolamini hydrobromidi 0,0005

Ephedrini hydrochloridi 0,025

Aquae pro injectionibus ad 1 ml

Хранение — список А, в защищенном от света месте

Обезболивающее, спазмолитическое, успокаивающее и кардиотоническое средство.

Применяют самостоятельно или в сочетании с нейролептиками для премедикации при общем и местном обезболивании

Rp.: Escodoli 1 ml

D. t. d. N. 4 in ampul.

S. Под кожу или внутримышечно 0,75—1 мл

Эскузан — Aescusan (ГДР)

Стандартизованный препарат сапонинов из семян конского каштана (*Aesculus hippocastanum*)

Синонимы: Ascip, Reparil

Выпускается в виде водно-спиртового раствора с добавлением 0,5% тиамин хлорида во флаконах по 20 мл и в драже с содержанием 0,016 сухого препарата

Хранение — список Б

Препарат повышает тонус вен и снижает свертываемость крови.

Применяют при геморрое, при язвах голени, для профилактики тромбозов и т. п.

Rp.: «Aescusan» 20 ml

DS. По 12—15 каплей 3 раза в день перед едой

Rp.: Dragee «Aescusan» 0,016
D. t. d. N. 50
S. По 1 драже 3 раза в день до еды

**Эстрадиола бензоат —
Oestradioli benzoas**

Эфир эстрадиола и бензойной кислоты

Синонимы: Agofollin, Bellahormon, Benovocycin, Benzestrin, Benzozestrofol, Benzofoline, Bio-Ostron, Difollisterol, Dihydrofollikulinbenzoat, Eston B, Estrolan-B, Foliculin B, Follidimyl, Graafina, Gynonguent, Hydroestron, Hormogynon, Ostradiolbenzoat, Oestramedin, Oestrin, Ovaria-Hormon «Polfa», Ovocylin M, Ovostab, Provetan, Solestro, Unistradiol и др.

Выпускается в ампулах по 1 мл 0,1% масляного раствора

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Женский половой гормон (эстроген).

Применяется при гипофункции яичников-дисменорея, гормональное бесплодие, климакс и т. п. — для сенсбилизации матки к средствам, возбуждающим сокращения последней в периоде родов. Может применяться для лечения рака простаты и рака молочных желез у мужчин, а также у женщин старше 60 лет. При гипофункции яичников (первичный и вторичный гипогонадизм) препарат применяется в первую половину цикла, в остальных случаях — непрерывно или курсами. Противопоказан при доброкачественных и злокачественных опухолях женских половых органов. При длительном применении может вызвать маточные кровотечения, повышенные либидо

Rp.: Sol. Oestradioli benzoatis oleosae 0,1% 1 ml
S. По 1 мл в мышцы через 3—5 дней

**Эстрадиола дипропионат —
Oestradioli dipropionas**

3,17-эстрадиол-3,17-дипропионат

Синонимы: Agofollin (inj), Dimenformon Dipropionate, Di-Ovocycin, Diprostron, Diprovex, Folicylin P, Ostradioldipropionat, Ovocrin, Ovocylin P, Progynon D

Выпускается в ампулах по 1 мл 0,1% масляного раствора

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Показания для применения такие же, как и для «Эстрадиола бензоата». Отличается пролонгированным действием

Rp.: Sol. Oestradioli dipropionatis oleosae 0,1% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampul.
S. По 1 мл в мышцы 2 раза в неделю

Эстрадиола пропионат —
Oestradioli propionas
3,17β-эстрадиол-17-монопропионат

Синонимы: Akrofolin (ВНР),
Follhormon, Oestrolum propionisum

Выпускается в драже по 0,05 и
0,1 и в ампулах по 1 мл 0,1%
масляного раствора

Хранение — список Б

Препарат по применению аналогичен «Эстрадиола бензоату», отличаясь от последнего более длительным действием

Rp.: Oestradioli propionatis 0,05 (0,1)

D. t. d. N. 50 in dragee

S. По 1 драже 2—3 раза в день под язык

Rp.: Sol. Oestradioli propionatis oleosae 0,1% 1 ml

D. t. d. N. 20 in ampul.

S. По 1 мл в мышцы 2—3 раза в неделю

Эстрадурин — Estradurin

(Дания)

1,3,5 (10) -эстратриен-3,17 β—диол
фосфорнокислого эфира полимер

Выпускается в ампулах по 0,04
в порошке

Эстрогенный препарат пролонгированного действия. Обладает специфической активностью против аденомы и рака предстательной железы.

Применяется так же, как и фосфэстрол. Отличается большей эффективностью и длительностью действия

Rp.: «Estradurin» 0,04

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. Содержимое ампулы растворить в 2 мл воды для инъекций, вводить внутримышечно по 2—4 мл 1 раз в две недели

Эстрон — Oestronum

Стандартизованный препарат
нативного эстрогена

Синонимы: Cristallovor, Estron,
Estrugonone, Estrusol, Femidyn,
Follestrine, Folliculine, Glandubolin (ВНР), Ketodestrin, Ketohydroxyestrin, Oestrobion, Oestroglandol, Oestrogynon, Ostron, Theelin, Thelestrin, Thelykinin

Эстроген, по действию и применению аналогичный «Эстрадиола бензоату». Отличается меньшей активностью

Выпускается в ампулах по 1 мл
масляного раствора с активностью 5000 и 10 000 ЕД и в спиртовом растворе (1000 ЕД/мл) во флаконах по 30 мл

Хранение — в прохладном, защищенном от света месте

Rp.: Sol. Oestroni oleosae 1 ml (5000 ED)
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. По 1 мл в мышцы ежедневно

Rp.: Sol. Oestroni spirituosae 30 ml (30 000 ED)
DS. По 20—30 капель для втирания в кожу лица при угрях и гипертрихозе

Этамид — Aethamidum

N,N-Диэтилсульфамидобензойная кислота

Синонимы: Etamid, Etebenecid, Longacid «неи», Urelim

Выпускается в таблетках по 0,35

Хранение — в обычных условиях

Срок годности — 2 года; после переконтроля — 6 мес.

Препарат влияет на процессы канальцевой секреции в почках, ускоряя выведение мочевой кислоты.

Применяют при лечении подагры, полиартритов с нарушением пуринового обмена, почечнокаменной болезни с образованием уратов. Этамид тормозит секрецию пенициллина и может применяться для пролонгирования эффекта последнего.

Rp.: Aethamidi 0,35
D. t. d. N. 50 in tabul.
S. По 2 таблетки 4 раза в день

Этаперазин — Aethaperazinum

2-Хлор-10-{3-[4-(β-оксиэтил)пиперазинил-1]-пропил}-фенотиазина дигидрохлорид

Синонимы: Calmazina, Chlorpiprazin, Decentan, Ethaperazin, Fentazin, Metid, Neuropax, Perfenzazin, Perfenil, Perphenan, Perphenazin, Sedozina, Thilatazin, Trilafan, Triomin

Выпускается в таблетках по 0,004 (0,01)

Хранение — список Б в герметически закрытой посуде из оранжевого стекла в защищенном от света месте.

Срок годности — 3 года

Нейролептик, эффективное противорвотное средство.

Применяют в психиатрической практике при разных формах шизофрении, при маниакальном возбуждении, при бредовых галлюцинациях и др., а также как снотворное средство у больных с психическими и нервными заболеваниями. Также применяют для купирования токсической рвоты (ранний токсикоз беременности, лучевая болезнь, различные отравления)

Rp.: Aethaperazini 0,004
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Этимидин — Aethimidinum
2,4-Диэтиленимино-6-хлорпиримидин

Выпускается в ампулах в порошке по 0,006

Хранение — список А, в прохладном и защищенном от света месте при температуре не выше 10°
Срок годности — 1 год

Противоопухолевое средство, близкое к «Дипину» и «Тиофосфамиду».

Применяется при раке яичников и бронхогенном раке легкого (после операции). Осложнения — тошнота, рвота, неврологические расстройства, лейкопения

Rp.: Aethimidini 0,006
D. t. d. N. 35 in ampul.
S. Для внутривенных вливаний по назначению врача. Перед употреблением содержимое ампулы растворяют в 20 мл изотонического раствора натрия хлорида

Этинилэстрадиол — Aethinyloestradiolum
17- α -Этинил-1,3,5(10)-эстратриен-3,17 β -диол

Синонимы: Diogyn-E, Diolyn, Dyliform, Estigyn, Estinyl, Estrolan-E, Ethidol, Ethinoral, Eticyclin, Etifollin, Etinestrol, Etivex, Fodinyl, Follicoral, Ginestrene, Gynoral, Inestra, Linoral, Menolyn, Metrociclina, Metroval, Mikrofollin (BHP), Novestrol, Oradiol, Orestralyn и др.

Выпускается в таблетках по 0,00001 и 0,00005

Хранение — список Б
Срок годности (микрофоллин) — 5 лет

Эстрогенный препарат.

Применяют при недостаточной функции яичников: дисменорее, гипер- и гипоменорее, кровотечениях в молодом возрасте, климактерических расстройствах и др. По свойствам и применению аналогичен «Эстрадиола бензоату». Отличается большей активностью, не разрушается в пищеварительном тракте, благодаря чему может применяться внутрь

Rp.: Aethinyloestradioli 0,00001
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1 таблетке 1—2 раза в день

Этионамид — Ethionamidum
2-Этил-4-тиоизоникотинамид
Синонимы: Ätina, Amidazin, Ethionamide, Etionid, Etionizina, Fatoliamid, Nicotion, Nizo-

Противотуберкулезный препарат II ряда.

Применяется при устойчивости микобактерий к изониазиду и стрептомицину

tin, Rigenicid, Sertinon, Thianid,
Trecator, Trecatyl и др.

Выпускается в таблетках по
0,25

Хранение — список Б

Срок годности ВНР — не огра-
ничен; ЧССР (драже) — 3 года

Rp.: Ethionamidi 0,25

D t. d. N. 30 in tabul.

S. По 1 таблетке 3 раза в день

Этоксид — Aethoxydum

Ди-(4,4'-этоксифенил)-тиомоче-
вина

Синонимы: Aethoksid, Aethoxyd,
Etoksid

Выпускается в таблетках по
0,25 и 0,5

Хранение — список Б, в хо-
рошо закупоренной банке

Срок годности — 4 года

Противотуберкулезный препа-
рат II ряда.

Применяют при резистентности
к основным препаратам или непе-
реносимости их

Rp.: Aethoxydi 0,25 (0,5)

D t. d. N. 30 in tabul.

S. Начинают по 0,25 г 2—3 раза в день. При хоро-
шей переносимости — по 0,5 2—4 раза в день

Эудан — Eudan (ЧССР)

5-метилфенилбарбитуровая ки-
слота

Синонимы: Heptobarbital, Мер-
hebarbital, Rutonal(e)

Выпускается в таблетках по 0,2

Хранение — список Б

Барбитурат, близкий к фенобар-
биталу.

Снотворное действие его значи-
тельно слабее, вследствие чего
«Эудан» применяется в основном
для лечения больших припадков
эпилепсии

Rp.: «Eudan» 0,2

D t. d. N. 20 in tabul.

S. По 1/2—4 таблетки в день (индивидуально)

Эуналгит — Eunalgit (ЧССР)

Состав на 1 таблетку:

Amidopyrini 0,22

Diali 0,03

Состав на 1 ампулу:

Amidopyrini 0,44

Diali 0,06

Aquae pro injectionibus ad 2 ml

Хранение — список Б

Анальгезирующее и успокаива-
ющее средство.

Применяют при болях различ-
ного происхождения и при бес-
соннице, связанной с болевым син-
дромом

Rp.: Sol. «Eunalgit» 2 ml
D. t. d. N. 5 in ampul.
S. По 1 ампуле 1—2 раза в день в мышцы или в вену

Rp.: «Tabul. «Eunalgit» N. 10
DS. По 1 таблетке 1—2 раза в день

Эуфиллин — Euphyllinum

Комплекс теофиллина с 1,2-этил-лендиамином

Синонимы: Allenfillina, Aminocardol, Aminofyllin, Aminomal, Aminophyl, Aminophylline (ПНР), Ammophyllin, Androphyllin, Biophylline, Cardiofillina, Cardiomin, Carena, Corophyllin, Corphyllamin, Diaphyllin (ВНР), Diucardin, Diurophylline, Diuxanthine, Escorphylin, Ethophylline, Eudiamin, Euphyllin, Genophyllin, Godafillin, Grifomin, Leofillina, Lixaminol, Metaphyllin, Minaphil, Miofilin, Ortophyllin, Peterphyllin, Phyllocormin, Stenovasan, Suppophylline, Syntophyllin (ЧССР), Tefamin, Teofyllamin, Theoaethamin, Theodrox, Theolamine, Theophyllamin, Theosumman, Thephyldine, Thilophyllin, Vasophylline

Выпускается в таблетках по 0,1 и в ампулах по 10 мл 2,4% раствора и по 2 мл 12% раствора.

Хранение — список Б, в защищенном от света месте

Срок годности таблеток — 5 лет, после переконтроля — 3 года; срок годности ампул — 2 года, после переконтроля — 1 год

Спазмолитическое и сосудорасширяющее средство.

Применяют для предупреждения и лечения бронхиальной астмы, в качестве вспомогательного средства при сердечной астме, при недостаточности левого желудочка сердца, при спастических состояниях мозговых сосудов, для купирования приступов стенокардии и гипертонического криза, печеночной и почечной колики и т. п.

Rp.: Euphyllini 0,1
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Sol. Euphyllini 12% 2 ml
D. t. d. N. 10 in ampul.
S. Для инъекций в вену (2,4%) или в мышцы (12%) по 1 ампуле

Эуфлат — Euflat (ГДР)
Состав на 1 драже:
Carbonis medicinalis 0,05
Papaverini hydrochloridi 0,02
Aloës 0,005
Radicis Angelici 0,02
Extracti Pancreatis 0,02
Extracti Cholisi 0,004
Хранение — список Б, в сухом месте

Адсорбирующее средство, способствующее нормализации пищеварения.

Применяется при различных желудочно-кишечных заболеваниях, запорах, метеоризме и т. п.

Рр.: Dragee «Euflat» N. 30
DS. По 1—2 драже 3 раза в день после еды.

Эфедрол — Ephedrolum
Состав на 1 таблетку:
Ephedriini hydrochloridi
Dimedroli aa 0,025
Хранение — список Б
Срок годности — 4 года

Антигистаминное и бронхолитическое средство.

Применяют при бронхиальной астме, сенной лихорадке, крапивнице и др.

Рр.: Tabul. Ephedroli N. 10
DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Эфестмин — Ephesthmin (ЧССР)
Состав на 1 таблетку:
Theophyllini 0,2
Ephedriini sulfatis 0,02
Radobelini 0,00015
Phenobarbitali 0,02
Хранение — список Б
Срок годности — 1 год

Бронхолитическое и успокаивающее средство.

Применяют при бронхиальной астме, астматическом бронхите и т. п.

Рр.: Tabul. «Ephesthmin» N. 10
DS. По 1—2 таблетки 1—2 раза в день

**Эфир ментоло-хлороформный —
Aether chloriformiatus cum
Mentholo**

Раздражающее, слабое местно-анестезирующее средство.

Применяется для обработки ушибов, разрывов связок и т. п.

Рр.: Mentholi 1,0
Chloroformii 10,0
Aetheris aethylici 15,0
MDS. Наносить на место повреждения

Эфкамон — Efcamoni

Состав:

Camphorae 10,0
Olei Caryophyllorum
Olei Sinapis aetherei āā 3,0
Olei Eucalypti 7,0
Mentholi 14,0
Methylii salicylatis 8,0
Tincturae Capsici 4,0
Chlorali hydrati
Thymoli āā 3,0
Olei Cinnamomi 1,0
Cetacei
Vasellini ad 100,0

Выпускается в тубах по 10, 15 и 25 г

Хранение — в прохладном, защищенном от света месте

Срок годности — не установлен

Rp.: Efcamoni 10,0 (15,0, 25,0)

DS. Втирать в кожу по 2—3 г 2—3 раза в день

Эхинопсина нитрат —

Echinopsini nitras

Алкалоид, содержащийся в семенах мордовника обыкновенного (Echinops Ritro L.)

Выпускается в ампулах по 1 мл 0,4% раствора и во флаконах по 30 мл 1% раствора

Хранение — список А, в прохладном защищенном от света месте

Срок годности — 1 год

Rp.: Sol. Echinopsini nitratis 0,4% 1,0

D. t. d. N. 10 in ampul.

S. По 1 мл под кожу 1 раз в день

Rp.: Sol. Echinopsini nitratis 1% 30 ml

DS. По 10 капель 2 раза в день

Яссера мазь —
Unguentum Jasseri

Противопаразитарное (акарицидное) средство.

Применяется для лечения чесотки

Rp.: Sulfuris

Zinci sulfatis āā 2,0

Axungiae porcinae 5,0

M. f. unguentum

DS. Наносить на пораженные участки кожи

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абехол 5
 Абциин 5
 Абомин 5
 Авербаха капли глазные 6
 Авномарин 6
 Ависан 6
 Адебит 7
 Адельфан 7
 Адимницин 7
 Адипат 8
 Адиптин 8
 Адоль 8
 Адонис-бром 9
 Адорин 9
 Адосен 9
 Адроксон 9
 Аевит 10
 Азаурацил 10
 Аймалин 10
 Аклиман 11
 Акостезин 11
 Акофин 11
 Аксеромальт 11
 Аксянцева порошки 12
 Алгена 12
 Алептин 12
 Алибура жидкость 13
 Алйодан 13
 Аллацил 13
 Аллергастмин 13
 Аллилглицер 14
 Аллилсат 14
 Аллилчеп 14
 Аллохол 14
 Алмагель 16
 Алсол 16
 Алулент 16
 Альба 17
 Альбумин плацентарный 15
 Альдомет 15
 Альфадрил 15
 Амазол 17
 Амбен 17
 Амбосекс 18
 Амедин 18
 Амизил 18
 Амизол 19
 Аминазин 19
 Аминоакрихин 20
 Аминокровин 20
 Аминопептид 21
 Амниофиллин сложный 21
 Амниохинол 21
 Амнитесал 22
 Амифен 22
 Аммифурин 22
 Аммония каприлат 23
 Аммония хлорид 23
 Аммурон шипучий 23
 Аналептин-Спофа 24
 Аналергин-Спофа 24
 Анальгин-Спофа 25
 Анальфеи 25
 Анапирин 25
 Анатруксовий 25
 Анбитал 26
 Ангидрид 26
 Ангиотрофин 26
 Ангирол 26
 Андекалин 27
 Андипал 27
 Андреева пилюли 27
 Андриасяна мазь 28
 Андросан 28
 Анестезол 28
 Анетин 28
 Анкофен 29
 Анозол 29
 Антастман 29
 Антерон 29
 Антигерпин 30
 Антигидрозин 30
 Антигистамин-Спофа 30
 Антиневралгин 31
 Антипаркин 31
 Антипсориадикум 31
 Антиструмин 31
 Антитуссин 32
 Антитермалин 32
 Антифлогистин, см. Антитермалин 32
 Антиформин 32
 Анузол 33
 Аписартрон 33
 Апикодин 33
 Апилак 33
 Апон 34
 Апоплектал 34
 Апсодон 34
 Ара 34
 Араго 35
 Аргазол 35
 Арета глазная примочка желтая 35
 Ариевича мазь 36
 Ариевича-Вихревой пластырь 36
 АФмин 36
 Ариика-глицерин 37
 Арпенал 37
 Арсотонин 38
 Арсотонин с железом 38
 Артро 38
 Арфенин 38
 Арфонад 38
 Аскорутин 39
 Аскофен 39
 Аснитин 39
 Астма-спрей 40
 Астматол-Спофа 40
 Астмин 40
 Асфен 41
 Атеронд 41
 Атромид 41
 Аурелин 41
 Аутенрита жидкость против пролеж-
 ней 42
 Ацетилдигитоксин 42
 Ацетилхолина хлорид 43
 Ацефен 43
 Ацидин-пепсин 43
 Ацидотест 44
 Ациклофин 44
 Аэрон 44
 Бактрим 45
 Балтикс 45
 Бальзам бенгальский 45
 — глицериновый косметический 46
 — для сосков № 1 46
 — — — № 2 46
 — йодно-мыльный 46
 — камфорно-мыльный 47

- Бальзам ланолиновый 47
 — — сложный 47
 — против обморожения № 1 47
 — — — № 2 47
 — сарептский 48
 — скипидарный 48
 Баметансульфат 48
 Банайтиса жидкость 49
 Баральгин 49
 Барбамид 49
 Барбитал-натрий 50
 Барбитесал 50
 Барвинкана гидрохлорид 50
 Барез-ванна 51
 Барелла порошок № 1 51
 — — № 2 51
 — — № 3 51
 — — № 4 51
 Бат 52
 Ватилон 52
 Бахона капли № 1 52
 — — № 2 52
 — — № 3 53
 Беамат 53
 Вебе 53
 Бекарбон 53
 Беклорам 54
 Беллицера и Катковой жидкость —
 см. БК-8 67
 Беллалгин 54
 Беллазон 54
 Белластезин 54
 Беллатаминал 55
 Беллафен 55
 Беллин 55
 Белкви 56
 Беллонд 56
 Беллусекал 56
 Белоголового капли № 1 56
 — — № 2 57
 Беляева капли 57
 БемеGRID 57
 Бемницин 57
 Бенаркоз 58
 Бензонал 58
 БензоТЭФ 58
 Бенканин 59
 Бепасал 59
 Берберина сульфат 59
 Бережного жидкость 59
 Бермол 60
 Бероксан 60
 Бертенсона порошок 60
 Бесалол 60
 Бетазин 61
 Беталактин 61
 Бетиол 61
 Бефорал 61
 Бифунгин-ниотин 62
 Бехтерева микстура 62
 Бецевина 62
 Вигумаль 63
 Виета микстура № 1 63
 — — № 2 63
 Вийохниол 63
 Викарминт 64
 Виллагит 64
 Вилихол 64
 Вильрота линимент йодоформный № 1
 65
 — — — № 2 65
 — — — № 3 65
 Вильрота линимент йодоформный
 № 4 65
 Виманол 65
 Вимолин 65
 Бинге микстура 66
 Бипрессин 66
 Бисал 66
 Бифактон 66
 Бишпан 67
 БК-8 (белковый кровезаменитель
 В. А. Беллицера и К. И. Катковой)
 67
 Б-комплекс 67
 БЛ, паста против геморроя 68
 Бланкара пилюли 68
 Бло пилюли № 1 69
 — — № 2 69
 — таблетки № 1 69
 — — № 2 69
 Богомоловой и Александровой там-
 пон биологический антисептиче-
 ский, см. БАТ 52
 Богомольного таблетки 70
 Богословского капли 70
 Бойко жидкость 70
 Бом-Бенге бальзам 70
 — мазь 71
 Бороглицирин 71
 Бороментол 71
 Боротимол 71
 Боткина капли № 1 72
 — — № 2 72
 Брассикон 72
 Бреславского мазь 72
 Бременера паста, см. Плантозан 426
 Бринальдикс 73
 Бродского микстура 73
 Бромадрил 73
 Бромизовал 74
 Бромитал 74
 Бромкамфора 75
 Бруфен 75
 Букарбан 75
 Булатова порошки 75
 Вуренкова пилюли 76
 Бурже микстура 76
 Бурже порошок № 1 76
 — — № 2 77
 Бурова жидкость 77
 Бутадион 77
 Бутаамид 78
 Буяльского примочка глазная 78
 Вазальгин 78
 Вазелин ароматный 79
 — карболовый 79
 — ланолиновый 79
 — тимоловый 79
 Вазоген жидкий 79
 — йодный 80
 — ихтиоловый 80
 Вазоластин 80
 Валедрин 80
 Валентесал 81
 Валидол 81
 Валуум 81
 Валоседан 82
 Вальда пастилы 82
 Вальденберга жидкость 82
 Ванна горчичная 82
 — скипидарная 83
 Варикоцид 83

Бегантофен 83
 Венапиолин 84
 Вералгин 84
 Верографин 84
 Веродон 85
 Верол 85
 Ветразин 85
 Виадрил 86
 Видала молоко 86
 Видеин 86
 Видекс 87
 Викаир 87
 Викалин 87
 Викасол 88
 Виллата жидкость № 1 83
 — — № 2 88
 Вилькинсона мазь № 1 88
 — — № 2 89
 — — № 3 89
 — — № 4 89
 Вильсона мазь 89
 Винбластин 89
 Винкамин 89
 Винкапан 90
 Винкрестин 90
 Виноградова порошки 90—91
 Винтерница экстракт черники жидкий 91
 Виола примочка глазная желтая 91
 Випарктин 91
 Випералгин 92
 Випраксин 92
 Вирапин 92
 Витабион 93
 Витален № 1 93
 — — 2 93
 — № 3 93
 — № 4 94
 Витакальцин 94
 Витаседин 94
 Витахлорциклин 94
 Витогепат 95
 Витоксидиклин 95
 Вихеркевича капли глазные 95
 Вицедрин 96
 Вицелин 96
 Вишняковского линимент бальзамический № 1 96
 — — — № 2 96
 — жидкость 97
 ВНД-6 97
 Восси капли 97
 Вода дегтярная 97
 — известковая 98
 — косметическая № 1 98
 — — № 2 98
 — — № 3 98
 — — № 4 98
 — белая 99
 — кровоостанавливающая № 1 99
 — — № 2 99
 — морская искусственная № 1 99
 — — — № 2 100
 — розовая 100
 — свиццовая 100
 — свиццово-борная 100
 — сулемово-квасцовая 100
 — укропная 101
 — хлороформная 101
 — чемерицная 101
 Войцеховского микстура 101
 Воля мазь 101—102
 Воробьева порошки № 1 102
 — — № 2 102
 — — № 3 102
 Восстановитель для волос 102—103
 Вотчала капли № 1 103
 — — № 2 103
 Воячека мазь 103
 Вульнузан 103
 Галазоллин 104
 Галидор 104
 Галоперидол 104
 Галохин 105
 Гальманин 105
 Гальмаформ 105
 Галлера эликсир 105—106
 Гаммалон 106
 Гамона 106
 Гартмана жидкость 106—107
 Гастрин 107
 Гастрилон 107
 Гастробамат 107
 Гастрогел 108
 Гастрофилин 108
 Гваякурам 108—109
 Гебра глицерин мыльный 109
 — линимент косметический 109
 — мазь против веснушек 109
 — — противочесоточная 109—110
 — спирт мыльный № 1 110
 — — — № 2 110
 Гексамидин 110
 Гексенал 111
 Гельмиразин 111
 Гематоген 111
 — детский 112
 Гемовинил 112
 Гемодез 112
 Гемостимулин 113
 Гемофирин 113
 Гемофобин 113
 Гендевит 114
 Гендон 114
 Гепарин 114—115
 Гериптил 115
 Гериплекс 115—116
 Геровит 116
 Геровиталь N₃ 116—117
 Гефепитин 117
 Геффе жидкость 117
 Гидранол 117—118
 Гидрокортизона ацетат 118
 Гидролизин 118
 Гидроперит 119
 Гималлина сульфат 119
 Гиндарина гидрохлорид 119—120
 Гипарез 120
 Гипостерол 120
 Гипотирин 120—121
 Гирепин 121
 Гирша жидкость 121
 Гистаглобулин 121
 Гистидин 122
 Глауцина гидробромид 122
 Гливалан 122
 Гливенол 123
 Гликоформол 123
 Глюо-6 123
 Глицерин борно-квасцовый 123
 — борно-таниновый 124
 — дегтярно-салициловый 124
 — известковый сложный 124

- Глицерин ихтиоловый 124
 — ихтиолово-мыльный 124
 — йодно-карболовый 125
 — йодно-мыльный 125
 — йодный 125
 — йодоформно-мыльный № 1 125
 — — № 2 125
 — — № 3 125
 — — № 4 125
 — карболово-молочнокислый № 1 126
 — — № 2 126
 — — № 3 126
 — карболово-мыльный 126
 — салицилово-мыльный 126
 — с бурой 126
 — серно-мыльный 127
 — с железом 127
 — с окисью цинка мыльный 127
 — таниновый 127
 — хлороформный № 1 127
 — — № 2 128
 — яичный 128
 Глицериноспирт 128
 Глицерофосфат 128
 Глицерофосфен 128
 Глория 129
 Гофотин 129
 Гордеева мазь цинхофеновая 129
 Гофунга паста 129
 Гранулы шипучие лимонные 130
 Гращенкова микстура 130
 Гризеофульвин 130
 Губка гемостатическая 131
 Гуженко паста 131
 Гуляяа мазь 131
 Гуляра примочка свинцовая 131

 Давида жидкость, см. Йод-салол 186
 Дайтек 132
 Дакена раствор антисептический 132
 Дарье мазь 132
 Даукарин 133
 Дегранол 133
 Дезоксикортикостерона ацетат (ДОКСА) 133—134
 Дезопимон 134
 Дезурол 134
 Декамевит 134—135
 Декамин 135
 Дексаметазон 135
 Делипин 136
 Делицкого-Митрошенко жидкость 136
 Делмезон 136
 Демалгон 137
 Демьяновича жидкость № 1 137
 — — № 2 137
 Демьяновича паста 137
 Дента 137
 Деполяторий 138
 Депо-калликреин, см. Падутин-депо 386
 Депрессин 138
 Депурган 138
 Дерла 138
 Дермазулен 139
 Дермозолон 139
 Дермофил 139
 Десмол 140
 Детурид 140
 Дефебрия 140
 Дехолин 141
 Днадрин 141

 Дназолин 141—142
 Днакарб 142
 Драл 142
 Днафен 142—143
 Днафенилсульфон 143
 Днботин 143
 Днваскол 143
 Днвенал 144
 Днгидроэрготамин 144
 Днгитесаал 145
 Днгитоксин 145
 Днгоксин 145
 Днгидотирозин 146
 Днкаптол 146
 Днкафен 146
 Днколин 147
 Днкумарин 147—148
 Днланизид 148
 Днльминнал 148
 Днмекарбин 148
 Днмеколин 149
 Днмэстрол 149
 Дннезин 149—150
 Дниил 150
 Дносониин 150
 Днотнлан 150
 Днпасаллин № 1 151
 — — № 2 151
 — — № 3 151
 Днпасафен 151
 Днплацина днхлорид 151
 Днпразин 152
 Днпрофен 152
 Днпрофиллин 153
 Днсульформин 153
 Днтиллин 154
 Днтримин 154—155
 Днфенин 155
 Днхлотиазид 155
 Днцнион 156
 Днэтифен 156
 Длусского мазь 156
 Добралин 157
 Добронравова капли 157
 Доверов порошок №1 157
 — — №2 157
 — — №3 157
 Доматрин 157—158
 Донована жидкость 158
 Допан 158
 Дроперидол 158
 Дрягина микстура 159
 Дуплекс 159
 Дустундан 159
 Дьякова мазь 159—160
 Дюрана жидкость 160

 Жавеля жидкость 160
 Жектофер 160
 Желатин глицининовый 161
 — для внутреннего употребления
 — жидкий 161
 Желатиноль 161
 Желчь медицинская 162
 Жидкость антисептическая 162
 — белковая 162—163
 — глицирино-хлороформная 163
 — для лечения обморожений 163
 — ментоловая анестезирующая 163
 — мозольная № 1—14 163, 164, 165
 — против веснушек 165
 — — зуда № 1 165

Жидкость против зуда № 2 165
— — № 3 165
— — № 4 165
— — пота № 1 —7 166
— — экземы 166
— охлаждающая № 1 166
— — № 2 167
— — щелочная № 1 167
— — № 2 167
Житнюка присыпка № 1 167
— — № 2 167

Здренко сборы для приготовления
микстуры № 1 167 3—169
— — № 2 167 3—169
Зеленниа капли 169
Зидмана жидкость 169—170
Золотовой-Костомаровой порошки
— № 1 170
— — № 2 170
Зорна порошки (таблетки) 170
Настил 171
Иванова-Смоленского микстура 171
Изадрин 171
Изафенин 172
Изоверин 172
Изонал 172
Изонитрозин 173
Изоприн 173
Изопропамид 173—174
Изоптин 174
Изофетил 174
Имизин 174—175
Имифос 175
Имферон 175
Инга-17 176
Ингакамф 176
Ингалипт 176
Ингалон 177
Ингаляция против кашля № 1 177
— — № 2 177
— — № 3 177
— — № 4 177
— — № 5 177
— — мигрени 178
— — насморка № 1 178
— — № 2 178
— — № 3 178
— — № 4 178
— — № 5 178
— — № 6 178
— — астмы 179
Индерал 179
Индигокармин 179
Индонал 180
Индонид 180
Инкрепан 180
Иноземцева капли 181
Инсектин 181
Интенсан 181
Интрайодин 182
Инфекундин 182
Инфузин солевой ЦИПК 182—183
Иогистрин 183
6-Иохимбин 183
Иохимбин 183—184
Ипразид 184
Ипронал 184
ИФ-12 184
Ихтиоллин 185
ИЭР-1 185
ИЭР-2 185

Йодантокс 185
Йодинол 186
Йодолитол 186
Йод-салол № 1 186
— № 2 186
Йодтесал 187
Йодхинопириин 187
Йосагност 188

Каглиосал 188
Казенна гидролизат 183
Калаброн 188
Калимин 188—189
Калинодон 189
Калия оротат 189
Калликренн-депо, см. Падутин-депо
385
Каловат 190
Калтабор 190
Кальсотиос 190
Кальцевит 191
Кальцекс 191
Кальций-кардинаид 191
Кальция глютамат 191
— пантотенат 192
Каметон 192
Камфедрин 192—193
Камфодол 193
Камфодал 193
Камфоний 193
Камфопириин 194
Камфофенол 194
Камфоцин № 1 194
— № 2 194
Канавит 195
Капли желудочные № 1 195
— — № 2 195
— — № 3 195
— — № 4 196
— — зубные № 1 196
— — № 2 196
— — № 3 196
— — камфорно-валериановые 196
— — квасцовые глазные 196
— — ландышево-валериановые 197
— — ландышевые сложные № 1 197
— — — № 2 197
— — — № 3 197
— — — № 4 197
— — с настойкой чилибухи 197
— — ментоловые сложные 197, 198
— — нашатырно-анисовые 198
— — противоастматические № 1 198
— — № 2 198
— — № 3 198
— — против мигрени 198
— — насморка № 1 199
— — — № 2 199
— — — № 3 199
— — противорвотные 199
— — строфанта сложные 199
— — и настойки чилибухи 199
— — сульфацило-днкаиновые глазные
200
— — тимоловые 200
— — щелочные 200
— — эфирно-скипидарные 200
Капсин 200
Капситрин 201
Каптоль 201
Каптосульфол 201
Карандаш горчичный 201—202

Карандаш йодно-таниновый 202
 кровоостанавливающий № 1 202.
 — — № 2 202
 — — № 3 202
 — ментоловый № 1 202
 — — № 2 203
 Карбагель 203
 Карбантокс 203
 Карбахолин 203
 Карболен 204
 Карденозин 204
 Кардиовален 204
 Кардиотраст 205
 Карнон 205
 Кармановой микстура 206
 — таблетки № 1 206
 — — — 2 206
 Карноль 206
 Карташева микстура 207
 — полоскание 207
 Каstellлани жидкость 207
 Катапресан 207—208
 Катарро 208
 Каферид 208
 Квалидил 208
 Кватера микстура 209
 Кватерон 209
 Кверцетин 209
 Квиэтидин 209
 Келлатрин 210
 Келливерин 210
 Келлотетрит 210
 Келлофиллин 210 ☉
 Кетазон 211
 Кефалозан 211
 Кеффера жидкость 211
 Кинедрил 212
 Кислота аденозинтрифосфорная 212
 — липосевая 213
 Клеол 213
 Климактерин 213
 Климарен 214
 Климован 214
 КН 214
 Киндомон 214—215
 Ковтуновича мазь 215
 Кокарбоксилаза 215
 Коллоид 215
 — глицериновый 216
 — кровоостанавливающий 216
 — сулемовый № 1 216
 — — № 2 216
 — эластичный № 1 216
 — — № 2 216
 Кольдкрем 217
 — А 217
 — Б 217
 — вазелиновый № 1 217
 — — № 2 217
 — ланолиновый 218
 — салициловый 218
 Колхамин 218—219
 Комбифенан 219
 Компламин 219
 Кондельфин 219
 Консервант крови № 7-6 220
 Контрагельмин 220
 Контраспан 220
 Контрацептин «Т» 221
 Кончаловского порошки 221
 Конькова мазь основная 221
 Конькова мазь с дегтем 221
 — — — ихтиолом 222
 — — — пенициллином 222
 — — — синтомцином 222
 Копиркал 222
 Корбелла 223
 Корвалол 223
 Коргормон 223
 Кордиамид-кофенн 224
 Кордигит 224
 Корезид 225
 Корнерин 226
 Коронтин 226
 Кортизона ацетат 226
 Кортикотропин для инъекций 226
 Кортин 226
 Кортол 226
 Корхорозид 227
 Корчагина спирт 227
 Кофальгин 227
 Кофендон 227—228
 Кофен-мите 228
 — -форте 228
 Кофетамин 228
 Кофотесал 228
 Красногорского микстура 229
 Краснушкина микстура № 1 229
 — — № 2 229
 Креде мазь 229—230
 Кризанол 230
 Кричевского жидкость 230
 Кромсан 230
 Ксиканн 231
 Ксплит 231
 Кукушкина жидкость 231
 Куммерфельда жидкость № 1 232
 — — № 2 232
 Купроль 232
 Курантил 232
 Курбин 233
 Кутизон 233
 Кутопур 233
 Кутумовой линимент 233
 Лазикс 234
 Лаксафел 234
 Ланакордал 234
 Лапол 234—235
 Ланолимент борный сложный 235
 — бороглицериновый 235
 — дегтярный 235
 — камфорно-феноловый 236
 — ментоло-салооловый 236
 — резорциповый 236
 — свиновый 236
 — серный 237
 — — сложный 237
 — цинково-серный 237
 — цинковый 237
 Лародопа 237
 Ларусан 238
 Ласонил 238
 Лассара паста 238
 Лашкевича микстура 239
 Лебедева пластырь № 1 239
 — — № 2 239
 Левомепромазин 239
 Левомецетин 240
 Лейкоген 240
 Леморан 241
 Ленбирен 241
 Лепского линимент № 1 241

Лепского линимент № 2 241
 Леспенефрил 242
 Лецитин-церебро 242
 Либексин 242
 Либрум 243
 Ливклиман 243
 Лидокаин-адреналин 243
 Ликватол 244
 Ликвиритон 244
 Ликорина гидрохлорид 244
 Липован 245
 Линетол 245
 Линимент алоэ 245
 — амниачный № 1 246
 — — № 2 246
 — беленого масла сложный № 1 246
 — — — № 2 246
 — — — хлороформный 246
 — борно-цинковый № 1 246—247
 — — № 2 246
 — вазелиновый 247
 — випералгиновый 247
 — известковый 247
 — ихтиоловый 248
 — йодно-камфорный 248
 — йодно-мыльный 248
 — йодно-парафиновый 248
 — йодно-феноловый 249
 — камфорно-амниачный 249
 — камфорно-мыльный № 1 249
 — — № 2 249
 — — № 3 250
 — — № 4 250
 — квасцовый сложный 250
 — ксероформный 250
 — левомицетиновый 250—251
 — медово-перцовый 251
 — ментоловый № 1 251
 — — № 2 251
 — метилсалицилата сложный № 1 252
 — — 2№ 252
 — — 3№ 252
 — мятный 252
 — нафталиновый 252
 — огуречный 252
 — ртутно-квасцовый 253
 — салициловый сложный № 1 253
 — — № 2 253
 — — № 3 253
 — — № 4 253
 — — № 5 254
 — серный сложный 254
 — синтомицина 1%, 5% и 10% 254
 — — 1% с новокаином 5% 254
 — скипидарно-амниачный 255
 — скипидарно-хлороформный 255
 — скипидарный сложный № 1 255
 — — № 2 255
 — стрептоцида 5% 255
 — тезана 256
 — тимоловый 256
 — трагаканта 256
 — хлоралгидрата № 1 256
 — — № 2 257
 — — сложный 257
 — хлороформный 257
 — цинхофена 257
 Лиотен 258
 Лиотиронин 258
 Липовецкого жидкость № 1 258
 Липовецкого жидкость № 2 259
 Липолизин 259
 Липоцеребрин 259
 Листер мазь борная № 1 259
 — — — № 2 259
 — — — мягкая 260
 — — паста карболовая 260
 Листерин 260
 Лобелина гидрохлорид 260—261
 Локакортен 261
 Лофенал 261
 Лукомского жидкость, см. Пиоцид 419
 — паста 262
 Лукьянова мазь 262
 Лумпан 262
 Лунина мазь 262—263
 Луронит 263
 Любазол 263
 Любнева мазь 263
 Люголя раствор для внутреннего применения № 1 264
 — — — — 2 264
 — — на глицерине 264
 — — для наружного применения № 1 264
 — — — — № 2 265
 — — — — № 3 265
 Люмисалин 265
 Люпаверин 265
 Мажептил 265
 Мазь автоловая № 1 266
 — — № 2 266
 — алсоловая 266
 — алюминнево-борная 266
 — анестезирующая № 1 266
 — — № 2 267
 — белая 267
 — белильная 267
 — бензилпенициллиновая 267
 — бодяги 268
 — борная № 1 268
 — — № 2 268
 — — № 3 268
 — — № 4 268
 — — № 5 268
 — борно-висмутовая № 1 268—269
 — — № 2 269
 — борно-салициловая 269
 — бромистая 269
 — висмутовая № 1 269
 — — № 2 269
 — висмутово-цинковая 269
 — глицериновая 270
 — гелиомициновая 270
 — гепариновая 270
 — гидрокортизоновая 270
 — листьев грецкого ореха 271
 — дегтярная 271
 — — сложная № 1 271
 — — — № 2 272
 — — — № 3 272
 — дегтярно-мыльная 272
 — дегтярно-серная 272
 — детярно-цинковая 272
 — дерматоловая 272—273
 — диакильная 273
 — дибномцициновая глазная 273
 — домашняя 273
 — защитная 274
 — инсулиновая 274

- Мазь ихтиоловая 274
 — ихтиоловая сложная № 1 274
 — — № 2 274
 — — № 3 274
 — ихтиолово-бензойная 275
 — ихтиолово-нафталанная 275
 — йодная № 1 275
 — — № 2 275
 — — сложная 275
 — йодоформная 276
 — — сложная 276
 — каломельно-висмутовая 276
 — камфорная 276
 — камфорно-скипидарная 277
 — камфорно-терпентинная 277
 — каолиновая 277
 — колларговая 277
 — колхаминная 278
 — косметическая № 1 278
 — — № 2 278
 — красавки 278
 — — с опием 278
 — ксероформная глазная 279
 — ксероформная-цинковая 279
 — ланолиновая № 1 279
 — — № 2 279
 — — № 3 279
 — — № 4 279
 — масла какао 280
 — ментоловая № 1 280
 — ментоловая № 2 280
 — — сложная № 1 280
 — — № 2 280
 — — № 3 280
 — — № 4 281
 — — № 5 281
 — — № 6 281
 — — с метилсалицилатом 271
 — ментоло-висмутовая 281
 — ментоло-протарговая 281—282
 — ментоло-эфедриновая 282
 — метилсалициловая 282
 — — сложная 282
 — можжевельная № 1 282
 — можжевельная № 2 282
 — — сложная 283
 — молочной кислоты салициловая 283
 — мягкая 283
 — нафталанная 283
 — — сложная № 1 283
 — — № 2 284
 — — № 3 284
 — нафталанно-салициловая 284
 — нафталанно-серная 284
 — — стеариновая № 1 284
 — — № 2 284
 — нафтоловая сложная № 1 285
 — — № 2 285
 — нистатиновая 285
 — окситетрациклиновая глазная 285
 — оксолиновая 285
 — оливомициновая 286
 — охлаждающая, см. Кольдкрем 217
 — парафиновая 286
 — перцовая сложная 286
 — полимиксинная 287
 — преднизолоновая 287
 — репеллентная № 1 287
 — — № 2 287
 — ртутная белая № 1 287
 — — № 2 288
- Мазь ртутная белая № 3 288
 — — — для губ 288
 — — — с висмутом № 1 288
 — — — — № 2 288
 — — — с камфорой 288
 — — — сложная № 1 289
 — — — № 2 289
 — — — желтая № 1 289
 — — — № 2 289
 — — — № 3 289
 — — — с дегтем 290
 — — — сложная № 1 290
 — — — № 2 290
 — — — серая 290
 — — — концентрированная 290
 — — — рыбьего жира 291
 — — — салициловая № 1 291
 — — — № 2 291
 — — — салицилово-ментоловая № 1 291
 — — — № 2 291
 — — — салицилово-молочнокислая 292
 — — — салицилово-нафталанная 292
 — — — салицилово-скипидарная № 1 292
 — — — № 2 292
 — — — свицковая № 1 292
 — — — № 2 292
 — — — № 3 293
 — — — с настойкой опия 293
 — — — сложная 293
 — — — с экстрактом красавки 293
 — — — свицково-бензойная 293—294
 — — — свицково-таниновая № 1 294
 — — — № 2 294
 — — — № 3 294
 — — — свицково-феноловая 294
 — — — свицково-цинковая 294
 — — — серебра нитрата 295
 — — — серная № 1 295
 — — — № 2 295
 — — — сложная № 1 295
 — — — № 2 296
 — — — № 3 296
 — — — серно-таниновая 296
 — — — с калия йодидом 296
 — — — желтая 296
 — — — и тиосульфатом натрия № 1 297
 — — — — — № 2 297
 — — — скипидарная № 1 297
 — — — № 2 297
 — — — сложная 297
 — — — спермацетовая № 1 298
 — — — № 2 298
 — — — № 3 298
 — — — № 4 298
 — — — сложная 298
 — — — стрептоцидная 298
 — — — сульфациловая 298—299
 — — — с хлоридом железа 299
 — — — таниновая 299
 — — — сложная 299
 — — — танино-серная 299
 — — — терпентинная 300
 — — — сложная № 1 300
 — — — № 2 300
 — — — тимоловая № 1 300
 — — — № 2 300
 — — — сложная 300—301
 — — — тополевая 301
 — — — уксусно-бензойная 301
 — — — серная 301
 — — — ундециловая 301—302

- Мазь формалиновая 302
 — фурацилиновая 302
 — фурацилино-касторовая 302
 — феноловая № 1 302—303
 — — № 2 303
 — хлороформная № 1 303
 — — № 2 303
 — — № 3 303
 — хлортетрациклиновая глазная 303
 — цинковая № 1 304
 — — № 2 304
 — — № 3 304
 — — № 4 304
 — цинково-серная 304
 — цинковая с меди сульфатом 304
 — динхофеновая сложная 304—305
 — цитралевая 305
 — щелочная 305
 — — глазная 305
 — эритромициновая 306
 — эстроновая 306
 — этакридиновая 306
 Макроциклин 307
 Малинина жидкость 307
 — порошок 307
 Малиновского суппозитории 307—308
 Маммофизин 308
 Маннитол 308
 Манус 309
 Марплан 309
 Масло беленное № 1 309
 — — № 2 309
 — камфорное для наружного употреб-
 ления 309—310
 — карболовое 310
 — льняное серное 310
 — ментоловое № 1 310
 — — № 2 310
 — — сложное 310
 — миндальное бензойное 311
 — облепиховое 311
 — тимоловое 311
 — цинковое 311
 Маслово-жидкость 312
 Мебедрол 312
 Медротестрона пропionate 312
 Мезалгин 313
 Мейсаховича паста 313
 Мексаза 313
 Мексамин 314
 Мексаформ 314
 Меллерил 314
 Мелливенон 315
 Мензилан 315
 Менталин 315
 Ментогом 315—316
 Ментолин 316
 Ментол-фенол 316
 Мелпазин 316
 Мелпанит 317
 Мепротан 317
 Меридил 317
 Мерказолил 318
 Меркамина аскорбинат 318
 Меркамина гидротартрат с пиридок-
 сином 318
 Меркамина гидрохлорид 319
 Маркаптопурии 319
 Меркузал 319
 Мессалин 320
 Местрол 320
 Месфенал 320
 Метамизил 320—321
 Метандростенолон 321
 Метиландростендиол 321—322
 Метилапогалантамин гидрохлорид
 322
 Метилтестостерон 322
 Метилэргометрин 323
 Метловит 323
 Метотрекат 323—324
 Метронидазол 324
 Мигренал 324
 Мигрозин 324
 Мидокалм 325
 Миелобромол 325
 Миелосан 325—326
 Мизидол 326
 Миколан 326
 Микосептин 327
 Микройод 327
 — с фенобарбиталом 327
 — № 1, см. Шерешевского пиллели
 327
 — № 2 328
 — № 3 328
 — № 4 328
 — № 5 328
 — № 6 328
 Микстура болгарская 328
 — бромидная № 1 329
 — — № 2 329
 — — № 3 329
 — — № 4 329
 — валериановая сложная 329
 — горькая 329
 — желчегонная 329—330
 — кислая 330
 — кровоостанавливающая № 1 330
 — — № 2 330
 — отхаркивающая № 1—12 330
 — — № 2 330
 — — № 3 330
 — — № 4 331
 — — № 5 331
 — — № 6 331
 — — № 7 331
 — — № 8 331
 — — № 9 331
 — — № 10 331
 — — № 11 331
 — — № 12 331
 — потогонная 331
 — противорвотная № 1 332
 — — № 2 332
 — салицилатная 332
 — слабительная 332
 — с пепсином сложная № 1 332—333
 — — № 2 333
 — — щелочная № 1—4 333
 — — № 2 333
 — — № 3 333
 — — № 4 333
 Миксулицил спирт 334
 — мазь 334
 Минтезол 334
 Миодил 335
 Миоксил 335
 Мион 335
 Миострофозан 336
 Миралпронт 336
 Миртиллин 336
 Мисклерон 337
 Мистол 337

- Митекс 337
 Митрошина жидкость 338
 Михайлова капли желудочные 338
 Можжевельного мазь 338
 Мозолин 338
 Моллизин 339
 Монкевича мазь 339
 Монтье палочки маzewые 339
 Моргалин 339
 Морфолеп 339—340
 Москаленко линимент 340
 Мотолон 340
 Мультисаликс 341
 Мыло дегтярное жидкое 341
 — сульсеновое 341
 — хлорное 341
 Мясникова порошки, см. Депрессин 138

 Навитон 342
 Назаль 342
 Налорфина гидрохлорид 342
 Нандролона деканоат 343
 Нандролона фенилпропионат 343
 Нанофин 343—344
 Настой алтея сложный № 1 344
 — — — № 2 344
 — — — № 3 344
 — валерианы сложный 344
 — горичвета сложный № 1 345
 — — — № 2 345
 — листьев грецкого ореха сложный 345
 — подорожника 345
 — рвотного корня сложный № 1 346
 — — — — № 2 346
 — ревеня сложный 346
 — сенны сложный № 1 346
 — — — № 2 347
 — эвкалипта 347
 Настойка аралин 347
 — арники 347
 — ароматная 347
 — барбариса 348
 — василистника воночюго 348
 — горькая 348
 — железа яблочно-кислого 349
 — женьшеня 349
 — зайцегуба 349
 — заманихи 349
 — зверобоя 350
 — золототысячника 350
 — клопогона даурского (цимицифуги) 350
 — лапчатки (калгана, завязника столячего) 350
 — лимонника китайского 350—351
 — марьялого корня 351
 — ноготков (календулы) 351
 — опия шафранная 351
 — перца стручкового 351
 — померанцевых корок 352
 — — плодов 352
 — — цветов 352
 — ревеня 352
 — — горькая 353
 — рвотного корня 353
 — розного ладаи 353
 — — — сложная 353
 — сабура 354
 — — сложная 354
 — — шафранная 354

 Настойка сенны сложная 354
 — сосновых шишек 355
 — софоры японской 355
 — стальника пашенного 355
 — стеркулии 355
 — хины 355
 — чемерицы 356
 — черники № 1 356
 — — № 2 356
 — чеснока 356
 — шлемника байкальского 356—357
 — эвкалипта 357
 — эвкомии (эйкомми) 357
 Натрия пукленнат 357
 — оксбугитрат 358
 — пара-аминосалицилат 358
 Натулан 359
 Наурастал 359
 Нафтальгин 359
 Нафтизин 360
 Невиграмон 360
 Невралгин 361
 Невротамин 361
 Нега 361
 Незол 361—362
 Нейтрацид 362
 Неоанузол 362
 Необензиол 362—363
 Неогинифорт 363
 Неодентиканн 363
 Неодикумарин 363
 Неокарболок 364
 Неопепульсан 364
 Неорегулин 364
 Неофедан 365
 Непотин 365
 Нервалин 365
 Неулептил 366
 Нпаламид 366
 Нибуфин 366
 Нигексин 367
 Никверин 367
 Никодин 367
 Николаева мазь № 1 367
 — — — № 2 368
 — — — № 3 368
 Никофер 368
 Никофлавин 368
 Никошпан 369
 Нитазол 369
 Нитразепам 369
 Нитранол 370
 Нитросорбид 370
 Нитротесал 370
 Нитрофунгин 371
 Нитрофурилек 371
 Нифонтова и Троицкого жидкость, см. НТ 374
 Новика жидкость зубная 371
 Новикова жидкость 372
 Новоканнамид 372
 Новопинол 372
 Новурит 373
 Новэмбитол 373
 5-НОК 373—374
 Ноксирон 374
 Норакин 374
 Но-шпа 375
 НТ 374—375

 Обливон 375
 Образцова микстура 376

- Окничица глобули 376
 Оксазем 376
 Оксазил 377
 Оксафенамид 377
 Оксикорт 377
 Оксипрогестерона капронат 378
 Окситоцин 378
 Оксифиллин 379
 Октадин 379
 Октэстрол 380
 Оливомидин 380
 Олиметин 380
 Олиторизид 381
 Омефни 381
 Оннхолзин 381—382
 Орензим 382
 Орферон 382
 Осан 382
 Осарбон 383
 Осарцид 383
 Основа мазева 383
 Осскальцинол 383—384
 Остакол 384
 Отвар барацца 384
 — дубовой коры квасцовый 384
 — истода сложный 384
 — кровохлебки 385
 Офтальмол 385
- Па**
 Пабиальгин 385
 Павестезин 385
 Павлова микстура 386
 — таблетки 386
 Падутин-Депо 386
 Паксил 386
 Палофин 387
 Панагин 387
 Пангексавит 387—388
 Паниверин 388
 Пантокрин 388
 Пантрилин 388—389
 Папаверингезал 389
 Папазол 389
 Паратиреоидин для инъекций 389—390
 Парацетамол 390
 Парфенова раствор 390
 Паста взбивная 390—391
 — антисептическая биологическая 391
 — беганафтоловая сложная №1 391
 — — — — №2 391
 — — — — №3 391
 — борно-цинковая 392
 — борная сложная 392
 — висмутовая 392
 — грамицидиновая 392—393
 — дегтярная сложная 393
 — димедроло-цинковая 393
 — известковая сложная №1 393
 — — — — №2 393
 — ихтиоловая № 1 394
 — — — — № 2 394
 — — — — № 3 394
 — — — — № 4 394
 — — сложная № 1 394
 — — — — № 2 394
 — — — — № 3 394
 — — — — № 4 394
 — казеиновая 395
 — каолиновая 395
 — магниезиальная 395
 — медовая 395—396
 — ментоловая сложная 396
- Паста мышьяковистая 396
 — натрия тиосульфата 396
 — нафталино-цинковая № 1 396
 — — — — № 2 397
 — резорцино-цинковая № 1 397
 — — — — № 2 397
 — салицилово-серная 397
 — салицилово-цинковая 397
 — свицовая сложная 398
 — серная сложная 398
 — серно-цинковая 398
 — содовая (натрия гидрокарбоната) № 1 398
 — — — — № 2 399
 — стрептоцидная сложная 399
 — сульсеновая 399
 — трикрезол-формалиновая 399
 — уксусная сложная № 1 399—400
 — — — — № 2 400
 — феноловая 400
 — хлорофилло-каротиновая 400
 — цинковая № 1 401
 — — — — № 2 401
 — — — — № 3 401
 — — — — № 4 401
 — — — — № 5 401
 — антисептическая 401
 — цинково-салициловая, см. Лас-сара паста 238
 Пастинацин 400—401
 Певзнера паста, см. Беллкви 56
 Пафиллин 402
 Пеллолин 402
 Пектол 402
 Пектусин 402
 Пеллодин 403
 Пентабисмол 403
 Пентальгин 403
 Пентаметон 404
 Пентамин 404
 Пентацин 405
 Пентовит 405
 Пентоксил 405
 Пен-экспеллер № 1 406
 — — — — № 2 406
 — — — — якорный 406—407
 Первитин 407
 Пергален 407
 Перноцин 408
 Перопаназ 408
 Перпарин 408—409
 Пертуссин № 1 409
 — — — — № 2 409
 — — — — № 3 409
 Петерса микстура 409—410
 Петрова — Белякова жидкость 410
 Петрова жидкость 410
 — таблетки 410
 Петролмент жидкий 411
 Пикнолепсин 411
 Пиксал 411
 Пиксол 411
 Пилюли азиатские № 1 412
 — — — — № 2 412
 — — — — № 3 412
 — бромидные 412
 — желчегонные 412
 — ихтиоловые 413
 — йодистые 413
 — колларголовые № 1 413
 — — — — № 2 413
 — кровоостанавливающие 413—414

- Пилюли марганцовые 414
 — ментоловые 414
 — мочегонные 414
 — опийные сложные № 1 415
 — — № 2 415
 — пепсиновые 415
 — подофиллиновые 415
 — ртутные 415
 — слабительные № 1 416
 — — № 2 416
 — — № 3 416
 — — № 4 416
 — — № 5 416
 — — № 6 416
 — с экстрактом красавки сложные 417
 — ферролецитиновые 417
 — хиининовые № 1 417
 — — № 2 417
 — — № 3 417
 — щелочные 418
 Пимевн 418
 Пинабин 418
 Пинат 418—419
 Пиоцид 419
 Пиперазин адипат 419—420
 Пирабутол 420
 Пиразинамид 420—421
 Пираменн 421
 Пираминал 421
 Пиранал 421
 Пирафен 421
 Пиридрол 422
 Пирилен 422
 Пиркофен 422
 Пиругенал 423
 Пирогова капли желудочные 423
 Пирогова примочка 423
 Пироксидан 423—424
 Пиррофос 424
 Питуйтрин для инъекций 424—425
 Питуйтрин М 425
 Плазмол 425
 Плаквенил 425
 Пантагина паста 426
 Плантал 426
 Плантозан, см. Бремерера паста 426
 Пластырь акрихиновый № 1, см. Лебедева пластырь 427
 — — № 2 427
 — бактерицидный 427
 — желтый, см. Пластырь лимонный 428
 — камфорный 427
 — касторовый 427—428
 — лимонный, см. Пластырь желтый 428
 — медовый 428
 — перцовый 428
 — салициловый сложный № 1 429
 — — № 2 429
 — — № 3 429
 — — № 4 429
 — свинцовый липкий 429
 — — сложный № 1 429
 — — № 2 430
 — универсальный, см. Пластырь свинцовый сложный № 1 429
 — эпителиновый 430
 Платонова жидкость № 1 430
 — — № 2 430
 Плисульфан 431
- Полибе 431
 Поливинил 431
 Полнвитамин 432
 Полоскание борное сложное 432
 — — квасцовое 432
 — — сложное 432
 — — салициловое 433
 — — тимоловое сложное 433
 — — феноловое 433
 Полосухина жидкость 433—434
 Попова микстура 434
 — жидкость 434
 Порошок антиастматический 435
 — антисептический биологический 435
 — висмутовый сложный 435—436
 — зубной красный 436
 — зубной щелочной 436
 — лимоннокислый 436
 — лимонный шипучий 436—437
 — слабительный № 1—12 437—438
 — таниновый сложный № 1 438
 — — — № 2 438
 Постовского паста 438—439
 Прегнантол 439
 Прегнин 439
 Преображенского мазь, см. Суно-рэф 501—502
 — порошки 440
 — спирт № 1 440
 — спирт № 2 440
 — спирт № 3 440
 Пресоцил 440
 Префизон 441
 Прилипко ванна 441
 Примочка глазная желтая № 1 441
 — — № 2 442
 — — квасцовая № 1 442
 — — № 2 442
 — — меди цитрата или сульфата № 1 442
 — — — — № 2 442
 — — серебра нитрата 442
 — — черная 442—443
 Присыпка алсоловая 443
 — бензойная 443
 — борная 443
 — — сложная № 1 443
 — — — № 2 443
 — — — № 3 444
 — — — № 4 444
 — — — № 5 444
 — — — № 6 444
 — — — № 7 444
 — висмутовая 444
 — дерматоловая 444
 — дерматоло-цинковая 445
 — ртутн монохлорида 445
 — салициловая сложная № 1 445
 — — — № 2 445
 — — — № 3 445
 — — — № 4 445
 — — — № 5 445
 — — — № 6 446
 — феноло-цинковая 446
 — цинковая № 1 446
 — — № 2 446
 — — № 3 446
 — — № 4 446
 — щелочная 446
 Проастмин 447
 Прогресс 447
 Прозоровского порошки 447

- Прокопчука жидкость 447
 Проктол 448
 Прокуран 448
 Проперистол 448
 Пропер-мил 448
 Протамин 449
 Протамин сульфат 449
 Противоядие при отравлении металлами и алкалоидами 449
 Протионамид 449—450
 Псориазин 450
 Пульмохин 450
 Пургал 450
 Пургосан 451

 Равкина микстура 451
 Радикал 451
 Радикал-мозолин 451
 Радобелин 451
 Рамнил 452
 Распайля жидкость 452
 Раствор альбумината железа 452
 — альбумино-плацентарный 453
 — амниака спирто-водный 453
 — анестезирующий для инъекций 453
 — арсенита калия, см. Фаулеров раствор 538
 — дезинфицирующий 453—454
 — вода спиртовой 1%, 2%, 3% 454
 — — обесцвеченный 454
 — калия перманганата 454
 — камфоры хлороформный 454—455
 — ментола спиртовой 455
 — натрия гидрокарбоната глицериновый 455
 — — хлорида изотонический 455
 — новокаина 0,25% для приема внутрь 455
 — серы масляный сложный 456
 — тройной, см. Раствор дезинфицирующий 453—454
 — щелочной 456
 Раудиазин 456
 Раунатин 456—457
 Рахманова паста 457
 Ревманол 457
 Резерпин 458
 Резурол 458
 Рекорд 458
 Ректозан 459
 Ремнолан 459
 Реозолон 459
 Ретол-Рутин 459
 Рибофлавин-моноклеотид 460
 Ривера пштые № 1 460
 — — № 2 460
 — — № 3 460
 Риднол 460
 Ридол 461
 Рингера раствор физиологический 461
 Рингера—Локка раствор физиологический 461
 — таблетки 461
 Ринопль 462
 Роватинекс 462
 Ровахол 462
 Ровенал 463
 Рогинской жидкость 463
 Родовича спирт 463
 Розенталя жидкость 463
 — паста № 1 464
 — — № 2 464

 Розентула порошки 464
 Ромазулан 464
 Рубашкина раствор, см. Йодхино-пирин 187
 Рубини-камфора 465
 Румалон 465
 Рутаскорбин 465
 Рутофиллин 465
 Рыбакова мазь 466

 Салинмент 466
 Сальвадор 466
 Санепил 466
 Санитас 466
 Санковой капли 467
 Сапросан 467
 Саррацина гидротартрат 467
 Сарколизин 468
 Сатитурани 468
 Сацерно 469
 Сбор аппетитный № 1 469
 — — № 2 469
 — — № 3 469
 — — № 4 469
 — ветрогонный № 1 469
 — — № 2 469
 — — № 3 470
 — — № 4 470
 — — № 5 470
 — витаминный № 1 470
 — — № 2 470
 — — № 3 470
 — — № 4 470
 — — № 5 470
 — — № 6 471
 — грудной № 1 471
 — — № 2 471
 — — № 3 471
 — — № 4 471
 — — № 5 471
 — — № 6 471
 — — № 7 472
 — желудочный № 1 472
 — — № 2 472
 — — № 3 472
 — — № 4 472
 — — № 5 472
 — — № 6 472
 — — № 7 473
 — желчегонный № 1 473
 — — № 2 473
 — — № 3 473
 — — № 4 473
 — мочегонный № 1 474
 — — № 2 474
 — — № 3 474
 — — № 4 474
 — — № 5 474
 — — № 6 474
 — — № 7 474
 — — № 8 475
 — — № 9 475
 — — № 10 475
 — — № 11 475
 — — № 12 475
 — потогонный № 1 475
 — — № 2 475
 — противоастматический № 1 475—476
 — — № 2 476
 — слабительный № 1 476
 — — № 2 476

Сбор слабительный № 3 476
 — — № 4 476
 — — № 5 476
 — — № 6 477
 — — № 7 477
 — успокаивающий № 1 477
 — — № 2 477
 — — № 3 477
 — — № 4 477
 Седальгин 478
 Седастмон 478
 Седобелин 478
 Седолор 478
 Секадол 479
 Селисского мазь 479
 — — засыхающая 479
 — — защитная № 1 479—480
 — — — № 2 480
 — — пенициллиновая 480
 Сельцовского жидкость № 1 480
 — — № 2 481
 Сентон 481
 Сеппа микстура 481
 Серейского порошки 481
 Сериатлиз 482
 Серотрансфузин ЦИПК 482
 Сигетин 482
 Симановского мазь 483
 Синалар-Н 483
 Синицына раствор 483
 Синкумар 484
 Сироп калия йодида 484
 — мятный 484
 — пиперазина адипината 484—485
 — противокашлевой 485
 Сиротинина пилюли 485
 Систонал 485
 Скабиол 485
 Склерофиллин 485
 Скобутил 485
 Скробанского жидкость, см. Лумпан 262
 Скутамил 486
 Словалгин 487
 Смесь аналептическая 487
 — литическая № 1 487
 — — № 2 487
 — — № 3 487
 Сок подорожника 488
 Соксидил 488
 Солкосерил 488
 Солутан 489
 Соль карловарская искусственная 489
 — морская искусственная № 1 489
 — — № 2 489
 — — слабительная 489—490
 Солюкамфора 490
 Солюсульфол 490
 Солюсурьмин 491
 Сомбревин 491
 Сомнил 491
 Спазмоантастман 492
 Спазмовералгин 492
 Спазмодинил 492
 Спазмолитин 493
 Спазмо-эвналгит 493
 Спиринолактон 493
 Спирт для сосков 494
 — для укрепления волос 494
 — камфорный 494
 — лавандный 494

Спирт ментоловый № 1 495
 — — № 2 495
 — огуречный 495
 — успокаивающий 495
 — хлороформный 495
 Спленин 495
 Стекловидное тело 496
 Стомол 496
 Стрелтаза 496—497
 Стрептойодол 497
 Стрептоксазол 497
 Стрижевского противоядие при отравлении металлами 497—498
 Строганова капли желудочные 498
 Стугерон 498
 Субехолин 498—499
 Сульфадиметоксин 499
 Сульфазин 499
 Сульфапиридазин 500
 Сульфасалазин 500
 Сульфозин 500—501
 Сульфолан 501
 Суммарит-10 501
 Сунорэф 501—502
 Суппозитории дерматоловые сложные 502
 — ихтиоловые 502
 — с экстрактом красавки 502
 Супрастин 503
 Сурмонтил 504
 Суспензия альбуцидо-дикаиновая 503—504
 — железа пирофосфата 504
 — йодоформа 504
 — йодоформно-йодная 504
 Сустан 505
 Сустанон-250 505
 Сядро порошки 504—505

 Табекс 506
 Таблетки азиатские 506
 — — желудочные № 1 506
 — — № 2 507
 — — № 3 507
 — — № 4 507
 Тавегил 507
 Таламонал 507
 Таллан 507—508
 Талусин 508
 Тальбин 508
 Тансал 508
 Тардил 509
 Таро 509
 Тауремизин 509
 Тебафен 510
 Тегретол 510
 Теймурова паста 510
 Текодин 510—511
 Теминал 511
 Теверин 511
 Теодибаверин 511
 Теодинал 512
 Теофедрин 512
 Тепалюсал 512
 Тепафиллин 513
 Терален 513
 Термопсис 513
 Терпилан 514
 Террасол 514
 Тесальбен 514
 Тесаминил 514
 Тестобромлецит 515

Тестостерона фенилпропионат 515
Тестостерона энантат 515
Тестэнат 516
Тетурам 516
Тефелидин 516
Тильмана капли 517
Тимолицид 517
Тиоацетазон 517
Тиодазин 518
Тиоспазмин 518
Тиреостропин 518
Тироде раствор 518
Тиротан 519
Токсапин 519
Толдео бальзам 519
Тонгевит 520
Тонофос 520
Торфот 521
Тосмилен 521
Тразикор 521
Трапезникова микстура 522
Трасилол 522
Траскова микстура 522
Третамин 523
Триамцинолон 523
Трийодтиронин 524
Трийотраст 524
Тримеканн 525
Триоксазин 525
Триоплан 525
Трипсимукс 526
Триптизол 526
Трисалин 526
Триселил 527
Трисульфат 527
Трифтазин 527
Тропарин 528
Тропарин комбинированный 528
Тропафен 529
Трунечка сыворотка 529
Трубочураина хлорид 529

Убретид 530
Уксус ароматный № 1 530
— — № 2 530
— — № 3 530
— — № 4 531
Унгветол 531
Ундепит 531
Уннос 531
Унитиол 532
Унна паста цинковая № 1 532
— — — № 2 532
— — — № 3 532
— — — № 4 532
— — — № 5 532
— мазь пирогаллоловая сложная 533
— — резорциновая сложная 533
— — свиццовая 533
— — помада № 1 533
— — № 2 534
— — № 3 534
— — № 4 534
— спирт 534
Урбазон 534
Уреапласт 534
Уробесалол 535
Уродан 535
Уродонал 535
Урокармин 536
Уросал 536
Уротраст 536

Фалитром 537
Фалихол 537
Фарингосепт 537
Фарктил 538
Фаулеров раствор 538
Фенальгин 539
Фенамин 539
Фенасал 540
Фенатрин 540
Фенверин 540
Фенокодин 541
Фентоламин 541
Фепранон 541
Ферковен 542
Феррокальк 542
Ферронат 542
Ферроцерон 542
Феррум Лек 543
Ферстера капли 543
Фетанол 543
Федорова жидкость 544
Федорова капли 544
Фибрекс 544
Фибриноген 545
Фибринолизин 545
ФиБС 545
Филатова жидкость № 3 546
— — № 43 546
Филлимонова мазь 546
Фитоферролактол 546
Фламин 547
Флатус 547
Флемникса жидкость 547
Флористен 548
Фогельсона капли 548
Фоллукотропин 548
Фомаг 548
Формидрон 549
Формоалестен 549
Формофорин 549
Фортевит 549
Фосфрен 550
Фосфэстрол 550
Фохта жидкость 551
Франковского спирт 551
Френолон 551
Фтазин 552
Фторокорт 552
Фторотан 552
Фторурацил 553
Фубромеган 553
Фурагин 554
Фурагин растворимый 554
Фурадонин 554
Фуразолин 555
Фуразонал 555
Фурапласт 555
Фурина микстура 556

Харахорина капли желудочные 556
Хасэлк жидкость № 1 556
— — № 2 556
Хемокальциум 557
Хинаскорбин 557
Хингамин 557
Хинопирин 558
Хлонского жидкость 558
Хлоракон 558
Хлорбутин 558
Хлорэтон для ингаляций 559
Хлорзоксазон 559
Хлорофиллипт 559

Хлорпропамид 560
Хлорпротиксен 561
Хлорурит 561
Ходаковского жидкость 561
Холагол 562
Холина хлорид 562
Холевид 563
Холезим 563
Холоплант 563
Хориогонин 564
Хофитол 564
Хризомаллин 564

Целанид 565
Цепорин 565
Церебролизин 566
Цетамифен 566
Циамид 566
Цибальгин 567
Циквалон 567
Цикламид 567
Циклобарбитал 568
Циклодол 568
Циклометназид 568
Циклофосфамид 569
Циклосерин 569
Циммермана капли № 1 570
— — № 2 570
— — № 3 570
Цинкундан 570
Цинхофен 571
Цистенал 571
Цитрамон 571
Цитрокарбон 572
Цитронал 572
Цинхоль 572

Чумаковой паста 573

Шарко микстура 573
Шслагурова порошки 573
Шерешевского пилюли, см. Микро-
люд 327
Шинкаревского жидкость 573
Шлейха жидкость 574
Шмидта микстура 574
Шмуккера примочка охлаждающая 574
Шнее жидкость 575
Шнырева паста (мазь) 575

Abcid 499
Abdocain 116
Abchol 5
Abetal 143
Abicin 5
Abilax 150
Abominum 5
Abrogen 205
Abroval 74
Abstensil 516
Abstinyl 516
Abulemin 541, 259
Acamol 9, 390
Acavyl 147
Acecolex 43
Acecolina 43
Acedigal 42
Acedoxin 42
Acelax 172

Эвкатол 575
Эдан 575
Эдельберга сбор слабительный 576
Эксангит 576
Экстракт горький густой 576
— нафталанской нефти, см. Розен-
таля жидкость 463
— печени 576
— тополевыи 577
Эликсир грудной 577
— желудочный 577
— хлороформный 578
Эмульсия касторового масла 578
— нафталанная, см. Линимент наф-
таланныи 252
Энднарон 578
Энтеросептол 578
Эпидермин 579
Эпиларктин 579
Эргам 579
Эргометрина малеат 580
Эроготамина тартрат 580
Эревит 581
Эрпит 581
Эрпозид 582
Эскодол 582
Эскузан 582
Эстрадиола Бензоат 583
— дипропнат 583
— пропнат 584
Эстрадурин 584
Эстрон 584
Этамид 585
Этаперазин 585
Этимидин 586
Этинилэстрадиол 586
Этионамид 586
Этоксид 587
Эудан 587
Эуналгит 587
Эуфиллин 588
Эуфлат 589
Эфедрол 589
Эфестмин 589
Эфир ментолово-хлороформный 589
Эфкамон 590
Эхинопсинна нитрат 590
Яссера мазь 590

Acenocoumarol 484
Acenocoumarin 484
Acephenum 43
Acenol 390
Acetalax 172
Acetaminophen 390
Acetazolamide 142
Acethrophan 226
Acetiodone 524
Acetophcholisatin 172
Acetophenolpicolin 87
Acetophen 390
Acetorphin 342
Acetoxylone 231
Acetrizozat-Natrium 524
Acetum aromaticum N. 1—4 530—531
Acetylcholini chloridum 43
Acetyldigitoxin 42
Acetyltocopherolum 581

Achibromit 74
 Aciclofin 44
 Acidamon 23
 Acidin-pepsinum 43
 Acidochinon 571
 Acidol-pepsin 44
 Acidotest 44
 Acidum adenosintriphosphoricum 212
 — dehydrocholicum 141
 — aminomethylbenzoicum 17
 — lipoicum 213
 — iopanicum 187
 — nalidixicum 360
 — phenylcinchonicum 571
 — thiocliticum 213
 Acinitrazol 369
 Aciotico 213
 Acipas 358
 Acipepsol 44
 Aciphen 577
 Acnosan 467
 Acofinum 11
 Acolen 141
 Acordin 24
 Acosthesinum 11
 ACTH 226
 Acthar 226
 Acticamphre 490
 Acton 226
 Actrope 226
 Actozine 18
 Acylanid 42
 Acylanil 42
 Adebit 7
 Adecortyl 523
 Adelphan 7
 Adenzima 212
 Adepbos 212
 Adepril 526
 Adiabil 567
 Adiabetin 143
 Adiazine 499
 Adimycin 7
 Adinsoral 143
 Adipalit 419
 Adipatum 8
 Adiphenin 493
 Adiposon 541, 259
 Adiptinum 8
 Adiprazina 419
 Adiver 419
 Adivermal 419
 Adocortyl 523
 Adol 8
 Adonis-brom 9
 Adophenum 9
 Adorin 9
 Adrenocorticotraphin 226
 Adrenosem 9
 Adreson 225
 Adroxyl 9
 Adroxonum 9
 Adumbran 376
 Aëronum 45
 Ascin 582
 Aescusan 582
 Atina 586
 Aethamidum 585
 Aethaphen 24
 Aethaperazinum 585
 Aethaverin 408
 Aether chloroformiatus cum Mentholo 589
 Aethimidinum 586
 Aethinyloestradiolum 586
 Aethinyltestosteron 439
 Aethisteron 439
 Aethocain 116
 Aethoksid 587
 Aethosuximid 411
 Aethoxazenum 536
 Aethoxydum 587
 Aethophyllinum 379
 Aethyladrianol 543
 Aethylhexabital 568
 Aethylis biscoumacetas 363
 Aethylpapaverin 408
 Äthylphenacemid 140
 Ätoxyd 587
 Aevitum 10
 Afungil 467
 Agacore 232
 Aglicem 78
 Aglicid 78
 Aglicolo 75
 Agliral 567
 Aglycid 78
 Agofollin 583
 Agofin (inj) 583
 Agofodile 182
 Agontan 146
 Agophen 571
 Ahyppon 57
 Aimalicin 183
 Ajmalinum 10
 Akineton 374
 Akinophyl 374
 Akliman 11
 Akrofolin 584
 Aktedrin 539
 Aktilin 317
 Aktivan 517
 Akuammigin 183
 Alaxa 87
 Alba 17
 Albisulfa 500
 Alboman 74
 Albox 142
 Albroman 74
 Albuminum placentae 17
 Alchloquin 578
 Alcophobin 516
 Aldactone 493
 Aldinamid 420
 Aldomet 15
 Aldometil 15
 Aldomin 15
 Alepsin 155
 Aleptin 12
 Alertol 422
 Alfacol 581
 Alfadryl 15
 Alficetyn 240
 Alfimid 374
 Alfuran 554
 Algena 12
 Algotropyl 390
 Alidril 171
 Alimemazine 513
 Alindor 420
 Aliodan 13
 Alipid 259, 541
 Alkatoid F 183

Alkeran 468
 Allacilum 13
 Allenfilina 588
 Allergan 152
 — A 24
 — S 503
 Allergastmin 13
 Allilcepum 14
 Allilglycerum 14
 Allilsatum 14
 Allobarbital 142
 Allobarbitone 142
 Allocain (e) 116
 Allocholum 14
 Allotropal 375
 Alloxazinmononucleotid 460
 Alluvial 74
 Allybarbitural 142
 Almagel 16
 Alnox 142
 Aloperidin 104
 Alotano 552
 Alotec 17
 Alphabroom 74
 Alserin 458
 Alsol 16
 Alsylax 87
 Altabactina 555
 Altafur 555
 Alupent 17
 Alural 74
 Aludrin 171
 Alurene 561
 Alvedon 390
 Amadil 390
 Amalmare 6
 Amazolum 17
 Ambathizonum 517
 Ambazone 537
 Ambenum 17
 Ambenoniumchloride 377
 Ambestiginumchloride 377
 Ambocain 116
 Amboclorin 558
 Ambosex 18
 Amebil 578
 Amedinum 18
 Amelizol 529
 Amepromat 317
 A-methopterin 323
 Amfepramonium 259, 541
 Amicil 18
 Amidazin 586
 Amidoprocain 371
 Amikon 18
 Aminationum 106
 Aminazinum 19
 Aminitrozole 369
 Aminocacrichinum 20
 Aminocain 116
 Aminocardol 588
 Aminochinolum 21
 Aminocor 225
 Aminocrovinum 20
 Aminofenofos 520
 Aminofyllin 588
 Aminometradin (e) 13
 Aminomal 588
 Aminometramide 13
 Aminopar 358
 Aminopeptidum 21
 Aminophan 571
 Aminophen 390
 Aminophyl 588
 Aminophylline 588
 Aminophyllin compositum 21
 Aminosaiyl(um) 358
 Aminotrate phosphate 370
 Aminox 358
 Amiphen 22
 Amisalin 372
 Amitacon 18
 Amitesalum 22
 Amithiozon 517
 Amitriptylinumhydrochlorid 526
 Amizol 19
 Amizylum 18
 Ammifurinum 22
 Ammophyllin 588
 Ammonii capillas 23
 — chloridum 23
 Ammuron effervescens 23
 Amnosed 568
 Amoenol 578
 Amotril 41
 Amosyt 6
 Amphedrin 559
 Amphedroxin 407
 Amphetamine 539
 Ampiliactil 19
 Amplictil 19
 Amuno 180
 Anabolin 321
 Anaboral 321
 Andaxin 317
 Anaesthesolum 28
 Anæsthoceain 116
 Analeptin «Fragner» 490
 Analeptin-Spofa 24
 Analergin-Spofa 24
 Analgin-Spofa 25
 Analgocaina 116
 Analphenum 25
 Anapyrin 25
 Anarcon 342
 Anatensol 258
 Anatruxonium 25
 Anausin 6
 Anautin 6
 Anbitalum 26
 Ancolan 141
 Ancophenum 29
 Andaxin 317
 Andecalin 27
 Andiamine 155
 Andipalum 27
 Andramine 6
 Androdiol 321
 Androgonyl 321
 Androhormon 322
 Andrometh 322
 Androphyllin 588
 Androral 322
 Androsan 28
 Androsten 322
 Androtardyl 515
 Androteston M 321
 — PP 515
 Anectine 154
 Anestecain 231
 Anesthesolum 116
 Anestil 116
 Anetinum 28
 Aneural 317

Angicap 581
 Anginon 537
 Angiotrophinum 26
 Angiovigor 225
 Angirol 26
 Angitol 581
 Angitrit 370
 Angormin 225
 Anhydrid 26
 Anicar 143
 Anorex 259, 541
 Anormon 321
 Anozol 29
 Ansiacal 243
 Antabus 516
 Ansil 317
 Ansiolin 81
 Ansiolisina 81
 Antabus 516
 Antan 360
 Antastan 24
 Antastan 24
 Antazolín (e) hydrochlorid 24
 Antelobine 564
 Anteron 29
 Antethyl 516
 Antasthmanum 29
 Antib 517
 Antibarbi 57
 Antibetis 75
 Anticatabolin 343
 Anticol 516
 Anticurasy 404
 Antideprin 174
 Antidotum metallorum et acaidoideum
 449
 Antidotum metallorum Strizevsky 497
 Antielmítico 419
 Antiemor K 88
 Antietil 516
 Antiforminum 32
 Antiberpin 30
 Antihistal 24
 Antihistamin-spofo 30
 Antihydrosin 30
 Antilusin 404
 Antilepsin 155
 Antineuralgin 31
 Antipar 149
 Antiparkazin 149
 Antiparkin 31
 Antiphlogistin 32
 Antiprotrombin 147
 Antipsoriaticum 31
 Antitroid 318
 Antisacer 155
 Antisol 161
 Antistin 24
 Antistruminum 31
 Antitens 143
 Antithermalin 32
 Antitrombosin 147
 Antitussinum 32
 Antivermin 419
 Antivomit 6
 Antorphin 342
 Antoxol 146
 Antreyl
 Anusolum 33
 Anxine 335
 Anolept 366
 Antoxol 335
 Anxine 335
 Apacil 317, 358
 Apamide 390
 Apamine 407
 APAP 390
 Aparacet 390
 Aparkan 568
 Apas 358
 Apaurin 81
 Apesan 486
 Apicodinum 33
 Apilacum 33
 Apisarthron 33
 Apon 34
 Apoplectal 34
 Apoplon 458
 Apothyrin 146
 Apricor 232
 Apridol 375
 Apsedon 34
 Apsical 458
 Aqua Aluminis cum Hydrargyri di-
 chlorido 100
 — Calcis 98
 — Chloroformii 101
 — cosmetica N. 1 98
 — — N. 2 98
 — — N. 3 98
 — — N. 4 98
 — — alba 99
 — Foeniculi 101
 — haemostatica N. 1 99
 — — N. 2 99
 Aqualon 340
 Aqua marina factitia N. 1 99
 — — N. 2 100
 Aqua-Mephiton 195
 Aqua ophthalmica Bujalsky 78
 — Picis 97
 — Plumbi 100
 — Plumbi borata 100
 — — Goulardi 131
 — Rosae 100
 — Veratri 101
 Aquil 561
 Aquocamphol 490
 Ara 34
 Araf 360
 Arago 35
 Aralen 557
 Arcadin 18
 Arcavit B₂ 460
 Arcodexan 135
 Arcort 133
 Arcosal 78
 Arecan 116
 Arechin 557
 Arfenin 38
 Arfonad 38
 Argasolum 35
 Aristin 499
 Aristocain 116
 Aristocort 523
 Aristophyllin 153
 Aristoserina 569
 Aritmin 10
 Arizonal 499
 Armin 36
 Arnica-glycerinum 37
 Arnosulfan 499
 Aromarone 241
 Arpenalum 37

Arso-tonin 37
 Arso-tonin cum Ferro reducto 38
 Artamin 571
 Artane 568
 Arteri-choline 43
 Arteriodone 205
 Arteryl 581
 Arthrizon 77
 Artrizin 77
 Artolon 317
 Artonil 243
 Artosin 78
 Artroplegina 335
 Artro 38
 Artropan 77
 Arusal 486
 Atrymal 10
 Asauracil 10
 Ascophenum 39
 Ascophylline 379
 Ascorutinim 39
 Ascuron 154
 Asitin 172
 Asmadren 171
 Asnittinum 39
 Asphenum 41
 Aspersio Acidi benzoici 443
 — — borici 443
 — — — composita N. 1—7 443, 444
 — — salicylici composita N. 1—6 445
 — — alcalina 446
 — — Alsoli 443
 — — Bismuthi subnitratris 444
 — — Dermatoli 444
 — — — zincata 445
 — — Hydrargyri monochloridi 445
 — — Phenoli zincata 446
 — — Zinci N. 1—4 446
 — — Zhitnuki 167
 Astedin 539
 Asthma-spray 40
 Asthmatol—Spofa 40
 Asthminum 40
 Astmo 177
 Astracaine 231
 Astrophyllin 153
 Atasol 390
 Atemorin 375
 Atempol 375
 Aten 540
 Atensin 335
 Atepodin 212
 Ateriosan 41
 Ateroid 41
 ATF 212
 Atipi 212
 Atonyl 203
 Atonalyt 486
 Atophanum 571
 Atosil 152
 Atossicaina 116
 Atoxicocain 116
 ATP 212
 Atrifos 212
 Atriphos 212
 Atrivyl 324
 Atromid 41
 Atromidin 41
 Atropan 77
 Attivina 184
 Auranile 155
 Aurelin 41
 Austrovit E 581
 Austrovit K 88
 Auxobil 377
 Avapena 503
 Avicol 134
 Aviomarin 6
 Avisanum 6
 Avlosulfon 143
 Avosyl 335
 Azamethoniumbromid 404
 Azameton 404
 Axeen 184
 Axeromaltum 11
 Azetidin 379
 Azobutil 77
 Aziodina 182
 Azopyrina 500
 Azulfidine 500
 Bactol 578
 Bactrim 45
 Bagocain 116
 BAL 146
 Balance 243
 Balistab 146
 Balneum Baretgines 51
 — Prilipco 441
 — — sinapisatum 82
 — — terebinthinatum 83
 Balsamum ad perniones N. 1 47
 — — — N. 2 47
 — Baum-Benge 70
 — bengalicum 45
 — Camhorae saponatum 47
 — cosmeticum glycerinatum 46
 — Jodi saponatum 46
 — lanolinatum 47
 — Lanolini compositum 47
 — — mammale N. 1 46
 — — N. 2 46
 — olei Terebinthinae 48
 — sarepte 48
 — Sulfuris terebinthinatum 48
 — Toledo 519
 Baltix 45
 Balusil 63
 Bamethani sulfas 48
 Bamethansulfat 48
 Bancain 116
 Bantinyl-duplex 364
 Bantron 261
 Baralgin 49
 Baratol 193
 Barballyl 142
 Barbamid 49
 Barbibrom 74
 Barbidal 142
 Barbidorm 110
 Barbimetten 50
 Barbitalum-natrium 50
 Barbitesal 50
 Barbonin 408
 Barvincani hydrochloridum 50
 Basis unguenti 383
 Basofortina 323
 Basolan 318
 Basoprocin 524
 BAT 52
 Batilolum 52
 Batylalkohol 52
 Batylol 52
 B-complex 67

Beamat 53
 Beatilina 18
 Bebe 53
 Becaptan 319
 Becarbonum 53
 Becevina 62
 Beclamide 558
 Becloram 54
 Befunginum 62
 Beglucin 78
 Bellahormon 583
 Bellalginum 54
 Bellaphenum 55
 Bellaspon 55
 Bellasthesinum 54
 Bellataminalum 53
 Bellazonum 54
 Bellin 55
 Bellkvi 56
 Belloid 56
 Bellusecal 56
 Bemaphate 557
 Bemegridum 57
 Bemycin 57
 Benactina 18
 Benactizan 18
 Benactizin 18
 Benactone 18
 Benactylinhydrochlorid 13
 Ben-a-Hist 24
 Benarcos 58
 Bencainum 59
 Bencyclanum 104
 Bendazol 334
 Bendor 340
 Benil 360
 Benetrank 18
 Benim 143
 Benizol 143
 Benovocylin 583
 Bensulfa 499
 Bent 243
 Bentavit K 88
 Benthiozon 517
 Bentonyl 370
 Benuride 140
 Benzazolinhydrochlorid 143
 Benzchlorpropamide 558
 Benzcurine iodide 459
 Benzedrin 539
 Benzestrin 583
 Benzestrol 380
 Benzhexolhydrochlorid 568
 Benzidazol 143
 Benzimidon 143
 Benzkurin 459
 Benzodepa 58
 Benzodiapin 243
 Benzodiazepin 243
 Benzoestrol 583
 Benzöstrol 380
 Benzoflex 559
 Benzofoline 583
 Benzolin 144
 Benzonalum 58
 Benzonatate 576
 Benzononatine 576
 Benzosulfa 500
 Benzotephum 58
 Benzothiozon 517
 Benzperidinhydrochlorid 30
 Benzpropamin 539
 Benzylamide 558
 Bepasalum 59
 Bephoral 61
 Berberini sulfas 59
 Berlicetine 240
 Bermol 60
 Berolase 215
 Beroxanum 60
 Bcsalolum 60
 Besonia 534
 Betacid 44
 Betacin 61
 Betasin 61
 Betalactin 61
 Betazine 61
 Bethiol 61
 Etoral 143
 Etosan 571
 Beveno 567
 Biperiden 374
 Bicarminum 64
 Bifacton 66
 Bigumalum 63
 Biliochinolum 63
 Biiodytyrosin 146
 Bilagit 64
 Bilalpin 141
 Bilamid 367
 Biledrol 141
 Bilene 377
 Biletan 213
 Bilichol 64
 Biliiodon 187
 Bilineurine 562
 Biliopaco 187
 Bilipac 187
 Biliron 141
 Bilizorin 367
 Bilocid 367
 Bilopac 187
 Bilostat 141
 Bilumbral 187
 Bimanol 65
 Bimolin 65
 Binomil 243
 Binoxin 499
 Biobamat 317
 Biocaine 116
 Biocholine 562
 Biocor 225
 Bio-coril 372
 Biofurin 555
 Biogan 360
 Bioglumin 560
 Biogrisin FP 130
 Biomiran 559
 Bionine 510
 Bio-östron 583
 Biophenicol 240
 Biophylline 588
 Bioprednon 534
 Bioserpine 458
 Biosyth 215
 Bioxilast 215
 Bioxine 65
 Biperiden 374
 Bipressin 66
 Bisacodyl 87
 Bisalum 67
 Bisatin 172
 Bishydroxycoumarin 147
 Bismiochinina 63

Bismos 63
 Bispan 67
 Bitonal 65
 Bitri 370
 Bivitasi 215
 B-Complex 67
 BK-8 67
 B-Neuran 215
 BL 68
 B-Neurox 215
 Bonadettes 141
 Bonamine 141
 Bonare 376
 Bontavit K 88
 Bontourist 6
 Boroglycerinum 71
 Boromentholum 71
 Borothymolum 71
 Botiran 517
 Bovizol 334
 Bradisulfa 500
 Brassicon 72
 Brevidil M 154
 Brinaldix 73
 Brianil 486
 Brocatine 172
 Bromadryl 73
 Bromcamphora 74
 Bromherbal 74
 Bromisovalum 74
 Bromisan 74
 Bromital 74
 Bromivalum 74
 Bromodorm 74
 Bromoval 74
 Bromovalcarbamid 74
 Bromoxil 74
 Bromural 74
 Bromuran 74
 Bromurea 74
 Bromuresan 74
 Bromuvan 74
 Bromvaleryl 74
 Bromvalerylurea 74
 Bromyl 74
 Bronchoselectan 524
 Broval 74
 Brovalurea 74
 Bronchodilatin 171
 Bronchomister 171
 Bronchoselectan 524
 Bromadryl 73
 Bromital 75
 Brufen 75
 Bucarban 75, 560
 Buformin 7
 Bulamin 486
 Bupatol 48
 Buscapina 486
 Buscopan 486
 Busulfan 325
 Busulphan 325
 Butadionum 77
 Butalidon 77
 Butamidum 78
 Butapirazol 77
 Butapyrin 420
 Butartril 77
 Butartrina 77
 Butazina 77
 Butazolidin 77
 Butedrin 48
 Butyl-norsympatol 48
 Butyl-norsynephrin 48
 Butylpyrin 77
 Butylscopolamini bromidum 486
 Butylspasmin 486
 Buzon 77
 Bydolax 172
 Caferid 208
 Cafron 18
 Caglusal 188
 Calabron 188
 Calcevit 191
 Calcex 191
 Calcli adenosintri-phosphas 212
 — glutamas 191
 — pantothenas 192
 — trinitrii pentetas 405
 — Trisodium Pentetate 405
 Calcium-Cardiamidum 191
 Calmine 50
 Calmadin 317
 Calmazina 585
 Calmonal 141
 Calovat 190
 Calsothios 190
 Cametonum 192
 Camphedrin 192
 Camphiodum 193
 Camphidonium 193
 Camphocinum 194
 Camphodalum 193
 Camphodausse 490
 Camphinjectol 490
 Camphontum 193
 Camphophenolum 194
 Camphopyrin 194
 Camphoral 490
 Camphora monobromata 74
 Camphosol 490
 Camphostyl 490
 Camphrolyse 490
 Camphryl 490
 Canavit 195
 Candiocaina 117
 Canfol 490
 Canforidrina 490
 Caprodat 486
 Capron 378
 Capsinum 200
 Capsitrimum 201
 Captol 201
 Captosulfol 201
 Carachol 141
 Caradrin 508
 Carbachol 203
 Carbacholinum 203
 Carbagem 203
 Carbamazepine 510
 Carbantox 203
 Carbazochrome 9
 Carbochromen 187
 Carbochromenum 187
 Carbolenum 204
 Carbutamid 75
 Cardanon 510
 Cardenosinum 204
 Cardigin 145
 Cardiocanfene 490
 Cardiodinamin 24
 Cardiodynamin 24
 Cardiofillina 588
 Cardioflux 232

Cardiografin 84
 Cardiomin 588
 Cardiorythmin 372
 Cardiotrastum 205
 Cardiovalenum 204
 Carditalin 145
 Carditin 225
 Carditoxin 145
 Carena 588
 Carisoma 486
 Carisoprodatum 486
 Carisoprodol 486
 Carisoprol 486
 Carminum coeruleum 179
 Carmurit 576
 Carnol. 206
 Carsodol 486
 Cartagin 10
 Carvasin 370
 Casantin 149
 Catanil 560
 Catapresan 207
 Catapyrin 13
 Cavonyl 567
 Cebrodin 65
 Cebrium 243
 Cedad 18
 Cedilanid 565
 Cedisanol 565
 Cedistabil 565
 Cedoxin 145
 Ceeten 448
 Cefasan 360
 Cefaloridinum 565
 Cefborin 565
 Ceglunat 565
 Celadigal 505
 Celanidum 565
 Celocurin(e) 154
 Cemhistine 122
 Cemiod 146
 Cenapin 390
 Centedrin 317
 Centrophoxine 43
 Cephalin 265
 Ceporan 565
 Ceporin 565
 Cephaloridine 565
 Cerebrolysin 566
 Cercine 81
 Cergon 65
 Cerocain 116
 Cestocid 540
 Cetain 116
 Cetamiphenum 566
 Cetylureum 365
 Cevanol 18
 Chedutan 211
 Chemestrogen 380
 Chemidin 431
 Chemiofuran 554
 Chemiosalfa 499
 Chemocain 117
 Chemocalcium 557
 Chepirol 211
 Chetazol 211
 Chetil 211
 Chetopir 211
 Chiclida 141
 Chinascorbin 557
 Chingaminum 557
 Chinoform 578
 Chinophenum 571
 Chinopyrinum 558
 Chlomin 240
 Chloraconum 558
 Chlorambucil 558
 Chloraminophene 558
 Chloramphenicolum 240
 Chloranautine 6
 Chlorbutinum 558
 Chlorcyclina 240
 Chlororderazin 19
 Chlordiazepoxidum 243
 Chlorethylaminouracil 158
 Chloretonium pro inhalatione 559
 Chlorguanid 63
 Chloriguane 63
 Chloroguanide hydrochloride 63
 Chlorneoantergan 503
 Chloronitromycin 240
 Chlorquinaldol 467
 Chlorobutanolum pro inhalationibus 559
 Chlorocaine 116
 Chlorochin 557
 Chlorocid 240
 Chloromycetina 240
 Chloromycine 240
 Chloromycetina 240
 Chloroguanide hydrochloride 63
 Chlorofillipt 559
 Chlorophenisate 41
 Chloropromazinhydrochlorid 19
 Chloropyramin 503
 Chlorpiprazin 585
 Chloropyribenzamin 503
 Chlorosal 561
 Chlorothiazid 561
 Chloroxine 578
 Chlorphterminumhydrochlorid 134
 Chlorpiprazin 585
 Chlorpromanyl 19
 Chlorpromazinhydrochlorid 19
 Chlorpropamidum 560
 Chlorophylliptum 559
 Chlorothiazid 561
 Chlorphazolin 207
 Chlorprothixen 561
 Chlorprothixenhydrochlorid 561
 Chlorpyraminum 503
 Chlorquinaldol 467
 Chlorquinol 578
 Chloroxine 578
 Chlortripeleppaminehydrochlorid 503
 Chlorurit 561
 Chlosudimeprimylum 73
 Chlorzoxasone 559
 Chlothixen 561
 Choladine 187
 Cholagolum 562
 Cholagon 141
 Cholamid 367
 Cholamin 141
 Chole conservata medicata 162
 Chole-Contrast 187
 Cholepatin 141
 Cholenzimum 563
 Cholevid 563
 Choligen 367
 Choline chloride 562
 Cholini chloridum 562
 Cholinercol 203
 Chologen 141

Chologonum 141
 Cholopant 563
 Chophitol 564
 Choriogonin 564
 Chorionic gonadotrophin 564
 Chromonarhydrochlorid 182
 Chryzomallinum 564
 Cibalgin 567
 Cibathen 226
 Cicholm 572
 Ciclobarbitol 568
 Ciclocarine 569
 Cictoral 567
 Ciclovalidin 569
 Cimedone 490
 Cinchophenum 571
 Cinnarizine 498
 Cinniprine 498
 Ciracen 172
 Cistobil 187
 Cistocolin 141
 Cistofuran 554
 Cistotel 187
 Citarin 116
 Citexal 340
 Citocholine 43
 Citosulfan 325
 Citramonum 571
 Citrocarbon 572
 Citronal 572
 Clasol 360
 Clavitol 439
 Cleolum 213
 Clinocaine 116
 Cloquinol 578
 Clodedanohydrochlorid 5
 Clufenoxine 43
 Clotibrate 41
 Clonidin 207
 Clont 324
 Clopamidum 73
 Clopoxidi chloridum 243
 Clorazide 561
 Clordelazin 19
 Clordiabet 560
 Clorgin 561
 Cloristin 122
 Cloropromazina 19
 Clorpyramine 503
 Cloruril 561
 Closin (e) 569
 Clysodrast 87
 Cnidomonum 214
 Cobilasi 215
 Cocainum-novum 116
 Cocarbil 215
 Cocarbina 215
 Cocarbossilasim 215
 Cocarbošyl 215
 Co-carbox 215
 Cocarboxylase 215
 Cocarboxylasum 215
 Cocodiazine 499
 Codiazine 499
 Coenzyme B 215
 Cofacodal 510
 Cofalginum 227
 Cofergot 228
 Coffeidon 227
 Coffen-forte 228
 Coffen-mite 228
 Coffetaminum 228
 Cofothosal 229
 Colcemid 218
 Colchaminum 218
 Coldan 360
 Coldcream 217
 Coldcream A 217
 — B 217
 — lanolinatum 218
 — salicylatum 218
 — vaselinatum N. 1 217
 — — N. 2 217
 Colegraf 187
 Colepax 187
 Colicid 578
 Colisan 562
 Colloidium 215
 — elasticum 216
 — glycerinatum 216
 — haemostaticum 216
 — Hydrargyri dichloridi N. 1 216
 — — — N. 2 216
 Collyrium adstringens aluminatum
 N. 1, 2 442
 — — Argenti nitratis 442
 — — Cupri citratis seu sultatis
 N. 1—2 442
 — — luteum N. 1, 2 441, 442
 — — — Areti 35
 — — — Violi 91
 — — nigrum 442
 Coloton 367
 Coloxyl 150
 Colutoid 439
 Combiphenan 219
 Complamin 219
 Compound 48-268 154
 Condolphinum 219
 Contalax 87
 Contax 172
 Conteben 517
 Contibiol 517
 Contol 243
 Contomin 19
 Contopheron 581
 Contraceptin «T» 221
 Contrahelmin 220
 Contraspanum 220
 Contraste Urologico 536
 Contraxine 524
 Contrical 522
 Convulsan 468
 Coopane 419
 Copharten 542
 Copirene 211
 Copyreal 222
 Coragoxine 145
 Coralgil 156
 Coralgina 156
 Coraphene 24
 Coratone 490
 Corazol 24
 Corbella 223
 Corchorosid A 227
 Corchorosidum 227
 Cordalen 145
 Cordalin 379
 Cordiamid-coffeinum 224
 Cordigitum 224
 Cordioxil 245
 Coresidum 224
 Corhormon 223
 Coribon 232

Corimon 155
 Corkonium 498
 Cornerinum 225
 Cornocentini 580
 Coronai 153
 Coronarin 153
 Corontin 225
 Corphyllamin 588
 Corophyllin 588
 Corophyllin-N 379
 Coropropil 225
 Corosan 232
 Coroxin 232
 Corpax 225
 Corphyllaminum 588
 Corpus vitreum 496
 Corsympal 24
 Cortadren 225
 Cortarmour 133
 Cortate 133
 Cortelan 225
 Cortenil 133
 Cortesan 133
 Corticotrophinum 226
 Corticotropinum pro injectionibus 226
 Cortidrona 135
 Cortigen 226
 Cortifen 225
 Cortilet 136
 Cortinaq 133
 Cortinum 226
 Cortiron 133
 Cortisat(e) 225
 Cortisoni acetat 225
 Cortistab 225
 Cortisyl 225
 Cortodrin 225
 Cortogen 225
 Cortol 226
 Cortrophin 226
 Corvalolum 223
 Corvantin 225
 Corvasympton 24
 Corvitin 407
 Corymbin 183
 Corynine 183
 Corynine 183
 Corynitrat 581
 Cotopherol 581
 Cremodiazine 499
 Cresodiol 335
 Crestabolic 321
 Cristalanat C 565
 Cristalloylar 584
 Cristapurat 145
 Croomsan 230
 Cronazol 500
 Croysulfone 143
 Crysanol 230
 Crystodigin 145
 Crystoserpine 458
 Cuma 147
 Cumarin 147
 Cuprol 232
 Curacholan 154
 Curacholin 154
 Curacit 154
 Curadetensin 524
 Curalax 172
 Curalest 154
 Curalgesina 527
 Curalysin 478
 Curam 448
 Curantyl 232
 Curaril 335
 Curarin «Asta» 529
 Curarythan 335
 Curbin 233
 Curox 419
 Curral 142
 Cutizonum 233
 Cutopur 233
 Cyamidum 507
 Cybalgin 567
 Cyclamid 567
 Cyclamidum 567
 Cyclobarbital 568
 Cyclobarbitalum 568
 Cyclobarbitone 568
 Cyclochin 105
 Cyclocol 144
 Cyclodolum 568
 Cyclodorm 568
 Cyclohexal 568
 Cyclomethiazidum 568
 Cyclomycin 569
 Cyclonamine 156
 Cyclopan 111
 Cyclophosphamid 569
 Cyclophosphan 569
 Cyclorin 569
 Cyclosedal 568
 Cycloserin 569
 Cyclovalon 567
 Cycvalonum 567
 Cydorm 568
 Cynomel 524
 Cysteamine 319
 Cystenal 571
 Cystidium 536
 Cystoceva 179
 Cystural B 536
 Cytobin 524
 Cytoflav 460
 Cytomel 524
 Cytonal 550
 Cytophosphan 569
 Cytosteon 369
 Cytotax 569
 Dabromat 317
 Daedalon 6
 Dagrabromyl 74
 Dagravit E 581
 Dalgol 375
 Danabol 321
 Danantizol 318
 Danical 135
 Dantoin(e) 155
 Dapson 143
 Darbid 173
 Daropervamin 407
 Daserd 335
 Dat-Wander 174
 Daucarinum 133
 Davitamon E 581
 Davosin 500
 Deaner 65
 Debeone 143
 Debenal 499
 Debinyl 143
 Decabis 135
 Decacort 135
 Decacuran 448

Decadil 243
 Decadran 135
 Decadron 135
 Deca-Durabol 343
 Deca-Durabolin 343
 Decamethonium 448
 Decameton 448
 Decamevit N. 1—2 134
 Decaminum 135
 Decentan 585
 Dectan 135
 Dechocid 141
 Decholinum 141
 Decoctum corticis Quercus alumi-
 natum 384
 — herbae Selaginis 384
 — radices Belladonnae 328
 — radices Polygalae compositum 384
 — Sanguisorbae 385
 Decol 141
 Decontrax 448
 Decorteron 133
 Decortrate 133
 Decosteron 133
 Dectan 135
 Dedalon 135
 Defillin 150
 Degranol 133
 Dehydratin 142
 Dehydrobenzperidol 158
 Dehydrochol 141
 Dehydromethyltestosteron 321
 Deldrobenzperidolo 158
 Dekacort 135
 Dekadin 135
 Deka-Durabolin 343
 Dekorton 133
 Delacurarine 529
 Delagil 557
 Delalutin 378
 Delatestryl 515
 Delfacort 523
 Deltafluoren 135
 Dellpin 136
 Delmeron 136
 Delmeson 136
 Delmofulvina 130
 Delmoneurina 366
 Delphicort 523
 Delsolone 523
 Deltazina 499
 Deltin 499
 Demalgon 137
 Demecariumbromid 521
 Demecastigmini bromidum 521
 Demecolcin 218
 Denta 137
 Dentosan 116
 Deparkin 149
 Dephebrin 140
 Depilatorium 138
 Depletina 561
 Depocid 431
 Deposul 499
 Deposulfal 500
 Depot-Östomon 149
 Deprenil 174
 Depressinum 138
 Deprimin 174
 Deprinot 174
 Depurgan 138
 Dequadin 135
 Dequaliniumchlorid 135
 Dequalonum 135
 Dequaspon 135
 Derla 138
 Dermax 108
 Dermazulen 139
 Dermofil 139
 Dermosolon 139
 Desacort 135
 Desamine 407
 Desephrine 407
 Desmol 140
 Desopimon 134
 Desoxin 407
 Desoxyphenobarbitone 110
 Desoxycorticosteroni acetat 133
 Destim 407
 Desurol 134
 Detaril 422
 Detreomycina 240
 Detrex 407
 Deturid 140
 Devincan 89
 Dexadrol 135
 Dexamethazon 135
 Dexapot 135
 Dexason 135
 Dexstim 407
 Dextromycetin 240
 Diabaryl 560
 Diabamide 560
 Diabein 143
 Diabenide 143
 Diaben 78
 Diabenal 560
 Diabet 560
 Diabetabs 560
 Diabetasi 560
 Diabet-Pages 560
 Diabexan 560
 Diabetal 75
 Diabetol 78
 Diabeton 75
 Diabex 143
 Diabinese 560
 Diabil 567
 Diaboral 75, 567
 Diab-Oral Hoffman 143
 Diabutan 75
 Diabuton 78
 Diacarbum 142
 Diacepan 81
 Diacetylcholin 154
 Diadol 142
 Diadril 141
 Diaethiphenum 156
 Diaethylpropionum 259
 Diafanal 142
 Diagen 142
 Diaginol 524
 Dial 142
 Diallymal 142
 Diallynal 142
 Diamarin 6
 Diamazol 536
 Diamox 142
 Dianabol 321
 Diandrin 321
 Dianol 65
 Diapheinum 142
 Diaphenyl 536
 Diaphenylsulfonum 143

Diaphyllin 588
 Diarrotorm 578
 Diasan 517
 Diasatin 172
 Diazil 18
 Diasolin 141
 Diasulfozyl 499
 Diasulin 78
 Diatrast 205
 Diatrizoate 84
 Diatron 560
 Diazepam 81
 Diazolinum 141
 Diazolone 499
 Diazyl 499
 Dibasin 541
 Dibein 143
 Dibophen 143
 Dibotin 143
 Dibroluur 74
 Dicaphenum 146
 Dicapto 146
 Dichlothiazidum 155
 Dichlotride 155
 Dicolan 141
 Dicolinum 146
 Dicoumarin 147
 Dicoumal 147
 Dicumacyl 363
 Dicuman 147
 Dicumarinum 146
 Dicumarol 146
 Dicumaryl 363
 Dicumol 146
 Dicynene 156
 Dcynone 156
 Didrocolo 141
 Dienpax 81
 Diepropon 259
 Diergotan 144
 Dietelmin 419
 Diethazine 149
 Diforene 65
 Difollisterol 583
 Difostilben 550
 Digacin 145
 Digazolan 145
 Digazon 145
 Digicetyl 42
 Digicoryl 145
 Digteristin 145
 Digilanid C 565
 Digilong 145
 Digipan 145
 Digisidin 145
 Digisol 145
 Digistrat 145
 Digital 145
 Digitessal 145
 Digtin 145
 Digtisol 145
 Digtixinol 145
 Digtixinum 145
 Digtirin 145
 Digolan 145
 Digosin 145
 Digossina 145
 Digostip 145
 Digotin 145
 Digoxin 145
 Diguabet 143
 Diguanyl 63
 Di-Hydan 155
 Dihydantoin 155
 Dihydergot 144
 Dihydran 155
 Dihydrochlorothiazide 155
 Dihydroergotaminmesilat 144
 Dihydrofollikulinbenzoat 583
 Diidergot 144
 Diodithyrosinum 146
 Dijodos 182
 Dilabil 141
 Dilacorán 174
 Diladon 144
 Dilancor 155
 Dilanisidum 148
 Dilantin 155
 Dilazolin 144
 Dilcor 232
 Dilcoran 174
 Diliminal 148
 Diliminal D 148
 Diluran 142
 Dimapp 152
 Dimecarbinum 148
 Dimekarbin 148
 Dimecolinum 149
 Dimecolonii iodidum 149
 Dimelin 149
 Dimenhydrinat 6
 Dimenformon Dipropionate 583
 Dimercaprol 146
 Dimercaptol 146
 Dimersol 146
 Dimetazyl 499
 Dimethyl-Oestrofen 149
 Dimitronal 498
 Dimoestrolum 149
 Dinarkon 510
 Dinezinum 149
 Dinil 150
 Dinolan 65
 Dioctylal 150
 Diodon 205
 Diodrast 205
 Diogyn-E 586
 Diolendorone 321
 Diolene 486
 Diolostene 321
 Dioloxol 335
 Diolyn 586
 Diosponinum 150
 Diotilan 150
 Di-Ovocyclin 583
 Diozol 77
 Dipanol 146
 Diparcol 149
 Dipasalinum 151
 Dipasphenum 151
 Diphacil 493
 Dipharsan 363
 Diphedan 155
 Diphenason 143
 Diphenazin 209
 Diphenbuzol 77
 Diphenylbutazon 77
 Diphennum 155
 Diphone 143
 Diphosphothilamine 215
 Diphostilben 550
 Diphyllum 225
 Dipinum 151
 Diplacinal dichloridum 152

Diplazin 152
 Dipramid 173
 Diprazinum 152
 Diprofen 153
 Diprofen hydrochlorid 153
 Diprophenum 153
 Diprophyllinum 153
 Diprostron 583
 Diprovex 583
 Dipyridamol 232
 Diquinol 408
 Dirastan 78
 Disarim 243
 Disipal 312
 Disoxyl 174
 Distigminbromid 530
 Distranorm 321
 Disulfiram 516
 Disulfurmin 154
 Disulone 143
 Dithioglycerin 146
 Dithylinum 154
 Ditin 172
 Ditrininum 154
 Dityrin 146
 Diucardin 588
 Diutazol 142
 Diumerin 373
 Diuractin 561
 Diuramid 142
 Diuresal 561
 Diuretix 142
 Diurex 561
 Diuribeta 142
 Diuril 561
 Diurnal 317
 Diurophylline 588
 Diursal 319
 Diutazol 142
 Diuxanthine 583
 Diuxin 561
 Dixin 145
 Dixina 145, 561
 Divanil 567
 Divanol 567
 Divascol 143
 Divenal 144
 Dobesin 259
 Dobralin 157
 Dociton 179
 Dolajan 486
 Dolamin 390
 Dolgin 156
 Dollipol 78
 Dollax 150
 Dolodorm 510
 Dolomit 171
 Domakol 517
 Domatrin 157
 Donapax 243
 Dopamet 15
 Dopa-flex 237
 Dopanum 158
 Dopegyt 15
 Dopidrin 407
 Dopom 379
 Dorbangil 370
 Dorcostrin 133
 Dorecain 117
 Doriden 374
 Dorison 375
 Dorlen 203
 Dormallyl 142
 Dormamed 568
 Dormigen(e) 74
 Dormigoa 340
 Dormiplex 340
 Dormised 340
 Dormosan 375
 Dormutil 340
 Doryl 203
 Dosmin 499
 Dovine 182
 Doxephtrin 407
 Doxo 133
 Doxolan 150
 Dramamin 6
 Dramarin 6
 Dramyl 6
 Drenamide 377
 Drinupalhydrochlorid 63
 Driol 377
 Droleptan 158
 Dromoran 241
 Droperidol 158
 Droxol 243
 Dualar 58
 Ducodal 511
 Dufalone 147
 Dulcolax 87
 Dumitone 143
 Dumovit E 581
 Dumovit K 88
 Duotrate 581
 Duplex 159
 Durabol 343
 Durabolin 343
 Duracholine 203
 Durasul 499
 Durasulf 500
 Durolax 87
 Duromine 336
 Duronitrin 370
 Durox 500
 Dustundanum 159
 Duxen 81
 Dyloform 586
 Dymadon 390
 Dynaprin 174
 Dytac 132
 Ecain 117
 Echinopsini nitras 590
 Ecobutazone 77
 Ecoferol 581
 Econ 581
 Ecuaniil 317
 Edan 575
 Edemox 142
 Edenal 317
 Ederen 142
 Ediodina 182
 Efcamonum 590
 Efer 581
 E-Ferol 581
 Eferon 365
 Effontil 543
 Effortil 543
 Efforan 324
 Effortil 543
 Eftolon 431
 Egherit 407
 Egypt-201 104
 Elatrol 526

Elavil 526
 Elcurin 154
 Elecor 225
 Elenium 243
 Elevan 65
 Elinol 258
 Elixir Chloroformii 578
 — Halleri 105
 — pectorale 571
 — stomachicum 571
 Elmarine 19
 Elpi 41
 Elrodorm 374
 Elserpine 458
 Emaform 578
 Emblnal 50
 Embramin hydrochlorid 73
 Emedyl 6
 Emeside 411
 Emplastrum Acidi salicylici compo-
 situm N. 1—4 429
 — Acrichini N. 1—2 239, 427
 — — compositum 239
 — adhaesivum bactericidum 427
 — Arievitschi-Vichrevae 36
 — camphoratum 427
 — Capsici 428
 — citrinum 428
 — Epilini 430
 — flavum 428
 — Lebedevi N. 1—2 239
 — Mellis 428
 — olei Ricini 427
 — Plumbi adhaesivum 429
 — — compositum 429
 — universale 429
 Emulsum olei Ricini 578
 — Naphthalani liquidum 252
 Endequil 243
 Endiaron 578
 Endiol 182
 Endismin 500
 Endojodin 182
 Endophenolphthalein 172
 Endoxan 569
 Endoxana 569
 Enduxan 569
 Eneril 390
 Enerzer 309
 Enidran 377
 Entacyl 419
 Enteritan 578
 Enterocol 578
 Enteroseptol 578
 Enterotonin 203
 Enterozol 578
 Entromone 564
 Eolax 87
 Eosan 150
 Epamin 155
 Epasanol 141
 Epelin 55
 Epha 6
 Ephedrolum 589
 Epheron 365
 Ephesthmin 589
 Ephynal 581
 Epiclas 365
 Epiderminum 579
 Epilan 468
 Epilarctin 579
 Eporal 143
 Epontol 491
 Eprazin 420
 Epsilon-M 581
 Equanil 317
 Equibral 243
 Equizole 334
 Eraldin 179
 Erbefan 571
 Erbrol 74
 Erevit 581
 Ercal 580
 Ercoril 364
 Ercotina 364
 Ercoquin 425
 Erevit 584
 Ergam 579
 Ergobromin 74
 Ergocito 580
 Ergoclin 439
 Ergofein 228
 Ergofeina 580
 Ergoffin 228
 Ergomal 580
 Ergomar 580
 Ergomet 580
 Ergomertini maleas 580
 Ergopartin 323
 Ergostabil 580
 Ergotamini tartras 580
 Ergotan 580
 Ergotartrate 580
 Ergotex 144
 Ergotate Maleate 580
 Eributazone 77
 Ericain 117
 Eridan 81
 Ermalate 580
 Ermetrin 580
 Erpozid 582
 Erynitum 581
 Escodolum 582
 Escophylline 588
 Escusan 582
 Eskazinyl 528
 Esol 581
 Esorb 581
 Espril 366
 Ester 22 18
 Estigyn 586
 Estinyl 586
 Eston B 583
 Estradurin 584
 Estrolan B 583
 Estrolan E 586
 Estrone 583
 Estronum 584
 Estrugene 584
 Estrusol 584
 Etamid 585
 Etamsylatum 156
 Etaverina 408
 Etebenecid 585
 Eterapion 581
 Ethamsylate 156
 Ethaperazin 585
 Ethaverin 408
 Ethidol 586
 Ethimidinum 586
 Ethinone 439
 Ethinoral 586
 Ethiodan 335
 Ethionamide 586

Ethionamidum 586
 Ethisterone 439
 Ethocain 117
 Etionid 586
 Etionizina 586
 Ethophylline 588
 Ethosuximidum 411
 Ethquinal 408
 Ethylfenacemide 140
 Ethylphenacemide 140
 Ethymal 411
 Eticyclin 586
 Etifollin 586
 Etimid 57
 Etinestrol 586
 Etionid 586
 Etionizine 586
 Etivex 586
 Etofillinum 379
 Etoksid 587
 Etoxazenum 536
 Eubetin 560
 Eubolin 343
 Eucanfol 490
 Eucatal 575
 Eucodal 511
 Eukraton 57
 Eucortone 226
 Eudan 587
 Eudiamin 588
 Eudrin 561
 Euflat 589
 Eukodal 511
 Enkraton 57
 Eulaxin 172
 Eulissin 448
 Eumicton 142
 Eunalgit 587
 Eunoctin 370
 Euphodyn 539
 Euphyllinum 588
 Eupramin 174
 Euspiran 171
 Eustral 499
 Eutensol 379
 Eutonyl «Cophabel» 490
 Evazol 135
 Eviabit 581
 E-Vicotrat 581
 Eviol 581
 Evipal 111
 Evipan-natrium 111
 Evipherol 581
 E-viterbin 581
 Evitol 581
 Exactin 226
 Exangit 576
 Exmigra 580
 Extractum amarum spissum 576
 — Heparis 576
 — Myrtilli liquidum Winternitzl 91
 — Naphthalani liquidum 463
 — Populi 517
 Fabahistin 141
 Factor E₃ 117
 Fadormir 340
 Falicain 117
 Falichol 537
 Falicor 225
 Fallitrat 205
 Falithorm 537
 Falitrom 537
 Farctyl 538
 Fargan 152
 Faringosept 537
 Farmiserina 569
 Farmizina 420
 Faston 6
 Fatoliamid 586
 Favistan 318
 Febrilix 390
 Febrolin 390
 Febuzina 77
 Fedaiodo 182
 Feguanide 143
 Feliflux 141
 Fel medicinale 162
 Felombrine 187
 Felosan 367
 Felurea 365
 Femidyn 584
 Fenacemid 365
 Fenactil 19
 Fenantoin 155
 Fenartril 77
 Fenazil 152
 Fenazolo 431
 Fendon 390
 Fenedrin 539
 Fenergan 19
 Fenformin 143
 Fenhombreol 515
 Fenibutol 77
 Fenilbutazon 77
 Fenised 365
 Fenoquin 571
 Fenostenyl 365
 Fenormin 143
 Fentazin 585
 Fenural 365
 Fenuril 561
 Fenurone 365
 Fenverinum 540
 Fenytan 365
 Fercovenum 542
 Fermergin 580
 Ferrocalum 542
 Ferroceron 542
 Ferronat 542
 Ferrum Leck 543
 Fertilvit 581
 Fibrex 545
 Fibrinogenum 545
 Fibrinolysinum 545
 FIBS 544
 Findolor 335
 Firmazolo 431
 Flaba 318
 Flagesol 324
 Flagil 324
 Flagyl 324
 Flaianina 146
 Flaminum 547
 Flatus 547
 Flavin 547
 Flavitol forte 460
 Flavugal 567
 Flaxedil 459
 Flegyl 324
 Flexartal 486
 Flivazone 517
 Flogicort 523
 Floralbina 467
 Floristen 548

Flucort 483
 Fluctan 552
 Fludeten 65
 Fluiting 360
 Flumadon 65
 Flumazine 258
 Flumen 561
 Flumethazone pivalate 261
 Flumetasonum pivalicum 261
 Flumethasondimethylpropionat 261
 Flumezin 258
 Flumidin 65
 Fluocenolonacetonid 483
 Fluolon 136
 Fluormone 135
 Fluorometholone 136
 Fluorocort 135
 Fluorodelta 135
 Fluorodexamethasonpivalat 261
 Fluorouracil 553
 Fluosterolone 523
 Fluothane 552
 Fluoxiprednisolon 523
 Fluphenazindihydrochlorid 258
 Fluracile 553
 Fluracilum 553
 Fluril 553
 Fobex 19
 Fodinyl 586
 Foliculin B 583
 Follustrine 584
 Follhormon 584
 Folliculine 584
 Folllicoral 586
 Follitropinum 548
 Follilyclin P 583
 Follidyimil 583
 Follutein 564
 Fomag 548
 Fomentum frigidum Schmuckeri 574
 — Pirogovi 423
 Fondon 390
 Fonurit 142
 Formidron 549
 Formison 375
 Formoalesten 549
 Formoforin 549
 Fortecorlin 135
 Fortevit 549
 Fortombrine 524
 Fortran 19
 Fosfamin 520
 Fosfazide 184
 Fosfestrolum 550
 Fosfobion 212
 Fostrolin 550
 Foxalin 145
 Frenolon 551
 Frentirox 318
 Fresan 78
 Fridophenum 6
 Frumtosinil 521
 Frusemide 234
 Ftorocort 552
 Ftorotan 552
 Fubromeganum 553
 Fulcin 130
 Fulvicin 130
 Fulvina 130
 Fulvistatin 130
 Fungivin 130
 Furadantin 554

Furadantoin 554
 Furadoninum 554
 Furaginum 554
 Furaginum solubile 554
 Furaltadone 555
 Furalton 555
 Furamidone 555
 Furanex 554
 Furanten 554
 Furaplastum 555
 Furasept 554
 Furazidin 554
 Furazolinum 555
 Furazonalium 555
 Furilin 554
 Furina 554
 Furitale 555
 Furmethonol 555
 Furobactina 554
 Furosemidum 234
 Fursemide 234

GABA 106
 Gadexyl 422
 Gaamar 108
 Galecain 117
 Galiron 560
 Gallamonium iodidum 459
 Galmaform 105
 Galmaninum 105
 Gamaquin 579
 Gamaserpin 458
 Gammachetone 211
 Gammalon 106
 Gammal 106
 Gammasethene 106
 Gammamol 106
 Gamona 106
 Ganlion 404
 Gardalaxan 172
 Gargarisma aluminatum 432
 — — compositum 432
 — boroxatum compositum N. 1—2 432
 — Kartaschovi 207
 — phenolatum 433
 — salicylatum 433
 — thymolatum compositum 433
 Gargilon 135
 Gastrin 107
 Gastripon 107
 Gastroamat 107
 Gastrofillin 108
 Gastroform 579
 Gastrogel 108
 Gastrografen 84
 Gastroistidina 122
 Gastropin 107
 Gectofer 160
 Gelatina glycerinata 161
 — liquida ad usum internum 161
 — Zinci Unna N. 1—5 532
 Gelatinolum 161
 Gendevitum 114
 Gendon 114, 457
 Genocain 117
 Genophyllin 588
 Genoxal 569
 Geocorton 377
 Gerlocain 117
 Gerloptil 115
 Germicina 555
 Germinol 581

Gerodyl 422
 Gero-H₃-Aslan 117
 Gerotrast 524
 Gerovital-H₃ 116
 Gerulcin 122
 Gestoral 439
 Gevex 581
 Gilurhythmal 10
 Gimalini sulfas 119
 Gimedone 490
 Gineflavir 324
 Ginestrene 586
 Gladilon 145
 Glandubolin 584
 Glanduitrin 424
 Glanil 498
 Glaucini hydrobromidum 122
 Glaucomil 203
 Glauvent 122
 Glaxoridin 565
 Glicemin 78
 Glicotron 78
 Glimid 374
 Glio-6 123
 Globeinicol 240
 Globuli Okintschici 376
 Gloria 129
 Glucidoral 75
 Glucobasin 212
 Glucodigin 145
 Glutamizol 57
 Glutethimid 374
 Glycerinum Acidi borici aluminatum 123
 — Acidi salicylici saponatum 126
 — borotanicum 124
 — Calcis compositum 123
 — chloroformiatum N. 1—2 127
 — cum Natrii tetraborate 126
 — cum Zinci oxydo saponatum 127
 — et Spiritus aethylici 128
 — ferratum 127
 — ichthyolatum 124
 — Ichthyoli saponatum 124
 — iodatum 125
 — Iodi saponatum 125
 — iodocarbonisatum 125
 — Iodoformii saponatum N. 1—4 125
 — Phenoli lacticum N. 1—3 128
 — Phenoli saponatum 126
 — Picis liquidae salicylatum 123
 — saponatum Hebrae 109
 — Sulfuris saponatum 127
 — tannatum 127
 — vitellinum 128
 Glycerophosphatum 128
 Glycerophosphenum 128
 Glycoformal 123
 Glycyamidum 567
 Glyfyllin 153
 Glyoxamin 24
 Glyphyllin 153
 Glyvalan 122
 Glyvenol 123
 Godablon-E 581
 Godafilin 588
 Gomphotinum 129
 Gonablon 564
 Gonadotropinum chorionicum 564
 Gontochin 557
 Graafina 583
 Granulae aërophorae citrices 130
 Granulax 172
 Gravitel 439
 Gravocain 117
 Graval 6
 Greosin 130
 Gricin 130
 Grifomin 588
 Grifulin 130
 Grifulylin 130
 Grisactin 130
 Grisefuline 130
 Griseofulvinum 130
 Grisovin 130
 Grosul 500
 Guaiaphenesin 108
 Guajacuran 108
 Guajamar 108
 Guanar 108
 Guanatol 63
 Guanatolily 63
 Guanethidine 379
 Guanothiazon 537
 Gulin 114
 Gumbix 17
 Guttae Aetheris terebinthinatae 200
 — alcalinae 200
 — antiasthmaticae N. 1—3 198
 — antiemeticae 199
 — antineuralgicae 198
 — Bachoni N. 1—3 52, 53
 — Belogolovovi № 1—2 56, 57
 — Bogoslovsky 70
 — Botkini N. 1—2 72
 — Camphorae valerianatae 196
 — contra coryzam N. 1—3 199
 — vomitum 199
 — Convallariae compositae N. 1—4 197
 — — cum tinctura Strychni 197
 — Dobronravovi 157
 — Feodorovi 544
 — Fersteri 543
 — Fogelsoni 548
 — gastricae Pirogovi 423
 — Inosemzevi 181
 — Mentholi compositae 197
 — odontalgicae N. 1—3 196
 — ophthalmicae Albuci et Diicaini 200
 — — aluminatae 196
 — — Averbachi 6
 — — Vicherkevitschi 95
 — Sankovae 467
 — stomachicae N. 1—4 195
 — — Beljaevi 57
 — — Charachorini 556
 — — Michailovi 338
 — — Stroganovi 498
 — Thilmani 517
 — Thymoli 200
 — tincturarum Strophanthi et Strychni 199
 — — Strophanthi, Valerianae et Convallariae 199
 — — Valerianae et Convallariae 197
 — Votschali N. 1—2 103
 — Vovsi 97
 — Zelenini 169
 — Zimmermani N. 1—3 570
 Gynecorn 580
 Gynediolo 321
 Gynergen 580

Gyneton 439
 Gynoestryl 534
 Gynofort 580
 Gynonguent 583
 Gynoral 586
 Gyno-Steroxin 467

Haematogenum 111
 — pro infantibus 112
Haemiton 207
Haemoconservantum N. 7 220
Haemodesum 112
Haemophilinum 113
Haemophobin 113
Haemostimulinum 113
Haemovinylium 112
Halazolin 104
Haldol 104
Halidor 104
Halochinum 105
Halomycetina 240
Haloperidol 104
Halopidol 104
Halopyramine 503
Halothane 552
Halquinol 578
Hansadorm 74
Harmonin 317
Harrical 370
Habanil 19
Hefaephytinum 117
Helfergin 43
Helmintex 419
Helmirazin 111, 419
Heltolan 419
Hemodal (L) 88
Hepabismol 63
Hepacholine 562
Heparin 114
Heparlipon 213
Hepatosan 562
Heptobarbital 587
Heriplex 115
Herocain 117
Herovit 116
Hexabendin 155
Hexadiphensulfoniumiodid 518
Hexadrol 135
Hexamidin 110
Hexasoniumiodid 518
Hexaverine 408
Hexemal 568
Hexenalum 111
Hexobendin 155
Hexofen 375
Hibanil 19
Hiberna 152
Hibernal 19
Hibicon 558
Hidantal 155
Hidroestron 583
Hillcain 117
Hillcholin 141
Hillcolax 87
Himalin 119
Hiposerpil 458
Hiposterol 120
Hirnamin 239
Hiropon 407
Histaglobulin 121
Histamethine 141
Histamethizine 141

Histidin 122
Histifan 122
Histostab 24
Hoechst 12512 225
Holodorm 340
Homan 322
Honvan 550
Honvol 550
Horizon 81
Hormale 322
Hormocline 562
Hormofort 378
Hormogynon 583
Hormo-retard 343
Hormotonin 203
Hostaginan 225
Huberdine 422
Huberplex 243
Humorsol 521
Hustodil 108
Hydantoin 155
Hydran AB 373
Hydranol 117
Hydrochlorothiazid 155
Hydrocortisoni acetat 118
Hydro-Diuril 155
Hydrolysatum caseini 188
Hydrolysinum 118
Hydroperitum 119
Hydro-Saluric 155
Hydrosarpan 183
Hydrothide 155
Hydroxychloroquine 425
Hydroxydionnatriumsuccinat 86
Hydroxyprogesteroncaproat 378
Hydroxytrimethoniumiodid 182
Hyndarini hydrochloridum 119
Hyoscinebutylbromid 486
Hypaque 84
Hypares 120
Hypcol 340
Hyperpax 15
Hypglycamid 75
Hypnodol 50
Hypnoval 74
Hypnoval «Richter» 568
Hypophen 424
Hypophysin 424
Hypotensin 404
Hypothiazid 155
Hypotirin 120
Hyperin 121

Iastil 171
Ibiothyron 524
Ibiotyzil 19
Ibuprophen 75
Ichthyolin 185
IER-1 185
IER-2 185
IF-12 184
Ibion 517
Imferon 175
Imidalin 144
Imidaminumhydrochlorid 24
Imidazolina 360
Imidazyl 360
Imidin 360
Imidobenzyle 174
Imiphosum 175
Imipramil 174
Imipramin(e) 174

Imizinum 174
 Imizol 360
 Imnudorm/375
 Inacid 180
 Inamil 431
 Inapsin(e) 158
 Incidal 141
 Incidan 141
 Incoran 225
 Increpanum 180
 Indacin 180
 Inderal 189
 Indigocarminum 179
 Indocid 180
 Indomee 180
 Indometacinum 180
 Indomethacin 180
 Indopanum 180
 Inestra 586
 Infatabs 499
 Infecundin 182
 Inflatine 260
 Influmin 65
 Infusinum 182
 Infusum folii Eucalypti 347
 — — Plantaginis 345
 — herbae Adonidis vernalis compositum N. 1—2 345
 — Juglandis compositum 345
 — radices Althaeae compositum N. 1—3 344
 — — Ipecacuanhae compositum N. 1—2 346
 — — Rhei compositum 346
 — Sennae compositum N. 1—2 346
 — Valerianae compositum 344
 INHA-17 176
 Inhacamp 176
 Inhalatio ad hemicraniam 178
 — antiasthmatica 179
 — contra corysam N. 1—6 178
 — — tussim N. 1—5 177
 Inhalon 177
 Inhalypt 176
 Inlax 87
 Insectinum 181
 Insomnol 375
 Insoral 143
 Insultion 468
 Intencordin 181
 Intensacrom 181
 Intensain 181
 Intensol 467
 Interpretina 458
 Intocostin-1 529
 Intra-butazone 77
 Intra-diodin 182
 Invenol 75
 Inversal 537
 Iobichin 63
 Iodantox 185
 Iodaseptine 185
 Iodatol 186
 Iodchinopyrin 187
 Iodgorgon 146
 Iodimethine 185
 Iodinolum 186
 Iodiplin 186
 Iodisan 182
 Iodoenterol 579
 Iodoglobin 146
 Iodogorgon 185
 Iodolein 186
 Iodolipolum 186
 Iodopact 524
 Iodopanoic acid 187
 Iodopropano 182
 Iodopyracet 205
 Iodoren 524
 Iodotiroxon 524
 Iodoxil 536
 Iodoxyl 182
 Iodozoat-Natrium 524
 Iod-Salolum N. 1—2 186
 Iodiriol 187
 Iodthesalum 187
 Iodumbran 205
 Ioduron B 205
 Iofendilatium 335
 Iohimbin 183
 Iohystrin 183
 Ionamin 336
 Iopagnost 187
 Iopan 187
 Iopracyl 205
 Iopyracil 205
 Ioxyl 579
 Ipenitol 65
 Iperfil 219
 Ipersulfa 499
 Ipnolan 340
 Ipoctal 379
 Ipoglicone 78
 Ipoguanin 379
 Ipometil 422
 Iporal 379
 Ipothiazide 561
 Iprasan 360
 Iprazidum 184
 Ipronol 184
 Iproniazid 184
 Ipronid 184
 Ipronin 184
 Iproveratril 174
 Ipsoflame 77
 Ipsotran 317
 Irgapyrin 420
 Iricolline 203
 Irmin 174
 Irocaïn 117
 Iroquine 557
 Irrorin 225
 Isadren 171
 Isadrinum 171
 Isalax 172
 Isalizina 366
 Isapheninum 172
 Ismelin 379
 Ismipur 319
 Ismiverm 419
 Isnacort 135
 Isoamin 539
 Isobamate 486
 Isobromyl 74
 Isocain 117
 Isocarboxazid 309
 Isochol 367
 Isocrin 172
 Isofetil 174
 Isolanid 565
 Isolidin 211
 Isomyn 539
 Isonal 173
 Isonaurin 74

Isonitrosinum 173
Isophen 407
Isophylline 153
Isoprenalin 171
Isoprimum 172
Isopropamid 173
Isopropamidiodid 173
Isoproponi iodidum 173
Isoptin 174
Isopyratsin 420
Isorbid 370
Isordil 370
Isosorbidedinitrat 370
Isoval 74
Isoverinum 172
Isoxyl 174
Ispranil 171
Istidina 122
Istivis 122
Isto 122
Itinerol 141
Itir 146
Iversal 537
Ivertol 537
Ivilax 87
Izobarin 379

Jatroneural 580
Jetsan 419
Jofendilatam 335
Johimbina 183
Jotiron 524
J-Tiron 524
Jubilar 243
Juvela 581
Juvocain 117

Kalli orotas 189
Kaliodon 189
Kallikrein-Depot 386
Kalmocaps 243
Kalsothios 190
Kallabor 190
Kalymin 188
Kanakion 195
Kanavit 195
Karlion 205
Karmazine 19
Kasyn 195
Kataglicina 143
Katapyrin 13
Katarro 208
Kativ-N 195
Kavitamin 88
Kavitan 88
Keflordin 565
Keipole 195
Kenacort 523
Kephalosan 211
Keramin 259, 541
Ketazon 211
Ketodestrin 584
Ketofen 211
Ketoxydroxyestrin 584
Ketophenylbutazonum 211
Khellatrinum 210
Khelliverinum 210
Khelllophyllin 210
Khellotetrit 210
Kinedryl 212
Klimacterin 212
Klimaren 214

Klimovan 214
Klion 324
Klorozoxason 559
Klorpromazin 19
Klotogen 88
KN 214
Kollidon 112
Kontal 540
Korchorozid 227
Korodilat 225
Korkonium 498
Krizanol 230
Kronosulfan 431
K-Trombin 88
Kumoran 147
Kvaterlon 209
K-Vital 88

Labican 243
Labiton 243
Lac Vidali 86
Lactinum 189
Lactoflavinphosphat 460
Lacumin 316
Laemoranium 241
Laevomepromazinum 239
Laevomyecinum 240
Lavorphan 241
Lambral 144
Lambratene 319
Lamsil 43
Lamoryl 130
Lanacordin 145
Lanacordal 234
Lanacrist 145
Lanatosidum C 565
Lanatoxin 145
Landrina 219
Lanlor 145
Lanol 234
Lanolimentum Boracis compositum 235
— Boroglycerini 235
— Camphorae phenolatam 236
— Metholi cum Phenylis salicylate 236
— Picis liquidae 235
— Plumbi 236
— Resorcini 236
— Sulfuris 237
— Sulfuris compositum 237
— Zinci 237
— Zinci sulfuratum 237

Lanoral 145
Lanoxin 145
Lantron 526
Largactil 19
Largaktyl 19
Laristine 122
Larodopa 237
Larostidin 122
Laroxyl 526
Larten 317
Larusanum 238
Lasilix 234
Lasix 234
Lasonil 238
Latibon 149
Laxadin .86
Laxafel 234
Laxaseptol 172
Laxigen 172
Laxocol 172

Lazeta 498
 Lecithin-cerebro 242
 Ledercort 523
 Lederkyn 500
 Lediamox 142
 Leikogen 240
 Lekosept 579
 Lembrol 81
 Lemiserp 458
 Lenbiren 241
 Lenigastiril 364
 Lentichol 203
 Lentin 203
 Lentosulla 500
 Lenrat 581
 Leodrast 205
 Leodrin 539
 Leophan 571
 Leophilin 588
 Leostesin 231
 Lepadine 63
 Lepimidin 110
 Lepsiral 110
 Leptidrol 422
 Leptosucin 154
 Lergigan 152
 Lespedin 242
 Lespenephryl 242
 Lethidrone 342
 Leucogenum 240
 Leucomycin 240
 Leukeran 558
 Leukerin 319
 Leupurin 319
 Leunerval 74
 Leurocristine 90
 Levodopa 237
 Levo-Dromoran 241
 Levorphan 241
 Levorphanol 241
 Levopromazin 239
 Levoprome 239
 Levotrin 524
 Leyk 240
 Liberetas 81
 Libexin 242
 Librium 243
 Licuden 130
 Lidazin 500
 Lidocain-Adrenalin 243
 Lidocain(e) 231
 Lidocaton 231
 Lignostab 231
 Limovan 245
 Limovanyl 245
 Linaetholum 245
 Linfolysin 558
 Lingraine 580
 Linimentum Acidi borici et Zinci
 oxydi N. 1—2 246
 — Aloës 245
 — Aluminis compositum 250
 — ammoniatum N. 1—2 246
 — balsamicum Wischnevsky N. 1—2
 96
 — Calcariae 247
 — Camphorae ammoniatum 249
 — saponatum N. 1—4 249
 — Capsici compositum N. 1—2 406
 — Chlorali hydrati N. 1—2 256
 — — — compositum 257
 — Chloroformii 257
 Linimentum Cinchopheni 257
 — cosmeticum Hebrae 109
 — Cucumeris 252
 — Hydrargyri amidochloridi alumi-
 natum 253
 — Ichthyoli 248
 — Iodi camphoratum 248
 — — paraffinatum 248
 — — phenolatum 249
 — Iodoformii Bilrotti N. 1—4 65
 — Kalii iodidi saponatum 248
 — Kutumovae 233
 — Laevomycetini 250
 — Lepsky N. 1—2 241
 — Melis capsicicum 251
 — Menthae 252
 — Mentholi N. 1—2 251
 — Methylis salicylatis compositum
 N₄ 1—3 251
 — Moskalenko 340
 — Naphthalani 252
 — Olei Hyoscyami chloroformiatum
 246
 — — — compositum N. 1—2 246
 — — Terebinthinae ammoniatum
 255
 — — Terebinthinae chloroformiatum
 255
 — — — compositum N. 1—2 255
 — salicylatum compositum N. 1—5
 253
 — Streptocidi 5% 255
 — Sulfuris compositum 254
 — Synthiomycini 1%, 5% aut 10%
 254
 — — 1% cum Novocaino 254
 — Thesani 256
 — Thymoli 256
 — Tragacanthae 256
 — Vaselini 247
 — Viperalgini 247
 — Xeroformii 250
 Linoral 586
 Lintex 540
 Linyl 336
 Lithyronin 258, 524
 Lipavlon 41
 Lipiodol 186
 Lipocerebrinum 259
 Lipo-Diazine 499
 Lipolisin 259
 Lipomin 259
 α-Liponsäure 213
 α-Liposäure 213
 Liposlim 259, 541
 Lipotril 562
 Liquadiazine 499
 Liquaemin 114
 Liquamar 537
 Liquatolum 244
 Liguiritonum 244
 Liquor ad clavos pedum N. 1—55 163
 — ad perniones 163
 — ad decubitus Autenrti 42
 — albuminatus 162
 — alcalinus N. 1—2 167
 — Alibiri 13
 — Ammonii anisatus 198
 — antiphelidicus 165
 — antipruriticus N. 1—4 165
 — antisepticum 162
 — Banajlisi 49

Liquor Berezchnovi 59
 — Bojko 70
 — Eurovi 77
 — Chaselk N. 1—2 556
 — Chlonsky 558
 — Chodakovsky 561
 — contra eczemam 166
 — — sudorem N. 1—7 166
 — Davidi 186
 — Delizky-Mitroschenko 136
 — Demjanovitschi N. 1—2 137
 — Donowani 158
 — Durandi 160
 — Feodorovi 544
 — Feodorovi-Vasiljevi 182
 — Filatovi N. 3, N. 43 546
 — Fochti 551
 — Glycerini chloroformiatus 163
 — Hartmani 106
 — Heffe 117
 — Hirschi 121
 — Javelle 160
 — Kalii arsenitis 538
 — Kastellani 207
 — Kefferi 211
 — Kritschevsky 230
 — Kukuschkini 231
 — Kummerfeldi N. 1—2 232
 — Lipovezky N. 1—2 258
 — Lucomsky 419
 — Malinini 307
 — Maslovi 312
 — Meniholi anaestheticus 163
 — Mitroschini 338
 — Nifontovi et Troizky 374
 — Novici odontalgicum 371
 — Novicovi 371
 — Petrovi 410
 — Petrovi-Beljacovi 410
 — Placentae albuminatus 453
 — Platonovi N. 1—2 430
 — Polosuchini 433
 — Popovi 434
 — Procoptschuky 447
 — Raspaili 452
 — refrigerans N. 1—2 166
 — Roginskae 463
 — Rosenthali 463
 — Schinkarevsky 573
 — Schleichi 574
 — Schnee 575
 — Scrobansky 262
 — Seltzovsky N. 1—2 480
 — Sinicyni 483
 — Valdenbergi 82
 — Villati N. 1—2 88
 — Vleminckxi 547
 — Wischnewsky 97
 — Zydmani 169
 Lissephen 335
 Listerin 260
 Litarin 111
 Livazone 517
 Liviclman 243
 Lixaminol 588
 Lixin 243
 Lobatox 261
 Lobelini hydrochloridum 260
 Lobeton 261
 Lobidan 261
 Lobishan 261
 Locacorten 261
 Localyn 483
 Locorten 261
 Lomarin 6
 Londocaina 117
 Longacid «neu» 585
 Longamid 500
 Longisulfa 499
 Lophenalum 261
 Lorinden 261
 Lubazolom 263
 Lucidil 19
 Lucidril 43
 Lucofente 134
 Ludonal 511
 Lumbocain 117
 Lumisalinum 265
 Lumoxyd 536
 Lumpan 262
 Luncidril 43
 Lunerval 74
 Lupaverinum 265
 Luridine 562
 Lurionitum 263
 Luteocrin depot 378
 Lutocyclol 439
 Lutral 439
 Luxidin 422
 Lycorini hydrochloridum 244
 Lyocholine 562
 Lyogen 258
 Lysthenon 154
 Lytensium 404
 Mablin 325
 Macrocyclin 307
 Madiol 321
 Madribon 499
 Madroxin 499
 Magnal 74
 Magrene 541
 Majeptil 265
 Majsolin 110
 Malarex 557
 Mallate 580
 Mallorol 315
 Malloryl 315
 Malogen 322
 Malysol 57
 Mammophysinum 308
 Maniton-S 308
 Mannazucker 308
 Mannigen 308
 Mannit 308
 Mannitlost 133
 Mannitol 308
 Mannomustinhydrochlorid 133
 Mansoni 540
 Manis 309
 Mapiprin 419
 Marcoumar 537
 Marcumar 537
 Marecaine 117
 Marex 141
 Margonovine 580
 Maricain 231
 Marisan 498
 Marplan 309
 Marplon 309
 Marsalid 184
 Marsilid 184
 Marygin-M 173
 Masdiol 321

Masteron 312
 Mato 540
 Maxidex 135
 Mebedrolum 312
 Mebhydrolin 141
 Mebryl 73
 Mebropenhydraminhydrochlorid 73
 Mecodrin 539
 Meclofenoxatehydrochlorid 43
 Meclozine 141
 Medesone 534
 Medicain 231
 Medicodale 511
 Medicoryn 360
 Medicumarin 147
 Medidorm 568
 Medifuran 555
 Medinal 50
 Mediphyllin 379
 Medorbon 340
 Medramin 6
 Medrelon 534
 Medrol 534
 Medrotestroni propionas 312
 Mefenhydraminhydrochlorid 15
 Megabion 321
 Megacortin 135
 Megafur 555
 Megaphen 19
 Megasedan 19
 Megibal 57
 Megimide 57
 Meksaminum 314
 Melaminsulfon 19
 Meldian 560
 Meletin 209
 Melipramin 174
 Melisar 560
 Melitoxin 147
 Mellaril 315
 Mellerets 315
 Mellerette (n) 315
 Melleril 315
 Mellivenon 314
 Melosan 74
 Melpintol 375
 Melsedin 340
 Melubrin 19
 Menadionnatrium-bisulfit 88
 Menhydrinate 6
 Menolyn 586
 Menthalin 315
 Menthogom 316
 Mentholin 316
 Mentholum-phenolum 316
 Menutil 259, 541
 Menzylan 315
 Mepanitum 317
 Mepazinum 316
 Mepentil 375
 Mephaserpin 458
 Mephatelin 364
 Mephatopherol 581
 Mephebarbital 587
 Mephenamin 312
 Mephenesin 335
 Mephenhydramin 15
 Mephenhydraminhydrochlorid 15
 Mephenytoine 464
 Mepholinum 141
 Mephytom 195
 Meprobamat 317
 Meproban 317
 Meprodat 486
 Meprosin 317
 Meprotanum 317
 Meranol 78
 Meratonic 422
 Meratran 422
 Mercalcukin 319
 Mercamini ascorbinas 318
 — hydrochloridum 319
 — hydrotartras cum Pyridoxino 318
 Mercaprol 146
 Mercaptaminum 319
 Mercaptizol 318
 Mercaptopurinum 319
 Mercapurene 319
 Mercapurin 319
 Mercazolilum 318
 Mercazolyl 318
 Mercupurin 373
 Mercurin 373
 Mercurrophyllin 373
 Mercusalum 319
 Mercuzan 373
 Mercuzanthin 373
 Merfalan 468
 Meretran 422
 Meridilum 317
 Meristolone 534
 Mern 319
 Merocait 117
 Merpanit 317
 Merthylinc 373
 Merhalan 468
 Mesalgin 313
 Mesantoin 469
 Mesdicain 525
 Mesidicaine 525
 Mesentol 411
 Mesocain 525
 Mesopren 534
 Mesphenalum 320
 Messalin 320
 Mestenediol 321
 Mesteron 322
 Mestimon 188
 Mestrol 320
 Mesural 243
 Metabolina 321
 Metadin 422
 Metalax 87
 Metalid 390
 Metamin(e) 370
 Metamizylum 320
 Metandiol 321
 Metandren 322
 Methamicil 320
 Metanitra 370
 Metaphyllin 588
 Metaproterenolsulfat 16
 Metastab 534
 Metazina 500
 Metazolo 318
 Metexteron 322
 Methamicil 320
 Methamine 407
 Methanabol 321
 Methandienonum 321
 Methandrostenolonum 321
 Methamine 407
 Methaminediazepoxide 243
 Methaqualonhydrochlorid 340

Methedrine 407
 Methergen 323
 Methimazol 318
 Methindol 180
 Methioplegium 39
 Methiovit 323
 Methirit 318
 Methocamphonii methylsulfas 193
 Methophenazin 551
 A-methopterin 323
 Methoplerine 323
 Methotrexate 323
 Methotrimeprazine 239
 Methphenoxydiol 108
 Methylaminopterinum 323
 Methylamphetaminum 407
 Methylandrostandiolum 321
 Methylapogalanthamini hydrochloridum 322
 Methyldiazyl 320
 α -Methyldiphenhydramin hydrochlorid 15
 α -Methyl-Dopa 15
 Methylidopa 15
 Methylergobasin 323
 Methylergobrevin 323
 Methylergometrin 323
 Methylergonovin 323
 Methylpentynol 375
 Methylphenidatehydrochlorid 317
 Methylphenidylat 317
 Methylprednisolon 534
 Methylpromazine 513
 Methyltestosteronum 322
 Metid 585
 Metilstendiolo 534
 Metofenazinum 551
 Methohyryn 318
 Metoxin 499
 Metranil 581
 Metravigor 13
 Metrisone 534
 Metrociclina 586
 Metronidazolium 324
 Metronil 324
 Metroval 586
 Metyldiazyl 320
 Mexaform 314
 Mexaminum 314
 Mexase 313
 Mezulon 340
 Mianesin 335
 Miazylsulfonamid 499
 Micolanum 326
 Microserina 570
 Microcid 500
 Microiodum 327
 Microiodum N. 1—6 (Pilulae Schereschevsky) 327
 — cum Phenobarbitalo 327
 Microsulf(a) 431
 Mictine 13
 Midarine 154
 Mideton 325
 Mielogen 106
 Mielucin 325
 Midronal 498
 Migrenal 324
 Migrosin 324
 Mikedimide 57
 Mikrofollin 586
 Mildmen 243
 Millicorten 135
 Minaphil 588
 Mincard 13
 Minocain 117
 Minorin 89
 Minosinan 239
 Minosulfa 500
 Mintezol 334
 Miocalma 486
 Miochol 43
 Miocurin 108
 Miofilin 588
 Miolisina 335
 Mioran 559
 Miorelax 108
 Mioridol 486
 Mioril 486
 Mirapront 336
 Miroseryn 570
 Miscleron 41, 337
 Misodin 110
 Misolyne 110
 Mistolum 337
 Misulban 325
 Misuran 377
 Mitex 337
 Mitostan 325
 Mitoxan 569
 Mitronal 498
 Miuril 561
 Mixture acida 330
 — alcalina N. 1—4 333
 — amara 329
 — analeptica 487
 — antiemetica N. 1—2 332
 — Bechterevi 62
 — Bietti N. 1—2 63
 — Binge 66
 — Brodsky 73
 — bromidorum N. 1—4 329
 — bulgarica 328
 — Burgee 76
 — cholekinetica 329
 — contra tussim N. 1—12 330
 — diaphoretica 331
 — Drjagini 159
 — Furini 556
 — Gratschenkovi N. 1—2 130
 — haemostatica N. 1—2 330
 — Ivanovi-Smolensky 171
 — Karmanovae 206
 — Kartaschovi 207
 — Krasnogorsky 228
 — Krasnuschkini N. 1—2 229
 — Laschkevitschy 239
 — laxativa 332
 — lytica N. 1—3 487
 — Natrii salicylatis 332
 — Obrazzovi 376
 — Pavlovi 386
 — Pepsini composita N. 1—2 332
 — Petersi 409
 — Popovi 434
 — Quateri 209
 — Ravkini 451
 — Scharko 573
 Mixtur Smidii 574
 — Seppi 481
 — Trapeznikovi 522
 — Traskovi 522
 — Valerianae composita 329
 — Wojcechowsky 101

Misofline 110
 Mizdolom 326
 Mizodin 110
 Mobenol 78
 Modalina 528
 Moderin 534
 Moditen 258
 Modulor 259, 541
 Mogadan 370
 Mogadon 370
 Mollax 150
 Mollisinum 339
 Momenlol 360
 Mono-Kay 195
 Morbam 317
 Morgalin 339
 Moroxydinhydrochlorid 65
 Morpholep 339
 Morpholinobiguanidhydrochlorid 65
 Moryl 203
 Mosolinum 338
 Motolon 340
 Moxastinhydrochlorid 15
 G-MP 319
 Mucostop 108
 Multosalix 341
 Muscureyl 154
 Muskurelax 108
 Myastenin 335
 Mycaptine 319
 Mycardol 581
 Mycoseptin 327
 Mydeton 325
 Mydocalm 325
 Myeleukon 325
 Myelobromol 325
 Myelodil 335
 Myelosanum 325
 Myelucin 325
 Myerlan 325
 Mygal 366
 Mylecylan 325
 Mylepsin 110
 Myleran 326
 Mylocordin 223
 Mynol 117
 Myocain 108
 Myodetensin 335
 Myodil 335
 Myolysin 335
 Myon 335
 Myoplegine 154
 Myorelax 108
 Myo-Refaxin 154
 Myostatine 529
 Myostrotosan 336
 Myotriphos 212
 Myoxyl 335
 Myralon 360
 Myricin 529
 Myrtillinum 336
 Mysuran chloride 377
 Mysulban 326
 Mytelasae chloride 377
 Myvisone 517

 Nadisan 75
 Nadosteron 322
 Nadozone 77
 Nafazol 360
 Nafazolin 360
 Naftazolina 360

 Nalidixanum 360
 Nalidixic acid 360
 Nalidixin 360
 Nallin(e) 342
 Nalorfin 342
 Nalorphini hydrochloridum 342
 Nalutorial 439
 Namuron 568
 Nandrolonedecanoat 343
 Nandroloni decanoas 343
 Nandroloni phenylpropionas 343
 Nantopinum 343
 Nanofinum 343
 Nanophin 343
 Nanophynum 343
 Napatyl 390
 Naphazolin 360
 Naphol 360
 Naphthalginum 359
 Naphthazolin 360
 Naphtizine 360
 Naphthyzinum 360
 Napional 390
 Napoton 243
 Narcodal 511
 Narcosin 511
 Narcotan «Spofa» 552
 Nasal 342
 Nastizol 360
 Natidigoxine 145
 Natrii acetizoas 524
 — adenosintriophosphas 212
 — apolas 407
 — dehydrocholas 141
 — nucleinas 357
 — oxybutyras 358
 — paraaminosalicylas 358
 Natrinal 350
 Natri-Pas 358
 Natrium amidotrizoat 84
 — dioctylsulfosuccinat 150
 — methylidiiodchelitamicum 536
 Natrinal 50
 Natruril 561
 Natulan 359
 Naucain (e) 117
 Naurastal 359
 Navicalm 141
 Navidrex 569
 Navidrix 569
 Naviton 342
 Nedeltran 513
 Nefrix 155
 Nega 361
 Nemacyl 419
 Neoanusolum 362
 Neobellin 78
 Neobenzinolum 362
 Neocain(e) 117
 Neocarbolax 364
 Neocolina 562
 Neocol 377
 Neocompensan 112
 Neo-Dema 561
 Neodenticain 363
 Neo-de-vomit 6
 Neodexabine 364
 Neo-Diabetal 78
 Neo-Diacid 74
 Neodicumarinum 363
 Neodrenal 177
 Neodrine 407

Neo-Ergotin 589
Neoflex 559
Neo-Fulcin 130
Neofuran 555
Neo-Gastroedan 364
Neogynofort 363
Neoinsoral 78
Neolax 172
Neoflex 559
Neolutin «Spofa» 378
Neo-Metantyl 364
Neomethiodal 205
Neo-Navigan 6
Neo-Oxylon 136
Neopavrin 408
Neopepulsan 364
Neophedan 365
Neophenal 365
Neopielofanina 53G
Neoregulin 364
Neo-Secopan 580
Neoserfin 458
Neo-Sintrom 484
Neospect 205
Neostene 321
Neosteron 321
Neosulfil 499
Neosulfon 500
Neofibil 517
Neo-Ulkophob 364
Neo-Urografin 84
Neo-venfrisian 364
Neoviron 515
Neo-Vopax 536
Neozepam 370
Neozine 239
Nephenal 365
Nephramid 142
Nepotin 365
Neptusan 6
Nerobol 321
Nerobolil 343
Nervacton 19
Nervalin 365
Nervonus 317
Nervatil 19
Nesol 361
Nesylan 205
Neulactil 366
Neuleptil 366
Neuractil 239
Neuralgin 361
Neurobenzile 19
Neurocil 239
Neuroleptone 19
Neuropax 585
Neuroplex 19
Neuroprom 19
Neurotamin 361
Neurotiazina 19
Neuroton 108
Neurotrast 335
Neustab 517
Neutracid 362
Neutrephylline 153
Nevigramon 360
Neviron 321
Ney Gram 310
Niagar 561
Nialamide 366
Nialamidum 366
Nialamina 366

Niamid(c) 366
Niazol 360
Nibiol 373
Nibufin 366
Nibuphinum 366
Niclosamidum 540
Nicodinum 367
Nicofer 368
Nicoflavin 368
Nicoform 367
Nicospan 369
Nicotlon 586
Nicoumalone 484
Nicoverinum 367
Nifadone 555
Nifurantin 554
Nigalax 87
Niglon 370
Nihexinum 367
Nihicor 379
Nikoban 261
Nilfan 503
Nioform 579
Niritol 581
Nirvan 239
Nitasom 536
Nitazolum 369
Nitralettae 370
Nitranolum 370
Nitrazepamum 370
Nitretamin 370
Nitrin 370
Nitroduran 370
Nitrofungin 371
Nitrofur 555
Nitrofuracin 554
Nitrofuraltadone 555
Nitrofurantoin 554
Nitrofurilen 371
Nitrofurin 554
Nitronium 370
5-Nitro-oxin 373
Nitropentaerythrit 581
Nitropenton 581
Nitrosorbidum 370
Nitro-Tabletten 370
Nitrothesal 371
Nitroxoline 373
Nivachine 557
Nizotin 586
Noan 81
Nobadorm 340
Nobedon 390
Noctilene 340
Noctivan 111
Noctynol 335
Nogram 360
5-NOK 373
No-kotin 261
Nometan 419
Norakin 379
Norfin 342
Noridyl 132
Norisedrin 171
Normadrine 407
Normalax 172
Normalene 87
Normanox 568
Normatens 422
Normoglie 560
Normorif 379
Norstenol 343

Nortestosteronphenylpropionat 343
 Nortobione 517
 Nortobril 31
 No-spa 375
 Nospan(um) 375
 Nosydrast 205
 Nosylan 205
 Nothiazine 316
 Nourilax 172
 Novabol 321
 Novakol 517
 Novallyl 142
 Novamid 420
 Novamin(a) 6
 Novapon-Troche 135
 Novapromazin 19
 Novasmasol 16
 Novembitolum 373
 Novestrol 586
 Noviotrast 205
 Novoadlin 117
 Novocain 117
 Novocainamidum 371
 Novocort 135
 Novodil 232
 Novodiur (ex) 155
 Novodrin 171
 Novomazina 19
 Novomina 6
 Novopan 111
 Novophone 143
 Novopinol 372
 Novosed 243
 Novosulfan 431
 Novurit 373
 Noxal 516
 Noxal 340
 Noxibiol 373
 Noxyron 374
 Nozifan 239
 NT 374
 Nuredal 366
 Nutinal 19
 Nycotrast 205
 Nydrane 558
 Nytophan 571

Obesitex 259, 541
 Oblivon 375
 Obsidan 179
 Octadinum 379
 Octatensine 379
 Octöströl 380
 Octoestrolum 380
 Octofollin 380
 Ocytocin 378
 Odontocaine 117
 Odemin 142
 Östradiolbenzoat 583
 Östradioldipropionat 583
 Östradioli benzoas 583
 Östradioli dipropionas 583
 Östradioli propionas 584
 Oestramedin 583
 Oestrastilben 149
 Oestrin 583
 Oestrobion 584
 Oestroglandol 584
 Oestrogynon 584
 Oestrolum propionicum 584
 Ostron 584

Öestronum 584
 Oitasone 225
 Oksafenamid 377
 Oktedrin 539
 Oleochryzine 230
 Oleum Amygdalarum benzoatum 311
 — camphoratum ad usum externum 309
 — carbolisatum 310
 — Hippopheae 311
 — Hyoscyami N. 1—2 309
 — Lini sulfuratum 310
 — Mentholi N. 1—2 310
 — — compositum 310
 — Thymoli 311
 — Zinci 311
 Olimetinum 380
 Olitensol 144
 Olitorisidum 381
 Olivomycinum 380
 Olosot 375
 Oltopan 111
 Olvodon 375
 Omain 218
 Ombradil 205
 Omca 258
 Omcilon 524
 Omeffin 381
 Omephin 381
 Omeril 141
 Omnalio 243
 Omnibex 336
 Omnicain 117
 Oncovin 90
 Oneiragon 50
 Onivizone 517
 Onycholysin 380
 Opagraf 524
 Oparenol 205
 Opaxil 536
 Ophthalmolum 385
 Opticorten 135
 Optinoxan 340
 Opton 511
 Optoverm 419
 Orabet 78
 Orabetic 75
 Oradexon 135
 Oradian 560
 Oradiol 586
 Oralgol 135
 Oralin 78
 Oraluton 439
 Oramil 75
 Oranixon 335
 Orasthin 378
 Oraviron 322
 Orciprenalinsulfat 16
 Orenzym 382
 Oresan 78
 Oresol 108
 Orestralyn 586
 Oretic 155
 Orferron 382
 Orgasona 225
 Orientomycin 570
 Oriserin 570
 Orisul 431
 Orisulan 431
 Oro-Diabin 560
 Orodin 189
 Orotics 189

Orotyl 189
 Orphenadrin hydrochlorid 312
 Orquisteron-E-Depot 515
 Ortin 370
 Ortol 335
 Ortophyllin 588
 Ortosol 231
 Orvagil 324
 Orvalin 75
 Osalmidum 377
 Osan 382
 Osangin 135
 Osarbonum 383
 Osarcidum 383
 Osdiabet 78
 Osmitol 308
 Osmosal 308
 Ossocalcinolum 383
 Ostacol 384
 Ostensin 193
 Ostensol 193
 Oterben 78
 Oticortrix 524
 Otifuril 555
 Otriven 104
 Otrivin 104
 Ovacin 583
 Ovaria-Hormon «Polfa» 583
 Ovisot 43
 Ovocyclin M 583
 Ovocyclin P 583
 Ovostab 583
 Oxamycin 570
 Oxaphenamidum 377
 Oxazepamum 376
 Oxazylum 377
 Oxedrin 24
 Oxiural 419
 Oxurazin 419
 Oxyäthyltheophyllin 379
 Oxychlorochin 425
 Oxycholin 562
 Oxycodonhydrochlorid 511
 Oxykort 377
 Oxydigitoxin 145
 Oxylone 136
 Oxyphyllin 379
 Oxyprogesteroni capronas 378
 Oxyprogesteronum capronicum 378
 Oxyren 557
 Oxytheonyl 379
 Oxytocinum 378
 Oxyzin 419

 Pabanol 65
 Pabialgin 385
 Pacatal 316
 Pacemol 390
 Pacinol 258
 Pacitane 568
 Pacitran 81
 Padicor 232
 Padutin-Depot 386
 Paidazolo 431
 Pain-Expeller N. 1—2 406
 Pain-Expeller-Anker 406
 Palinum 568
 Palpex 513
 Paludrin 63
 Paludrin(ol) 63
 Palufinum 387
 Palusil 63

 Pamba 17
 Panadil 390
 Panangin 387
 Pancain 117
 Pandrenil 24
 Pankalma 317
 Panectyl 513
 Panergal 580
 Panhexavit 387
 Paniverin 388
 Panjopaque 187
 Pandrenil 24
 Panobat 146
 Panodorm 568
 Panrome 517
 Pantazina 500
 Pantocrinum 388
 Pantolax 154
 Pantopaque 335
 Pantrypinum 388
 Panurin 155
 Papaverinthesal 389
 Papazolom 389
 Papetherine 408
 Paphyllinum 402
 Parabolin 259, 541
 Paracetamolom 390
 Parachloramine 141
 Paraflex 559
 Paralest 568
 Paralgin 390
 Paramin 358
 Paraminthin 419
 Paramisan 358
 Paranoval 154
 Parasas 19
 Parasymphathol 24
 Parathyreoindinum pro injectionibus
 399
 Paratil 19
 Paraxin 240
 Parazone 517
 Parensedal 317
 Paresan 562
 Parexyl 459
 Pargitan 568
 Parkazin 149
 Parkodiazin 499
 Parkopan 568
 Parks 460
 Parmetina 65
 Parminal 340
 Parmol 390
 Parpon 19
 Partigan 568
 Partocon 378
 Parvin 259, 541
 Pasalon 358
 Pask 358
 Pasta abrasiva 390
 — Acidi acetici composita N. 1—2
 399
 — — borici composita 392
 — — — zincata 392
 — — salicylici sulfurata 397
 — Acidi borici zincata 397
 — antihæmorrhoidalia «BL» 68
 — antiseptica biologica 391
 — arsenicosa 393
 — Betanaphtholi composita N. 1—3
 391
 — Bismuthi subnitratii 392

Pasta Bremeneri 426
 — Calcis composita N. 1—2 393
 — carbolisata Listeri 260
 — Caseini 395
 — Chlorophyllo-carotini 400
 — Demjanovitschi 137
 — Dimedroli zincata 393
 — Gramicidini C 392
 — Guzienco 131
 — Hofungi 129
 — Ichthyoli N. 1—4 394
 — — composita N. 1—4 394
 — Kaolini N. 1—2 395
 — Lassari 238
 — Lukomsky 262
 — Magnesia 395
 — Meisachovitschi 313
 — Mellis 395
 — Mentholi composita 396
 — Naphthalani zincata N. 1—2 396
 — Natrii hydrocarbonatis N. 1—2 398
 — — thiosulfatis 396
 — Pevsneri 56
 — phenolata 400
 — Picis composita 393
 — Plantagini 426
 — Plumbi oxydi composita 398
 — Postovsky 438
 — Rachmanovi 457
 — Resorcini zincata N. 1—2 397
 — Rosentali N. 1—2 464
 — Schiyrovi 575
 — Streptocidi composita 399
 — Sulfuris composita 398
 — — zincata 398
 — Sulseni 399
 — Teimurovi 510
 — Tricresoli formalinata 399
 — Tschumakovae 573
 — Zinci N. 1—5 401
 — — antiseptica 401
 — — salicylata 238
 — — Unna N. 1—5 523
 Pastinacinum 401
 Patrovina 493
 Pavesthesinum 385
 Pavorex 375
 Paxidil 317
 Paxin 317
 Paxium 243
 Paxyl 386
 Pecazine 316
 Pectol 402
 Pectussinum 402
 Pedolin 402
 Pelentan 363
 Peloidinum 403
 Pelviran 205
 Pemal 411
 Pemalin 411
 Pempidil 422
 Pempidinetartrat 422
 Pempiten 422
 Pendiomid 404
 Pernalg 580
 Pentabismolum 403
 Pentacin(um) 405
 Pentadorm 375
 Pentaerythryltetranitrat 581
 Pentakos 360
 Pentalgin 403
 Pentalong 581
 Pentamethazene 404
 Pentamethonium 404
 Pentaminum 404
 Pentaryt 581
 Pentedrin 24
 Penthamil 405
 Penthonium 404
 Pentinol 375
 Pentoksl 405
 Pentostam 491
 Pentovitam 405
 Pentoxylum 405
 Pentral 581
 Pentrit 581
 Pentritol 581
 Pentyoxylon 581
 Pepsacid 44
 Peragit 568
 Perangil 581
 Perastinhydrochlorid 70
 Percodan 511
 Perfenazin 585
 Perfenil 585
 Pergalen-Wirkstoff 407
 Perhydrit 581
 Peclazinum 366
 Periodil 205
 Peripherine 144
 Periston 112
 Periston H 112
 Perlopal 375
 Permasin 232
 Permin 578
 Permital 6
 Permitil 258
 Pernovin 408
 Perolysen 422
 Peropanasa 408
 Perparin 408
 Perphenan 585
 Perphenazine 585
 Persantin 232
 Pertiran 360
 Pertussinum N. 1—3 409
 Perurdil 205
 Pervagal 364
 Pervasol 144
 Pervitinum 407
 Peson 407
 Peterphyllin 588
 Petinimid 411
 Petnidan 411
 Petrolimentum liquidum 411
 Phacetur 365
 Phanoctal 568
 Phanodorm 568
 Phargan 152
 Pharmacain 117
 Pharmadiazin 499
 Pharmatonin 117
 Phebuzine 77
 Phenacalum 365
 Phenacemide 365
 Phenacereum 365
 Phenacin 390
 Phenalgin 539
 Phenaminum 539
 Phenasalum 540
 Phenathyl 19
 Phenatrin 540
 Phenazolin 24
 Phenbutazol 77

Phenergan 152
 Pheneturide 140
 Phenexol 120
 Pnenidamine 408
 Phenidamintartraty 408
 Phenidillate 317
 Phenocodin 541
 Phenoformin 143
 Phenopyrine 77
 Phenprocoumarol 537
 Phenprocoumon 537
 Phenterminumresinat 336
 Phentolamine 541
 Phentolaminum 540
 Phenuron 365
 Phenutal 365
 Phenylbutazonum 77
 Phenylisatin 172
 Phenylpropylhydroxycumarinum 537
 Phenylsulfapyrazol 431
 Phenyrit 365
 Phenytoin 155
 Phepranonum 259, 541
 Phethanolum 543
 Phetylureum 365
 Philodorm 568
 Philopon 407
 Phobex 19
 Pnosarbin 424
 Phosphamin 520
 Phosphoestrolum 550
 Phosphrenum 550
 Phrenolon 551
 Phthazinum 552
 Phthorotan 552
 Phthorothanum 552
 Phthoruracilum 552
 α -Phyllochinon 195
 Phyllocormin 588
 Phyllocormin N 379
 Phytoferrolactolum 546
 Phytomenadion 195
 Phytionadione 195
 Piaccamide 173
 Plectan 536
 Pielosil 205
 Pilulae alkalinae 418
 — Andrejevi 27
 — asiaticae N. 1—3 412
 — Blancardi 68
 — Burenkovi 76
 — Blaudi N. 1—2 69
 — Chinini N. 1—3 417
 — cholereticae 412
 — Collargoli N. 1—2 413
 — diureticae 414
 — extracti Belladonnae compositae 417
 — Ferrolecithini 417
 — haemostaticae 413
 — Hydrargyri diiodidi 415
 — Ichthyoli 413
 — Kalii bromidi 412
 — Kalii iodidi 413
 Pilulae Kalii permanganatis 414
 — Mentholi 414
 — Opii compositae N. 1—2 415
 — Pepsini 415
 — Podophyllini 415
 — purgativae N. 1—6 416
 — Schereshevsky 327
 — Sirotinini 485
 Pimal 317
 Pimeinum 418
 Pinabinum 418
 Pinat 418
 Pipadox 419
 Pipanol 568
 Piperascat 419
 Piperaver 419
 Piperazini adipinas 419
 Piperoxine 419
 Pipertol 419
 Pipolphen 152
 Pipradol 422
 Pipradolhydrochlorid 422
 Pipral 422
 Pipralon 422
 Piraldina 420
 Pirasulfon 500
 Pirazinamid 420
 Piridisur 499
 Piridrolum 422
 Pirilenum 422
 Pirimal 499
 Pitocin 378
 Piton 424
 Pituglandol 424
 Pituigan 424
 Pituilobine 378
 Pituitrinum M 425
 Pituitrinum pro injectionibus 424
 Pitupartiin 378
 Pixal 411
 Pixol 411
 Pivadorme 74
 Placidon 317
 Planocaine 117
 Plantal 426
 Plantosanum 426
 Plaquenil 425
 Plaquinol 425
 Plasdone 112
 Plasin 63
 Plasmodil 63
 Plasmolum 425
 Plasmosan 112
 Plegomazin 19
 Plenabural 74
 Pietocol 581
 Plexamine 122
 Plisulfan 431
 Polcortolon 524
 Polifavenol 123
 Polibe 431
 Policort 135
 Polival 555
 Polocaine 117
 Polycidine 135
 Polyphlogin 571
 Polyvinolum 431
 Polyvitamin 432
 Pomada Unnae N. 1—4 534
 POPMA-aethanol 24
 Posedran 558
 Posedrine 558
 Positon 524
 Postafen(e) 141
 Potio Riveri N. 1—3 460
 Praegnantolum 439
 Praegnum 439
 Prälumin 568
 Praenitrona 370
 Praephyson 441

Franone 439
 Praxiten 376
 Prazil 20
 Prefaxil 144
 Pregneninolon 439
 Pregnin 439
 Pregnocin-natrium 86
 Pregnoral 439
 Prenylamin(e) 225
 Preparein 408
 Pre-sate 134
 Presinol 15
 Presocyl 440
 Presolisin 15
 Pressedin 379
 Presuren 86
 Prevangor 581
 Priamide 114
 Priazimide 174
 Pridinolhydrochlorid 460
 Primaclone 110
 Primal 537
 Primidone 110
 Primolut-Depot 378
 Primoniad-Depot 515
 Primotest-Depot 515
 Primoteston-Depot 515
 Priscol 144
 Priscoline 144
 Privin 360
 Prizole 360
 Proastmin 449
 Proazamin 152
 Probamyl 317
 Pro-Bantin(e) 364
 Procainamid 372
 Procaine 117
 Procalm 19
 Procalmidol 317
 Procarbazinehydrochlorid 359
 Procardyl 372
 Prochol 141
 Procit 152
 Proctol 448
 Procuran 448
 Procytox 569
 Prodexona 135
 Prodiaben 560
 Prodigal 145
 Prodil 144
 Prodigamon 364
 Produxan 439
 Profundol 375
 Pro-Gastron 364
 Progestab 439
 Progesterona-Serral 378
 Progesteron-retard Pharlou 378
 Progestin P 439
 Progestoral 439
 Progress 446
 Proguanide 63
 Proguanilhydrochlorid 63
 Progyon 584
 Progyon D 583
 Proheptadien 526
 Proinsul 78
 Prolox 335
 Prolixin 258
 Prolonil iodidum 182
 Prolutol 439
 Proluton C 439
 Proluton-Depot 373
 Promactil 20
 Promazil 20
 Promazinamide 152
 Prometazinhydrochlorid 152
 Promiodol 486
 Pronestyl 372
 Propamin 407
 Propanid 491
 Propanosedyl 108
 Propanthel 364
 Propanthelinbromid 364
 Propaphen 20
 Propaphenin 20
 Propenyl 539
 Propericiazine 366
 Properistol 448
 Proper-Myl 448
 Propiodal 182
 Propranololhydrochlorid 179
 Propylon 171
 Propylsympatol 48
 Prosamine 6
 Proscillaridin 508
 Proscillaridin A 508
 Proscillin 508
 Protamini sulfas 449
 Protaminum 449
 Protendiol 321
 Prothazin 152
 Prothionamide 450
 Protionamidum 449
 Protocaine 117
 Protogen 143
 Protogen A 213
 Provetan 583
 Proviron-Depot 515
 Prozil 20
 Prozin 20
 Prulax 172
 Prysoline 110
 Psicarmon 20
 Psichial 243
 Psicodisten 366
 Psicofar 243
 Psiconor 243
 Psicopan 407
 Psicopax 376
 Psicosan 243
 Psicosedin 243
 Psicoterina 243
 Psicoton 65
 Psoriasinum 450
 Psychedrin 539
 Psychial 20
 Psychoton 539
 Pularin 114
 Pulmochin 450
 Pulveres Axiancevi 12
 — Bulatovi 15
 — Burgee cum extracto Belladonnae N. 1—2 76
 — Kontschalovsky 221
 — Mjasnikovi 138
 — Preobraschensky 440
 — Prosovsky 447
 — Rosentuli 464
 — Sereysky 481
 — Schelagurovi 573
 — Sjabro 504
 — Winegradovi 90
 — Worobjevi N. 1—3 102
 — Zolotovae-Kostomarovae N.1—2 170

Pulveres (tabulettae) Zorini 170
 Pulvis Acidi citrici 436
 — aërophorus citratus 436
 — antiasthmaticus 435
 — antisepticus biologicus 435
 — Bertensoni 60
 — Bismuthi subnitratris compositus
 435
 — dentifricus alcalinus 436
 — — ruber 436
 — Doveri 157
 — Malinini 307
 — purgativus N. 1—12 437, 438
 — stomachicus Barelli N. 1—4 51
 — Tannini compositum N. 1—2
 438
 Purgaceum 172
 Purgal 450
 Purgophen 172
 Purgosan 451
 Purinethol 319
 Purodigin 145
 Purpureum 145
 Purpurid 145
 Pyelodrast 205
 Pyelombrine 205
 Pyelosil 205
 Pyknolepsinum 411
 Pyocidum 419
 Pyrabutol 77, 420
 Pyracain 117
 Pyraceton 205
 Pyradene 212
 Pyrameinum 421
 Pyraminalum 421
 Pyranalum 421
 Pyraphenum 421
 Pyraseptic 536
 Pyrazinamid 420
 Pyrazogin 19
 Pycophenum 422
 Pyridostigmin 188
 Pylilax 87
 Pyrocofcain 423
 Pyrogenalum 423
 Pyrophos 424
 Pyruvodehydrase 215

 Qualidilum 208
 Qualidin 208
 Quateronum 209
 Quebrachin 183
 Quelicin 154
 Quensyl 425
 Quercetin 209
 Quercetol 209
 Quertine 209
 Quetnil 81
 Quiatril 81
 Quiescin 458
 Quietal 375
 Quiete 74
 Quietidin 209
 Quinby 63
 Quinimutol 63
 Quinobine 63
 Quinobismuth 63
 Quinoseptyl 50
 Quinostad 63
 Quixalin 578
 Quoticidine 135

 Racemelphalanum 468
 Racephen 539
 Radedorm 370
 Radical 451
 Radical-Mosolin 451
 Radioselectan urinaire et vasculaire 84
 Radobelin 451
 Rastinon 78
 Raudiazin 456
 Raudixin 114, 457
 Raudioxid 458
 Raulen 458
 Raumalina 183
 Raunatinum 456
 Raupasil 458
 Raupina 114, 457
 Rausan 458
 Rusedan 458
 Rausedyl 458
 Rautrin 458
 Rauvasan 183
 Rauvilid 458
 Rauviloid 114, 457
 Rauwasan 457
 Rauwilid 458
 Rauwolfin 10
 Raziosulfa 431
 Recheton 211
 Record 458
 Rectofuran 554
 Rectosan 459
 Redomex 526
 Reductor capillaris 102
 Reduton 108
 Refusal 516
 Regelan 41
 Regitine 541
 Rela 486
 Relaxan 459
 Relaxar 335
 Relaxine 154
 Relaxyl G 108
 Reliberan 243
 Remodin 390
 Removine 6
 Remyolan 459
 Renamid 142
 Renografin 84
 Rentovet 561
 Reocorin 225
 Reopyrin 420
 Reorganin 108
 Reosolon 459
 Reparil 582
 Repeltin 513
 Reposal «Ocefa» 243
 Resedril 458
 Resercaps 458
 Reserpamed 458
 Reserpil 458
 Reserpinum 458
 Resil 108
 Resochin 557
 Respenyl 108
 Respil 108
 Restenil 317
 Resurool 458
 Resyl 108
 Retabolil 343
 Retandrol 515
 Retensin 459
 Retol-Rutin 459

Reuchetal 211
 Reumanol 457
 Reumasyll 77
 Reumuzol 77
 Reumoide 425
 Reupolar 77
 Rexicor 225
 Rhamnium 452
 Rhematophine 571
 Rhinal 360
 Rhinantin 360
 Rhinazin 360
 Rhinex 360
 Rhinon 360
 Rhinoperd 360
 Riboflavinmonophosphat 460
 Riboflavinum mononucleotidum 460
 Ribofosfina 460
 Ridinolum 460
 Ridol 461
 Rigenicid 587
 Rigidyl 31
 Rilatin 317
 Rimidol 360
 Rinazina 360
 Rincorten 225
 Rinitol 360
 Rinofug 360
 Rinol 462
 Riposon 375
 Risordan 370
 Ritalin 317
 Ritarsulfa 499
 Rivadesuin 114
 Rivivol 184
 Rivon 422
 Robitussin 108
 Rogitine 541
 Romazulan 464
 Romergan 152
 Romelin 579
 Romparkin 568
 Rondar 376
 Roter 87
 Rougoxin 145
 Rovachol 462
 Rovatinex 462
 Rovalen 463
 Royalcor 232
 Rubini-Camphora 465
 Rubyl 63
 Rumalon 465
 Rutascorbin 465
 Rutonal(e) 584
 Rutophyllin 465
 Rytmilax 87

 Sabari 141
 Sacerno 468
 Sacersulfa 431
 Sadocort 524
 Safalgin 486
 Sal carolinum factitium 489
 — marinum factitium N. 1—2 489
 Sal purgativum 489
 Salazopyridin 500
 Salazopyrin 500
 Salazosulfapyridine 500
 Salicylazosulfapyridin 500
 Salimid 568
 Salinimentum 466
 Salsulf 500

 Salmidochol 377
 Salpax 524
 Saluret 561
 Saluretic 561
 Saluretil 561
 Saluric 561
 Salutrid 561
 Salvador 466
 Salvuron 536
 Samoryl 203
 Sanasma 171
 Sandril 458
 Sanepil 466
 Sangostasin 9
 Sanitas 466
 Sanodiazine 499
 Sanoma 486
 Sanopron 20
 Sanoquin 557
 Sanoral 135
 Sanorin 360
 Sanotensin 379
 Sanulcin 174
 Sapo chloratus 341
 — piceus liquidus 341
 — Sulseni 341
 Saprostan 467
 Sarbamyl 174
 Sarcochlorin 468
 Sarcoclysinum 468
 Sarodormin 374
 Saroten 526
 Sarotex 526
 Sarpan 183
 Sarracini hydrotartras 467
 Satituran 468
 Savac 205
 Savatin 367
 Savitil 19
 Scabiol 485
 Scleramine 185
 Sclerophyllin 486
 Scobutil 486
 Scoline 154
 Scopolaminbutylbromid 486
 Scutamil 486
 Sea Legs 141
 Secadol 479
 Secagyn 580
 Secanorm 580
 Secometrin 580
 Secotamin 580
 Secupan 580
 Sedalcer 364
 Sedalgin 478
 Sedansina 19
 Sedantoin 468
 Sedapercut 375
 Sedastmon 478
 Sedazyl 317
 Sedobelin 478
 Sedolin 539
 Sedolor 478
 Sedormed 142
 Sedovestul 6
 Sedoxazin 525
 Sedozina 585
 Sedral 317
 Sedural 74
 Seduxen 81
 Segontin 225
 Seguril 234

Sembrina 15
 Sendoxan 569
 Senton 481
 Sepan 498
 Sepsinol 555
 Sepsoral 537
 Seral 375
 Serax 376
 Serciclina 570
 Serenace 104
 Serenal 376
 Serenase 104
 Serenelfi 104
 Serenid-D 376
 Sereium 536
 Serenivita 243
 Sernallis 482
 Serociclina 570
 Seroden 517
 Seromicina 570
 Serotransfusinum 482
 Serpatan 458
 Serpasil 458
 Serpasol 458
 Serpilum 458
 Sertan 110
 Sertensin 458
 Sertinon 587
 Serum Trunetscheky 529
 Servedasa 213
 Sevinal 258
 Shigrocin 77
 Sigetin 482
 Silubilin 7
 Silubin 7
 Simaten 411
 Simpadren 24
 Simpalon 24
 Simpatedrin 539
 Simpatol 24
 Sinan 335
 Sinapet 259, 541
 Sincaline 562
 Sincolin semplice 567
 Sinesex 321
 Sinogan 239
 Sinopen 503
 Sintrome 484
 Sintiodal 511
 Sintral 503
 Siocarbazone 517
 Siogenal 467
 Siogenon 467
 Sioren 467
 Siosteran 467
 Siqualine 258
 Sirotol 108
 Sirupus contra pertussim 485
 — Kalii iodidi 484
 — Menthae 484
 — Piperazini adipinatis 484
 Sistogram 555
 Sistonat 485
 Slovalgin 487
 Smail 243
 Sodanton 155
 Sodium amidotrizoate 84
 Sodium apolate 407
 Sodium lyapolate 407
 Solanthyl 226
 Solapsone 490
 Solasulfone 490

Solbrin 6
 Solcain 231
 Solcoseryl 488
 Solestro 583
 Solucampher 490
 Solucamphre 490
 Solufullin 153
 Solustobosan 491
 Solustin 491
 Solusulfonum 490
 Soluturmin 491
 Solutan 489
 Solutio alcalina 456
 — Ammonii caustici spirituosaaquosa 453
 — anaesthetica pro injectionibus 453
 — arsenicalis Fowleri 538
 — Camphorae chloroformiata 454
 — desinfectans 453
 — Ferri albuminatus 452
 — Iodi decolorata 454
 — — spirytiosa 1%, 2%, 3% 454
 — Kalii permanganatis 454
 — Lugoli ad usum externum N. 1—3 264
 — — — — internum N. 1—2 264
 — — glycerinosa 264
 — Mentholi spiritiosa 455
 — Natrii chloridi isotonica 455
 — — hydrocarbonatis glycerinosa 455
 — Natrii hypochlorisi Dakini 132
 — Novocaini 0,25% pro uso interno 455
 — Parfenovi 390
 — physiologica Ringeri 461
 — — Ringer-Lokk 461
 — Rubaschkini 187
 — Sinicyni 483
 — Sulfuris oleosa composita 456
 — triplex 453
 — Tyrode 518
 Solvasma 171
 Soma 486
 Somadril 486
 Somalgit 486
 Somanil 486
 Sombertol 340
 Sombrevin 491
 Sombrinal 50
 Somnesin 375
 Somnibrom 74
 Somnidon 340
 Somnil 491
 Somnomed 340
 Somnotropon 340
 Somnurol 74
 Sonaforn 568
 Sonal 340
 Sonia 243
 Sonimen 243
 Sonnornon 375
 Sophoretin 209
 Soprinol 50
 Sorbangil 370
 Sorot 135
 Soxidil 486
 Spasmamina 486
 Spasmoantasthman 492
 Spasmodinyl 492
 Spasmo-Eunalgit 493
 Spasmolyn 335
 Spasmolytin (um) 493

Spasmoveralgin 492
 Spatinox 568
 Species amarae N. 1—4 469
 — antiasthmaticae N. 1—2 475
 — carminativae N. 1—5 469
 — cholagogae N. 1—4 473
 — diaphoreticae N. 1—2 475
 — diureticae N. 1—12 474
 — laxantes N. 1—7 476
 — — Edelbergi 476
 — pectoralis N. 1—7 471
 — sedativae N. 1—4 477
 — stomachicae N. 1—7 472
 — vitaminicae N. 1—6 470
 — Zdenko N. 1—2 167
 Spectrafur 555
 Spiractin 205
 Spiritus camphoratus 494
 — Chloroformii 495
 — contra deluvium capillorum 494
 — Cucumeris 495
 — Frankovsky 551
 — kalinus Hebrae N. 1—2 110
 — Kortschagini 227
 — Lavandulae 494
 — mammalis 494
 — Mentholi N. 1—2 495
 — Miculitschl 334
 — nervinus 495
 — Preobraschensky N. 1—3 440
 — Rodovitschi 463
 — Unna 534
 Spirobismol 63
 Spirolactone 493
 Spirolang 493
 Spironolactonum 493
 Spleninum 495
 Spofadazin 500
 Spoloven 135
 Spongia haemostatica 131
 Sporostatin 130
 Stanazolone 360
 Stangyl 503
 Sta-Pas 358
 Stelasin 528
 Stellacamphre 490
 Stellarid 508
 Stellidin 122
 Stenalgil 219
 Stenediol 321
 Stenocardil 232
 Stenofosfer 530
 Stenolon 321
 Stenopir 232
 Stenosterone 321
 Stenovasan 588
 Steraq 133
 Sterazine 499
 Sterosan 467
 Steroxin 467
 Stibanose 491
 Stibatil 491
 Stilalgin 335
 Stilphostrol 550
 Stimolcardio 232
 Stoikon 18
 Stomol 496
 Stopethyl 516
 Streptasa 496
 Streptoidolum 496
 Streptoxazol 497
 Striadyne 212
 Strialgin 486
 Strictylon 360
 Stugeron 498
 Strumazol 318
 Stutgeron 498
 Stutgin 498
 Styli unguentes Monties 339
 Stylus haemostaticus N. 1—3 202
 — Iodo-Iannatum 202
 — Mentholi N. 1—2 202
 — Sinapis 201
 Styptopur 17
 Suavitil 19
 Subechollinum 498
 Subicard 581
 Sublings 322
 Substosan 112
 Succicuran 154
 Succicurariumchlorid 154
 Succimal 411
 Succinolin 154
 Succinyl-Asta 154
 Succinylcholin 154
 Succinylidicholin 154
 Succus Plantaginis 488
 Sucolin 154
 Sucostrine chloride 154
 Sugiuron 536
 Sulamin 500
 Sulfabid 431
 Sulfabutin 326
 Sulfactin 146
 Sulfa-D 499
 Sulfadiabet 75
 Sulfadiazinum 499
 Sulfadimetoxinum 499
 Sulfadiurine 142
 Sulfaduran 499
 Sulfadurazin 500
 Sulfamethopyrazine 500
 Sulfamethoxypridazin 500
 Sulfamidopyrin-natrium 19
 Sulfamipyryne 500
 Sulfaphenazol 431
 Sulfapirazid 431
 Sulfapirin 500
 Sulfaplan 499
 Sulfapyridazinum 500
 Sulfapyrimidin 499
 Sulfarest 431
 Sulfazin(um) 499
 Sulfazina 500
 Sulfdurazin 500
 Sulfetron 490
 Sulfiam 431
 Sulfolan 501
 Sulfona 143
 Sulfonmere 143
 Sulforal 431
 Sulfosinum 500
 Sulmontil 503
 Sulphadiazine 499
 Sulphamidopyrin-Natrium 19
 Sulphasalazin 500
 Sulphonazine 490
 Sulqui 540
 Sumial 179
 Summavit-10 501
 Sunoreph 501
 Superanabolon 543
 Supercort 524
 Superprednol 135

Supersulfa 499
 Supicain Amide 371
 Suppophylline 588
 Suppositoria cum extracto Belladonnae
 composita 502
 — Dermatoli composita 502
 — Ichthyoli N. 1—2 502
 — Malinowsky 307
 Suprachol 141
 Supracort 226
 Suprametil 534
 Supranil 364
 Suprastin 503
 Suprimal 6, 141
 Surgex 366
 Surmontil 503
 Surplix 174
 Suspendio Ferri pyrophosphatis 504]
 — Iodoformii 504
 — — cum Iodo 504
 — Sulfacyll cum Dicaino 503
 Sustac 505
 Sustanon-250 505
 Suxamethonium 154
 Suxameton 154
 Sux-Cert 154
 Suxilep 411
 Suxin 411
 Suxinutin 411
 Suxinyl 154
 Svavitil 19
 Sygethinum 482
 Symcoral 24
 Sycorthal 24
 Sycortol 24
 Sympadrin 24
 Sympaethamin 24
 Sympalept 24
 Sympamin 539
 Symparin 147
 Sympatedrin 589
 Sympatocain 117
 Sympathomim 24
 Sympatol 24
 Symptovas 24
 Synacur 448
 Synadren 24
 Synadrin 225
 Synalar N 483
 Synandone 483
 Synapleg 422
 Syncalton 24
 Syncoumar 484
 Syncumar 484
 Syncurin(e) 448
 Syncurol 154
 Synephrene 24
 Synergol 24
 Syngachol 141
 Syngestrotabs 439
 Synopen 503
 Synpen 503
 Synpitan 378
 Synthenate 24
 Synthex 88
 Synthomycetin 240
 Syntocain 117
 Syntocinon 378
 Syntocur 154
 Syntopherol Acetate 581
 Syntophyllin 588
 Syntubin 459
 Tabalgin 390
 Tabex 506
 Tabulettae Acidi arsenicosi obductae
 506
 — asiaticae 506
 — Blaudi N. 1—2 69
 — Bogomolnovi 70
 — Karmanovae N. 1—2 206
 — Pavlovi 386
 — Petrovi 410
 — Ringer-Lokk 461
 — stomachicae N. 1—4 506
 Tachipirina 390
 Tachmalin 10
 Tacosal 155
 Tactaran 561
 Takolin 562
 Talanton 75
 Talbin 508
 Tallan 507
 Talusin 508
 Tamponum biologicum antisepticum
 Bogomolovae et Alexandrovae 52
 Tanakan 557
 Tanidil 152
 Tansalum 508
 Tapazol 318
 Taquicurin 154
 Taractan 561
 Taras(s)an 561
 Tardil 509
 Tardosulf 431
 Taro 509
 Tauremisinum 509
 Tavegyl 507
 Taxin 172
 Tazepam 376
 Tebaten 509
 Tebalon 517
 Tebasid 517
 Tebecure 517
 Tebemar 517
 Tebemicina 570
 Tebethion 517
 Tebeuno 517
 Tebezon 517
 Tebrazid 420
 Teebacin 358
 Tefamin 588
 Tegretal 510
 Tegretol 510
 Tekodin 511
 Telepaque 187
 Teletrast 187
 Tamaril 513
 Temparin 147
 Teniarene 540
 Tenormal 422
 Tensiflex 422
 Tensoral 422
 Tensofin 258
 Tensyl 183
 Teodramin 6
 Teofene 153
 Teofyllamin 588
 Tepanil 259, 541
 Teralen 513
 Teralutil 378
 Terfluzin 528
 Terliam 132
 Terpilan 514
 Terrasol 514

Tertroxin 258
Tervalon 571
Tessalin 576
Tessalon 576
Testahomen-Depot 515
Testhormona 322
Testobromleicithum 515
Testodiol 322
Testo-Enant 516
Testoenatum 515
Testoral 322
Testoron-retard 515
Testosteron longo 515
Testosteron-Depot 515
Testosteroni oenanthas 515
— phenylpropionas 515
Testosteronphenylpropionat 515
Testoviron-Depot 515
Tetrahydrogardenal 568
Tetrahydrophenobarbital 568
Tetran-hydrocortison 377
Tetranite 581
Tetrasule 581
Tetroxin 524
Teturamum 516
Teviral 258
Thalamonal 507
Thecodinum 510
Theelin 584
Thefylan 153
Thelestrin 584
Thetykinin 584
Theminalum 511
Theoaethamin 588
Theodibaverinum 511
Theodinalum 512
Theodrox 588
Theolamine 588
Theophedrinum 512
Theophorin 408
Theophyllamin 588
Theosumman 588
Theoverinum 511
Theoxyline 379
Thepalusalum 512
Thepaphyllinum 513
Thephelidinum 516
Thephorin 408
Thephyldine 588
Theradiazine 499
Theralene 513
Thermopsis 513
Thesalbenum 514
Thesaminalum 514
Thiaben 334
Thiabendazolom 334
Thianid 587
Thiantan 149
Thlamazole 318
Thibetine 370
Thibenzole 334
Thibon 517
Thiorgan 152
Thilatazin 585
Thillocanfol 490
Thilophyllin 588
Thimethaphan-d-Camphersulfonat 39
Thioacetazonum 517
Thiocarlide 174
Thioctacid 213
Thioctan 213
Thioctsäure 213
Thioctacid 213
Thiodazin 518
Thiomucid 517
Thiooperazine 265
Thiophanium 38
Thiopropazinumbismethansulfonat 265
Thioridazin 315
Thiospasmin 518
Thiolebeziue 517
Thireotropin 518
Thiuram 516
Thiuranide 516
Thorazene 20
Thorazine 20
Thromboliquin 114
Thyalone 50
Thybon 524
Thycapzol 318
Thymolicid 517
Thyrotan 519
Tiabendazolom 334
Tiaminasi 215
Tibicin 570
Tibicur 517
Tibisan 517
Tifomicetin 240
Tinctura Allii sativi 356
— Aloës 354
— — composita 354
— — crocata 354
— amara N. 1—2 348
— Araliae 347
— Arnicae 347
— aromatica 347
— Benzoës 353
— — composita N. 1—2 353
— Berberis 348
— Calendulae 351
— Capsici 351
— Centaurii 350
— Chinae 355
— Cimicifugae dahuricae 350
— corticis Aurantii 352
— Echinopanacis elati 349
— Eucalypti 357
— Eucommiae 357
— Ferri pomati 349
— florum Aurantii 352
— fructus Aurantii 352
— gemmae Pini 355
— Ginsengi 349
— Hyperici 350
— Ipecacuanhae 353
— Lagochili 349
— Leuzeae carthamoidis 351
— Myrtilli N. 1—2 356
— Ononidis arvensis 355
— Opii crocata 351
— Rhei 352
— — amara 353
— — — vinoso 352
— Schizandrae chinensis 350
— Scutellariae 356
— Sennae composita 354
— Sophorae japonicae 355
— Sterculiae 355
— Thalictri foetidi 348
— Tormentillae 350
— Veratri 356
Tiocarlidum 174
Tiocacid 213

Tioctan 213
 Tioctidasi 213
 Tirazolo 318
 Tirian 63
 Tirogen 524
 Tiroton 524
 Tisamid 420
 Tisercin 239
 Tisomyacin 570
 Ti-Tre 524
 Tocomine 581
 Tocopherex 581
 Tocopherolo Bioglan 581
 Tocophrin 581
 Tocos 581
 Tocovigor 581
 Tofaxin 581
 Toferol 581
 Tofranil 174
 Tolansin 335
 Tolazolin 144
 Tolbugen 78
 Tolbusal 78
 Tolbutamid 78
 Tolbutol 78
 Tolhexamide 567
 Toline 144
 Tolinon 340
 Tolpal 144
 Tolseron 335
 Tolulox 335
 Tolumid 78
 Tolurasi 78
 Toluvan 78
 Tolydrin 335
 Tongevit 520
 Tonocardin 496
 Tonocholin 203
 Tonolyt 486
 Tonophos 520
 Tonormon 322
 Tonuron 561
 Tophol 571
 Tophosan 571
 Topiclyn 483
 Topilidon 231
 Torazina 20
 Torfotum 521
 Torinal 340
 Torion 369
 Tosmilen 521
 Tossilamina 5
 Totosulfa 431
 Toxapin 519
 Toxivers 419
 Tralgon 390
 Trancin 258
 Trancocard 232
 Tranquilan 561
 Tranquilate 317
 Tranquillactin 19
 Tranquilline 19
 Tranquirit 81
 Traquilan 561
 Trasentin 493
 Trasycor 521
 Trasylol 522
 Travamine 6
 Travelin 6
 Travelmin 6
 Travelon 141
 Traxal 561

Trazicor 521
 Trecator 587
 Tredemine 510
 Tremin 568
 Trepoquinol 93
 Trescatyl 587
 Tretaminum 523
 Trevintix 450
 Triadenyl 212
 Triäthylenmelamin 523
 Trialafan 585
 Trialona 524
 Triamcimetil 136
 Triamcinolon 523
 Triamcort 524
 Triamelin 523
 Triamteren 132
 Triantoin 468
 Triaren 132
 Tribenozid 123
 Tribiofosfor 212
 Trichazol 324
 Trichex 324
 Trichocid 369
 Trichopol 324
 Trichoral 369
 Tricocet 324
 Tricom 324
 Tricoryl 370
 Tricosteril 369
 Tricowas B 324
 Trictal 561
 Tricuram 459
 Triesifenidile 568
 Triethanomelamine 523
 Triethylene Melamine 523
 Trifluoperazine 528
 Trifosfodin 212
 Trifluoroperazine 528
 Trifosyl 212
 Triftazinum 527
 Trigamma 369
 Trihexyphenidylhydrochlorid 568
 Triiodina 182
 Triiodthyronin 524
 Triiotrastum 524
 Trijoden 524
 Trilafan 585
 Trimanyl 156
 Trimecaini hydrochloridum 525
 Trimecainum 525
 Trimeprazine 513
 Trimeprimin 503
 Trimeproprimum 503
 Trimetaphancamsilat 38
 Trimethidinummethosulfat 193
 Trimetozinum 525
 Trimipraminum 503
 Trinex 369
 Trinuride 140
 Trijodina 182
 Triognost 84
 Triomin 585
 Trionine 524
 Triopac 524
 Triospan 525
 Triothyronone 524
 Trioxazin 525
 Triphenydil 568
 Triphosaden 212
 Triphosadenine 212
 Triphosphodine 212

- Triptazine 528
 Tripsimusk 526
 Triptyl 526
 Trisalin «mite» 526
 — «forte» 527
 Trisedyl 527
 Trispan 132
 Trisulfan 527
 Trithyrone 258
 Triumbren 254
 Triurool 524
 Triuropan 524
 Trivazol 324
 Trochisci Valdi 82
 Trocurin 554
 Troformone 322
 Trombarin 363
 Trombex 363
 Trombolysan 363
 Trombosan 147
 Trombostop 484
 Tromexan 363
 Tropaphenum 529
 Troparin 528
 — et Phenobarbitalum 528
 Trophil 37
 Tropodifen 529
 Truxil 561
 Truxol 561
 Tryptanol 526
 Tryptizol 526
 Tsalol 522
 Tubadil 529
 Tubarine 529
 Tubercazon 517
 Tubersan 420
 Tubocain 117
 Tubocuran 529
 d-Tubocurarinchlorid 529
 Tubocurarin chloridum 529
 Tubocurin 529
 Tubopas 358
 Tulyl 108
 Tyjodin 524
 Tylenol 390
 Tylinal 259
 Typhomycin 240
 Tyrimid(e) 174

 Ubretid 530
 Ucediazine 499
 Udolac 143
 Ulcostidine 122
 Ultrapal 154
 Ultrasulfan 499
 Umbradil 205
 Umbragnost 205
 Umbralon 205
 Umelargil 20
 Unazid 155
 Undevit 531
 Unguentum Acidi acetici benzoatum
 301
 — — — sulfuratum 301
 — — — borici N. 1—5 268
 — — — et Bismuthi subnitratris N.
 1—2 268
 — — — Listeri N. 1—2 259
 — — — — molle 260
 — — — salicylatum 269
 — — — lactici salicylatum 283
 — — — salicylici lacticum 292

 Unguentum Acidi salicylici menthola-
 tum N. 1—2 291
 — — — naphthalanatum 292
 — — — terebinthinatum N. 1—2
 292
 — Aethacridini (Rivanoli) 306
 — album 267
 — alcalinum 305
 — — ophthalmicum 305
 — — compositum 306
 — Alsoli 266
 — Aluminium boratum 266
 — anaestheticum N. 1—2 266
 — Andriasjani 28
 — antiphelidicum Hebrae 109
 — Arievitschi 36
 — Argenti nitratis 295
 — Autoli N. 1—2 266
 — Baum-Bengee 71
 — Belladonnae 278
 — — cum Opio 279
 — Benzylpenicillini-Kalii 267
 — Betanaphtholi compositum N. 1—2
 285
 — Bismuthi compositum 269
 — — subnitratris N. 1—2 269
 — — — zincatum 269
 — Breslawsky 72
 — Camphorae cum oleo Terebinthinae
 277
 — Camphorae cum Terebinthino—277
 — camphoratum — 277
 — Capsici compositum — 286
 — Cerussae — 237
 — Cetacei N. 1—4 — 298
 — — compositum — 298
 — Chloroformii N. 1—3 — 303
 — Chlortetracyclini ophthalmicum —
 303
 — Cinchopheni compositum — 304
 — Cinchopheni Gordeevi — 129
 — Citrali 305
 — Colchamini 278
 — Collargoli 277
 — contra scabiem Herbae 109
 — Crede 229
 — Darie 132
 — defendens 274
 — Dermatoli 272
 — diachylon 273
 — Dibiomycini ophthalmicum 273
 — Djakovii 159
 — Dlussky 155
 — domesticum 273
 — Erythromycini 306
 — exsiccans Selissky 79
 — Ferri chloridi 299
 — Fillimonovi 546
 — Formalini 302
 — Furacilini 302
 — — cum oleo Ricini 302
 — Glycerini 270
 — Guljani 131
 — Heliomycini 270
 — Heparini 270
 — Hydrargyri amidochloridi N. 1—3
 287
 — — — camphoratum 288
 — — — compositum N. 1—2 289
 — — — cum Bismuthi subnitrate N.
 1—2 288
 — — — labiale 288

Unguentum Hydrargyri chloridi cum
 Bismuthi subnitrate 276
 — — cinereum 290
 — — concentratum 290
 — — oxydi flavi N. 1—3 289
 — — — compositum N. 1—2 290
 — — — piceatum 290
 — Hydrocortisoni 270
 — Ichthyoli 274
 — — benzoatum 275
 — — compositum N. 1—3 274
 — — naphthalanatum 275
 — Insulini 274
 — Iodi N. 1—2 275
 — — compositum 275
 — Iodoformii 276
 — — compositum 276
 — Jasseri 590
 — Juglandis 271
 — Juniperi N. 1—2 282
 — — compositum 283
 — Kalii bromidi 269
 — — iodidi 296
 — — cum Natrii thiosulfate N.
 1—2 297
 — — flavum 296
 — Kaolini 277
 — Konkovi basicum 221
 — — cum Benzylpenicillino 222
 — — — Ichthyolo 222
 — — — Pixo 221
 — — — Synthomycino 222
 — Kovtunovitschi 215
 — Lanolini N. 1—4 279
 — leniens 217
 — Lubnevi 263
 — Lukjanovi 262
 — Lunini 262
 — Mentholi N. 1—2 280
 — — compositum N. 1—6 280
 — — cum Bismuthi subnitrate 281
 — — cum Ephedrino 282
 — — — Methylis salicylate 281
 — — protargolicum 281
 — Methylis salicylatis 282
 — — compositum 282
 — Miculitschi 334
 — — molle 283
 — Monkevitschi 339
 — Mozschevelini 338
 — Naphthalani 283
 — — compositum N. 1—3 283
 — — cum Natrii stearate N. 1—2 284
 — — salicylatum 284
 — — sulfuratum 284
 — Nikolaevi N. 1—3 367
 — Nystatini 285
 — Oestroni 306
 — olei Cacao 276
 — — jecoris Aselli 291
 — — Terebinthinae N. 1—2 297
 — — compositum 297
 — Olivomycini 285
 — Oxolini 286
 — Oxytetracyclini ophthalmicum
 285
 — Paraffini 286
 — Penicillini Selissky 480
 — Phenoli N. 1—2 302
 — Picis liquidae 271
 — — compositum N. 1—3 271
 — — — saponatum 272

Unguentum Picis liquidae sulfuratum
 272
 — — — zincatum 272
 — — Plumbi N. 1—3 292
 — — benzoatum 293
 — — compositum 293
 — — cum extracto Belladonnae 293
 — — — tinctura Opii 293
 — — phenolatum 294
 — — tannicum N. 1—3 294
 — — Unna 533
 — — zincatum 294
 — Polymyxini 287
 — pomadium N. 1—2 278
 — Populi 301
 — Prednisoloni 287
 — Preobrazensky 501
 — Pyrogalloli compositum Unna 533
 — repellens N. 1—2 287
 — Resorcini compositum Unna 533
 — Rybacovi 466
 — — salicylatum N. 1—2 291
 — — Selissky 479
 — — Simanovsky 483
 — — Spongillae fluviatilis 268
 — — Streptocidi 298
 — — Sulfacyli 298
 — — sulfurato-tannatum 296
 — — sulfuratum N. 1—2 295
 — — — compositum N. 1—3 295
 — — Tannini 299
 — — compositum 299
 — — sulfuratum 299
 — — tegans Selissky N. 1—2 479
 — — Terebinthinae 300
 — — compositum N. 1—2 300
 — — Thymoli N. 1—2 300
 — — compositum 300
 — — undecylenicum 301
 — — Vojatscheky 103
 — — Wilkinsoni N. 1—4 88
 — — Wilsoni 89
 — — Woli 101
 — — Xeroformii ophthalmicum 279
 — — — zincatum 279
 — — Zinci N. 1—4 304
 — — — cum Cupri sulfate 304
 — — sulfuratum 304
 Unguetolum 531
 Unidigin 145
 Unifur 555
 Unilobin 261
 Union 531
 Unistradiolum 583
 Unisulfa 500
 Unithiolum 532
 Upiol 74
 Urbason 534
 Ureaplastum 534
 Urelin 585
 Uridognost 536
 Uridoxyl 419
 Urinex 561
 Uriodone 205
 Urizanol 230
 Urobessalolum 535
 Urocarmin 536
 Uro-Coli 373
 Urodanum 535
 Urodiazin 155
 Urodonal 535
 Urofene 571

Uroflux 561
 Urofurin 554
 Urognost 205
 Urograf 205
 Urografin 84
 Urografin B 536
 Urolisa 554
 Urosalum 536
 Uroselectan B 536
 Urospect 524
 Urotrast 536
 Urovison 84
 Urumbrin 536
 Ustimon 155
 Utedrin 378
 Uteracon 378
 Uterol 439
 Uterotonyl 439
 Util 375
 Uvaleral 74

Vadalan 561
 Vagifuran 554
 Vagospasmyl 493
 Valamina 258
 Valbine 511
 Valecor 225
 Valedrin 80
 Valentosalum 81
 Validolum 81
 Vallium 81
 Valladan 19
 Vallergeran 513
 Vallergerin 152
 Valobroom 74
 Valocordin 223
 Valosedan Spofa 82
 Valural 74
 Valurea 74
 Vanabol 321
 Vanilone 567
 Vapedrine 539
 Varialgil 513
 Varicocid 83
 Vasalgin 78
 Vascardyne 24
 Vasculat 48
 Vasculit 48
 Vaselinum aromaticum 79
 — carbolisatum 79
 — lanolinatum 79
 — thymolatum 79
 Vasidin 144
 Vasimid 144
 Vasiodone 205
 Vasocaine 231
 Vasocon-Regular 360
 Vasocor 581
 Vasocordin 24
 Vasodex 136
 Vasodiatol 581
 Vasodil 144
 Vasodilatant 144
 Vasodilatant 144
 Vasogenum Ichthyoli 80
 — iodatum 80
 — liquidum 79
 Vasolan 174
 Vasolastin 80
 Vasolimentum 79
 — Ichthyoli 80

Vasolimentum iodatum 80
 Vasomed 370
 Vasophylline 588
 Vasoton 24
 Vasserina 570
 Vastosulfa 499
 Vedrin 219
 Vegantil 493
 Vegantim 493
 Vegantofen 83
 Velmol 150
 Venapiolinum 84
 Ventussin 576
 Veractil 239
 Veralgin 84
 Verapamilhydrochlorid 174
 Veratrylhydrazinhydrochlorid 85
 Vermicompren 419
 Vermilass 420
 Vermitin 540
 Vermitox 420
 Vermofrik 420
 Verobroman 74
 Verodonum 85
 Verografin 84
 Verol 85
 Verospiron 493
 Vertirosan 6
 Verzina 420
 Vesamin 524
 Vespazin 258
 Vetacalm 561
 Velidrex 155
 Vetocain 117
 Vetrazinum 85
 Viadril 86
 Viansin 243
 Vibiasi 215
 Vicairum 87
 Vicalinum 87
 Vicedrin 95
 Viceinum 96
 Videinum 86
 Videx 87
 Vi-Etal 581
 Viforflax 150
 Vikasolum 83
 Vimabil 367
 Vinblastin 89
 Vincaminum 89
 Vincapan 90
 Vincristin 90
 Vinisil 112
 Vioform 579
 Viofural 555
 Viophan 571
 Viopsicol 243
 Vitil 422
 Vitazol 579
 Viparctin 91
 Viperalgin 92
 Vipraxinum 92
 Virapin 92
 Vironil 65
 Virugon 65
 Virusimin 65
 Virustat 65
 Viscoisol 205
 Visotrast 84
 Visumetazone 136
 Visumiotic 521
 Visutensil 379

Vitablon 93
Vitalcalcin 94
Vitochlorcyclin 94
Vitalen N. 1-4 93
Vitamin B₁₃ 189
Vitamin K₁ 195
Vitaneurina 215
Vitaplex K 88
Vitasedin 94
Viteolin 581
Vitohepatum 95
Vitoxycyclin 95
VND-6 97
Volocid 500
Volon 524
Vomex A 6
Vomidrine 6
Vomisseis 141
Vontil 265
Voyal 6
Vulnusan 103

Wandervit E 581
Wasangor 225
Wasserina 570
Welfurin 554
Wintermin 20
Wintetil 240
Wintomylon 360
Wintradine 499
Wofapas 358
Wofapyrin 420
Wurmex 420
Wyacort 534

Xamamina 6
Xanthinolnicinate 219
Xantinolnicotinat 219
Xenytropimbromid 107
Xilina 231
Xumbradil 205
Xycalnum 231
Xylesin 231
Xyllitum 231
Xylomethazolinhydrochlorid 104
Xyloton 231
Xylotox 231

Yadalan 561
Yodopalina 295
Yodorgan 182
Yoduron 225
δ-Yohimbin 183
Yohimbin 183
Yohimvetol 183
Yomesan 540
Yosichol 377
Yosulan 75
Yrigratub 84

Zarondan 411
Zarontin 411
Zartalin 411
Zentraleptin 57
Zentropil 155
Zetrax 87
Zidatin 420
Zinamide 420
Zincundanum 570
Zoosteran 467

ИСААК ВЛАДИМИРОВИЧ ВОЛКИНД,
ИСААК ЯКОВЛЕВИЧ ГУРЕВИЧ,
ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ УРЮПОВ

**РЕЦЕПТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК
ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ФАРМАЦЕВТОВ**

*Редактор А. Д. Кочанов
Художественный редактор А. И. Приймак
Переплет художника Т. И. Кофьян
Технический редактор Л. И. Данилова
Корректор Р. И. Гольдина*

Сдано в набор 2/II 1976 г. Подписано к печати 28/V 1976 г. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бум. л. 10,125. Печ. л. 20,25. Уч.-изд. л. 34,91. Усл. л. 34,02. ЛС-03. М-18736. Заказ № 433. Тираж 140 000 экз. Цена 1 р. 91 к. Бумага типографская № 3.

Ленинград, «Медицина», Ленинградское отделение.
192104, Ленинград, ул. Некрасова, д. 10.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.